

2021 年临床助理医师真题及答案

1.27 岁经产妇,妊娠 39 周,双胎妊娠。第一儿枕先露自然分娩,第二儿间隔 8 分钟臀助产娩出,历经 10 分钟娩出胎盘,随后阴道流血量达 600ml,最有可能的诊断是

- A.副胎盘残留
- B.胎盘残留
- C.子宫收缩乏力
- D.宫颈裂伤
- E.凝血功能障碍

答案：C

2.维生素 D 缺乏性佝偻病最早出现的骨骼改变是

- A.肋骨串珠
- B."O"形腿
- C.手镯、足镯
- D.方颅

E. 颅骨软化

答案：E

解析：用手指按在 3-6 个月患儿的枕骨及顶骨部位，感觉颅骨内陷，随手放松而弹回，称乒乓球征。8-9 个月以上的患儿头颅常呈方形，前囟大及闭合延迟，严重者 18 个月时前囟尚未闭合。两侧肋骨与肋软骨交界处膨大如珠子，称肋串珠。胸骨中部向前突出形似“鸡胸”，或下陷成“漏斗胸”，胸廓下缘向外起为“肋缘外翻”；脊柱后突、侧突；会站走的小儿两腿会形成向内或向外弯曲畸形，即“o”型或“x”型腿。患儿的肌肉韧带松弛无力，因腹部肌肉软弱而使腹部膨大，平卧时呈“蛙状腹”，因四肢肌肉无力学会坐站走的年龄都较晚，因两腿力容易摔跤。出牙较迟，牙齿不整齐，容易发生龋齿。大脑皮质功能异常，条件反射形成缓慢，患儿表情淡漠，语言发育迟缓，免疫力低下，易并发感染、贫血。

3. 两样本均数比较的 t 检验，差别有统计学意义时，P 越小，说明

A. 越有理由认为两总体均数的差别很大

B. 越有理由认为两总数均数不同

C. 两总体均数的差别越大

D. 两总体均数的差别不大

E. 越有理由认为两样本均数不同

答案:B

4.全身强直-阵挛性发作和失神发作合并发生时,药物治疗首选

A.地西洋(安定)

B.乙琥胺

C.苯妥英钠

D.苯巴比妥

E.丙戊酸钠

答案：E

解析:部分性发作和部分性继发全身性首选药—卡马西平。全身强直-阵挛性发作—丙戊酸钠。

强直性发作—卡马西平。阵挛性发作—丙戊酸钠。典型失神、肌阵挛发作—丙戊酸钠。非典型

失神发作——乙琥胺或丙戊酸钠。因此 E 为正确答案。

5.肝功能减退的体征。

6.男,28岁。少尿、水肿、呕吐1个月余,7岁时曾发现尿蛋白阳性。血压180/120mmHg,尿蛋白(+++),红细胞5-10/HP,白细胞3-5/HP,BUN为30mmol/L,血酐860μmol/L,血红蛋白65g/L,初步诊断为

- A.急性肾小球肾炎
- B.慢性肾小球肾炎,肾功能不全
- C.肾病综合征
- D.慢性肾盂肾炎,肾功能不全
- E.高血压病3级

答案：B

7.呼吸衰竭的分型

8.急性重型溃疡结首选的治疗药物是

9.一型呼吸和二型呼吸衰竭指标

10.甲状腺危象和甲状旁腺。非肾源性的终末血尿

11.损伤性血胸血不凝办什么

12.烟草成瘾选啥?尼古丁

13.慢性肾脏病 V 期最常出现的电解质紊乱是

14.预防接种资料保留五年

15.与甲状腺髓样癌有关的激素是

A.甲状腺素

B.促甲状腺素

C.降钙素

D.促甲状腺激素释放激素

E.胰高血糖素

答案：C

16.在烟草烟雾中,使红细胞失去携氧能力的物质是

A 烟酸

B 尼古丁

C 苯并芘

D.焦油

E.一氧化碳

17.肺性脑病的意识障碍

18.考点：气胸肺部压缩 $<10\%$

答案：保守治疗、观察

19.COPD 急性加重常见致病菌是

答案：肺炎链球菌

20.1 型呼吸衰竭的诊断标准

答案： $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$,不伴有 $\text{PaCO}_2 > 50\text{mmHg}$

21.2 型呼吸衰的诊断标准

答案： $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$,伴有 $\text{PaCO}_2 > 50\text{mmHg}$

22.按摩颈动脉导致心率减低的机制是

答案：迷走神经兴奋

23.一个人情绪低落，想自杀，吃药的机制是

答案：抑制 5-羟色胺的再摄取

24.男,57 岁,肠梗阻切除小肠 105cm,需要补充的是

答案：维生素 B12

25.儿童,10岁,游走性关节痛,心悸、呼吸困难、 $T36.5^{\circ}\text{C}$,BP90/60mmHg,双肺湿音,死亡。尸检发现,二尖瓣肿胀,有赘生物,诊断是

答案：风湿性瓣膜病

26.感染日本血吸虫病理变化是

答案：肉芽肿炎

27.肾功能衰竭会引起哪个离子降低是

答案：高血磷、低 Ca^{2+}

28.对乙酰氨基酚治疗感冒还是类风湿关节炎

29.容易引起 II 型呼衰加重的药物是

A.呼吸兴奋剂

B.袪利尿剂

C.强心剂

D.镇静剂

E.血管扩张剂

答案：D

30.肾结核最具有特征的临床表现是

A.腰痛

B.发热伴盗汗

C.肉眼血尿

D.慢性膀胱刺激症状

E.消瘦

答案：D

31.咳嗽，咳浓痰，问不适宜的治疗措施是

32.膀胱癌最常见的组织类型

33.胃癌最常见的转移部位

34.肾综合征大量利尿后使用利尿剂电解质变化

35.吸烟，哪种物质会影响血红蛋白

答案：CO

36.冬季→中毒

答案：CO 中毒

37.甲状腺术后损伤到甲状旁腺表现是

答案：口周麻木,四肢抽搐

38.胆囊炎检查是

答案：B 超

39.胆囊炎的治疗是

答案：手术切除

40.上部隐痛 2 月余,近期体重无变化,饥饿痛,大便潜血阳性

答案：诊断是十二指肠溃疡

41.共用题干题：

小孩、阑尾炎术后、肛门停止排便、排气+液气平面,诊断是

(1)导致此疾病病因是

答案：手术导致

(2)诊断是

答案：黏连性肠梗阻

42.急性乳腺炎有波动感

答案：切开引流

43.男,30 岁,被枪弹击伤上臂中段,体检:垂腕,各手指不能伸直,拇指、食指、中指背侧麻木,肘关节屈伸活动正常。X 线示:肱骨中段见 1 个弹头形状的金属异物,骨质未见断裂。其最可能的神经损伤是

A.桡神经

B.正中神经

C.尺神经

D.臂丛神经

E.以上皆不正确

答案：A

44.男,28 岁。因左上腹肿块进行性肿大就诊。查体肝肋下 2cm,脾肋下 4cm。实验室检查:血红蛋白 140g/L,白细胞 $120 \times 10^9/L$,血小板 $360 \times 10^9/L$ 。本里最可能诊断为

A.肝硬化脾功能亢进

B.急性粒细胞白血病

C.慢性粒细胞白血病

D.类白血病反应

E.骨髓纤维化

答案：C

45.应用全胃肠外营养时,氮和热量之比应为

A.1:50~80Kcal

B.1:100~120Kcal

C.1:150~200Kcal

D.1:210~240Kcal

E.1:250Kcal 以上

答案:C

46.下列乙肝病毒标记物中反映 HBV 有活动性复制和传染性的是

A.表面抗原(HBsAg)

B.表面抗体(抗-HBs)

C.e 抗原(HBeAg)

D.e 抗体(抗-HBe)

E.核心抗体(抗-HBc)

答案：C

47.女,50 岁。掌指和腕关节反复肿痛 2 年余,近 1 个月病情加重,晨起时出现关节僵硬,活动后可缓解。首先考虑的诊断是

A.风湿性关节炎

B.痛风

C.强直性脊柱炎

D.骨关节炎

E.类风湿关节炎

答案:E

48.某山区一妇女育有 3 个子女,生活贫困,长期从事重体力劳动,近期感觉头晕,乏力,腿部水肿,去医院检查:血清白蛋白 28g/L,铁蛋白 20 ug/L,建议该妇女应多吃

A.绿色蔬菜

B.白面

C.大豆及其制品

D.红薯

E.大米

49.高血压可引起左室心肌细胞

A.再生

B.化生

C.肥大

D.增生

E.变性

50.以下各项中不适合采取一级预防的是

A.糖尿病

B.病因不明确疾病

C.脑卒中

D.职业病

E.心血管疾病