

临床执业/助理医师高频必考点合集

1. 《献血法》规定，国家提倡健康公民自愿献血的年龄是 18 周岁至 55 周岁。
2. 《执业医师法》规定对考核不合格的医师，卫生行政部门可以责令其暂停执业活动，并接受培训和继续医学教育，暂停期限是 3 个月至 6 个月。
3. 1-2 岁幼儿 1 年中身高约增长 10-12cm。
4. 最易完全再生修复的组织是 上皮组织。
5. 1 岁以内婴儿基础代谢，每日每千克约需 55kcal。
6. 3-6 个月婴儿维生素 D 缺乏性佝偻病激期骨骼改变最常见的表现为 颅骨软化。
7. 丙酸睾酮治疗子宫肌瘤的每月总量不应超过 300mg。
8. 补钾速度一般每小时不宜超过 20mmol/L。
9. 残胃癌发生在因良性病变施行胃大部分切除术后 至少 5 年。
10. 产后出血是指阴道流血量在胎儿分娩后 24 小时内超过 500ml。
11. 成年患者因失血致意识模糊，血压测不到，估计失血量 >1600ml。
12. 成人急性血吸虫病患者，采用此峰酮治疗其总剂量为 每千克体重 120mg。
13. 成人双手占体表面积的 5%。
14. 成人右手占体表面积的 2.5%。
15. 出生后第一年身高增长约 25cm。
16. 出生时新生儿的头围约 34cm。
17. 初产妇第一产程 活跃期停滞是指进入活跃期后宫口不再扩张超过 2 小时
18. 初产妇第一产程 活跃期延长是指活跃期超过 8 小时。
19. 初次感结核，产生变态反应的时间为 4-8 周。
20. 存在于核酸分子中的碱基有 5 种。
21. 单侧隐睾手术治疗应在 2 岁以前。
22. 短时记忆储存时的信息量为 7±2。
23. 短暂性脑缺血发作(TIA)，出现相应的症状及体征，完全恢复最长应在 24 小时。
24. 儿童期出现甲状腺结节的恶性率为 50%。
25. 肝脏的血液供应来自静脉的约占 70%-75%。
26. 高血压合并糖尿病患者，血压应控制在小于 130/80mmHg。
27. 各种补铁成分浓度达到成人水平的年龄是 5 个月。
28. 宫内妊娠时孕妇血清绒毛膜促性腺激素最高峰出现在 8-10 周。
29. 骨巨细胞瘤的好发年龄是 21-30 岁。
30. 骨折愈合过程中血肿机化演进期的完成时间是 2 周。
31. 患者死亡，医患双方当事人不能确定死因或者对死因有异议的，应当尸检。当地不具备尸体冻存条件时，尸检的期限是在患者死亡后 48 小时内进行。
32. 急性肺脓肿抗菌治疗的疗程是 6-8 周。
33. 急性肾功能衰竭少尿期结束的标志，是指 24 小时尿量至少增加至 500ml。
34. 急性肾小球肾炎患者，当蛋白尿大于 1g/d 时，血压控制的理想水平是 125/75mmHg 以下。
35. 急性胰腺炎假性囊肿形成的时间一般是病后 3 到 4 周。
36. 甲亢术后呼吸困难发生于术后 48 小时以内。
37. 将每日代谢所产生的大约 600mmol/L 的溶质(废物)完全溶解排出，需要的尿量至少是 500ml。
38. 惊厥性全身癫痫持续状态必须快速控制发作，并保持不再复发的时间至少为 24 小时。
39. 惊厥性全身癫痫持续状态静脉注射苯妥英钠时，每 1-2 分钟注射速度最多不应大于 50mg。



40. 胫骨结节骨软化好发年龄是 12-14 岁。
41. 卡介苗接种后所致结核菌阳性反应是指 硬结直径 5-9mm, 3-5 天后反应消失。
42. 卵子由卵巢排出后未受精, 黄体开始萎缩是在排卵后的 9-10 天。
43. 麻疹出疹一般在发热后 3-4 天。
44. 麻疹合并肺炎者应隔离至出疹后 10 天。
45. 慢性肾衰竭失代偿期是指 GFR (肾小球滤过率) 的范围是 20-50ml/min。
46. 每 100kcal 热量的混合膳食产生的内生水是 12ml。
47. 每毫升 11.2% 乳酸钠含 $\text{HCO}_3^-1.0\text{mmol}$ 。
48. 判断休克以纠正除血压正常外, 尿量每小时至少应稳定在 30ml 以上。
49. 胚胎期是指受孕后的 8 周以内。
50. 乳酸脱氢酶同工酶有 5 种。
51. 神经胶质瘤占全部颅内肿瘤的 40%-50%。
52. 生物-心理-社会医学模式建立在 20 世纪的 70 年代。
53. 食物中每克碳水化合物、脂肪和蛋白质可供能量(kcal) 分别为 4、9、4。
54. 手部伤口清创处理, 一般不迟于 8 小时。
55. 手术患者从术前 12 小时禁食, 4 小时禁水是为了 防止麻醉或手术中呕吐。
56. 受血者配血试验的标本必须是 输血前 3 天之内。
57. 糖尿病的诊断是糖尿病症状加上随机血糖 $\geq 11.1\text{mmol/L}$ 。
58. 通常三环类抗抑郁药物的每天治疗剂量为 150-300mg。
59. 头皮裂伤清创的最佳时限, 最迟应在 24 小时内。
60. 完全性葡萄胎的恶变率, 国内外报道有异, 我国为 14.5%。
61. 我国卫生部规定, 一名供精者的精子最多只能供给 5 名 孕妇受孕。
62. 小儿初次感染结核菌至产生变态反应的时间是 4-8 周。
63. 小儿腹泻发病率高的年龄组是 6 个月-2 岁。
64. 小儿急性肾小球肾炎起病前常有皮肤感染, 其前驱期多为 2-3 周。
65. 小儿末梢血中性粒细胞和淋巴细胞的比例相等的时间分别是 4-6 天和 4-6 岁。
66. 广泛的下肢深静脉血栓形成最严重的并发症为 肺栓塞。
67. 小儿胸围与头围相等的年龄是在 1 岁。
68. 心房颤动患者服用华法林, 凝血酶原时间的国际标准化率(INR) 应控制在 2.0-3.0mg。
69. 心脏病孕妇容易发生心衰的时期是好娠 32-34 周。
70. 新生儿溶血病换血治疗的指征, 血清胆红素在足月儿至少应大于 15mg/dl。
71. 新生儿溶血症的换血量约为婴儿全血量的 2 倍。
72. 正常足月婴儿生后第 1 个月体重逐渐增加可达 1-1.7kg, 生后 3-4 个月体重约等于出生时体重的 2 倍。
73. 猩红热出现皮疹多在发热后 12-48 小时。
74. 迅速出血后出现休克症状, 表明至少已丢失全身血量的 20%。
75. 严重冠状动脉狭窄程度达 70%以上。
76. 医疗机构对其医疗废物暂时的储存时间不得超过 2 天。
77. 因抢救危急患者, 未能及时书写病历的, 有关医务人员应当在抢救结束后据实补记, 并加以注明, 其时限是 6 小时内。
78. 应用全胃肠外营养时, 氮和热量之比应为 1:(150-200) kcal。
79. 婴儿从母体获得的抗体开始消失的月龄是 5-6 个月以后。
80. 婴儿每日水的需求量是 150ml/kg。
81. 婴儿尿少的标准是每日尿量少于 200ml。



82. 原始骨痂形成一般需要 4-8 周。
83. 推算预产期(EDC):按末次月经(LMP)第 1 日算起,月份减 3 或加 9 日数加 7。
84. 孕 40 周新生儿,出生时由口鼻排出肺内液体,其余经血管及淋巴管吸收的肺叶约为 2/3。
85. 孕妇开始知觉胎动的时间是妊娠 18-20 周。
86. 孕妇血清绒毛膜促性腺激素(HCG)浓度达高峰是在妊娠 8-10 周。
87. 早产儿的胎龄是 >28 周至足周。
88. 早产儿使用铁剂预防贫血起始的月龄是 2 个月。
89. 诊断成年女性贫血的标准为血红蛋白浓度低于 110g/L。
90. 正常儿童新鲜尿沉渣镜检时,每高倍视野下红细胞应少于 3 个。
91. 正常人脑脊液中糖的最低含量为 2.5mmol/L。
92. 正常妊娠 38 周时的羊水量约为 1000ml。
93. 正常新生儿后闭合的时间一般于出生后 6-8 周。
94. 伤寒最严重的并发症是 肠穿孔。
95. 左心衰竭最早出现的症状是 劳力性呼吸困难。
96. 治疗等渗性脱水理想的液体是 平衡盐溶液。
97. 智力发展的关键期在 7 岁前。
98. 智商 IQ 的结论高于平常,是指其分数为 110-119。
99. 中毒型细菌性痢疾多见于 2-7 岁体格健壮的小儿。
100. 中度营养不良患儿调整饮食,每日开始供给的热量应是 40kcal/kg。
101. 最常见的子宫内膜异位症病灶部位是 卵巢。
102. 最常见的子宫肌瘤类型是 肌壁间肌瘤。
103. 足月儿生后第一时间内呼吸频率是 60-80 次/分。
104. 足月妊娠时得羊水量约为 800ml。
105. 足月妊娠时的胎心率正常值应是每分钟 120-150 次。
106. 最常见的肾盂肾炎病原菌是 大肠埃希菌。
107. 工型呼吸衰竭最常见的病因是 慢性阻塞性肺疾病。
108. B 细胞表面最重要的标志为 SmIg。
109. Felty 综合征引起的中性粒细胞减少的最可能机制是 免疫性破坏过多。
110. Graves 病最重要的体征是 弥漫性甲状腺肿大伴血管杂音。
111. 癌前病变最确切的概念是有癌变潜在可能的 良性病变、有可能逆转。
112. 艾滋病患者肺部机会性感染最常见的病原体是 肺孢子虫。
113. 膀胱癌在病理上最重要的是 分化程度。
114. 膀胱癌最常见的组织类型是 移行细胞癌。
115. 肠结核最好发的部位是 回盲部。
116. 成人呼吸窘迫综合征(ARDS)的最重要的诊断依据是 会吸频率增加,每分钟大于 28 次。
117. 除有关节肿痛外,对类风湿关节炎诊断最有意义的表现是关节隆起部与受压部皮下出现 无痛性结节。
118. 触诊时语音振颤增强最常见于 大叶性肺炎。
119. 传播病毒危险性最大的血液成分是 血浆。
120. 雌激素受体阳性的乳癌在根治术后最常见的激素治疗方法是 口服三苯氧胺(他莫昔芬)。
121. 大多数情况下,继发性腹膜炎最主要的治疗方法是 手术治疗。
122. 单纯性睾丸鞘膜积液最可靠的诊断依据是 透光试验阳性。
123. 蛋白质-热能营养不良小儿最先出现的症状是 体重不增。
124. 最常见的女性生殖器结核为 输卵管结核。



125. 导致肺水肿最直接的原因是肺静脉压升高。
126. 导致阑尾穿孔最主要的因素是阑尾腔阻塞。
127. 低钾血症时最常见的临床表现是肌乏力。
128. 典型霍乱患者，发病最先出现的症状是剧烈腹泻，继之呕吐。
129. 对 Crohn 病最有诊断意义的病理改变是肠壁非干酪性上皮样肉芽肿。
130. 对出血坏死型胰腺炎最具诊断价值的是血钙降低。
131. 对放射治疗最敏感的卵巢恶性肿瘤是无性细胞瘤。
132. 最常见的卵巢肿瘤并发症是蒂扭转。
133. 对肝癌的临床诊断最常见的早期症状是刺激性咳嗽、血痰。
134. 对鉴别肾小球源性血尿最有意义的是变形红细胞血尿。
135. 对结核性腹膜炎最有诊断价值的检查室腹腔镜检查+腹膜活检。
136. 对慢性疾病进行现况调查，最适宜计算的指标为患病率。
137. 对铜绿假单胞菌（绿脓杆菌）作用最强的氨基苷类抗生素是妥布霉素。
138. 对药物治疗无效的反复发作的室性心动过速/心室颤动的心力衰竭患者，最适宜的治疗为植入心脏转复除颤器。
139. 对原发性肝癌早起诊断最有价值的是甲胎蛋白测定。
140. 对原发性慢性肾上腺皮质功能减退症的诊断最有意义的血检结果是皮质醇下降。
141. 对诊断肥厚性梗阻型心肌病最有意义的是超声心动图发现舒张期室间隔与左室后壁厚度之比 >1.3 ，伴二尖瓣前叶收缩期向前运动。
142. 对诊断慢性肾盂肾炎最有意义的是肾小管功能持续性损害。
143. 多根多处肋骨骨折患者，最典型的症状和体征是反常呼吸运动。
144. 恶性程度最高的乳癌类型是炎性乳癌。
145. 恶性程度最高的体表肿瘤是恶性黑色素瘤。
146. 发现早起直肠癌最有意义的方法是直肠镜。
147. 法洛四联症最早出现的临床表现是口唇青紫。
148. 肺结核类型中，传染性最强的是慢性纤维空洞性肺结核。
149. 肺心病患者出现心室颤动、心脏骤停以致突然死亡最常见的原因是急性严重心肌缺氧。
150. 风湿病中最具有诊断意义的病变是 Aschoff 小体形成。
151. 风湿性心瓣膜病并发感染性心内膜炎时，最支持感染性心内膜炎诊断的是体温 38.5°C 。
152. 风湿性心脏病二尖瓣狭窄最具诊断价值的检查是胸廓 X 线摄片。
153. 复苏后治疗，保证一切复苏措施奏效最重要的是脑复苏。
154. 腹部闭合伤，确诊有无内脏损伤最简便，最可靠的诊断方法为腹腔穿刺。
155. 腹部闭合性损伤中最易损伤的实质性器官是脾脏。
156. 最长出现 ANCA（中性粒细胞质抗体）阳性的肾病是急进性肾小球肾炎。
157. 腹外疝最易嵌顿的是股疝。
158. 改善急性左心衰竭症状最有效的药物是利尿剂。
159. 肝硬化门静脉高压症最具诊断价值的表现是食管下段，胃底静脉曲张。
160. 高血压病脑出血最常见的部位是内囊和基底节。
161. 根据马斯洛的需要层次理论，人的最高需要是自我实现。
162. 根据乳腺癌在不同部位的发生率，扪诊时最需要注意的是乳腺的外上象限。
163. 脑骨中断骨折最容易损伤的神经是挠神经。
164. 宫颈癌最常见的病理类型是鳞状细胞癌。
165. 股骨颈骨折时股骨头缺血性坏死率最高的是完全性头下骨折。



166. 股疝最常用的手术方法是 McVay 法。
167. 骨髓检查巨核细胞明显减少最常见于 再生障碍性贫血。
168. 骨与关节结核发病率最高的部位是 髌关节。
169. 肺硅沉着症最常见的并发症是 肺结核。
170. 最适于进行输卵管结扎术的时间是 月经后 3-7 天。
171. 后纵隔最常见的是 神经源性肿瘤。
172. 呼吸衰竭最主要的临床表现是 呼吸困难与发绀。
173. 肌肉中最主要的脱氨基方式是 嘌呤核苷酸循环。
174. 急非淋白血病最佳诱导治疗缓解方案为 DA。
175. 急性白血病引起贫血最重要的原因是 红系增殖受白血病细胞干扰。
176. 急性胆囊炎最严重的并发症是 胆囊坏疽穿孔。
177. 急性肝衰竭最多见的病因是 病毒性肝炎。
178. 急性感染性心内膜炎最常见的致病菌是 金黄色葡萄球菌。
179. 急性化脓性骨髓炎最常见的致病菌是 金黄色葡萄球菌。
180. 急性尿储留时最常用的处理方法是 导尿。
181. 急性脓胸最常继发于 肺部感染。
182. 急性失血时最先出现的调节反应是 交感神经兴奋。
183. 急性细菌性痢疾病变最显著的部位是 直肠与乙状结肠。
184. 急性下壁心肌梗死最符合 房室传导阻滞。
185. 急性心包炎心包积液时最突出的症状是 呼吸困难。
186. 急性心肌梗死，起闭塞的冠状动脉最常见的是 左冠状动脉前降支。
187. 急性心肌梗死时，特异性最高的血清标志物是 cTnI。
188. 急性心肌梗死早期最重要的治疗措施是 心肌再灌注。
189. 急性重症胆管炎并发休克，最重要的治疗措施是 解除胆道梗阻，通畅引流。
190. 脊髓压迫症中，脊髓外硬膜内和神经根处最常见病变为 神经纤维瘤。
191. 甲型肝炎病程中，传染性最强的阶段是 黄疸前期。
192. 甲状腺癌最常见的病理类型是 乳头状癌。
193. 甲状腺功能亢进症最常见的甲状腺改变是 弥漫性甲状腺肿。
194. 甲状腺手术后最危急的并发症是 呼吸困难。
195. 鉴别肾盂肾炎和下尿路感染最有意义的是 尿中白细胞管型。
196. 鉴别室速与阵发性室上速最有利的证据是 是否存在房室分离。
197. 鉴别水肿型和出血坏死型胰腺炎最有价值的是 Cullen 征。
198. 鉴别酸碱失衡的种类，最有价值的测定组合是 动脉血 pH 和 PaCO₂。
199. 降压药物中便秘发生率最高的药物是 维拉帕米。
200. 结肠癌最早出现的临床症状是 排便习惯和粪便性状改变。
201. 结核病最重要的社会传染源是 慢性纤维空洞性肺结核。
202. 结核分枝杆菌化学组成最显著的特点是 含有大量的脂类。
203. 近年女性生殖系统恶性肿瘤中死亡率最高的是 卵巢癌。
204. 近年来临床输血中细菌污染反应增多的最主要原因是 血小板在体外保存于室温，细菌相对容易生长繁殖。
205. 精神分裂症的遗传方式，目前认为可能性最大的原因 基因遗传。
206. 胫骨中下 1/3 骨折最常见的并发症是 骨折延迟愈合。
207. 决定血浆 pH 最重要的缓冲对是 NaHCO₃/HCO₃。



208. 口服铁剂治疗有效的缺铁性贫血患者，最先上升的是网织红细胞。
209. 扩张型心肌病患者的最主要的临床表现是心力衰竭。
210. 扩张型心肌病左、右心室同时衰竭，与临床症状和体征最相关的因素是心率失常。
211. 阑尾切除术最常见的并发症是切口感染。
212. 老年心力衰竭患者症状加重的最常见诱因是呼吸道感染。
213. 梨形心最常见于二尖瓣狭窄。
214. 两组呈正态分布的数值变量资料，但绝数相差悬殊，若比较离散趋势，最好选用的指标为变异系数。
215. 临床上壶腹癌最重要的症状是黄疸。
216. 临床上最常见的输血反应是非溶血性发热反应。
217. 临床上最常用的血液制品是红细胞悬液。(添加剂红细胞)。
218. 淋巴瘤最有诊断意义的临床表现为无痛性淋巴结肿大。
219. 硫酸镁中毒时最早出现的是膝反射消失。
220. 麻疹早期诊断最具有意义的临床表现 Koplik 斑。
221. 慢性肺心病引起肺动脉高压最主要的原因是缺氧性肺血管收缩。
222. 慢性肾功能不全继发性甲状旁腺功能亢进最主要的原因是维生素 D 减少。
223. 慢性胃溃疡最常见的并发症是出血。
224. 慢性再生障碍性贫血患者出现酱油色尿，最特异的诊断性检查是酸溶血试验。
225. 慢性支气管炎发展成阻塞性肺气肿的过程中最先发生的病理改变是细支气管不完全阻塞。
226. 慢性支气管炎患者呼吸道感染时，最长致病的革兰阴性杆菌为流感嗜血杆菌。
227. 盲肠癌患者最少见的合并症是大肠梗阻。
228. 门脉高压症手术治疗最主要的目的是治疗食管胃底静脉破裂出血。
229. 弥漫性毛细血管内增生性肾小球肾炎最主要的病变是毛细血管内皮细胞及系膜细胞增生。
230. 目前国内最常见的细菌性痢疾病原菌是福氏痢疾杆菌。
231. 目前确定乳腺肿块性质最可靠的方法是：活组织病理检查。
232. 难以鉴别的肾癌和肾囊肿，最可靠的鉴别方法是 CT。
233. 能够明确甲状腺单发结节性质的最可靠方法是细针穿刺细胞学检查。
234. 能最显著的促进胰岛素分泌的激素是抑胃肽。
235. 尿毒症患者高血压最主要的原因是水钠潴留。
236. 判断小儿体格发育最常用的指标是体重，身高，头围。
237. 脾肿大显著的疾病是慢性粒细胞白血病。
238. 最先提出不伤害原则的西方医学家是希波克拉底。
239. 破伤风病人典型的症状是在肌紧张性收缩的基础上发生阵发性肌肉强烈痉挛，通常最先受影响的肌群是咀嚼肌。
240. 葡萄胎患者清宫后最理想的避孕方法是阴茎套。
241. 普查宫颈癌是最有实用价值的检查方法是宫颈刮片细胞学检查。
242. 奇脉最常见于大量心包积液。
243. 骑跨式外伤最易损伤尿道球部。
244. 抢救由心室颤动引起的心脏骤停时，最有效的方法是非同步电击复律。
245. 侵蚀性葡萄胎与绒毛膜癌最主要的区别点是活检有无绒毛结构。
246. 全身骨与关节结合中发病最高的是脊柱髓核。
247. 缺铁性贫血早期最可靠的依据是血清铁蛋白降低。
248. 缺铁性贫血最常见的病因是慢性失血。
249. 缺铁性贫血最可靠的诊断依据是血清铁降低。



250. 确定肺结核是否为传染源的最主要依据是痰结核菌检查。
251. 确定胎儿安危最简便而较准确的方法是胎动计数。
252. 确诊高功能性甲状腺结节，最有意义的检查是放射性核素扫描。
253. 确诊前列腺癌最可靠的方法是穿刺活检。
254. 确诊肿瘤最可靠的方法是病理学检查。
255. 绒癌最常见的转移部位是肺部。
256. 乳房表浅脓肿切开引流，最佳切口应选择为轮辐状切口。
257. 乳房后脓肿切开引流最好采用乳房下缘弧形切口。
258. 伤寒患者最具有特征性的病理改变部位是在回肠末端。
259. 上消化大出血最常见的病因是胃十二指肠溃疡。
260. 上消化道出血最常见的病因是消化性溃疡。
261. 上行性感染的肾盂肾炎病变最轻的部位是肾小球。
262. 社区获得性肺炎最常见的致病菌是肺炎链球菌。
263. 肾病综合征最基本的表现是尿蛋白定量>3.5g/24h。
264. 肾上腺皮质肿瘤引起的库欣综合症与库欣病鉴别，最有意义的试验检查是大剂量地塞米松抑制试验。
265. 肾性贫血最主要的原因是红细胞生成素合成不足。
266. 室性心动过速心电图诊断的最主要依据是心室夺获和室性融合波。
267. 水痘最常见的并发症是皮肤感染。
268. 随着抗生素的广泛应用，引起细菌性肺炎的病原体最主要的变化是革兰阴性杆菌肺炎不断增加。
269. 胎儿娩出后 4 分钟，产妇出现大量阴道流血，最可能的诊断是宫颈裂伤。
270. 胎头于临产后迟迟不入盆，骨盆测量径线最有价值的是骶耻外径。
271. 糖尿病患者胰岛素治疗最主要的不良反应是发生低血糖。
272. 糖尿病患者最基础的治疗措施是饮食治疗。
273. 糖尿病最常见的精神症状是情绪抑郁。
274. 体内 CO₂ 分压最高的部位是细胞内液。
275. 体内氧分压最高的部位是肺泡气。
276. 头部外伤后，最常扣及头皮下波动的是帽状脑膜下血肿。
277. 脱敏治疗的最佳适应症为恐怖症。
278. 外科患者最易发生水和钠代谢紊乱是等渗性缺水。
279. 外阴部外伤后最易发生血肿的部位是大阴唇。
280. 晚期血吸虫病中，最常见的临床类型是巨脾型。
281. 维持躯体姿势的最基本方式是肌紧张反射。
282. 维生素 D 缺乏性佝偻病最早出现的骨骼改变是颅骨软化。
283. 胃癌最好发的部位是胃窦小弯侧。
284. 胃溃疡底部常见动脉内血栓机化，该处血栓形成的最主要机制是溃疡处动脉内膜炎至内膜粗糙。
285. 胃溃疡最常见的位置是胃窦小弯侧。
286. 细菌性肝脓肿，细菌进入肝脏最常见的途径是胆道。
287. 细菌性痢疾肠道病变最显著的部位是乙状结肠和直肠。
288. 细菌性阴道病最常见的病原体是加德奈尔菌。
289. 细菌芽胞最显著的特性是耐热性。
290. 现在医学科学工作者通过获得大量特异 DNA，结合适当的分析技术可鉴定基因缺陷。当前临床或研究室获得大量特异 DNA 片段最流行的方法是聚合酶链反应。
291. 腺垂体功能减退症最常见原因是各种垂体肿瘤。



292. 小脑幕切迹症最有意义的临床测定体征是患侧瞳孔散大。
293. 心动周期中，室内压升高速率最快的时相是等容收缩期。
294. 心肌梗死 24 小时内并发急性左心衰竭时，最不宜应用洋地黄。
295. 心肌梗死最常发生的部位在左心室前壁。
296. 心尖部触及舒张期震颤最常见于二尖瓣狭窄。
297. 子宫内膜结核最可靠的诊断依据是子宫内膜病理活检。
298. 心室颤动引起阿-斯综合征时，最有效的抢救方法是非同步电击复律。
299. 心脏病孕妇最容易发生心力衰竭的时间是妊娠 32-34 周。
300. 心脏性猝死最主要的病因是冠心病其并发症。
301. 新生儿败血症最有价值的诊断依据是白细胞总量增加。
- 302 新生儿溶血病最常见的是 ABO 血型不合。
303. 胸骨右缘第二肋触及收缩震颤，最常见于主动脉瓣狭窄。
304. 胸骨左缘第二肋间及收缩期杂音最常见的器质性病变是房间隔缺损。
305. 休克期反映器官血流灌注最简单可靠的指标是尿量。
306. 血浆蛋白质中含量最多的是清蛋白。
307. 血栓闭塞性脉管炎早期最主要的临床表现是间歇性跛行。
308. 血源性肺脓肿最常见的病原菌是金黄色葡萄球菌。
309. 洋地黄中毒最常见的心电图表现是室性期前收缩。
310. 腰间盘突出最常见的部位是 L5。
311. 一昼夜人体血液中生长素水平最高的是在熟睡时。
312. 医生在与慢性病患者的交往中，医患关系最理想的模式是共同参与型。
313. 医学伦理学中最古老，最有生命力的医德范畴是医疗保密。
314. 疑为骨盆骨折的患者来院急诊，最首要的检查是 X 线片。
315. 乙状结肠扭转最具特征的表现是腹部 X 线平片见马蹄状巨大的双充气棒。
316. 因肺结核引起的支气管扩张，湿罗音最常见的部位是肩脾间区。
317. 引起继发性再生障碍性贫血最常见的病因是药物和化学物质。
318. 引起脑萎缩最常见原因是脑动脉粥样硬化。
319. 引起血源性肺脓肿最常见的病原菌是葡萄球菌。
320. 引起牙周脓肿最常见的病原菌是甲型溶血性链球菌。
321. 营养不良的患儿皮下脂肪减少或消失，最后累及的部位是面颊部。
322. 有功能的垂体腺瘤最常见的是 PRL 瘤。
323. 有关急性胰腺炎的各项检查中，最早出现异常的是血清淀粉酶。
324. 诱导免疫耐受形成的最佳时期是胚胎期。
325. 诱发 DIC 最常见的病因为革兰阴性细菌感染。
326. 与病理缩复环关系最密切的是看道形肩先露。
327. 与急性同种异基因移植排斥关系最密切的细胞是 CD8+T 细胞。
328. 预防术后肺不张最主要的措施是多翻身多做深呼吸，鼓励有效咳嗽。
329. 原发性肺脓肿最常见的感染细菌是厌氧菌。
330. 原发性肝癌的肝外血行转移多见于肺。
331. 原发性甲状腺功能减退症最早出现异常的是血 TSH。
332. 在安静的状态下，人体调节产热活动最重要的因素是甲状腺激素。
333. 在大多数传染病的感染过程中最常见的是隐形感染。
334. 在发达国家，慢性二尖瓣关闭不全的最常见病因是风湿性心脏病。



335. 在感染过程的 5 种表现中所占比例最低，但最易识别的是显性感染。
336. 在绝大多数人中胆囊管汇合于肝总管。
337. 在神经纤维动作电位的去极化，通透性最大的离子是 Na^+ 。
338. 在我国，引起慢性肾功能不全的病因最常见的是慢性肾小球肾炎。
339. 在血浆蛋白电泳中涌动最慢的蛋白质是 α_2 -球蛋白。
340. 在噪声对听觉系统损伤的发病过程中最具特征性的表现是听闻升高，在后期不能恢复到正常的水平。
341. 在中国，急性胰腺炎最常见的诱发因素是胆道结石病。
342. 早期动脉粥样硬化病变，最早进入动脉内膜的细胞是巨噬细胞。
343. 早期诊断急性血源性骨髓炎最有价值的方法是局部分层穿刺。
344. 早起发现肺结核的最主要方法是 X 线检查。
345. 造成先天性甲状腺功能低下的最主要的原因是甲状腺不发育或发育不全。
346. 诊断膀胱肿瘤最可靠的方法是膀胱镜检+活检。
347. 诊断感染性心内膜炎的最重要方法是血培养。
348. 诊断冠心病最常的非创伤性检查方法是心电图负荷运动试验。
349. 诊断急进性肾小球炎最有价值的指标是 50%以上肾小球囊内有新月体形成。
350. 诊断甲状腺高功能腺瘤最佳的检查是甲状腺核素扫描。
351. 诊断绞窄性肠梗阻最可靠的依据是腹肌紧张，有压痛和反跳痛。
352. 诊断库欣综合征最有意义的检查是地塞米松抑制试验。
353. 诊断慢性呼吸衰竭最重要的依据是 PaO_2 ，或伴 $\text{PaCO}_2 > 50\text{mmHg}$ 。
354. 诊断免疫溶血性贫血最重要的实验室检查是 Coombs 试验。
355. 诊断缺铁最肯定的是骨髓小粒可染铁消失。
356. 诊断消化性溃疡穿孔最有价值的临床表现是肝浊音界消失。

