

临床执业/助理医师-第一单元摸底测评卷

A1 型选择题 (001-069 题)

答题说明：每一道试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

001. 急性心肌梗死并发心脏破裂多发生于起病

- A. 16 天~20 天
- B. 20 天之后
- C. 7 天之内
- D. 7 天-10 天
- E. 11 天-15 天

002. 心尖区收缩中期附加音并有收缩中晚期杂音者最可能的诊断为

- A. 冠心病劳力性心绞痛
- B. 风心病二尖瓣关闭不全
- C. 二尖瓣脱垂
- D. 扩张型心肌病
- E. 乳头肌功能不全

003. 下肢静脉曲张患者手术前应做的深静脉通畅试验，又称

- A. Trendelenburg 试验
- B. Perthes 试验
- C. Pratt 试验
- D. Buerger 试验
- E. Finkelstein 试验

004. 对于心脏的描述，正确的是

- A. 心尖平对第 6 肋间隙
- B. 心底与膈相贴
- C. 房间隔分为肌性部和膜部
- D. 前室间沟内有右冠状动脉前室间支
- E. 左半心位于右半心的左后方

005. 心脏触及震颤多由于

- A. 心脏瓣膜轻度关闭不全
- B. 心脏瓣膜狭窄
- C. 心房颤动
- D. 心室颤动
- E. 左室增大

006. 甲状腺功能亢进症可出现

- A. 水冲脉
- B. 交替脉
- C. 重搏脉
- D. 奇脉
- E. 无脉

007. 心包填塞时不出现

- A. 心音低钝
- B. 声音嘶哑

- C. 奇脉
D. 肝颈静脉反流征阳性
E. 双肺满布干湿性啰音
008. 合并急性左心衰竭的阵发性室上性心动过速，最佳治疗是
A. 静脉注射维拉帕米
B. Valsava 动作
C. 直流电复律
D. 置入起搏器
E. 射频消融
009. 恶性高血压与急进型高血压的区别要点是
A. 眼底有无视乳头水肿
B. 舒张压的高低程度
C. 有无肾功能不全
D. 有无心功能不全
E. 有无脑功能障碍
010. 大量心包积液时，查体可发现
A. 心包摩擦音
B. 心脏咯喇音
C. 胸膜摩擦音
D. Quincke 征
E. Ewart 征
011. 属于 β 受体阻滞剂的降压药是
A. 卡托普利
B. 硝苯地平
C. 维拉帕米
D. 阿替洛尔
E. 哌唑嗪
012. 二尖瓣狭窄患者发生右心衰竭后可能会减轻的临床表现是
A. 肝肿大
B. 脾肿大
C. 呼吸困难
D. 双下肢水肿
E. 颈静脉怒张
013. 亚急性感染性心内膜炎最常见的致病菌是
A. 乙型溶血性链球菌
B. 草绿色链球菌
C. 革兰阴性杆菌
D. 白色葡萄球菌
E. 肠球菌
014. 治疗休克时，收缩压 88 mmHg，但中心静脉压 16cmH₂O，错误的判断是
A. 心功能不全
B. 静脉血管床过度收缩
C. 血容量充足

- D. 肺循环阻力增加
- E. 充血性心力衰竭
- 015. 诊断冠心病最常用的非创伤性检查方法是
- A. 休息时心电图
- B. 24 小时动态心电图
- C. 心电图运动负荷试验
- D. 超声心动图
- E. 心脏 CT 检查
- 016. 老年心力衰竭患者症状加重的最常见诱因是
- A. 过度劳累
- B. 摄入液体过多
- C. 心肌缺血
- D. 室性期前收缩
- E. 呼吸道感染
- 017. 评价心功能最常见的检查方法是
- A. 常规心电图
- B. 超声心动图
- C. 动态心电图
- D. 放射性核素
- E. 心电图运动负荷试验
- 018. 洋地黄中毒的心电图变化最常表现为
- A. 室性期前收缩
- B. ST-T 呈鱼钩样改变
- C. Q-T 间期缩短
- D. 心房颤动
- E. 房室传导阻滞
- 019. 胸骨右缘第二肋间触及收缩期震颤，最常见于
- A. 三尖瓣狭窄
- B. 肺动脉瓣狭窄
- C. 二尖瓣狭窄
- D. 室间隔缺损
- E. 主动脉瓣狭窄
- 020. 主动脉瓣反流时心尖部可存在
- A. Graham-Stell 杂音
- B. Austin-Flint 杂音
- C. Duroziez 征
- D. Traube 征
- E. Musset 征
- 021. 呼吸衰竭患者缺氧的典型表现是
- A. 呼吸困难
- B. 呼吸急促
- C. 心率增快
- D. 发绀

- E. 神经精神症状
022. 引起血源性肺脓肿最常见的病原菌是
- A. 粪链球菌
- B. 葡萄球菌
- C. 大肠埃希菌
- D. 肺炎克雷伯杆菌
- E. 厌氧菌
023. 能直接作用于体温调节中枢的物质是
- A. 白细胞致热源
- B. 细菌毒素
- C. 抗原抗体复合物
- D. 坏死物质
- E. 病毒
024. 后纵隔肿瘤最常见的是
- A. 畸胎瘤
- B. 神经源性肿瘤
- C. 胸腺瘤
- D. 淋巴源肿瘤
- E. 胸内甲状腺
025. 胸部触诊语音震颤减弱的是
- A. 肺脓肿
- B. 肺梗死
- C. 阻塞性肺气肿
- D. 空洞性肺结核
- E. 支气管肺炎
026. 吸气性呼吸困难常见于
- A. 慢性支气管炎
- B. 气管异物
- C. 支气管哮喘
- D. 肺炎球菌肺炎
- E. 阻塞性肺气肿
027. 不属于湿性啰音特点的是
- A. 断续
- B. 短暂
- C. 连续多个
- D. 性质不变
- E. 部位易变
028. 慢性支气管炎早期呼吸功能的最主要变化是
- A. 大气道功能异常
- B. 小气道功能异常
- C. 大、小气道气流阻塞
- D. 限制性通气功能障碍
- E. 混合性通气功能障碍

029. 慢性支气管炎的诊断标准是

- A. 咳嗽、咳痰伴喘息，每年发作持续 2 个月，连续 2 年以上，并排除其他心肺疾病
- B. 咳嗽、咳痰伴喘息，每年发作持续 3 个月，连续 2 年以上，并排除其他心肺疾病
- C. 咳嗽、咳痰伴喘息，每年发作持续 4 个月，连续 2 年以上，并排除其他心肺疾病
- D. 咳嗽、咳痰伴喘息，每年发作持续 4 个月，连续 3 年以上，并排除其他心肺疾病
- E. 咳嗽、咳痰伴喘息，每年发作持续 2 个月，连续 3 年以上，并排除其他心肺疾病

030. 慢性阻塞性肺气肿最主要的并发症是

- A. 肺源性心脏病
- B. 肺肉质变
- C. 肺脓肿
- D. 纤维素性肺炎
- E. 肺萎陷

031. 肺心病肺动脉高压形成的多项因素中，可经治疗后明显降低肺动脉压的是

- A. 慢支所致血管炎
- B. 缺氧性肺血管收缩
- C. 肺气肿压迫肺毛细血管
- D. 慢性缺氧所致肺血管重建
- E. 肺泡壁破裂所致肺循环阻力增大

032. 外源性支气管哮喘，浆细胞产生使人体致敏的抗体是

- A. IgA
- B. IgG
- C. IgE
- D. IgM
- E. IgD

033. 当支气管哮喘与心源性哮喘一时难以鉴别时，为缓解症状可使用的药物为

- A. 毛花苷丙
- B. 肾上腺素
- C. 氨茶碱
- D. 吗啡
- E. 呋塞米

034. 怀疑支气管扩张而胸片大致正常首选检查是

- A. 支气管碘油造影
- B. 纤维支气管镜
- C. 高分辨 CT
- D. 增强 CT
- E. MRI

035. 肺炎球菌肺炎可出现以下体征，除了

- A. 口角或鼻周单纯性疱疹
- B. 肋间带状疱疹
- C. 皮肤和黏膜出血点
- D. 病变部位湿啰音
- E. 病变部位支气管呼吸音

036. 治疗肺炎球菌肺炎的首选药物是

- A. 磺胺类药物
 - B. 青霉素 G
 - C. 四环素
 - D. 庆大霉素
 - E. 阿米卡星
037. 判定肺结核临床类型的主要依据是
- A. 肺部体征
 - B. 痰菌检查
 - C. 结核菌素试验
 - D. 全身中毒症状
 - E. 胸部 X 线征象
038. 卡介苗接种后所致结核菌素阳性反应是指硬结直径
- A. $<5\text{mm}$
 - B. $5\sim 9\text{mm}$, 3-5 天后反应消失
 - C. $10\sim 15\text{ mm}$, 1 周后留有色素
 - D. $15\sim 20\text{ mm}$
 - E. $>20\text{mm}$
039. 抑制结核菌 DNA 与细胞壁合成的抗结核药物是
- A. 异烟肼
 - B. 利福平
 - C. 吡嗪酰胺
 - D. 乙胺丁醇
 - E. 链霉素
040. 抗结核化疗时可引起高尿酸血症的药物是
- A. IDH
 - B. RFP
 - C. EMB
 - D. PAS
 - E. PZA
041. 出现明显皮下气肿的胸部损伤是
- A. 闭合性气胸
 - B. 多根单处肋骨骨折
 - C. 开放性气胸
 - D. 大量血胸
 - E. 张力性气胸
042. 记忆障碍在脑器质性精神障碍的早期主要表现是
- A. 顺行性遗忘
 - B. 逆行性遗忘
 - C. 错构
 - D. 虚构
 - E. 近事遗忘
043. 常出现意识障碍的疾病是
- A. 精神分裂症

- B. 脑器质性精神病
C. 神经衰弱
D. 心身疾病
E. 抑郁症
044. 关于精神分裂症的临床特点。错误的是
A. 多数在青壮年发病
B. 自知力丧失
C. 联想障碍，妄想、幻觉是重要的早期表现
D. 偏执型是最常见类型
E. 病程多迁延，预后不佳
045. 慢性酒精中毒的震颤谵妄的临床表现是
A. 停酒后出现的急性精神症状群
B. 长期饮酒过程中出现的慢性精神症状群
C. 停酒后缓慢出现的记忆障碍
D. 长期饮酒过程中出现的记忆障碍
E. 长期饮酒过程中出现的行为改变
046. 抗精神病药物常见的不良反应不包括
A. 口干、便秘
B. 粒细胞缺乏
C. 锥体外系反应
D. 视物模糊
E. 体位性低血压
047. 下列抗精神病药物中易引起粒细胞减少或缺乏，需定期检查血常规的是
A. 氟哌啶醇
B. 奋乃静
C. 舒必利
D. 氯氨平
E. 利培酮
048. 碳酸锂中毒的早期症状为
A. 厌食、恶心、呕吐等胃肠道反应
B. 震颤、共济失调
C. 发热、定向障碍
D. 癫痫大发作
E. 下肢水肿、多尿
049. 三环类抗抑郁药的副作用主要是
A. 锥体外系症状
B. 过敏反应
C. 心血管副作用
D. 粒细胞减少
E. 失眠
050. 强迫性障碍的核心症状为
A. 强迫行为
B. 强迫意向

- C. 强迫表象
 - D. 强迫性恐惧
 - E. 强迫观念
051. 苯二氮卓类抗焦虑药物的主要作用为

- A. 精神松弛
- B. 肌肉松弛
- C. 精神和肌肉都松弛
- D. 阻断多巴胺受体
- E. 阻断 5-羟色胺受体

052. 脱敏治疗的最佳适应证为

- A. 精神分裂症
- B. 恐惧症
- C. 躁狂症
- D. 神经衰弱
- E. 强迫症

053. 单纯小脑幕切迹疝的临床表现不正确的是

- A. 昏迷
- B. 呕吐
- C. 偏瘫
- D. 双侧瞳孔大小多变
- E. 病侧瞳孔散大

054. 左肾结核无功能，右肾轻度积水，功能正常，经抗结核治疗仍有膀胱刺激症状。下步治疗方案为

- A. 继续抗结核治疗
- B. 加强支持疗法
- C. 左肾切除术
- D. 右肾造瘘术
- E. 对症治疗

055. 肾结核早期最常见的临床表现是

- A. 肾区绞痛
- B. 蛋白尿
- C. 尿频、尿急、尿痛
- D. 全身结核中毒症状
- E. 急性肾功能不全

056. 与活动有关的血尿和腰腹疼痛，首先应考虑的是

- A. 急性阑尾炎
- B. 急性肾盂肾炎
- C. 上尿路结石
- D. 卵巢囊肿扭转
- E. 膀胱癌

057. 肾结石行体外冲击波碎石的主要禁忌是

- A. 高血压
- B. 糖尿病

- C. 前列腺增生
D. 结石急性发作
E. 输尿管狭窄
058. 膀胱癌组织类型是
A. 磷状细胞癌
B. 内翻乳头状瘤
C. 膀胱腺癌
D. 基底细胞癌
E. 移行细胞癌
059. 急性尿潴留时最常用的处理方法是
A. 利尿
B. 针灸
C. 膀胱穿刺抽尿
D. 膀胱造瘘
E. 导尿术
060. 检查精索静脉曲张患者，应采取
A. 左侧卧位
B. 站立位
C. 右侧卧位
D. 平卧位
E. 俯卧位
061. 尿毒症病人高血压最主要的原因是
A. 肾素增多
B. 促红素减少
C. 水钠潴留
D. 血管加压素增多
E. 交感神经兴奋
062. 慢性肾衰竭失代偿期是指 GFR（肾小球滤过率）的范围在
A. $<25 \text{ ml/min}$
B. $25\text{--}50 \text{ ml/min}$
C. $50\text{--}60 \text{ ml/min}$
D. $60\text{--}70 \text{ ml/min}$
E. $70\text{--}80 \text{ ml/min}$
063. 关于睾丸的叙述，正确的是
A. 位于阴囊内，属于外生殖器的一部分
B. 外形呈球形
C. 其后缘游离
D. 表面有一层坚厚的白膜
E. 精曲小管上皮能产生精子并分泌雄性激素
064. 临床上最常见的蛋白尿是
A. 肾小球性
B. 肾小管性
C. 溢出性

D. 分泌性

E. 组织性

065. 急性链球菌感染后肾小球肾炎血生化改变意义最大的是

A. 抗“O”明显升高

B. 血沉升高

C. 血 IgG 升高

D. 血白蛋白下降

E. 血 C₃ 明显下降

066. 急进性肾小球肾炎 I 型患者血浓度常升高的抗体是

A. 抗肾小球基底膜抗体

B. 抗核抗体

C. 抗双链 DNA 抗体

D. 抗中性粒细胞胞浆抗体

E. 抗平滑肌抗体

067. 肾结核最具有特征性的临床表现是

A. 腰痛

B. 发热伴盗汗

C. 肉眼血尿

D. 慢性膀胱刺激症状

E. 消瘦

068. 难以鉴别的肾癌和肾囊肿，最可靠的鉴别方法是

A. 排泄性尿路造影

B. 逆行肾盂造影

C. B 超

D. 肾动脉造影

E. CT

069. T₂ 期膀胱肿瘤浸润的组织层是

A. 原位癌

B. 黏膜固有层

C. 浅肌层

D. 深肌层

E. 膀胱邻近组织

A2 型选择题（070-113 题）

答题说明：每一道试题是以一个小案例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

070. 男，32 岁。车祸伤 2 小时。排尿困难，尿道出血，查体：BP 70/40 mmHg，骨盆挤压分离试验阳性，会阴部淤斑，疼痛明显，B 超显示腹膜后血肿。首先应进行的处理是

A. 即刻行尿道会师术

B. 即刻行骨折切开复位内固定

C. 下肢牵引

D. 抗休克治疗

E. 打开后腹膜止血

071. 男性，32 岁。3 小时前从 5 米高处跌下，左腰部撞到石块上，当时无昏迷，现血压正常，感左

腰部疼痛伴轻压痛，尿常规 RBC+/HP。最可能的诊断是

- A. 肾挫伤
- B. 肾部分裂伤
- C. 肾全层裂伤
- D. 肾蒂断裂
- E. 肾蒂伤伴输尿管损伤

072. 3 岁男孩，右侧阴囊包块，质软，透光试验阳性，平卧后可消失，应考虑哪种疾病

- A. 右侧睾丸鞘膜积液
- B. 右侧交通性鞘膜积液
- 右侧斜疝
- D. 右侧睾丸肿瘤
- E. 右侧精索鞘膜积液

073. 男性，40 岁。间歇性浮肿 10 年，恶心、呕吐 1 周。查血压 20/13.3 kPa (150/100 mmHg)，Hb80g/L，尿蛋白 (++)，蜡样管型 (+)，血 BUN 40 mmol/L，Cr 760 μ mol/L，血钾 5.5 mmol/L 最适宜的首选治疗是

- A. 降压治疗
- B. 利尿剂
- C. 纠正贫血
- D. 饮食治疗
- E. 血液透析

074. 患儿，男，1 岁。B 型超声检查发现左侧睾丸位于腹股沟管内，经内分泌治疗 10 周后睾丸仍未下降到阴囊内。下一步治疗的最好方法是

- A. 观察
- B. 左睾丸切除术
- C. 继续内分泌治疗
- D. 近期行左睾丸下降固定术
- E. 3 岁后行左睾丸下降固定术

075. 女性，30 岁。左腰部受伤后出现腰痛和镜下血尿，生命体征稳定，应考虑

- A. 肾挫伤
- B. 肾部分裂伤
- C. 肾盂裂伤
- D. 肾实质全层裂伤
- E. 肾蒂损伤

076. 男，62 岁。慢性乙型肝炎病史 30 年。反复尿少、腹胀、双下肢水肿 5 年，加重 1 周。腹部 B 超示腹水。腹腔穿刺抽出淡黄色清亮液体 3000ml。此后 3 天无尿。查血肌酐 180 μ mol/L。该患者肾脏的情况可能是

- A. 肾小管病变
- B. 肾盂损伤
- C. 肾脏无器质性病变
- D. 肾小球病变
- E. 肾血管病变

077. 男，28 岁。少尿，浮肿 1 月余，7 岁时曾发现尿蛋白阳性。血压 180/120 mmHg，尿蛋白 (一)，红细胞 5-10 个/HP，白细胞 3-5 个/HP，BUN 30 mmol/L，血肌酐 860 μ mol/L，血红蛋白 65g/L，初步诊

断为

- A. 急性肾小球肾炎
- B. 慢性肾小球肾炎，肾功能不全
- C. 肾病综合征
- D. 慢性肾盂肾炎，肾功能不全
- E. 高血压病Ⅲ期

078. 男，28岁。查血压 160/95 mmHg (21.3/12.6kPa)，Hb85g/L，蛋白(+)，颗粒管型 2-3 个/HP，BUN10 mmol/L，Cr 220 μmol/L，对该患者不宜采取

- A. 低蛋白饮食
- B. 高蛋白饮食
- C. 低钠饮食
- D. 根据尿量多少适当限水
- E. 低磷饮食

079. 男，28岁。3个月前因血尿、蛋白尿伴水肿，临床诊断为急性肾炎。查体：BP145/95mmHg。尿红细胞 15-20 个/HP，尿蛋白 2.5g/24h，血肌酐 100 μmol/L，补体 C₃下降，首选的正确处理措施是

- A. 休息及对症处理，监测肾功能
- B. 青霉素治疗
- C. 激素治疗
- D. 糖皮质激素联合细胞毒药物治疗
- E. 肾活检

080. 男，20岁。感冒后 7 天出现颜面及双下肢浮肿，尿少。查：血压 160/100mmHg，尿蛋白(++)，尿沉渣：红细胞(++)，Scr 130 μmol/L，2 周后少尿，BUN28 mmol/L，Scr 620 μmol/L，哪种疾病可能性大

- A. 急性肾小球肾炎
- B. 急进性肾小球肾炎
- C. 慢性肾炎
- D. 肾病综合征
- E. 高血压肾病

081. 女，65岁。经常出现头晕、四肢麻木感，注意力不集中，自感记忆力下降半年，近 2 周突然加重。常半夜起床翻东西，怀疑家中被窃，易哭泣，对一些物品不能命名。既往高血压病史 15 年。头颅 CT 示：多发性脑梗死。最可能的诊断是

- A. 阿尔茨海默病
- B. 血管性痴呆
- C. 轻度认知功能损害
- D. 高血压病合并精神障碍
- E. 匹克病

082. 男，25岁。无特殊原因出现生活懒散 3 个月，工作效率低下，走路时常常独自发笑或喃喃自语。该患者最可能的诊断是

- A. 精神分裂症
- B. 急性应激障碍
- C. 强迫症
- D. 躁狂症
- E. 抑郁症

083. 女, 30 岁。半年来总担心双手有细菌而经常反复洗手, 一天无数次总不放心, 自知不对, 又无法控制。此症状属于

- A. 妄想
- B. 强迫行为
- C. 刻板动作
- D. 情绪焦虑
- E. 强迫性思维

084. 女, 25 岁。2 年以来和丈夫吵架或遇到不高兴的事后, 即出现四肢强直和抽搐样表现。发作时能听清楚家人的呼唤但不予回答。无唇舌咬伤和大小便失禁, 瞳孔无散大, 对光反应存在。该患者最可能的诊断是

- A. 神经衰弱
- B. 适应性障碍
- C. 癫痫
- D. 创伤后应激障碍
- E. 分离(转换)性障碍

085. 男, 73 岁。进行性手抖、动作缓慢 3 年。查体: 面具脸, 右手静止性震颤, 四肢肌张力增高, 行走缓慢。有前列腺增生、肾功能不全和房颤病史。对该患者最恰当的治疗是

- A. 丙炔苯丙胺
- B. 溴隐亭
- C. 安坦
- D. 金刚烷胺
- E. 复方左旋多巴

086. 患儿, 5 岁。阵发性头痛 3 个月, 因突然剧烈头痛、反复呕吐半天急诊入院。检查: 神志清醒, 双瞳孔正常, 颈项强直, 半小时后突然呼吸停止, 心跳存在, 其诊断是

- A. 垂体腺瘤
- B. 急性脑水肿
- C. 急性脑膜炎
- D. 枕骨大孔疝
- E. 小脑幕切迹疝

087. 男, 30 岁。患甲状腺功能亢进症, 突然出现双下肢不能动。检查: 双下肢膝腱反射减退, 无肌萎缩。血钾测定 3 mmol/L , 你认为最可能是下列哪种情况

- A. 慢性甲亢性肌病
- B. 周期性瘫痪
- C. 周围神经炎
- D. 重症肌无力
- E. 癱症

088. 男, 70 岁。因观看足球比赛突然晕倒而入院治疗。查体发现左侧上、下肢瘫痪, 腱反射亢进, 左侧眼裂以下面瘫, 伸舌时舌尖偏向左侧。左半身深、浅感觉消失。双眼左侧半视野缺失, 瞳孔对光反射存在。考虑病变的部位在

- A. 左侧中央前、后回
- B. 右侧中央前回
- C. 左侧内囊
- D. 右侧内囊

E. 右侧中央后回

089. 患者男, 70 岁。左侧下颌部阵发性抽搐剧痛 3 天, 不能吃饭, 查体: 双额纹对称, 闭目有力, 面部感觉对称存在。诊断

- A. 右面神经麻痹
- B. 偏头痛
- C. 左三叉神经痛
- D. 右三叉神经痛
- E. 左面神经麻痹

090. 男, 33 岁。突发四肢无力伴手足麻木 2 天。查体: 双侧轻度面瘫, 四肢肌张力较低, 肌力 3 级, 腱反射消失, 双手指痛觉减退, 大小便自控。该患者最可能的诊断是

- A. 重症肌无力
- B. 吉兰-巴雷综合征
- C. 急性脊髓炎
- D. 脊髓压迫症
- E. 周期性麻痹

091. 女, 16 岁。脑外伤后, 双眼睑皮下及球结膜下出血, 鼻腔流出血性脑脊液, 临床诊断最大可能是

- A. 颅顶骨凹陷性骨折
- B. 颅底前窝骨折
- C. 颅底中窝骨折
- D. 颅底后窝骨折
- E. 鼻骨骨折

092. 男, 18 岁。左下肢跛行 15 年, 查体发现左侧马蹄内翻足畸形, 胫前肌有轻度肌收缩, 但不能产生关节运动, 其肌力为

- A. 0 级
- B. 1 级
- C. 2 级
- D. 3 级
- E. 5 级

093. 中年, 男性, 不慎跌倒摔伤右肩。以左手托右肘部来诊。头向右倾, 检体见右肩下沉, 右上肢功能障碍, 胸骨柄至右肩峰连线中点隆起, 并有压痛, 其可能的诊断是

- A. 肩关节脱位
- B. 锁骨骨折
- C. 肱骨外科颈骨折
- D. 肩胛骨骨折
- E. 肱骨解剖颈骨折

094. 男性, 35 岁。因车祸右小腿受伤, 经拍 X 线片, 诊断为右胫骨中下 1/3 交界处斜形骨折, 其易发生

- A. 骨筋膜室综合征
- B. 脂肪栓塞
- C. 延迟愈合或不愈合
- D. 血管损伤
- E. 神经损伤

095. 中年男性，右上肢外展牵拉伤，患肩疼痛，以健手托患侧前臂。检查患侧方肩，杜加氏征阳性。其可能的诊断是

- A. 锁骨骨折
- B. 肱骨解剖颈骨折
- C. 肱骨外科颈骨折
- D. 肩关节脱位
- E. 肩锁关节脱位

096. 14 岁男孩，平素喜踢足球，近 1 周右小腿上端前侧疼痛。查体：右小腿上端前侧隆起，皮肤无红肿发热及静脉怒张，压痛明显。X 线片示胫骨结节骨骺增大、致密。应首先考虑的诊断是胫骨结节

- A. 撕脱骨折
- B. 骨髓炎
- C. 骨结核
- D. 骨软骨瘤
- E. 骨软骨病

097. 男性，30 岁。腰痛伴右下肢麻木 2 年，反复发作。右小腿外侧麻木，足趾背伸无力，踝反射正常。经休息、牵引、理疗等无效。化验检查：空腹血糖 15mmol/L，CT 示腰 4-5 间隙椎间盘突出。其最佳治疗方案是

- A. 继续牵引后手术
- B. 继续理疗 4 周后手术
- C. 立即腰椎间盘突出摘除手术
- D. 卧床休息 4 周后手术
- E. 血糖控制正常后手术

098. 男性，28 岁。胫骨开放性骨折创口不愈，治疗 3 个月后形成窦道，有少量脓性分泌物，并有死骨排出。应考虑为

- A. 骨结核
- B. 骨肿瘤
- C. 慢性骨髓炎
- D. 缺血性骨坏死
- E. 急性化脓性骨髓炎

099. 女，9 岁。5 天前突然右髋疼痛，并有高热。体温 39℃，脉搏 110 次/分，白细胞 $22 \times 10^9/L$ ，中性 98%，血沉 30mm/第一小时末。右髋关节肿胀，不敢活动，考虑为

- A. 急性化脓性髋关节炎
- B. 急性风湿性髋关节炎
- C. 类风湿性髋关节炎
- D. 髋周软组织炎
- E. 髋关节结核

100. 一类风湿关节炎患者，病程持续 1 年余，有对称性多关节肿痛，未经治疗，三大常规及肝肾功能检查正常，首选方案是

- A. 一种 NSAID（非甾体抗炎药）
- B. 两种 NSAIDs 联合使用
- C. 慢作用药
- D. 慢作用药加 NSAID
- E. 慢作用药加糖皮质激素

101. 女性, 75 岁。肩部摔伤, 杜加征阴性。X 线片见肱骨外科颈骨折对位 2/3。并有嵌入。其最佳治疗方案是

- A. 仅用三角巾悬吊即可
- B. 切开复位钢板固定
- C. 手法复位夹板固定
- D. 切开复位钢针固定
- E. 人工肱骨头置换术

102. 男性儿童, 左肘摔伤急诊就医, 小夹板外固定后, 前臂高度肿胀, 手部青白发凉, 麻木无力, 经拍 X 线片, 诊断为左肱骨髁上骨折, 若不及时处理, 其最可能的后果是

- A. 感染
- B. 缺血性骨坏死
- C. 骨化性肌炎
- D. 关节僵硬
- E. 缺血性肌挛缩

103. 女, 33 岁。昨晚吃街边烧烤后于今晨 3 时突然畏寒、高热、呕吐、腹痛、腹泻, 腹泻共 4 次, 开始为稀水样便, 继之便中带有黏液和脓血。在未做实验检查的情况下, 该患者可能的诊断是

- A. 急性轻型细菌性痢疾
- B. 急性普通型细菌性痢疾
- C. 中毒型细菌性痢疾
- D. 慢性细菌性痢疾急性发作
- E. 慢性迁延型细菌性痢疾急性发作

104. 男, 32 岁。持续高热 5 天入院。查体: 前胸部可见散在的玫瑰疹, 脾脏肋下 2cm。化验: 肝功能及心肌酶均轻度升高。考虑该患者出现了全身脏器损伤。最不可能损伤的器官是

- A. 脾脏
- B. 肠系膜淋巴结
- C. 骨髓
- D. 肾脏
- E. 肠道

105. 冬季, 2 岁患儿, 以高热、惊厥伴神志不清就诊, 对流脑诊断最有帮助的体征是

- A. 反复惊厥
- B. 出现脑疝
- C. 口唇疱疹
- D. 脑膜刺激征
- E. 皮肤淤点淤斑

106. 2 岁女孩, 突起发热, 伴咽痛, 稀便 3-4 次/天, 3 天后热退, 间隔 2 天又发热伴头痛、多汗, 全身肌肉疼痛, 持续 3 天热退, 继之出现右下肢无力、肌张力减退、膝反射消失。应诊断为

- A. 风湿性关节炎
- B. 类风湿性关节炎
- C. 脊髓灰质炎
- D. 化脓性关节炎
- E. 结核性关节炎

107. 男, 20 岁。在一次体检中发现 HBsAg 阳性, 当时无自觉症状及体征, 肝功能正常。次年 5 月, 因突然乏力、恶心、厌食、尿黄而入院。化验: ALT 500U/L, 血清总胆红素 85 $\mu\text{mol/L}$, 抗-HAV IgM (+)。

该患者的诊断可能为

- A. 乙型肝炎，慢性迁延型，既往感染过甲型肝炎
- B. 乙型肝炎，慢性活动型，既往感染过甲型肝炎
- C. 急性甲型肝炎，乙型肝炎病毒携带者
- D. 急性乙型肝炎，合并甲型肝炎
- E. 急性黄疸型肝炎，甲、乙型肝炎病毒混合感染

108. 男性，40岁农民，以“发热、周身不适、头痛3天”为主诉入院。查体：面色苍白、脉搏细弱而快，皮肤有少许出血点，体温35.8℃，血压60/40 mmHg，末梢血象WBC $30 \times 10^9/L$ 、中性粒细胞80%、异型淋巴细胞10%、血小板 $50 \times 10^9/L$ ，尿蛋白(++)。最可能的诊断是

- A. 流行性脑脊髓膜炎
- B. 败血症，感染性休克
- C. 流行性出血热
- D. 钩端螺旋体病
- E. 传染性单核细胞增多症

109. 男，46岁。8月12日来诊，发热4天，伴全身痛、乏力、头痛，近1个月当地暴雨不断，查体：眼结膜充血，颈部、腋下淋巴结肿大，腓肠肌压痛(+)，最可能的诊断是

- A. 流行性感冒
- B. 败血症
- C. 疟疾
- D. 钩端螺旋体病
- E. 肾综合征出血热

110. 男，22岁。民工，近4天来发热、头晕、头痛、食欲减退，体检皮肤有少量散在淡红色斑丘疹，脾于侧位肋下1cm，外斐反应变形杆菌OX₁₉凝集试验阳性。本例的诊断是

- A. 伤寒
- B. 地方性斑疹伤寒
- C. 感冒
- D. 流行性出血热
- E. 猩红热

11. 男，28岁。船民，昨晚进食海蟹一只，晨起腹泻稀水便，10小时内排便20余次，量多，水样，无臭味，中午呕吐3-4次，初起水样，后为米泔水样。发病后无排尿，就诊时呈重度脱水征，神志淡漠，BP 80/50 mmHg，下列检查均有助于诊断，除了

- A. 血培养
- B. 血清凝集试验
- C. 大便悬滴镜检
- D. 大便碱性蛋白胨增菌培养
- E. 大便涂片革兰染色镜检

112. 男性，30岁。因反复现癫痫大发作半年余，近1个月来智力有所下降，经CT检查诊断为脑囊虫，应首先考虑是

- A. 脑实质型
- B. 脑室型
- C. 软脑膜型
- D. 脊髓型
- E. 混合型

113. 30 岁男性农民，腹痛、腹泻半个月，大便 48 次/天，便量多，为暗红色，有腥臭味，肉眼可见血液及黏液，患者无发热，右下腹隐痛，粪便镜检：WBC 10-15 个/HP，RBC 满视野，该患者最可能的诊断是

- A. 细菌性痢疾
- B. 肠伤寒合并肠出血
- C. 阿米巴痢疾
- D. 溃疡性结肠炎
- E. 血吸虫病

A3/A4 型选择题（114-136 题）

答题说明：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道试题。请根据案例所提供的信息，在每一道试题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

[114-116]

地震现场，一工人左腰及下肢被倒塌之砖墙压住，震后 6 小时救出，4 小时送抵医院。诉口渴，尿少，呈暗红色。检查：脉搏 120/min，血压 95/70mmHg，左下肢明显肿胀，皮肤有散在淤血斑及水疱，足背动脉搏动较健侧弱，趾端凉，无骨折征。

114. 诊断首先考虑

- A. 感染性休克
- B. 肾挫伤
- C. 左下肢挫伤
- D. 左下肢血栓形成
- E. 挤压伤综合征

115. 静脉输液宜首选

- A. 全血
- B. 血浆
- C. 右旋糖酐
- D. 等渗盐水加入 1.25%碳酸氢钠溶液
- E. 5%葡萄糖溶液

116. 首先应采取的处理是

- A. 镇痛
- B. 左下肢固定
- C. 镇静
- D. 胸腔闭式引流
- E. 吸氧

[117-119]

女性，45 岁。被鱼刺扎伤右手食指指尖 2 天，右手食指针刺样痛半天就诊。查体：T36.8℃，右手食指末节轻度肿胀、压痛，但张力不高，皮肤不红。

117. 该病的诊断是

- A. 甲沟炎
- B. 指头炎
- C. 指骨髓炎
- D. 腱鞘炎
- E. 滑囊炎

118. 下列处理错误的是

- A. 抗生素控制感染
- B. 保持右手下垂，以利于血液循环
- C. 鱼石脂软膏外敷右手食指
- D. 金黄散糊剂敷贴右手食指
- E. 右手食指理疗

119. 病人右手食指肿胀加重，伴有剧烈搏动性跳痛，此时作切开引流，正确的操作是

- A. 右手食指末端做鱼口形切口
- B. 末节指侧面纵切口，远侧应超过甲沟的 1/2
- C. 右手两侧面纵切口，远侧应超过指节横纹
- D. 脓腔较大时，宜做对口引流
- E. 突出切口的脂肪不应剪去，以防损伤血管、神经

[120-121]

患者，男，60 岁。突然感到心前区闷痛，伴心悸 3 小时，自服硝酸甘油 1 片，疼痛未能缓解。做心电图检查，显示 II、III、aVF，ST 段弓背向上抬高。

120. 该患者的诊断是

- A. 心绞痛
- B. 急性心包炎
- C. 急性心肌梗死
- D. 心肌病
- E. 心肌炎

121. 根据心电图显示，心脏病变部位是

- A. 前壁
- B. 下壁
- C. 正后壁
- D. 前间壁
- E. 后壁

[122-124]

男，51 岁。胸骨后剧烈疼痛 4 小时，伴大汗淋漓，血压 10.7/8.0 kPa (80/60 mmHg)，心率 134 次/分。面色苍白，四肢冰冷。心电图示急性广泛前壁心肌梗死。

122. 该患者血压低的原因是

- A. 血容量不足
- B. 合并右室梗塞
- C. 舒张期充盈不足
- D. 心源性休克
- E. 疼痛性休克

123. 对指导治疗最有帮助的辅助检查是

- A. 心电图和血压监测
- B. 心肌酶谱监测
- C. 漂浮导管血流动力学监测
- D. 超声心动图
- E. 胸部 X 线片

124. 对该患者最理想有效的治疗措施是

- A. 毛花苷丙强心

- B. 多巴胺升压
- C. 尿激酶溶栓
- D. 主动脉内球囊反搏泵
- E. 直接 PTCA 术

[125-126]

女，26 岁。因阵发心悸 4 年就诊。发作无诱因，突发突止，持续 30~180 分钟。发作时心电图提示：心室率 180 次/分，节律规则，QRS 波群形态与时限正常，可见逆行 P 波。平时心电图正常。

125. 该患者最可能的诊断是

- A. 快速心房颤动
- B. 心房扑动（2:1 传导）
- C. 窦性心动过速
- D. 阵发性室性心动过速
- E. 阵发性室上性心动过速

126. 最适宜的药物治疗是

- A. 静脉推注维拉帕米
- B. 静脉滴注异丙肾上腺素
- C. 静脉推注阿托品
- D. 静脉滴注多巴胺
- E. 静脉推注利多卡因

[127-128]

女性，19 岁。近 2 周来发热 38℃ 左右，伴恶心、呕吐、腹泻。遂出现心悸、胸痛、呼吸困难，晕厥发作。体检发现：面色苍白，精神萎靡。心率 40 次/分。律齐，心尖部第一心音低钝，具可闻及大炮音，临床诊断病毒性心肌炎。

127. 心电图表现最可能是

- A. 窦性心动过缓
- B. 一度房室传导阻滞
- C. 二度房室传导阻滞
- D. 三度房室传导阻滞
- E. 室内传导阻滞

128 最适宜的治疗措施为

- A. 静脉注射阿托品
- B. 脉滴注硝酸甘油
- C. 皮下注射肾上腺素
- D. 临时植入心脏起搏器
- E. 心脏复律

[129-131]

男性，20 岁。有四肢关节疼痛病史，近半年来，时感心悸，活动后有气急，休息时缓解，体检：两颧紫红色，口唇轻度紫绀，听诊心尖区闻及舒张期隆隆样杂音，胸骨左缘第 3-4 肋间可闻及二尖瓣开放拍击音，P₂亢进，分裂。

129. 应首先考虑诊断为

- A. 风心病二尖瓣狭窄
- B. 风心病二尖瓣关闭不全
- C. 风心病主动脉瓣狭窄

- D. 风心病主动脉瓣关闭不全
- E. 风心病二尖瓣狭窄伴关闭不全

130. 入院二天后体检发现第一心音强弱不等，心律绝对不规则，心率 120 次/分，脉率 100 次/分，应考虑并发

- A. 窦性心动过速
 - B. 阵发性室上性心动过速
 - C. 心房扑动
 - D. 心房颤动
 - E. 窦性心律不齐
131. 首选的治疗药物为

- A. 普萘洛尔
- B. 利多卡因
- C. 毛花苷丙
- D. 苯妥英钠
- E. 新斯的明

[132-134]

男，68 岁。阵发性胸闷 3 年，持续加重 6 小时后突发意识丧失。查体：BP 40/20 mmHg，双肺呼吸音清。心率 32 次/分，律齐、各瓣膜未闻及杂音。血清肌钙蛋白增高。

132. 该患者意识丧失的最可能病因是

- A. 心肌病
- B. 主动脉夹层
- C. 急性肺栓塞
- D. 主动脉瓣狭窄
- E. 急性心肌梗死

133. 最可能的心律失常是

- A. 心房颤动
- B. 心室颤动
- C. 室性心动过速
- D. 二度房室传导阻滞
- E. 三度房室传导阻滞

134. 入院后经抢救患者病情平稳，但第 3 天突发憋喘，不能平卧。查体：心尖部可闻及 3/6 级收缩期杂音。双肺满布干湿罗音。该患者最可能合并

- A. 心脏乳头肌断裂
- B. 急性心包炎
- C. 二尖瓣狭窄
- D. 主动脉瓣狭窄
- E. 肺部感染

[135-136]

男，60 岁。突发心前区疼痛 4 小时，心电图示急性前壁心肌梗死，既往无高血压史、癫痫病史和出血性疾病史。入院时心率 80 次/分，律齐，血压 20/12 kPa（150/90 mmHg），入院后 2 小时突然出现短暂意识丧失，抽搐，听不到心音。

135. 最可能的心电图表现是

- A. 心房颤动

- B. 心室颤动
- C. 窦房传导阻滞
- D. 房室传导阻滞
- E. 室性心动过速

136. 如果并发乳头肌断裂, 出现的可能性最大的体征是

- A. 心包摩擦音
- B. 心尖区出现舒张期奔马律
- C. 室性心律失常
- D. 心尖区出现收缩中晚期喀喇音和响亮的收缩期杂音
- E. 心尖区 S_1 降低, 出现第四心音

B1 型选择题 (137-150 题)

答题说明: 以下提供若干组试题, 每组试题共用在试题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个与问题关系最密切的答案。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

[137-138]

- A. Osler 结节
- B. Janeway 损害
- C. 淤点
- D. 淤斑
- E. Roth 斑

137. 主要见于急性感染性心内膜炎的是

138. 视网膜的卵圆形出血斑称

[139-140]

- A. 心脏室间隔非对称性肥厚
- B. 心脏室间隔对称性肥厚
- C. 心脏增大, 以左心为著
- D. 心脏增大, 以右心为著
- E. 心脏赘生物 $>2\text{mm}$

139. 扩张型心肌病

140. 肥厚型心肌病

[141-142]

- A. PaO_2 为 70 mmHg, PaCO_2 为 45 mmHg
- B. PaO_2 为 70 mmHg, PaCO_2 为 40 mmHg
- C. PaO_2 为 55 mmHg, PaCO_2 为 50 mmHg
- D. PaO_2 为 50 mmHg, PaCO_2 为 40 mmHg
- E. PaO_2 为 65 mmHg, PaCO_2 为 40 mmHg

141. 符合 I 型呼吸衰竭的动脉血气标准是

142. 符合 II 型呼吸衰竭的动脉血气标准是

[143-144]

- A. 每次抽液量 $<1000\text{ml}$
- B. 加大抗结核药物剂量
- C. 每次抽液量以抽尽为止
- D. 合理化疗同时合并用泼尼松
- E. 抗结核治疗的同时加用抗菌药

143. 结核性大量胸腔积液患者伴有毒血症症状重时应

144. 结核性大量胸腔积液患者抽液的原则是

[145-146]

A. 原发型肺结核

B. 浸润性肺结核

C. 结核性胸膜炎

D. 血行播散型肺结核

E. 慢性纤维空洞性肺结核

145. II型肺结核是指

146. X线表现为垂柳样的多见于

[147-148]

A. FT_3

B. T_3

C. FT_4

D. T_4

E. TSH

147. Graves 病甲状腺功能亢进时最早出现异常的是

148. 原发性甲状腺功能减退症最早出现异常的是

[149-150]

A. 甲状腺素

B. α 受体阻滞剂

C. 复方碘溶液

D. 氢化可的松

E. 去氨加压素

149. 继发性甲减治疗用

150. 甲亢手术前准备用

临床执业/助理医师-第一单元摸底测评卷答案

001. 【答案】C
002. 【答案】C
003. 【答案】B
004. 【答案】E
005. 【答案】B
006. 【答案】A
007. 【答案】E
008. 【答案】C
009. 【答案】A
010. 【答案】E
011. 【答案】D
012. 【答案】C
013. 【答案】B
014. 【答案】E
015. 【答案】C
016. 【答案】E
017. 【答案】B
018. 【答案】A
019. 【答案】E
020. 【答案】B
021. 【答案】D
022. 【答案】B
023. 【答案】A
024. 【答案】B
025. 【答案】C
026. 【答案】B
027. 【答案】E
028. 【答案】B
029. 【答案】B
030. 【答案】A
031. 【答案】B
032. 【答案】C
033. 【答案】C
034. 【答案】C
035. 【答案】B
036. 【答案】B
037. 【答案】E
038. 【答案】B
039. 【答案】A
040. 【答案】E
041. 【答案】E
042. 【答案】E

043. 【答案】B
044. 【答案】C
045. 【答案】A
046. 【答案】B
047. 【答案】D
048. 【答案】A
049. 【答案】C
050. 【答案】E
051. 【答案】C
052. 【答案】B
053. 【答案】D
054. 【答案】C
055. 【答案】C
056. 【答案】C
057. 【答案】E
058. 【答案】E
059. 【答案】E
060. 【答案】B
061. 【答案】C
062. 【答案】B
063. 【答案】D
064. 【答案】A
065. 【答案】E
066. 【答案】A
067. 【答案】D
068. 【答案】E
069. 【答案】C
070. 【答案】D
071. 【答案】A
072. 【答案】B
073. 【答案】E
074. 【答案】D
075. 【答案】A
076. 【答案】C
077. 【答案】B
078. 【答案】B
079. 【答案】E
080. 【答案】B
081. 【答案】B
082. 【答案】A
083. 【答案】B
084. 【答案】E
085. 【答案】A

086. 【答案】D
087. 【答案】B
088. 【答案】D
089. 【答案】C
090. 【答案】B
091. 【答案】B
092. 【答案】B
093. 【答案】B
094. 【答案】C
095. 【答案】D
096. 【答案】E
097. 【答案】E
098. 【答案】C
099. 【答案】A
100. 【答案】D
101. 【答案】A
102. 【答案】E
103. 【答案】B
104. 【答案】D
105. 【答案】E
106. 【答案】C
107. 【答案】C
108. 【答案】C
109. 【答案】D
110. 【答案】B
111. 【答案】A
112. 【答案】A
113. 【答案】C
114. 【答案】E
115. 【答案】D
116. 【答案】B
117. 【答案】B
118. 【答案】B
119. 【答案】D
120. 【答案】C
121. 【答案】B
122. 【答案】D
123. 【答案】B
124. 【答案】C
125. 【答案】E
126. 【答案】A
127. 【答案】D
128. 【答案】D

129. 【答案】A
130. 【答案】D
131. 【答案】C
132. 【答案】E
133. 【答案】E
134. 【答案】A
135. 【答案】B
136. 【答案】D
137. 【答案】B
138. 【答案】E
139. 【答案】C
140. 【答案】A
141. 【答案】D
142. 【答案】C
143. 【答案】D
144. 【答案】A
145. 【答案】D
146. 【答案】E
147. 【答案】E
148. 【答案】E
149. 【答案】A
150. 【答案】C