

临床执业医师 2021 年真题

第一单元

1. 患者，女，32 岁。接受精神分析治疗，舒适地躺在沙发上，把进入头脑中的一切都讲出来，不论其如何微不足道、荒诞，都如实地报告出来，这种方法是
 - A. 移情
 - B. 自由联想
 - C. 释梦
 - D. 阻抗
 - E. 自我宣泄
2. 患者反复就医仍不能治愈疾病，近日情绪波动较大，过分担忧。该患者属于哪种精神障碍
 - A. 惊恐障碍
 - B. 焦虑障碍
 - C. 强迫障碍
 - D. 双相障碍
 - E. 应激障碍
3. 女，30 岁，不婚主义者，想去医院接受人工授精，但是被拒绝了，涉及的医院《伦理学》问题是
 - A. 保护后代原则
 - B. 患者有利原则
 - C. 保密原则
 - D. 社会公益原则
 - E. 知情同意原则
4. 医生小刘在值班期间，某病房突然失火，小刘不顾个人安危，奋不顾身将卧床患者背下楼。其行为受到医患众人的好评。小李履行了下列哪项义务
 - A. 维护医务人员之间、医院间的和谐
 - B. 维护医务人员和医院的声誉
 - C. 维护医务人员和医院的经济效益
 - D. 维护医务人员和医院的自身利益
 - E. 维护患者的利益和社会公益
5. 医生李某，未经人体器官移植技术临床应用与伦理委员会审查同意摘取了王某的一个肾脏，牟取私利，其应受到的处罚是

- A. 吊销其执业证书
- B. 行政拘留
- C. 暂停其 6 个月以上 1 年以下执业活动
- D. 暂停其 1 年以上 2 年以下执业活动
- E. 暂停其 2 年以上 3 年以下执业活动
6. 某育龄妇女因摔倒后腰部及下腹部剧烈疼痛，经检查发现已妊娠 12 周。为进一步明确诊断，接诊医师没有开放射相关的检查，原因是
- A. 妊娠妇女且在 8~15 周孕期
- B. B 超即可诊断
- C. 就诊前服用止痛药
- D. 根据病史即可诊断
- E. 患者拒交相关费用
7. 患者，男，17 岁。需行手术治疗，最适宜应由谁签署知情同意书
- A. 患者的表兄弟
- B. 患者的爷爷
- C. 患者的老师
- D. 患者本人
- E. 患者的父母
8. 老年患者发生脑出血急诊入院，无儿无女，其老伴经受不住打击出现精神恍惚。若要行急诊手术，应由谁同意签字
- A. 等待家属清醒后签字
- B. 医疗机构负责人
- C. 上报到市级卫生部门
- D. 可直接行急诊手术
- E. 等患者清醒后签字
9. 大龄未婚女性想进行人工授精，但被拒绝，主要的原因是违背了
- A. 社会公正原则
- B. 社会公益原则
- C. 全社会参与原则
- D. 互相协同原则
- E. 信息公开原则
10. 健康伦理的核心包括
- A. 健康责任

- B. 健康权利
C. 健康公正
D. 健康义务
E. 健康互助
11. 运动出汗属于
A. 辐射散热
B. 传导散热
C. 对流散热
D. 蒸发散热
E. 以上均错误
12. 给高热患者用冰帽降温是通过增加
A. 辐射散热
B. 传导散热
C. 对流散热
D. 蒸发散热
E. 以上均错误
13. 下列关于胆色素的叙述，正确的是
A. 以血红素为主要成分
B. 胆汁酸为其代谢终产物
C. 在血中主要与球蛋白结合而运输
D. 铁卟啉化合物的分解代谢产物
E. 可以转变成细胞色素
14. 女性素食主义者长期大量食用碾磨过分精白的米和面粉容易缺乏
A. 维生素 C
B. 维生素 A
C. 维生素 B1
D. 维生素 D
E. 膳食纤维
15. 下列哪种酶缺乏引起蚕豆病
A. 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶
B. 苯丙氨酸羟化酶
C. 丙酮酸脱氢酶
D. 酪氨酸羟化酶

E. 肌酸激酶

16. 白化病是哪一种氨基酸酶异常或缺乏引起

A. 天冬酰胺

B. 谷氨酸

C. 谷氨酰胺

D. 酪氨酸

E. 精氨酸

17. 某女中学生，在晚上遭遇一条白狗，当时十分恐惧，表现出心率加快、血压增高、呼吸加速和肌张力增强，这些生理反应说明活动增强的神经内分泌系统是

A. 下丘脑-垂体-甲状腺轴

B. 下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴

C. 交感-肾上腺髓质轴

D. 下丘脑-垂体-性腺轴

E. 下丘脑-神经垂体轴系

18. 下列行主动转运的物质是

A. 二氧化碳

B. 维生素 D

C. 氨基酸

D. 递质

E. 激素

19. 出现尿糖阳性时，血糖至少为

A. 11.1mmol/L

B. 7.0mmol/L

C. 8.0mmol/L

D. 6.1mmol/L

E. 10.0mmol/L

20. 心理活动可以通过大脑直接影响以下系统来调节生理变化，但需除外下列哪个系统

A. 心血管系统

B. 交感神经系统

C. 内分泌系统

D. 自主神经系统

E. 免疫系统

21. 下列关于发热时机体代谢变化的叙述，不正确的是

A. 基础代谢率提高

B. 可发生代谢性酸中毒

C. 维生素 B 族和维生素 C 缺乏

D. 出现正氮平衡

E. 脂肪分解增强

22. 某高血压患者，昏迷数小时后清醒。查体：右侧上、下肢呈痉挛性瘫痪，腱反射亢进，病理反射阳性；伸舌时舌尖偏向左侧，左侧半舌肌萎缩。右侧躯干及上、下肢振动觉和精细触觉消失，但全身痛、温觉正常。患者可能受损的部位和结构是

A. 左侧中脑腹侧部，受损结构有左侧锥体束、右侧内侧丘系

B. 左侧脑桥腹侧部，受损结构有左侧锥体束、右侧内侧丘系

C. 右侧脑桥腹侧部，受损结构有右侧锥体束、左侧内侧丘系、左侧三叉神经核

D. 左侧延髓腹侧部，受损结构有左侧锥体束、左侧内侧丘系、左侧舌下神经核

E. 右侧延髓腹侧部，受损结构有右侧锥体束、右侧内侧丘系、右侧舌下神经核

23. 患儿，5 岁，诊断为多动症，医生给其开具了处方药，但父母没立即取药。几天后再去取被告知已无法取药，其原因是

A. 处方超过规定用量

B. 一张处方中超过 5 种药品

C. 中药与西药开在同一张处方

D. 家属未按规定签字

E. 处方已超过期限

24. 患儿，5 岁，诊断为多动症，医生给其开具了处方药，但父母没立即取药。若开具的是哌醋甲酯，每张处方不得超过多少天的常用量

A. 90 天

B. 20 天

C. 30 天

D. 7 天

E. 15 天

25. 连某，因患严重的躁狂抑郁障碍正在精神病专科医院住院治疗。因病情恶化，患者出现伤人毁物等行为，医院在没有其他可替代措施的情况下，对其实施了约束身体的措施，但实施后没有及时通知连某的监护人。连某的父亲作为监护人探视时，看到儿子被捆绑在病床上非常气愤。对患者连某实施身体约束，而未告知其监护人的做法，侵犯患者权利是

A. 生命权

B. 健康权

- C. 认知权
- D. 知情权
- E. 名誉权

26. 连某，因患严重的躁狂抑郁障碍正在精神病专科医院住院治疗。因病情恶化，患者出现伤人毁物等行为，医院在没有其他可替代措施的情况下，对其实施了约束身体的措施，但实施后没有及时通知连某的监护人。连某的父亲作为监护人探视时，看到儿子被捆绑在病床上非常气愤。依照《精神卫生法》对患者连某实施的约束行为的性质属于

- A. 治性措施
- B. 惩罚性措施
- C. 保护性医疗措施
- D. 诊断性措施
- E. 警告性措施

27. 医疗机构应对无正当理由开具抗菌药物超常处方达到一定次数的医师提出警告，应当予以警告的最低次数是

- A. 2 次
- B. 6 次
- C. 3 次
- D. 4 次
- E. 5 次

28. 某边远医院收治一名宫外孕破裂失血性休克的患者，紧急手术并输血，当时该医院库存血液不足，又无自体血液回输条件，血站送血需要 3 小时车程，在此情况下，医院的正确做法应当是

- A. 动员社会人员互助捐血
- B. 等待血站送血
- C. 外借自体血液回输设备
- D. 立即将患者转院
- E. 临时采集血液，并确保采血用血安全

29. 某医院未经批准新设医疗美容科，从外地聘请了一位退休外科医师担任主治医师，该院行为的性质属于

- A. 非法行医
- B. 超范围执业
- C. 正常医疗行为
- D. 特殊情况
- E. 开展新技术

30. 监测机构发现突发公共卫生事件，向所在地县级人民政府卫生行政部门报告的时限是

- A. 1 小时

- B. 2 小时
C. 3 小时
D. 4 小时
E. 6 小时
31. 母婴保健法及其实施办法中，婚前医学检查服务的内容是指
A. 进行性卫生知识生育知识的教育
B. 进行遗传病知识的教育
C. 对有关婚配问题提供医学意见
D. 对有关生育健康问题提供医学意见
E. 对严重遗传疾病指定传染病和有关精神病的检查
32. 医疗机构未按照规定供应、接收、采购疫苗的，不正确的是
A. 予以警告，没收违法所得
B. 处 5 万元以上 50 万元以下的罚款
C. 由县级以上人民政府卫生健康主管部门责令改正
D. 情节严重的，对负责人撤职处分
E. 责令负有责任的医疗卫生人员暂停 1 年以上 18 个月以下执业活动
33. 属于医师执业规则的是
A. 医师在执业活动中人格尊严人身安全不受侵犯
B. 医师在执业活动中应当遵守法律法规，遵守技术规范
C. 对考核不合格的医师，可以责令其接受培训和继续医学教育
D. 医师应当使用经国家有关部门批准使用的药品、消毒药剂和医疗器械
E. 对医学专业技术有重大突破、作出显著贡献的医师，应当给予表彰或者奖励
34. 患者，男，29 岁。输血后感染艾滋病，这是经
A. 下行传染
B. 垂直传播
C. 水平传播
D. 接触传播
E. 医源性传播
35. 某护士在给一位乙型肝炎病毒携带者注射时，不慎被患者用过的针头刺伤手指。为预防乙型肝炎病毒感染，应首先采取的措施是
A. 注射抗生素
B. 注射丙种球蛋白
C. 注射乙型肝炎疫苗

- D. 注射 α -干扰素
- E. 注射 HBIg
36. 直立时，胸膜腔的最低点位于
- A. 肺下界
- B. 膈上界
- C. 肋膈隐窝
- D. 纵隔下界
- E. 心包下界
37. 齿状韧带由什么构成
- A. 硬脊膜
- B. 蛛网膜
- C. 软脑膜
- D. 软脊膜
- E. 硬脑膜
38. 患儿，3 岁，因出现面色苍白、食欲下降来诊，其父母诉有喂食蚕豆病史，考虑诊断蚕豆病。该患儿最可能缺乏
- A. 磷酸果糖激酶-1
- B. 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶
- C. 丙酮酸羧化酶
- D. 过氧化物酶
- E. ATP 合成酶
39. 化脓性脑膜炎患者最易并发
- A. 脑积水
- B. 脑脓肿
- C. 硬脑膜下积液
- D. 偏瘫
- E. 亚急性硬化性全脑炎
40. 室间隔缺损的患者最常见的并发症是
- A. 肺炎
- B. 化脓性脑膜炎
- C. 脑血栓
- D. 脑脓肿
- E. 脑栓塞

41. 某考研女学生，相信自己一定会通过，但成绩出来后发现并不理想，此后出现情绪低落、焦虑。该学生属于
- A. 急性应激障碍
 - B. 适应障碍
 - C. 创伤后应激障碍
 - D. 分离障碍
 - E. 强迫障碍
42. 在不同年龄段的心理健康中，流体智力升高，晶体智力下降的人群是
- A. 儿童
 - B. 青少年
 - C. 中年人
 - D. 老年人
 - E. 婴幼儿
43. A 型行为性格与下列哪项疾病有关
- A. 癌症
 - B. 溃疡病
 - C. 冠心病
 - D. 功能性胃肠病
 - E. 哮喘
44. 心理过程包括哪 3 个过程
- A. 气质、性格和能力
 - B. 动力、活动和评价
 - C. 认知、情感和意志
 - D. 认知、人格和活动
 - E. 动力、情感和意志
45. 不含味蕾结构的是
- A. 轮廓乳头
 - B. 菌状乳头
 - C. 软腭的黏膜上皮
 - D. 丝状乳头
 - E. 会厌的黏膜上皮
46. 健康管理的首要步骤一般是
- A. 收集健康信息
 - B. 人群的健康体检

- C. 健康维护计划的制定
D. 健康维护计划的实施
E. 疾病危险度评估
47. 下列疾病中，骨髓有核红细胞出现“核老浆幼”现象的是
A. 巨幼红细胞性贫血
B. 急性红白血病
C. 缺铁性贫血
D. 骨髓增生异常综合征
E. 再生障碍性贫血
48. 米索前列醇属于哪类药物
A. PGE1
B. PGE2
C. PGD
D. PGF
E. PGA
49. 下列属于阿片类药物的是
A. 地西洋
B. 甲基苯丙胺
C. 美沙酮
D. 麦角酸二乙酰胺
E. 可拉明
50. 长期应用糖皮质激素治疗，停药时主要注意
A. 检查患者血细胞
B. 了解胃黏膜有无损伤
C. 补充蛋白质
D. 服用抗糖皮质激素药物
E. 逐次减量停药
51. 血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)的特点为
A. 可用于各型高血压，有反射性心率加快
B. 对肾脏无保护作用
C. 可改善高血压患者心肌重塑
D. 长期用药易引起低血钾
E. 抑制高血压患者的前列腺素生成

52. 关于流感病毒的特点，哪项错误

- A. 是有包膜病毒
- B. 具有神经氨酸酶(NA) 刺突
- C. 不易发生抗原性变异
- D. 具有分节段的 RNA 和核蛋白(NP)
- E. 具有血凝素 HA 刺突

53. 通过市场机制来筹集费用和提供服务的保险模式是

- A. 国家医疗保险
- B. 社会医疗保险
- C. 商业医疗保险
- D. 储蓄医疗保险
- E. 企业医疗保险

54. 通过国家立法形式强制实施，主要由雇主和雇员缴纳保费的保险模式

- A. 国家医疗保险
- B. 社会医疗保险
- C. 商业医疗保险
- D. 储蓄医疗保险
- E. 企业医疗保险

55. 用钼靶 X 线摄片检查方法做乳腺癌的筛检试验，分别检查了 100 名经活检确诊为乳腺癌的妇女和 100 名未患乳腺癌的妇女，结果如下：乳腺癌妇女筛查结果阳性 64 例，阴性 36 例；非乳腺癌妇女筛查结果阳性 16 例，阴性 84 例。此项筛检试验中灵敏度为

- A. 16%
- B. 84%
- C. 64%
- D. 36%
- E. 74%

56. 用钼靶 X 线摄片检查方法做乳腺癌的筛检试验，分别检查了 100 名经活检确诊为乳腺癌的妇女和 100 名未患乳腺癌的妇女，结果如下：乳腺癌妇女筛查结果阳性 64 例，阴性 36 例；非乳腺癌妇女筛查结果阳性 16 例，阴性 84 例。此项筛检试验中特异度为

- A. 16%
- B. 84%
- C. 64%
- D. 36%

E. 74%

57. 钼靶 X 线摄片检查方法做乳腺癌的筛检试验, 分别检查了 100 名经活检确诊为乳腺癌的妇女和 100 名未患乳腺癌的妇女, 结果如下: 乳腺癌妇女筛查结果阳性 64 例, 阴性 36 例; 非乳腺癌妇女筛查结果阳性 16 例, 阴性 84 例。此项筛检试验中粗一致率为

A. 16%

B. 84%

C. 64%

D. 36%

E. 74%

58. 某大学学生发生不明原因集体腹泻, 为了寻找病因及流行的线索。首先应进行的研究是

A. 病例对照研究

B. 队列研究

C. 临床试验研究

D. 理论流行病学研究

E. 现况调查研究

59. 某大学学生发生不明原因集体腹泻, 为了寻找病因及流行的线索。通过第一步的研究, 结果提示大批学生的腹泻可能与吃学校食堂饭菜有关, 下一步最好采取

A. 病例对照研究

B. 队列研究

C. 现况调查研究

D. 理论流行病学研究

E. 临床试验研究

60. 患者, 女, 30 岁, 前来体检, 医生为其行巴氏涂片检查, 属于

A. 化学预防

B. 健康筛查

C. 预防接种

D. 危险度评价

E. 健康咨询

61. 孕妇定期产检, 医生嘱其口服叶酸, 属于

A. 化学预防

B. 健康筛查

C. 预防接种

D. 危险度评价

E. 健康咨询

62. 欲比较两种药物的效果是否有差别，若评定为“很有效，较有效，效果一般，基本无效”，宜采用的统计

A. 卡方检验

B. t 检验

C. 方差分析

D. 回归分析

E. 秩和检验

63. 疾病的三间分布是指

A. 国家、地区和城乡分布

B. 职业、家庭和环境分布

C. 短期波动、季节性和周期性分布

D. 年龄、性别和种族分布

E. 时间、地区和人群分布

64. 卫生服务需要主要取决于卫生服务消费者的

A. 实际支付能力

B. 购买愿望

C. 购买愿望和支付能力

D. 自身健康状况

E. 健康状况和购买愿望

65. 孕妇服用叶酸属于什么

A. 化学预防

B. 筛查

C. 健康咨询

D. 免疫接种

E. 药物治疗

66. 患者，男，56岁，矽肺。因呼吸困难2天入院。患者曾在采矿场做采石工长达15年。那么患者所患的矽肺与其职业有关，可认定为

A. 慢性病

B. 急性病

C. 工伤

D. 职业病

E. 与职业无关

67. 流行病学的三类偏倚是

- A. 选择、中心、混杂偏倚
B. 中心、信息、混杂偏倚
C. 选择、信息、混杂偏倚
D. 选择、信息、中心偏倚
E. 选择、数据、混杂偏倚
68. 小概率事件是指
- A. $P \leq 0.05$
B. $P \leq 0.01$
C. $0.01 \leq P \leq 0.05$
D. $0.05 \leq P \leq 0.1$
E. $P \leq 0.1$
69. 与水体富营养化密切相关的元素是
- A. 氟、氮
B. 汞、氟
C. 铅、汞
D. 氮、磷
E. 碘、磷
70. 关于流行病学中的疾病三间分布是指
- A. 性别分布、民族分布、地区分布
B. 人群分布、时间分布、地区分布
C. 历史分布、地区分布、职业分布
D. 年龄分布、季节分布、地区分布
E. 以上都不是
71. 坏血病常见缺乏
- A. 维生素 C
B. 维生素 B
C. 维生素 A
D. 维生素 K
E. 维生素 D
72. 旅游回来后, 和家人描述旅游时遇到的风景属于记忆的内容中的
- A. 运动记忆
B. 逻辑记忆
C. 形象记忆

- D. 情绪记忆
- E. 瞬时记忆
73. 慢性非传染性疾病的一级预防，不包括
- A. 隔离
- B. 预防性治疗
- C. 化学预防
- D. 健康筛查
- E. 健康咨询
74. 对新型冠状病毒防治最有效的措施是
- A. 抗病毒治疗
- B. 及时报告疫情
- C. 隔离
- D. 疫苗接种
- E. 咽拭子筛查
75. 长期吃精面粉容易导致哪种维生素缺乏
- A. 维生素 B1
- B. 维生素 B12
- C. 维生素 B6
- D. 维生素 B2
- E. 维生素 C
76. 以下哪种疾病不属于生物地球化学性疾病的是
- A. 氟中毒
- B. 镉中毒
- C. 砷中毒
- D. 碘缺乏
- E. 克山病
77. 体现了新公共健康精神的项目是
- A. 预防为主
- B. 三级预防
- C. 强化社区行动
- D. 人人享有卫生保健
- E. 群众性自我保健
78. 衡量人群中在短时间内新发病例的频率，采用的指标为

A. 罹患率

B. 发病率

C. 患病率

D. 感染率

E. 续发率

79. 与克山病有关的是

A. 铅中毒

B. 汞中毒

C. 砷中毒

D. 硒缺乏

E. 镉缺乏

80. 与乌脚病有关的是

A. 铅中毒

B. 汞中毒

C. 砷中毒

D. 硒缺乏

E. 镉缺乏

81. 慢性苯中毒主要损害

A. 中枢神经系统

B. 循环系统

C. 造血系统

D. 泌尿系统

E. 呼吸系统

82. 有机磷中毒患者几天后出现呼吸困难和意识障碍, 最可能的原因是

A. 急性脑卒中

B. 有机磷中毒加重

C. 急性有机磷中毒迟发型脑病

D. 中间型综合征

E. 急性有机磷中毒迟发型多发性神经病变

83. 一氧化碳中毒的机制是

A. 该气体与细胞色素氧化酶中三价铁和谷胱甘肽结合抑制细胞呼吸酶

B. 引起氧分压增加, 导致组织供氧不足, 引起缺氧

C. 使血氧饱和度增加, 组织不能利用氧

- D. 该气体与氧化型细胞色素氧化酶中的二价铁结合，引起细胞内窒息
- E. 影响血液中氧的释放和传递，导致低氧血症和组织缺氧
84. 乳糜池临近的椎体是
- A. T11
- B. T12
- C. L1
- D. L2
- E. L3
85. 颈静脉怒张常发生于
- A. 颈外静脉
- B. 颈内静脉
- C. 颈前静脉
- D. 颈静脉弓
- E. 甲状腺静脉
86. 临床进行膀胱穿刺时，可不进入腹膜腔以减少感染，其根据是
- A. 膀胱位于盆腔上方
- B. 膀胱位置浅表，不必打开腹膜腔
- C. 膀胱是腹膜间位器官
- D. 膀胱体直接与腹前壁相邻
- E. 膀胱随尿液充盈程度不同而发生位置变化
87. 下列哪项是引起低容量性低钠血症的原因
- A. 长期持续使用速尿
- B. 肾上腺皮质功能亢进
- C. 幽门梗阻患者
- D. 大面积烧伤
- E. 大量出汗
88. 高钾血症易引起心脏骤停的发病机制，不正确的是
- A. 增加了心肌复极 2 期时 Ca^{2+} 的内流
- B. 动作电位 0 期心肌细胞膜内电位上升的速度减慢
- C. 细胞膜处于部分去极化
- D. 动作电位时间和有效不应期均缩短
- E. 细胞内 K^{+} 的外流比正常时加快
89. 某患者血氧检查结果为： $\text{PaO}_2 250\text{mmHg}$ ，血氧容量 20ml/dl ，动脉血氧含量 15ml/dl ，动-静脉血氧含量差 4ml/dl 。

其缺氧类型是

- A. 低张性缺氧
- B. 血液性缺氧
- C. 淤血性缺氧
- D. 组织性缺氧
- E. 循环性缺氧

90. 气性坏疽的临床特点是

- A. 局部红肿、热、痛不明显
- B. 一般白细胞不升高
- C. 体温正常
- D. 休克发生早
- E. 局部肌坏死，有血性分泌物，恶臭

91. 股骨颈骨折易导致股骨头缺血坏死的主要原因是

- A. 股圆韧带内的小凹动脉损伤
- B. 旋股内侧动脉损伤
- C. 股骨干的滋养动脉升支损伤
- D. 闭孔动脉损伤
- E. 阴部外动脉损伤

92. 膝关节内侧半月板较外侧半月板更容易损伤是因为

- A. 紧附于胫侧副韧带
- B. 屈膝时股骨内旋
- C. 腘肌不适当地牵拉
- D. 形态较小
- E. 运动时被前交叉韧带向后推

93. 患者，男，38岁。运动时扭伤踝关节，导致足不能内翻，最可能损伤的部位是

- A. 胫前肌腱
- B. 外侧副韧带
- C. 腓骨长肌肌腱
- D. 下胫腓韧带
- E. 腓总神经

94. 患者，女，65岁。端坐时出现腰腿痛，行走需要休息片刻缓解疼痛，直腿抬高试验阳性，加强试验阴性。该患者最可能损伤的部位是

- A. 闭孔内肌

- B. 臀小肌
- C. 臀中肌
- D. 臀大肌
- E. 梨状肌

95. 患者，女，36岁。月经周期延长，月经量较前减少，且出现泌乳、体重下降。考虑诊断催乳素腺瘤，最适宜的治疗是

- A. 溴隐亭药物治疗
- B. 经鼻-蝶窦垂体腺瘤切除术
- C. 环磷酰胺化疗
- D. 放射治疗
- E. 黄体酮药物治疗

96. 患者，男，55岁。近2年来出现关节炎症状和尿路结石，进食肉类食物时病情加重。该患者发生的疾病涉及的代谢途径是

- A. 糖代谢
- B. 脂代谢
- C. 嘌呤核苷酸代谢
- D. 嘧啶核苷酸代谢
- E. 氨基酸代谢

97. 白化病是哪种氨基酸酶异常或缺乏引起的

- A. 尿黑酸氧化酶
- B. 组氨酸酶
- C. 酪氨酸酶
- D. 精氨酸酶
- E. 苯丙氨酸羟化酶

98. 奥美拉唑的抑酸机制属于哪种抑制

- A. 竞争性抑制
- B. 非竞争性抑制
- C. 可逆性抑制
- D. 反竞争抑制
- E. 不可逆性抑制

99. 下列关于氧化磷酸化偶联机制的化学渗透学说，哪一项是错误的

- A. 呼吸链中各递氢体可将 H^+ 从线粒体膜内转运到膜外
- B. H^+ 不能自由通过线粒体内膜

- C. 在线粒体膜内外形成电化学梯度而储存能量
- D. 线粒体膜内外形成的电化学梯度包括 H^+ 浓度梯度和跨膜电位差
- E. 当质子顺浓度梯度回流时驱动 ADP 与 P_i 生成 ATP

100. 关于原癌基因特点的叙述, 下列哪项是错误的

- A. 广泛存在于生物界
- B. 基因序列高度保守
- C. 其作用通过表达产物来实现
- D. 基因处于静止或低表达状态
- E. 所有原癌基因都有致癌性

101. 关于原癌基因特点的叙述, 下列哪项是错误的

- A. 广泛存在于生物界
- B. 基因序列高度保守
- C. 其作用通过表达产物来实现
- D. 基因处于静止或低表达状态
- E. 所有原癌基因都有致癌性

102. 关于胆色素的描述, 正确的是

- A. 80%来源于肌红蛋白
- B. 属于水溶性物质
- C. 与蛋白结合后难溶于水
- D. 铁卟啉类化合物的分解代谢产物
- E. 在肠道中分解成尿胆红素

103. 气性坏疽的致病菌产气荚膜梭菌的特点, 错误的是

- A. 有荚膜无鞭毛
- B. 属于专性厌氧菌
- C. 革兰阳性短小杆菌
- D. 可有“汹涌发酵”现象
- E. 外毒素致病

104. 在微循环中, 主要受局部代谢产物调节的结构是

- A. 微动脉
- B. 直捷通路
- C. 毛细血管前括约肌
- D. 真毛细血管
- E. 毛细血管后括约肌

105. 能够通过胎盘的抗体为

- A. IgG
- B. IgA
- C. IgM
- D. IgD
- E. IgE

106. 患者，男，69岁，因尿毒症于2周前行肾移植手术，今出现腰痛、发热、乏力、无尿的症状，彩超提示肾肿大。考虑肾移植失败，行移植肾切除术，病理见移植肾有大量淋巴细胞浸润。肾移植失败最主要的原因是

- A. 急性排斥反应
- B. 超急性排斥反应
- C. 慢性排斥反应
- D. 移植肾衰竭
- E. 移植肾发生急性肾炎

107. 引发超敏反应的抗原是

- A. 同种异型抗原
- B. 异嗜性抗原
- C. 耐受原
- D. 超抗原
- E. 变应原

108. 慢性肉芽肿病的发生原因是

- A. 先天性胸腺发育不全
- B. 吞噬细胞功能缺陷
- C. T、B细胞混合缺陷
- D. 补体某些组分缺陷
- E. B细胞发育和功能异常

109. 患者，女，28岁。停经40天，1个月前始感恶心、厌食、乏力，且日渐加重。诊断：早孕、妊娠剧吐。此时孕妇心肌与脑组织活动的主要供能物质是

- A. 酮体
- B. 脂肪酸
- C. 蛋白质
- D. 氨基酸
- E. 乙酰乙酸

110. 患者，28岁，经产妇。人工流产术后半年，术后断续阴道流血，量不多，术后一直避孕。尿妊娠试验阳性，

查子宫鸭卵大，软。胸片见两肺中下部有多处散在棉絮团影。本例最可能的疾病是

- A. 吸宫不全
- B. 葡萄胎
- C. 侵蚀性葡萄胎
- D. 绒毛膜癌
- E. 胎盘部位滋养细胞肿瘤

111. 患者，女，54岁。行人工流产后3个月，出现持续性的不规则阴道流血，刮宫病理检查提示无绒毛结构，最可能的诊断是

- A. 葡萄胎
- B. 绒毛膜癌
- C. 侵蚀性葡萄胎
- D. 子宫内膜癌
- E. 转移性癌

112. 患者，男，44岁，农民，居住地鼠类活动频繁。以“发热、全身不适、头痛5天”为主诉入院。查体：面色苍白、脉搏细弱而快，皮肤有少许出血点，体温39.8℃，血压60/40mmHg。末梢血象WBC $30 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞80%，异型淋巴细胞10%，血小板 $50 \times 10^9/L$ ，尿蛋白(++)。该患者最可能的诊断是

- A. 流行性脑脊髓膜炎
- B. 败血症，感染性休克
- C. 流行性出血热
- D. 钩端螺旋体病
- E. 传染性单核细胞增多症

113. 患者，男，39岁。聚餐后出现上腹部疼痛、腰背痛，同时腹部出现瘀斑，腹部膨隆、全腹压痛反跳痛，肠鸣音减弱，查BP90mmHg/65mmHg，Fib1.1g/L。考虑急性胰腺炎合并DIC。胰腺炎患者出现DIC的机制是

- A. 通过钙与组织因子形成复合物
- B. 激活凝血酶原，促进凝血酶生成
- C. 导致血管内皮广泛损伤
- D. 促使大量组织因子入血
- E. 引起激肽释放酶原激活

114. 患者，女，26岁。妊娠16周，心慌、怕热、多汗、易饿4周。查体：BP130/60mmHg，中等体型，皮肤潮红，手有细颤，轻度突眼，甲状腺弥漫性II度肿大，血管杂音(+)，心率110次/分，TSH5.0(正常范围0.27~4.20)MIU/ml，FT313.34(2.0~4.4)pg/ml、FT45.18(0.93~1.70)pg/ml，诊断为妊娠合并甲状腺功能亢进症。甲亢的治疗选用

- A. 甲状腺大部切除术
- B. 核素¹³¹I

- C. 丙基硫氧嘧啶
- D. 大剂量心得安
- E. 甲巯咪唑
115. 宫颈上皮不典型增生病变累及 2/3 层以上到全层，但基底膜完整，属于
- A. CIN I
- B. CINIV 级
- C. CINII 级
- D. CINIII 级
- E. 浸润癌
116. 葡萄胎患者行清宫术，需刮除的组织是
- A. 肌层绒毛
- B. 输卵管绒毛
- C. 子宫内绒毛
- D. 蜕膜组织
- E. 宫外绒毛
117. 患者，男，38 岁。入院诊断为扩张型心肌病，心功能 IV 级。心电图示心率 98 次/分，心房颤动，血清钾 6.7mmol/L，血清钠 130mmol/L。该患者不宜应用
- A. 美托洛尔
- B. 呋塞米(速尿)
- C. 螺内酯(安体舒通)
- D. 地高辛
- E. 华法林
118. 阵发性室上性心动过速患者出现晕厥的原因是
- A. 冠状动脉痉挛
- B. 心肌、脑组织缺血缺氧
- C. 并发心肌炎
- D. 并发自发性气胸
- E. 心脏舒张受限
119. 冠状动脉粥样硬化性心脏病患者的膳食原则，不包括
- A. 脂肪热量占总热量不超过 30%
- B. 胆固醇摄入 $\leq 200\text{mg/d}$
- C. 增加植物蛋白摄入
- D. 增加蔬果摄入量

E. 食盐摄入应在 6~10g 之间

120. 慢性萎缩性胃炎，出现贫血的最主要原因是

A. 自身免疫性溶血

B. 营养不良

C. 铁吸收减少

D. 再生障碍

E. 内因子缺乏

121. 对出血坏死性胰腺炎最具诊断价值的是

A. 血脂肪酶增高

B. 血淀粉酶增高

C. 血钙降低

D. 血胆红素增高

E. B 超检查胰腺增大

122. 患者规律服用抗结核药物治疗，若出现视神经炎，应停用

A. 利福平

B. 乙胺丁醇

C. 异烟肼

D. 链霉素

E. 吡嗪酰胺

123. 肝体积明显缩小，外观黄绿色，表面呈结节状，光镜下见肝细胞大片坏死，同时可见肝细胞再生结节，明显淤胆，大量炎症细胞浸润，结节间纤维组织及小胆管明显增生，根据上述病变应诊断为

A. 急性黄疸性普通型肝炎

B. 重度慢性肝炎

C. 急性重型肝炎

D. 亚急性重型肝炎

E. 门脉性肝硬化

124. 患者，男，38 岁。肛周皮下有一深部脓肿，一端向体表穿破，另一端向直肠穿孔，不断有脓、粪液流出，此管道应称为

A. 蜂窝织炎

B. 溃疡

C. 空洞

D. 窦道

E. 瘘管

125. 患者男，57 岁，曾在石英粉厂工作 30 年，因慢性肺源性心脏病致呼吸衰竭、心力衰竭死亡。尸检见双肺组织内明显的灰白色结节样病变，肺门淋巴结肿大，伴有结节样病变，较大的结节中心部有坏死，并形成空洞。结节镜下表现为同心圆排列的玻璃样的胶原纤维呈漩涡状排列，中央部有坏死，边缘可见类上皮细胞、多核巨细胞及淋巴细胞。周围肺组织内肺泡间隔可见纤维组织增生，该患者确切的病理诊断为

- A. 肺结核
- B. 硅沉着病
- C. 肺纤维化
- D. 石棉肺
- E. 硅沉着病合并结核病

126. 糖尿患者由于反复注射胰岛素，在注射局部出现红肿，出血，坏死等剧烈的炎症，应是

- A. 类风湿性关节炎
- B. 类 Arthus 反应
- C. 血清病
- D. 免疫复合物型肾小球性肾炎
- E. SLE

127. 弥漫性新月体性肾小球肾炎因肾小囊内新月体形成，阻塞囊腔，患者可迅速出现的临床表现是

- A. 血尿
- B. 蛋白尿
- C. 少尿
- D. 管型尿
- E. 多尿

128. 叶性肺炎患者出现明显发绀等缺氧症状时，其病变基础是

- A. 合并肺肉质变
- B. 充血水肿期
- C. 红色肝样变期
- D. 灰色肝样变期
- E. 溶解消散期

129. 下列病变中不能根据肉眼所见确定坏死性质的是

- A. 凝固性坏死
- B. 液化性坏死
- C. 脂肪坏死
- D. 纤维素样坏死
- E. 干酪样坏死

130. 可见燕麦细胞的肺癌类型是

- A. 鳞状细胞癌
- B. 腺癌
- C. 小细胞肺癌
- D. 大细胞癌
- E. 腺鳞癌

131. 十二指肠溃疡镜下观，下列描述错误的是

- A. 表面有少量炎性渗出物
- B. 可见坏死组织
- C. 增殖性动脉内膜炎
- D. 可见异型增生细胞
- E. 底部神经节细胞变性

132. 关于肿瘤的转移错误的是

- A. 胃癌可转移至盆腔
- B. 乳腺癌可转移至锁骨上淋巴结
- C. 交界性肿瘤不出现转移
- D. 肝癌可出现脑转移
- E. 肺癌可出现骨转移

133. 患者，男，22岁。反复发作喘息、呼吸困难、咳嗽3年。体检：双肺散在哮鸣音，心脏无异常。下列检查结果中有助于明确诊断的是

- A. 最大呼气流量显著降低
- B. 一秒钟用力呼气容积降低
- C. 最大呼气中段流量降低
- D. 支气管舒张试验阳性
- E. 抗生素治疗有效

134. 支气管哮喘中起主要作用的是

- A. IgG
- B. IgE
- C. IgM
- D. IgA
- E. IgD

135. 患者突发昏迷就院，既往有高血压病史，医院考虑突发高血压危象抢救无效死亡，家属要求进行医疗损害鉴定，执行的机构是

- A. 设区的市医疗协会
- B. 县级卫生行政部门
- C. 设区的市卫生行政部门
- D. 设区的市相关鉴定医疗协会
- E. 待补充

136. 一对夫妇多年未孕，遂至医院准备行医疗辅助生殖技术，一医生为增加患者受孕率，遂一次将多个胚胎种植到患者体内，最后均成功着床，该医生违背了辅助生殖技术的基本原则是

- A. 有利患者
- B. 保护后代
- C. 防止商业化
- D. 社会公益
- E. 待补充

137. 道德的评判标准是

- A. 善恶
- B. 黑白
- C. 美丑
- D. 良善
- E. 是非

138. 与左锁骨上淋巴结转移性腺癌最相关的器官是

- A. 胃
- B. 肝
- C. 食管
- D. 胸腺
- E. 肺

139. 不能抑制胃酸的药是

- A. 西咪替丁
- B. 奥美拉唑
- C. 雷尼替丁
- D. 莫法替丁
- E. 碳酸氢钠

140. 抑制胃酸分泌最强的药

- A. 西咪替丁
- B. 奥美拉唑

- C. 雷尼替丁
- D. 法莫替丁
- E. 碳酸氢钠
141. 解除迷走神经对心脏的抑制，使心率加快的药物
- A. 阿托品
- B. 去甲肾上腺素
- C. 异丙肾上腺素
- D. 肾上腺素
- E. 多巴胺
142. 地西泮抗焦虑作用是作用于大脑的
- A. 大脑皮层
- B. 边缘系统
- C. 黑质纹状体
- D. 下丘脑
- E. 脑干网状结构
143. 治疗指数是指
- A. LD50/ED50
- B. LD99/ED1
- C. LD95/ED5
- D. ED1/LD99
- E. ED95/LD5
144. 良性高血压细小动脉硬化病理改变是细动脉壁
- A. 纤维化
- B. 水肿
- C. 玻璃样变性
- D. 纤维素样坏死
- E. 脂质沉着
145. 分泌穿孔素的免疫效应细胞是
- A. DC 细胞
- B. B 细胞
- C. CTL
- D. 肥大细胞
- E. 嗜酸性粒细胞

146. 革兰阳性菌细胞壁中的磷壁酸的功能是

- A. 扩散作用
- B. 粘附作用
- C. 自溶作用
- D. 溶血作用
- E. 毒素作用

147. 以躯干、四肢等大腿肌肉群参与为主的，有节律，时间较长，能够维持在一个稳定状态的身体活动称为

- A. 有氧运动
- B. 无氧运动
- C. 阻力活动
- D. 体适能
- E. 协调性运动

148. 医师认真倾听患者的意见，但不为其做决定，这体现了健康咨询原则的

- A. 调动参与
- B. 保守秘密
- C. 建立友好的关系
- D. 移情
- E. 识别需求

149. 胰岛 α 细胞分泌的是

- A. 胰高血糖素
- B. 胰岛素
- C. 促胃液素
- D. 胰多肽
- E. 生长抑素

150. 氨基酸在小肠黏膜上皮吸收属于

- A. 继发继发性主动转运
- B. 原发性主动转运
- C. 易化扩散
- D. 单纯扩散
- E. 入胞转运

第二单元

1. 男, 40 岁。反复发热半个月。查体: $T38.5^{\circ}\text{C}$, 双侧颈部及右侧腹股沟区可触及数个肿大淋巴结, 最大为 $2\text{cm}\times 2\text{cm}$, 活动, 无压痛。腹软, 肝、脾肋下未触及。淋巴结活检找到 R-S 细胞。胸部 CT 显示右侧胸腔积液, 穿刺胸水见大量淋巴瘤细胞。

- A. ABVD 方案
- B. CHOP 方案
- C. COP 方案
- D. HA 方案
- E. DVLP 方案

2. 男, 40 岁。反复发热半个月。查体: $T38.5^{\circ}\text{C}$, 双侧颈部及右侧腹股沟区可触及数个肿大淋巴结, 最大为 $2\text{cm}\times 2\text{cm}$, 活动, 无压痛。腹软, 肝、脾肋下未触及。淋巴结活检找到 R-S 细胞。胸部 CT 显示右侧胸腔积液, 穿刺胸水见大量淋巴瘤细胞。患者最可能的诊断是

- A. 霍奇金淋巴瘤
- B. 淋巴结转移癌
- C. 非霍奇金淋巴瘤
- D. 急性淋巴细胞白血病
- E. 急性粒细胞白血病

3. 孕期出现巨幼细胞贫血主要是由于缺乏

- A. 维生素 B12
- B. 泛酸
- C. 叶酸
- D. 蛋白质
- E. 铁

4. 粒细胞缺乏症的诊断标准是指外周血中性粒细胞绝对计数低于

- A. $0.2\times 10^9/\text{L}$
- B. $0.5\times 10^9/\text{L}$
- C. $4.0\times 10^9/\text{L}$
- D. $1.5\times 10^9/\text{L}$
- E. $3.0\times 10^9/\text{L}$

5. 患者, 男, 15 岁。贫血伴尿色黄 5 年, 未诊治。其弟弟有类似表现。查体: 巩膜轻度黄染, 脾肋下 2cm。实验室检查: $\text{Hb}70\text{g/L}$, $\text{MCV}70\text{fL}$, $\text{MCHC}29\%$, 网织红细胞 0.09, 尿胆红素(-), 尿胆原强阳性。最有帮助的检查是

- A. 酸溶血试验
- B. 自体溶血试验
- C. Coombs 试验
- D. 血红蛋白电泳
- E. 血沉

6. 患者, 女, 40 岁。因宫颈癌接受化疗, 近 3 天来常发生牙龈出血, 血小板计数 $20\times 10^9/\text{L}$, 遂给予血小板输注, 输注后 20 分钟, 患者突然寒战、发热、恶心, 体温 39.5°C , 尿色正常。该患者很可能发生的输血不良反应是

- A. 非溶血性发热性输血反应
- B. 溶血性输血反应
- C. 过敏反应
- D. 出血
- E. 循环超负荷

7. 患者，男，80岁。体重45kg。因胃癌需要手术治疗。脉搏100次/分，血压140/95mmHg；Hb60g/L，血小板 $90 \times 10^9/L$ ，医生决定给予输血。此时应该选用

- A. 新鲜全血
- B. 浓缩红细胞
- C. 去白细胞的红细胞
- D. 浓缩红细胞和血浆
- E. 去白细胞的红细胞和血浆

8. 患者，女，28岁。月经量多1年，近10日经常鼻出血，脾肋下未及。血红蛋白90g/L，白细胞 $10 \times 10^9/L$ ，血小板 $30 \times 10^9/L$ 。骨髓检查：粒红细胞系增生旺盛，巨核细胞增多，伴成熟障碍，应诊断为

- A. 原发免疫性血小板减少症
- B. 血友病
- C. 过敏性紫癜
- D. 弥散性血管内凝血
- E. 血小板增多症

9. 小李儿子手术需要输血，小李想献血。已知小李为A型血，经交叉配血试验，主侧不凝集而次侧凝集，则小李儿子的血型应为

- A. A型
- B. B型
- C. AB型
- D. O型
- E. A型或B型

10. 患者，男，14岁。左膝关节肿胀3天，自幼外伤后易出血不止。查体：皮肤、黏膜未见出血及紫癜，出血时间2分，凝血时间30分，凝血酶原时间正常。父亲也有类似病史。该患者所患疾病分类应为

- A. 纤维蛋白生成障碍
- B. 凝血酶生成障碍
- C. 血小板异常
- D. 凝血活酶生成障碍
- E. 血管壁功能异常

11. 患者，男，35岁。1周来乏力、发热伴牙龈肿胀出血。化验Hb65g/L，WBC $3.0 \times 10^9/L$ ，分类见原幼细胞30%，Plt $35 \times 10^9/L$ 。骨髓检查原始细胞80%，POX染色部分呈弱阳性，非特异性酯酶染色阳性，NaF可抑制。该例急性白血病最可能的FAB分型是

- A. M1型
- B. M2型
- C. M3型
- D. M4型

E. M5 型

12. 患者，男，33 岁。患慢性粒细胞白血病 3 年，应用羟基脲常规治疗。近 1 周出现发热。查体：T39.2℃，脾肋下 6cm。查红细胞无异常，Hb70g/L，WBC $50 \times 10^9/L$ ，PLT $50 \times 10^9/L$ ，骨髓增生极度活跃，原始粒细胞占 15%。该患者目前最重要的治疗是

- A. 高剂量阿糖胞苷
- B. 小剂量高三尖杉酯碱+阿糖胞苷
- C. 酪氨酸激酶抑制剂
- D. 小剂量柔红霉素+阿糖胞苷
- E. 高剂量羟基脲

13. 患者，男，35 岁。腹泻 10 余次，水样便，伴恶心、呕吐，无腹痛、发热。查体：T36.1℃，P110 次/分，BP75/50mmHg。精神萎靡、烦躁，皮肤弹性差，腹软，无压痛，肠鸣音亢进。粪动力试验阳性。该患者最有可能的诊断是

- A. 霍乱
- B. 细菌性痢疾
- C. 细菌性食物中毒
- D. 急性胃肠炎
- E. 胃肠型感冒

14. 患者，男，35 岁。腹泻 10 余次，水样便，伴恶心、呕吐，无腹痛、发热。查体：T36.1℃，P110 次/分，BP75/50mmHg。精神萎靡、烦躁，皮肤弹性差，腹软，无压痛，肠鸣音亢进。粪动力试验阳性。该患者最适合的治疗措施是

- A. 静脉点滴抗生素
- B. 静脉点滴碳酸氢钠
- C. 静脉补充电解质和液体
- D. 口服补液盐
- E. 口服止泻药

15. 麻疹的传播途径是

- A. 呼吸道传播
- B. 消化道传播
- C. 接触传播
- D. 虫媒传播
- E. 血液、体液传播

16. 疟疾的传播途径是

- A. 呼吸道传播
- B. 消化道传播
- C. 接触传播
- D. 虫媒传播
- E. 血液、体液传播

17. 男，25 岁。5 天来出现发热、头痛、眼眶痛。与啮齿类动物有接触史。查体：面部潮红，结膜充血，胸背部皮肤有大小不等的出血点。尿常规：尿蛋白(+++)。该患者的诊断可能为

- A. 流行性脑脊髓膜炎
- B. 斑疹伤寒

C. 肾综合征出血热

D. 钩端螺旋体病

E. 败血症

18. 男, 25 岁。5 天来出现发热、头痛、眼眶痛。与啮齿类动物有接触史。查体: 面部潮红, 结膜充血, 胸背部皮肤有大小不等的出血点。尿常规: 尿蛋白(+++)。为明确诊断, 首选的检查是

A. 肥达-外斐试验

B. 尿培养

C. 血清特异性抗体检测

D. 血常规

E. 咽拭子培养

19. 男, 25 岁。5 天来出现发热、头痛、眼眶痛。与啮齿类动物有接触史。查体: 面部潮红, 结膜充血, 胸背部皮肤有大小不等的出血点。尿常规: 尿蛋白(+++)。病原治疗首选的药物为

A. 四环素

B. 环丙沙星

C. 利巴韦林

D. 金刚烷胺

E. 青霉素

20. 女, 19 岁。发热伴食欲减退 1 周。查体: T39.6℃, 脉搏 74 次/分, 神志清楚, 表情淡漠, 腹部可见红色斑丘疹, 肝肋下 2cm, 脾肋下 1cm。外周血白细胞 $2.6 \times 10^9/L$ 。首先应考虑诊断是

A. 伤寒

B. 疟疾

C. 斑疹伤寒

D. 肾综合征出血热

E. 败血症

21. 女, 19 岁。发热伴食欲减退 1 周。查体: T39.6℃, 脉搏 74 次/分, 神志清楚, 表情淡漠, 腹部可见红色斑丘疹, 肝肋下 2cm, 脾肋下 1cm。外周血白细胞 $2.6 \times 10^9/L$ 。为明确诊断最有意义的检查是

A. 粪便培养

B. 外斐反应

C. 肥达反应

D. 血涂片查疟原虫

E. 血培养

22. 患者, 女, 22 岁。自述乏力、食欲减退、尿黄 10 天。近 1 个月经常在外进餐。既往无肝炎病史, 无服用损害肝药物史。查体: 意识清楚, 巩膜轻度黄染, 肝掌(-), 腹软, 肝区叩痛(+), 肝脾肋下未触及。实验室检查: ALT2300U/L, AST410U/L, TBI160 $\mu\text{mol/L}$, DBI1140 $\mu\text{mol/L}$ 。最可能的诊断是

A. 自身免疫肝炎

B. 急性病毒性肝炎

C. 脂肪肝

D. 慢性肝炎急性发作

E. 药物性肝炎

23. 患者, 女, 45 岁。主诉发热、腹痛、腹泻 2 小时, 大便 10 余次, 为脓血便, 5 小时前曾在小餐馆进食。

实验室检查：血 WBC $13.0 \times 10^9/L$ ，N0.85，L0.15。粪便镜检：WBC80/HP，RBC10/HP。最可能的诊断是

- A. 急性胃肠炎
- B. 急性阑尾炎
- C. 急性病毒性腹泻
- D. 急性细菌性痢疾
- E. 食物中毒

24. 女，22岁。妊娠30周。出现外阴灰白色疣状物伴瘙痒、灼痛不适半个月。外阴皮损病理组织学检查见挖空细胞。最可能的诊断是

- A. 梅毒
- B. 尖锐湿疣
- C. 淋病
- D. 细菌性阴道病
- E. 滴虫性阴道炎

25. 肾综合征出血热早期休克的主要原因是

- A. 病毒血症
- B. 血浆外渗
- C. 心肌损害
- D. 微血管痉挛
- E. 电解质紊乱

26. 下列关于伤寒的治疗措施，不正确的是

- A. 抗感染首选喹诺酮类抗生素
- B. 便秘时用高压灌肠
- C. 少进食豆奶等产气食物
- D. 低糖低脂饮食
- E. 禁止用新斯的明等促进肠蠕动药

27. 丙型肝炎的确诊检查是

- A. HCV 抗体检测
- B. HCV-DNA 检测
- C. HCV-RNA 检测
- D. 肝功能检查
- E. 腹部 CT

28. 粒细胞缺乏症的诊断标准是指外周血的中性粒细胞绝对计数低于

- A. 0.2×10^9
- B. 0.5×10^9
- C. 4.0×10^9
- D. 1.5×10^9
- E. 3.0×10^9

29. 患者，男，7岁。近期剧烈运动后气短、乏力。查体：心前区未触及震颤，胸骨左缘第2肋间闻及3/6级收缩期喷射性杂音，P2增强，固定分裂。明确诊断首选的检查是

- A. 心电图检查

- B. 超声心动图
- C. 磁共振成像
- D. 心导管检查
- E. 心电图

30. 患儿，男，10岁。发热、头痛、呕吐3天。查体：精神萎靡，全身皮肤有散在瘀点、瘀斑，两肺无异常，腹软无压痛。诊断应首先考虑

- A. 流行性乙型脑炎
- B. 钩端螺旋体病脑膜脑炎型
- C. 流行性出血热
- D. 脑型疟疾
- E. 流行性脑脊髓膜炎

31. 患者，女，26岁。曾在大便中发现白条状物。颈部有一圆形皮下结节，质地较硬，活动好，无压痛。明确诊断最有意义的检查是

- A. 血培养
- B. 大便常规
- C. 皮下结节活检
- D. 血象
- E. 环卵沉淀试验

32. 鉴别再障和白细胞不增多型白血病最重要的检查是

- A. 血小板计数
- B. 外周血找幼稚白细胞
- C. 外周血找红细胞
- D. 骨髓细胞学检查
- E. 网织红细胞计数

33. 慢性粒细胞白血病用伊马替尼治疗无效后的治疗措施是

- A. 造血干细胞移植
- B. 改用羟基脲治疗
- C. 改用 α 干扰素治疗
- D. 脾切除
- E. 改用二代TKI进行治疗

34. 易出现睾丸浸润肿大，且较易累及中枢神经系统的白血病类型是

- A. 急性粒细胞白血病
- B. 急性单核细胞白血病
- C. 急性淋巴细胞白血病
- D. 急性粒-单核细胞白血病
- E. 急性早幼粒细胞白血病

35. 儿童继发性肾炎最常见的类型是

- A. 肾淀粉样变性
- B. 紫癜性肾炎
- C. 肾病综合征

D. 狼疮肾炎

E. 膜性肾病

36. 属于慢性肾炎的病理类型是

A. 肾淀粉样变性

B. 紫癜性肾炎

C. 肾病综合征

D. 狼疮肾炎

E. 膜性肾病

37. 男, 40 岁。夜尿增多 1 年余。偶有双下肢水肿。查体: BP150/110mmHg, 尿蛋白(+), 血肌酐 $180 \mu\text{mol/L}$ 。

最可能的诊断是

A. 急性肾小球肾炎

B. 慢性肾小球肾炎

C. 肾病综合征

D. 急进性肾小球肾炎

E. 高血压肾损害

38. 男, 40 岁。夜尿增多 1 年余。偶有双下肢水肿。查体: BP150/110mmHg, 尿蛋白(+), 血肌酐 $180 \mu\text{mol/L}$ 。

该患者应首选的降压药物是

A. 袢利尿剂

B. 血管紧张素转换酶抑制剂

C. 钙通道阻滞剂

D. β 受体拮抗剂

E. α 受体拮抗剂

39. 患者, 女, 28 岁。主诉尿急、尿频、尿痛 2 天, 查体: $T36.5^{\circ}\text{C}$, 双肾区无叩痛, 尿沉渣镜检: RBC5~10/HP,

WBC20~30/HP。最可能的诊断为

A. 急性膀胱炎

B. 急进性肾小球肾炎

C. 急性间质性肾炎

D. 急性肾小球肾炎

E. 急性肾盂肾炎

40. 患者, 男, 50 岁。左肾结核无功能, 右肾严重积水伴尿毒症, 膀胱容量 20ml, 宜先行

A. 膀胱再造术

B. 右肾造瘘术

C. 左肾切除术

D. 膀胱造瘘术

E. 抗结核治疗

41. 患者, 男, 69 岁。进行性排尿困难 3 年, 不能自行排尿 8 小时, 下腹区胀痛。首选的治疗方法为

A. 针灸

B. 耻骨上膀胱穿刺

C. 药物治疗

D. 耻骨上膀胱造瘘

E. 导尿并保留导尿管

42. 患者，男，50岁。间歇性水肿20年，恶心呕吐2周，血压150/100mmHg，Hb80g/L。尿蛋白(++)蜡样管型(+)，血BUN40mmol/L，SCr760 μ mol/L，血钾5.5mmol/L。最适宜的首选治疗方法是

- A. 降压治疗
- B. 利尿剂
- C. 纠正贫血
- D. 禁食疗法
- E. 血液透析

43. 患者，男，24岁。被车撞伤致骨盆骨折，不能排尿1天。查体：烦躁不安，BP70/50mmHg，P120次/分，下腹膨隆，压痛明显。该患者入院后紧急治疗的最好办法是

- A. 尿道会师术
- B. 膀胱造瘘术
- C. 抗休克治疗后膀胱造瘘术
- D. 止痛止血镇静消炎
- E. 尿道缝合术

44. 患者，男，30岁。工地工人，半小时前从3米高架坠落，右腰部受伤，剧烈疼痛，有明显肉眼血尿。查体：烦躁不安，脸色苍白，P120次/分，BP80/40mmHg，右腰部有包块。在对该患者施行手术时宜采用的切口是

- A. 经11肋间切口
- B. 经12肋下切口
- C. 腰背部切口
- D. 经腹切口
- E. 胸腹联合切口

45. 患者，女，70岁，因高血压、冠心病口服阿司匹林、卡托普利、普萘洛尔、硝苯地平、辛伐他汀等药物治疗，用药过程中感觉四肢无力、肌肉酸痛、下肢肌肉疼痛，肌酸激酶水平明显增高。出现上述异常最可能的原因是

- A. 下肢深静脉血栓形成
- B. 下肢动脉粥样硬化
- C. 普萘洛尔的副作用
- D. 卡托普利的副作用
- E. 辛伐他汀的副作用

46. 患者，男，31岁。真菌感染出现口腔白膜，治疗可选用的药物是

- A. 氟康唑
- B. 制霉菌素
- C. 两性霉素
- D. 青霉素
- E. 红霉素

47. 患者，女，35岁。因服用有机磷农药半小时入院，经治疗后意识恢复，症状好转。3天后患者出现视物模糊、呼吸困难，并再次出现意识障碍。查体：T36.7℃，P52次/分，R6次/分。目前应立即给予的治疗措施是

- A. 彻底洗胃
- B. 应用阿托品

- C. 抗休克
- D. 静脉注射安定
- E. 气管插管

48. 患者，男，28岁。昏迷2小时入院。查体：体温37.4℃，呼吸8次/分，瞳孔针尖样，颈、腋淋巴结肿大，无痛，活动好，肝肋下2cm，肘部静脉多处针孔。首选的治疗药物是

- A. 纳洛酮
- B. 阿托品
- C. 解磷定
- D. 乙酰胺
- E. 维生素K1

49. 患者，女，20岁，因食管烧伤7日入院，入院时口渴、躁狂，体重55kg，血气分析 HCO_3^- 6mmol/L，血清钠155mmol/L，输液时首选的是

- A. 0.9%氯化钠
- B. 0.45%氯化钠
- C. 5%碳酸氢钠
- D. 1.25%碳酸氢钠
- E. 1.86%乳酸钠

50. 患者，女，66岁。2年前诊断左股骨颈骨折。近3个月左髋疼痛，逐渐加剧。X线片示左髋关节间隙变窄，股骨头变形。最佳治疗方案是

- A. 左下肢皮肤牵引
- B. 切开复位钢板内固定
- C. 人工关节置换术
- D. 闭合复位内固定
- E. 卧床休息对症治疗

51. 单侧多根多处肋骨骨折最严重的生理改变是

- A. 疼痛，呼吸运动减弱
- B. 胸壁软化，反常呼吸
- C. 咳嗽，血痰
- D. 严重皮下气肿
- E. 肺内出血

52. 膝关节内侧半月板较外侧半月板更容易损伤是因为

- A. 紧附于胫侧副韧带
- B. 屈膝时股骨内旋
- C. 腘肌不适当地牵拉
- D. 形态较小
- E. 运动时被前交叉韧带向后推

53. 患者，男，5岁。突发高热寒战，体温39℃，右膝部疼痛剧烈，不敢活动，局部无明显肿胀。应首先考虑的是

- A. 风湿性关节炎
- B. 膝关节结核

- C. 骨关节炎
- D. 急性血源性骨髓炎
- E. 化脓性关节炎

54. 患者，男，50岁。发生严重车祸，撞伤左小腿，创口出血，骨折端戳出伤口。现场紧急处理时不正确的是

- A. 包扎伤口
- B. 妥善地外固定
- C. 首先抢救生命
- D. 外露的骨折端立即复位
- E. 迅速运往医院

55. 患者，50岁，女。右肩痛半年，活动受限，近来自觉梳头都感到困难。检查：右肩活动受限，肩周肌肉萎缩，局部明显压痛，X线片无异常。考虑为

- A. 关节结核
- B. 肩周炎
- C. 风湿性关节炎
- D. 肩部肿瘤
- E. 骨关节炎

56. 患者，女，28岁。左手腕被镰刀割伤2小时。查体：左手拇指对掌功能障碍，桡侧掌面皮肤感觉障碍。初步判断应为

- A. 腓总神经损伤
- B. 桡神经损伤
- C. 正中神经损伤
- D. 尺神经损伤
- E. 腋神经损伤

57. 患儿，男，11岁。玩耍时摔倒后，右腿疼痛、肿胀，X线示干骺端椭圆形病灶，边界清楚。最可能的诊断为

- A. 软骨肉瘤
- B. 骨肉瘤
- C. 纤维肉瘤
- D. 骨巨细胞瘤
- E. 骨囊肿

58. 患者，男，36岁。腰腿痛3个月，伴有乏力、盗汗。查体：双下肢感觉、运动功能正常。X线显示L2~3椎间隙狭窄，椎旁软组织阴影增宽。最可能的诊断是

- A. 腰椎间盘突出
- B. 腰椎骨质增生症
- C. 腰椎肥大
- D. 腰椎结核
- E. 强直性脊柱炎

59. 桡骨头半脱位的治疗措施是

- A. 手法复位不必固定
- B. 切开复位内固定

- C. 切开复位韧带修复
D. 手法复位外固定
E. 切开复位外固定
60. 脊柱骨折搬运时禁用的方法是
A. 平托将伤员移至木板
B. 平托将伤员移至担架
C. 多人用手同时平托搬运
D. 将患者躯干成一体滚动
E. 一人抬头一人抬足搬运
61. 成人最常见的延迟愈合的骨折是
A. 胫骨上 1/3 骨折
B. 胫骨中、下 1/3 骨折
C. 胫骨中上 1/3 骨折
D. 胫骨下 2/3 骨折
E. 腓骨颈骨折
62. 骨肉瘤可见到的骨膜反应是
A. 肥皂泡样变
B. 乒乓球样改变
C. “溶冰征”改变
D. “日光射线”现象
E. “葱皮状”改变
63. 尺骨上 1/3 骨干骨折合并桡骨小头脱位为
A. 孟氏骨折
B. 盖氏骨折
C. 柯力氏骨折
D. 巴通氏骨折
E. 斯密氏骨折
64. 下列关于外阴阴道假丝酵母菌病治疗，正确的是
A. 阴道内放置咪康唑栓
B. 阴道内放置甲硝唑栓
C. 阴道内放置己烯雌酚栓
D. 外阴应用氢化可的松软膏
E. 外阴应用 0.5% 醋酸液清洗
65. 尿毒症患者高血压最主要的原因是
A. 肾素增多
B. 促红细胞生成素减少
C. 水钠潴留
D. 血管加压素增多
E. 交感神经兴奋
66. 患者，男，25 岁，腰背痛，并向臀部放射。检查见腰背僵硬，神经系统无异常，X 线片显示脊柱呈“竹节”

样改变，骶髂关节间隙变窄，实验室检查：血红蛋白减低、血沉快，HLA-B27 阳性。其诊断是

- A. 风湿性关节炎
- B. 类风湿关节炎
- C. 脊柱结核
- D. 强直性脊柱炎
- E. 腰椎间盘突出症

67. 下列属于类风湿关节炎特征的是

- A. 不出现关节畸形
- B. 多发生于儿童和青少年
- C. 常侵犯腕关节和近端指间关节
- D. 非对称性
- E. 为感染性疾病

68. 关于风湿性疾病的临床特点，下列哪项不正确

- A. 病程多呈慢性经过
- B. 临床表现差异很大
- C. 反复发作与缓解交替出现
- D. 免疫学异常表现复杂
- E. 对治疗反应的个体差异不大

69. SLE 狼疮肾炎首选的免疫抑制剂为

- A. 环磷酰胺
- B. 甲氨蝶呤
- C. 长春新碱
- D. 依木兰
- E. 雷公藤

70. 高血压伴有低钾血症首先考虑

- A. 皮质醇增多症
- B. 嗜铬细胞瘤
- C. 原发性醛固酮增多症
- D. 继发性慢性肾炎的高血压
- E. 肾动脉狭窄

71. 继发性高血压最常见的病因是

- A. 内分泌疾病
- B. 妊娠期合并高血压
- C. 肾实质性高血压
- D. 肥厚型心肌病
- E. 糖尿病

72. 甲状腺功能减退的指标是

- A. T₃、T₄ 降低，TSH 增高
- B. T₃ 降低，T₄、TSH 增高
- C. T₃、T₄ 降低，TSH 降低

D. T3 增高, TSH 降低

E. T3、T4、TSH 正常

73. 单纯性甲状腺肿的血象表现是

A. T3、T4 降低, TSH 增高

B. T3 降低, T4、TSH 增高

C. T3、T4 降低, TSH 降低

D. T3 增高, TSH 降低

E. T3、T4、TSH 正常

74. 患者, 女, 35 岁。出现心悸、消瘦 6 个月, 高热、腹泻、谵语 1 天。查体: T40.2℃, BP90/60mmHg, 大汗, 甲状腺 II 度肿大, 可闻及血管杂音, 双肺未闻及干湿性啰音, P200 次/分, 心律绝对不齐。应首先考虑的诊断是

A. 甲状腺危象

B. 感染性休克

C. 甲状腺功能亢进症合并肠炎

D. 甲亢性心脏病

E. 急性甲状腺炎

75. 患者, 男, 44 岁。身高 1.62m, 体重 56kg, 近 3 个月来口渴、多饮, 查空腹血糖 6.8mmol/L, 无糖尿病家族史。为确定有无糖尿病最有意义的实验室检查是

A. 餐后 2 小时血糖

B. 用药后测血糖

C. 口服葡萄糖耐量试验

D. 糖化血红蛋白

E. 24 小时尿糖定量

76. 患者, 女, 38 岁。心悸、无力 4 个月。大便次数增多, 不成形, 体重下降。1 周前诊断为甲状腺功能亢进症, 未治疗。今日晨起发现双下肢无力, 不能活动。查血钾 2.0mmol/L。患者考虑诊断为

A. 重症肌无力

B. 周期性麻痹

C. 周围神经炎

D. 甲亢性肌病

E. 肌营养不良症

77. 易引起严重低血糖不良反应的降血糖药是

A. 双胍类口服降糖药

B. 磺脲类口服降糖药

C. α 葡萄糖苷酶抑制剂

D. 胰岛素增敏剂

E. GLP-1 受体激动剂

78. 符合糖尿病眼病 III 期表现的是

A. 微血管瘤

B. 机化物增生

C. 玻璃体积血

D. 棉絮状软性渗出

E. 视网膜脱离

79. 孕妇 8 周，口服丙硫氧嘧啶抑制甲状腺素合成的机制是

- A. 抑制甲状腺过氧化物酶，阻止碘离子氧化
- B. 降低促甲状腺素 (TSH) 分泌
- C. 影响已合成的 T3/T4 释放与利用
- D. 破坏甲状腺组织
- E. 在周围组织中抑制 T4 转化为 T3

80. 妊娠 20 周合并甲亢首选的治疗药物是

- A. 丙硫氧嘧啶
- B. 普萘洛尔
- C. 甲巯咪唑
- D. 碘剂
- E. 抗甲状腺药

81. 1 型糖尿病的首选治疗药物是

- A. 胰岛素
- B. 格列喹酮
- C. 二甲双胍
- D. 普伐他汀
- E. 阿卡波糖

82. 女，42 岁。系统性红斑狼疮患者，长期服用糖皮质激素。半年来，右侧髋部出现进行性疼痛，呈跛行。查白细胞正常，X 线显示髋关节形态好、间隙正常。最有价值的辅助检查是

- A. MRI
- B. B 超
- C. 关节液检查
- D. 结核菌素试验
- E. CT

83. 女，42 岁。系统性红斑狼疮患者，长期服用糖皮质激素。半年来，右侧髋部出现进行性疼痛，呈跛行。查白细胞正常，X 线显示髋关节形态好、间隙正常。患者考虑诊断为

- A. 股骨头缺血性坏死
- B. 髋关节结核
- C. 类风湿关节炎
- D. 强直性脊柱炎
- E. 髋关节骨关节炎

84. 女，42 岁。系统性红斑狼疮患者，长期服用糖皮质激素。半年来，右侧髋部出现进行性疼痛，呈跛行。查白细胞正常，X 线显示髋关节形态好、间隙正常。该患者最适宜的治疗措施是

- A. 口服糖皮质激素
- B. 髋关节融合
- C. 髓芯减压术
- D. 关节镜下滑膜切除
- E. 理疗、避免负重

85. 男, 26 岁。坐位乘车时, 急刹车后右膝前方受到撞击, 出现髌关节剧痛, 髌关节运动障碍, 处于屈曲、内收、内旋畸形状态。患者应诊断为

- A. 股骨颈骨折
- B. 股骨粗隆间骨折
- C. 股骨粗隆下骨折
- D. 髌关节后脱位
- E. 髌关节前脱位

86. 男, 26 岁。坐位乘车时, 急刹车后右膝前方受到撞击, 出现髌关节剧痛, 髌关节运动障碍, 处于屈曲、内收、内旋畸形状态。应选择哪种治疗方法

- A. Hippocrates 法
- B. Kocher 法
- C. Allis 法
- D. 骨牵引
- E. 皮牵引

87. 男, 26 岁。坐位乘车时, 急刹车后右膝前方受到撞击, 出现髌关节剧痛, 髌关节运动障碍, 处于屈曲、内收、内旋畸形状态。可能合并的损伤是

- A. 坐骨神经
- B. 股神经
- C. 闭孔神经
- D. 胫神经
- E. 腓总神经

88. 易损伤血管且不易愈合的骨折

- A. 骨盆骨折
- B. 肱骨髁上骨折
- C. 股骨颈骨折
- D. 锁骨骨折
- E. Coles 骨折

89. 青少年易合并血管神经损伤, 发生外翻畸形的骨折是

- A. 骨盆骨折
- B. 肱骨髁上骨折
- C. 股骨颈骨折
- D. 锁骨骨折
- E. Coles 骨折

90. 男, 26 岁, 坐位乘车时急刹车, 右膝前方受到撞击, 出现右髌剧痛, 髌关节运动障碍, 处于屈曲、内收、内旋畸形状态。最可能出现的合并损伤是

- A. 坐骨神经损伤
- B. 股神经损伤
- C. 闭孔神经损伤
- D. 胫神经损伤
- E. 腓总神经损伤

91. 胫骨干下 1/3 骨折易引起

- A. 骨的缺血性坏死
- B. 血管损伤
- C. 神经损伤
- D. 骨的延迟愈合
- E. 骨筋膜室综合征

92. 检查发现病人尺骨近端 1/3 骨折伴桡骨小头脱位诊断为

- A. 尺骨骨折
- B. Galeazzi 骨折
- C. Monteggia 骨折
- D. Colles 骨折
- E. 肘关节脱位

93. 患者，女，25 岁。咯血伴少尿 3 天。查体 T36.8℃，P74 次/分，BP160/100mmHg，颜面及双下肢水肿。实验室检查：尿红细胞(++)，尿蛋白(++)；尿素氮 10.5mmol/L，血肌酐 189 μmol/L。B 超显示双肾体积增大。该患者最可能的病理诊断是

- A. 新月体性肾小球肾炎
- B. 急性肾盂肾炎
- C. 微小病变型肾炎
- D. 膜性肾小球肾炎
- E. 系膜增生性肾小球肾炎

94. 患者，男，59 岁。排尿困难 1 个月。直肠指检前列腺增大，有结节，质地坚硬。泌尿系超声检查提示前列腺结节，内部回声不均匀。该患者考虑诊断为

- A. 直肠癌
- B. 前列腺癌
- C. 睾丸肿瘤
- D. 膀胱癌
- E. 前列腺增生症

95. 患者，男，71 岁。尿少、尿细 2 个月，发热 3 天。B 超检查见前列腺增大，考虑诊断为前列腺癌。目前首选的处理方法是

- A. 抗感染
- B. 严密观察随诊
- C. 导尿管导尿
- D. 穿刺活检
- E. 化疗

96. 患者，女，25 岁。右肾结核行右肾切除抗结核治疗半年多，尿痛缓解，但尿频加重，每晚 7~8 次，静脉尿路造影见左肾显影尚好，仅伴轻度肾积水及膀胱挛缩，尿常规白细胞 0~2/HP，现治疗应选择

- A. 左肾造瘘术
- B. 继续抗结核治疗
- C. 左输尿管皮肤造瘘术
- D. 膀胱扩大术

E. 膀胱造瘘术

97. 患者，男，68岁。排尿困难2年，腹部平片提示膀胱区有1.8cm椭圆形致密影。首选的治疗方案是

- A. 经尿道膀胱镜取石或碎石
- B. 大量饮水，自然排出
- C. 多饮水+药物治疗
- D. 膀胱切开取石
- E. 服用中药排石

98. 患者，男，22岁。晨起眼睑水肿4个月，查体：可见颜面、下肢水肿。尿常规：尿蛋白(++++)，其水肿原因主要考虑为

- A. 毛细血管血压增高
- B. 血浆胶体渗透压降低
- C. 淋巴回流受阻
- D. 组织液静水压降低
- E. 组织液胶体渗透压升高

99. 急性肾小球肾炎补体恢复正常一般在病后

- A. 1周内
- B. 2周内
- C. 4周内
- D. 6周内
- E. 8周内

100. 内痔的好发部位是截石位的

- A. 2点、7点、11点
- B. 2点、6点、10点
- C. 3点、9点、12点
- D. 3点、7点、11点
- E. 4点、8点、12点

101. 需要紧急溶栓的是

- A. 恶化型心绞痛
- B. ST段抬高型心肌梗死
- C. 非ST段抬高型心肌梗死
- D. 初发型心绞痛
- E. 变异型心绞痛

102. 稳定型心绞痛同等体力活动下心脏症状发作时间延长，属于

- A. 恶化型心绞痛
- B. ST段抬高型心肌梗死
- C. 非ST段抬高型心肌梗死
- D. 初发型心绞痛
- E. 变异型心绞痛

103. 患者，女，52岁。急性前壁心肌梗死16小时，合并急性左心功能不全，血压170/100mmHg，治疗其心功能不全应首选

- A. β 受体阻断药
- B. 地高辛
- C. 硝普钠
- D. 卡托普利口服
- E. 硝酸甘油

104. 患者，男，15岁。活动后心慌、气短、胸痛两周，两周前曾患“感冒”，持续发热一周。查体：面色苍白，心界向左下扩大，心率120次/分，频发早搏。第一心音减弱。心尖区闻及奔马律及III级全收缩期杂音。心肌酶谱检查 CK-MB80U/L。首先考虑的诊断是

- A. 急性心肌梗死
- B. 扩张型心肌病
- C. 风湿性二尖瓣关闭不全
- D. 急性病毒性心肌炎
- E. 急性风湿热

105. 患者，男，52岁。突发心悸、头晕，查体：BP70/45mmHg，心电图示宽QRS波心动过速，心律稍不规则，间断可见呈窄QRS波。首选的治疗是

- A. 静脉注射利多卡因
- B. 静脉注射普鲁卡因酰胺
- C. 直流电复律
- D. 静脉注射普罗帕酮
- E. 静脉注射胺碘酮

106. 患者，男，52岁。诊断为扩张型心肌病，查体：心率80次/分，心律不规整，肝大肋下3.0cm，下肢轻度水肿。治疗首选哪一种药物

- A. 毛花苷丙 0.8mg，静脉注射
- B. 地高辛 0.25mg，每日1次口服
- C. 呋塞米 20mg，静脉注射
- D. 硝普钠 25mg，静脉滴注
- E. 高流量吸氧

107. 患者，女，60岁。发现主动脉瓣狭窄10年，快走时心前区憋闷3年，心电图示左心室肥厚，该患者治疗宜首选

- A. 主动脉瓣瓣膜置换术
- B. 主动脉瓣球囊成形术
- C. 心脏移植
- D. 冠状动脉搭桥术
- E. 主动脉瓣修补术

108. 患者，女，56岁。剧烈胸痛伴发热，ST段除aVR导联以外呈弓背向下型抬高。该患者最可能的诊断为

- A. 高压性气胸
- B. 急性心包炎
- C. 急性心肌梗死
- D. 主动脉夹层动脉瘤破裂
- E. 变异型心绞痛

109. 急性心肌梗死，其闭塞的冠状动脉最常见的是

- A. 左冠状动脉前降支
- B. 右冠状动脉
- C. 左冠状动脉主干
- D. 右冠状动脉加左冠状动脉回旋支
- E. 右冠状动脉主干

110. 洋地黄中毒多见的心律失常是

- A. 室上性心动过速
- B. 室性期前收缩二联律
- C. 心房纤颤
- D. 房室传导阻滞
- E. 房性期前收缩

111. 二尖瓣狭窄最典型的体征是

- A. 胸骨右缘第二肋间收缩期吹风样杂音
- B. 胸骨左缘第二肋间连续机械样杂音
- C. 胸骨左缘第三肋间舒张期叹气样杂音
- D. 心尖部收缩期吹风样杂音
- E. 心尖部舒张期隆隆样杂音

112. 引起左心室前负荷过重的原因为

- A. 三尖瓣关闭不全
- B. 高血压
- C. 主动脉瓣狭窄
- D. 二尖瓣狭窄
- E. 二尖瓣关闭不全

113. 缩窄性心包炎最具有特异性的体征是

- A. 奇脉
- B. 颈静脉怒张
- C. 心包叩击音
- D. 肝大
- E. 心包积液征

114. 急性心肌梗死最常导致

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 二尖瓣关闭不全
- C. 栓塞
- D. 心室壁瘤
- E. 心肌梗死后综合征

115. 急性心肌梗死支架术后服用双联抗血小板药物至少

- A. 6 个月
- B. 8 个月
- C. 12 个月

D. 18 个月

E. 24 个月

116. 患者，女，39 岁。腹胀、呕吐已半年，多于午后发作，吐出隔夜食物，吐量较大，吐后舒服，由于长期呕吐，除脱水外还会造成

A. 低氯、高钾性碱中毒

B. 低氯、低钾性碱中毒

C. 低氯、高钾性酸中毒

D. 低氯、低钾性酸中毒

E. 低氯、低钾血症

117. 患者，男，49 岁。反复出现腹胀 3 年。慢性肝炎病史 15 年。查体发现脐周静脉曲张呈海蛇头样，其最可能的原因为

A. 心包积液

B. 上腔静脉阻塞

C. 下腔静脉阻塞

D. 门静脉高压

E. 肝静脉阻塞

118. 重型病毒性肝炎出血的最主要原因是

A. 血小板减少

B. 毛细血管脆性增加

C. 凝血因子合成减少

D. 肝素样物质增多

E. 骨髓造血功能受抑制

119. 膀胱癌最常见的组织类型是

A. 腺癌

B. 鳞状细胞癌

C. 非上皮性肿瘤

D. 小细胞癌

E. 移行细胞癌

120. 下列宜选用塞来昔布治疗的疾病是

A. 胃溃疡

B. 痛风

C. 骨关节炎

D. 支气管哮喘

E. 肾绞痛

121. 患者，女，34 岁。吸烟，近 1 年来右下肢行走后疼痛，休息后好转，出现间歇性跛行。近 1 个月来，右脚趾变黑、皱缩、失去知觉。此种病变是

A. 干酪样坏死

B. 固缩坏死

C. 干性坏疽

D. 湿性坏疽

E. 变性

122. 一患者，伤后表现单侧坐骨神经痛及腰痛，直腿抬高试验及加强试验阳性，脊柱侧弯，踝反射异常，足趾跖屈力减退，此时最可能损伤的神经是

A. L2

B. L3

C. L4

D. L5

E. S1

123. 男，35 岁，车祸致左髋部疼痛，畸形 2h，查体：左髋部屈曲，内收，内旋，考虑的诊断是

A. 股骨转子间骨折

B. 骨盆骨折

C. 股骨颈骨折

D. 髋关节后脱位

E. 髋关节前脱位

124. 膝关节损伤后，外翻范围增大，损伤什么韧带

A. 前交叉韧带

B. 胫腓韧带

C. 内侧副韧带

D. 外侧副韧带

E. 髌韧带

125. 骨盆骨折的并发症最不可能的是

A. 尿道损伤

B. 坐骨神经损伤

C. 直肠损伤

D. 腹膜后血肿

E. 脊髓损伤

126. 患者摔倒，左踝关节扭伤，韧带部分撕裂，踝关节稳定，首选的治疗是

A. 韧带重建

B. 局部理疗

C. 支具外固定

D. 踝关节置换

E. 非甾体类抗炎药

127. 男，35 岁。被倒塌的房屋压伤左下肢 6 小时入院。查体：T37℃，P108 次/分，R28 次/分，左小腿大片肌肉撕脱，伤口处留有大量污物。急诊行清创处理。术后 3 天，患者体温逐步上升，烦躁不安，大量出汗，尿量明显减少，观察伤口，左下肢明显肿胀，见大量恶臭浆液血性渗出物，皮下可触及捻发音。下列处理措施不正确的是

A. 整块切除受累肌肉

B. 术后勤换敷料

C. 应用高压氧治疗

D. 首选氨基糖苷类抗生素

E. 病变区多处切开

128. 哪项属于破伤风较为特异的临床表现

- A. 张口困难
- B. 恐水
- C. 稽留热
- D. 昏迷
- E. 坏疽

129. 易引起二重感染的主要原因是

- A. 联合应用抗菌药物
- B. 致病菌量过多
- C. 使用免疫抑制剂
- D. 营养不良
- E. 全身免疫力降低

130. 男, 50 岁。头晕、乏力伴腰痛 3 个月。血常规: Hb72g/L, WBC $6.4 \times 10^9/L$, Plt $125 \times 10^9/L$, ESR106mm/h, 血清蛋白电泳见 M 蛋白带。尿蛋白 (+)。骨髓细胞学检查: 幼稚浆细胞占 0.42。腰椎 X 线检查见第 2、3 椎体压缩性骨折。最可能的诊断是

- A. 反应性浆细胞增多症
- B. 多发性骨髓瘤
- C. 骨转移癌
- D. 慢性肾小球肾炎
- E. 霍奇金淋巴瘤

131. 女, 24 岁。头晕、乏力伴月经量增多 1 年。既往体健。查体: 下肢皮肤瘀点, 肝脾肋下未触及。血常规: Hb60g/L, WBC $2.8 \times 10^9/L$, Plt $38 \times 10^9/L$, 网织红细胞 0.001。胸骨骨髓细胞学检查: 骨髓增生活跃, 未见巨核细胞。最可能的诊断是

- A. 特发性血小板减少性紫癜
- B. 再生障碍性贫血三系均减少
- C. 阵发性睡眠性血红蛋白尿
- D. 慢性失血性贫血
- E. 骨髓增生异常综合征

132. 尖锐湿疣的病原体是

- A. 人乳头瘤病毒
- B. 单纯疱疹病毒
- C. 苍白密螺旋体
- D. 淋病奈瑟菌
- E. 钩端螺旋体

133. 艾滋病病人出现腹泻最可能的感染是

- A. 结核感染
- B. 肺孢子菌感染
- C. 隐孢子虫感染
- D. 链球菌感染

E. 菌痢感染

134. 日本血吸虫病的病原体属于

- A. 支原体
- B. 螺旋体
- C. 立克次体
- D. 原虫
- E. 蠕虫

135. 预防疟疾复发选用的药物是

- A. 哌喹
- B. 伯氨喹
- C. 青蒿素
- D. 奎宁
- E. 乙胺嘧啶

136. 钩端螺旋体的传染源和宿主

- A. 鸡和鸭
- B. 猪和蚊
- C. 虱和跳蚤
- D. 病人和带菌者
- E. 鼠和猪

137. 乙型脑炎（简称乙脑）的主要传染源是

- A. 猪
- B. 乙脑病毒携带者
- C. 乙脑患者
- D. 蚊虫
- E. 野鼠

138. 外科医生手术时不慎将手指刺破，患者 HBeAg (+)，该医生 3 月前查肝功能正常，HBsAg (-)，抗 HBs (-)，此时应该采取的措施

- A. 注射聚乙二醇干扰素
- B. 注射丙种球蛋白
- C. 注射乙肝免疫球蛋白
- D. 口服恩替卡韦
- E. 接种乙肝疫苗

139. 流行性斑疹伤寒的病原体

- A. 支原体
- B. 螺旋体
- C. 立克次体
- D. 原虫
- E. 蠕虫

140. 青年女性，发热伴尿频数天，既往体健，肾区叩痛阳性，尿沉渣检查：RBC20-40/HP，WBC30-40/HP，尿细菌 (+)。应考虑诊断为

- A. 急性膀胱炎
- B. 急性肾盂肾炎
- C. 慢性肾小球肾炎
- D. 慢性肾盂肾炎
- E. 泌尿系结核

141. 青年女性，发热伴尿频数天，既往体健，肾区叩痛阳性，尿沉渣检查：RBC20-40/HP，WBC30-40/HP，尿细菌（+）。该患者最可能出现的尿管型为

- A. 上皮细胞管型
- B. 白细胞管型
- C. 颗粒管型
- D. 红细胞管型
- E. 脂肪管型

142. 男性，34岁，诊断甲亢1个月，查体BP：150/90mmHg，静息心率110次/分，用力快速蹬踏后150次/分，该患者心率加快的发病机制是

- A. 心肌收缩力增强
- B. 每搏输出量增加
- C. 外周阻力降低
- D. 动脉压升高
- E. 心肌对 β 受体的敏感性增强

143. 一侧肾结核无功能，对侧肾正常，应行

- A. 抗结核治疗
- B. 病灶清除术
- C. 肾部分切除术
- D. 肾切除术
- E. 肾造瘘

144. PTT、PT都延长提示缺乏以下成分，除了

- A. 凝血因子II
- B. 凝血因子V
- C. 凝血因子X
- D. 纤维蛋白原
- E. 凝血因子VIII

145. 外源性凝血途径启动于

- A. 凝血因子II
- B. 凝血因子III
- C. 凝血因子IV
- D. 凝血因子XII
- E. 凝血因子IX

146. 侵袭性非霍奇金淋巴瘤的首选治疗方案为

- A. DA方案
- B. CHOP方案

C. MOPP 方案

D. VDLP 方案

E. ABVD 方案

147. 急性髓系白血病化疗方案为

A. DA 方案

B. CHOP 方案

C. MOPP 方案

D. VDLP 方案

E. ABVD 方案

148. 酮症酸中毒过早补充碳酸氢钠的造成的后果是

A. 继发性低钾血症

B. 继发性低钠血症

C. 继发性低钙血症

D. 待补充

E. 待补充

149. 糖尿病降脂治疗首要目标是降低什么

A. CM

B. VLDL

C. HDL

D. LDL

E. IDL

150. 甲亢术后最严重并发症是

A. 甲状腺危象

B. 呼吸困难和窒息

C. 喉上神经损伤

D. 喉返神经损伤

E. 待补充

第三单元

1. 患者，女，26岁，面色苍白，易疲乏，时而烦躁，食欲减退。自诉为素食主义者，近期月经量过多。检查：Hb86g/L，RBC 3.45×10^{12} /L。最可能的诊断是
- A. 巨幼细胞贫血
 - B. 再生障碍性贫血
 - C. 缺铁性贫血
 - D. 维生素B12缺乏性贫血
 - E. 生理性贫血
2. 引起过敏反应的主要血液成分是
- A. 红细胞
 - B. 血浆
 - C. 淋巴细胞
 - D. 血小板
 - E. 纤维蛋白
3. 可见高度脾大的疾病是
- A. 结缔组织病
 - B. 急性白血病
 - C. 慢性溶血性贫血
 - D. 慢性粒细胞白血病
 - E. 急性失血
4. 患者，男，35岁。车祸头部外伤，昏迷30分钟后清醒。查体：神志清楚，右颞头皮血肿，神经系统检查无阳性发现。入院观察，5小时后又转入昏迷，伴右侧瞳孔逐渐散大，左侧肢体瘫痪。临床诊断首先考虑是
- A. 急性硬脑膜下积液
 - B. 脊髓横断
 - C. 脑水肿
 - D. 脑挫伤
 - E. 急性硬脑膜外血肿
5. 患者，男，34岁。患伤寒经治疗后体温渐降，但未降至正常，此后体温再次升高，血培养阳性，属于
- A. 复发
 - B. 再燃
 - C. 重复感染
 - D. 混合感染
 - E. 继发感染
6. 患者，女，30岁。肛周及外生殖器丘疹、乳头状赘生物，醋酸白试验阳性。最可能感染的病原体是
- A. 疱疹病毒
 - B. 沙眼衣原体
 - C. 人免疫缺陷病病毒
 - D. 苍白密螺旋体
 - E. 人乳头瘤病毒

7. 下列关于腹膜解剖生理的描述, 错误的是

- A. 由间皮细胞构成
- B. 是双向性半透膜
- C. 可分泌淋巴细胞及巨噬细胞
- D. 受交感神经和迷走神经支配
- E. 腹膜腔是人体最大的体腔

8. 患者, 女, 33 岁。尿频、尿急、尿痛 2 年。尿常规检查示白细胞 30~50/HP, 红细胞 15~25/HP。排泄性尿路造影显示右肾区散在小片状高密度阴影, 右肾不显影, 左肾中度积水, 造影片上膀胱如乒乓球大小。应怀疑

- A. 右肾结核
- B. 左肾结核
- C. 双肾结核
- D. 右肾、膀胱结核
- E. 右肾多发结石+左输尿管结石

9. 关于闭合性肾损伤, 应考虑手术治疗的是

- A. 肾实质裂伤
- B. 保守治疗观察过程中出现血尿
- C. 血尿加重伴血压下降
- D. 血尿仍存在, 但血压在上升
- E. 伤后出现腰部或腹部包块

10. 患者, 女, 45 岁。体重 50kg, 包括臀在内双下肢全部烫伤。查体: 臀部及双下肢红肿明显, 有大小不一的水泡形成, 疼痛不明。该患者属于几度烧伤

- A. 深 II 度烧伤
- B. 浅 II 度烧伤
- C. I 度烧伤
- D. III 度烧伤
- E. 浅 III 度烧伤

11. 患者, 女, 45 岁。体重 50kg, 包括臀在内双下肢全部烫伤。查体: 臀部及双下肢红肿明显, 有大小不一的水泡形成, 疼痛不明。第一个 24 小时的补液量是

- A. 5450ml
- B. 5750ml
- C. 3750ml
- D. 3450ml
- E. 6750ml

12. 因雌激素比例失调, 使乳腺实质增生和复旧不全引起的疾病是

- A. 乳腺癌
- B. 乳管内乳头状瘤
- C. 乳房肉瘤
- D. 乳房纤维腺瘤
- E. 乳腺囊性增生病

13. 患者, 女, 26 岁。双侧乳房周期性胀痛 3 年, 并可触及不规则包块, 伴有触痛, 月经过后疼痛缓解, 包块

略缩小，考虑可能是

- A. 乳腺癌
- B. 乳腺炎
- C. 乳腺纤维瘤
- D. 乳腺囊性增生病
- E. 乳管内乳头状瘤

14. 一氧化碳中毒时，防止中毒性迟发脑病最重要的手段是

- A. 静脉注射地塞米松
- B. 高压舱氧疗
- C. 静脉注射甘露醇
- D. 静脉注射呋塞米
- E. 护脑药物的应用

15. 某患儿，男，10岁，因发热2天就诊。家住平房，蚊子多，周围有类似患者。查体：体温39℃，心率120次/分，血压140/90mmHg。皮肤无瘀斑、瘀点。脑膜刺激征阳性。实验室检查：血白细胞 $17 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.8。该患儿最可能的诊断是

- A. 流行性乙型脑炎
- B. 流行性脑脊髓膜炎
- C. 钩端螺旋体病
- D. 结核性腹膜炎
- E. 肾综合征出血热

16. 某患儿，男，10岁，因发热2天就诊。家住平房，蚊子多，周围有类似患者。查体：体温39℃，心率120次/分，血压140/90mmHg。皮肤无瘀斑、瘀点。脑膜刺激征阳性。实验室检查：血白细胞 $17 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.8。确诊首选检查是

- A. 补体结合试验
- B. 冷凝集试验
- C. 中和试验
- D. 特异性IgM抗体检测
- E. 脑脊液检查

17. 乳腺癌雌激素受体阳性，治疗首选

- A. 手术治疗
- B. 化疗
- C. 放疗
- D. 靶向治疗
- E. 内分泌治疗

18. 患者，男，24岁。右手拇指针刺伤，当时未予特殊处理。2天后出现拇指红肿、剧痛、波动感，伴发热。可能的原因是

- A. 化脓性骨髓炎
- B. 化脓性指头炎
- C. 丹毒
- D. 化脓性腱鞘炎

E. 急性静脉炎

19. 患者，男，24 岁。右手拇指针刺伤，当时未予特殊处理。2 天后出现拇指红肿、剧痛、波动感，伴发热。

正确的处理方法是

- A. 继续观察
- B. 应用抗生素
- C. 脓肿切开引流
- D. 热盐水浸泡患指
- E. 理疗

20. 患者，男，36 岁。重症感染患者，每天上午 9~10 点出现寒战、高热，已连续 5 天。疑有败血症，应做血培养。最佳抽血时间应在

- A. 出现寒战时
- B. 预计发生寒战及发热前
- C. 寒战后体温升至最高时
- D. 体温正常后 1 小时
- E. 体温正常的任何时段

21. 患者，男，40 岁。左下肢红、肿、热、痛，边界不清，压痛明显，诊断应首先考虑

- A. 急性淋巴管炎
- B. 浅静脉炎
- C. 气性坏疽
- D. 丹毒
- E. 急性蜂窝织炎

22. 下列有关手术前的准备，错误的是

- A. 术前服用口服降糖药的，应服用至前一天晚上
- B. 术前血压 160mmHg 以下的不需降压
- C. 术前吸烟 30 年，每天 10 根，术前一天戒烟
- D. 术前一周停用阿司匹林
- E. 术前使用胰岛素的，手术日晨停用

23. 不属于肠外营养成分的是

- A. 白蛋白
- B. 葡萄糖
- C. 水
- D. 维生素
- E. 脂肪乳

24. 患者，女，65 岁。反复不规律上腹部胀痛 3 年，胃镜诊断为萎缩性胃炎。判断该患者炎症活动的客观依据是

- A. 胃黏膜肠上皮化生
- B. 胃黏膜出血
- C. 胃黏膜内中性粒细胞增多
- D. 胃黏膜中增多的主要是淋巴细胞
- E. 胃黏膜纤维组织增生

25. 患者，女，65 岁。反复不规律上腹部胀痛 3 年，胃镜诊断为萎缩性胃炎。该患者如考虑为

- A. 壁细胞抗体阴性
- B. 胃酸升高
- C. 不出现厌食、体重下降
- D. 不出现恶性贫血
- E. 主要位于胃体部

26. 患者，男，64 岁。反复发作上腹部疼痛 4 年，近 2 天上腹绞痛，伴发热、寒战，皮肤巩膜黄染。该病最可能的原因是

- A. 肿瘤
- B. 结石
- C. 蛔虫
- D. 炎性狭窄
- E. 炎症

27. 患者，男，64 岁。反复发作上腹部疼痛 4 年，近 2 天上腹绞痛，伴发热、寒战，皮肤巩膜黄染。若患者出现神志淡漠、嗜睡、血压 90/50mmHg，最有效的治疗措施是

- A. 纠正水、电解质和酸碱平衡紊乱
- B. 给予有效足量抗生素
- C. 应用肾上腺皮质激素
- D. 紧急手术解除胆道梗阻并减压
- E. 继续观察

28. 长期便秘，大便干燥、带血，考虑

- A. 肛瘘
- B. 肛裂
- C. 内痔
- D. 直肠癌
- E. 直肠息肉

29. 直肠指检肛门条索状肿物，考虑

- A. 肛瘘
- B. 肛裂
- C. 内痔
- D. 直肠癌
- E. 直肠息肉

30. 直肠指诊摸到不平质硬肿物，指套上有脓血与黏液，应考虑

- A. 肛瘘
- B. 肛裂
- C. 内痔
- D. 直肠癌
- E. 直肠息肉

31. 直肠指检触及表面光滑且圆软的可推动肿物，应考虑

- A. 肛瘘

- B. 肛裂
- C. 内痔
- D. 直肠癌
- E. 直肠息肉

32. 患者，男，45岁。反酸、烧心2个月，站立时症状减轻，卧位、弯腰时加重。首先考虑的诊断是

- A. 消化性溃疡
- B. 胃食管反流病
- C. 食管癌
- D. 食管贲门失弛缓症
- E. 食管裂孔疝

33. 患者，男，45岁。反酸、烧心2个月，站立时症状减轻，卧位、弯腰时加重。造成该病的主要发病机制不包括

- A. 食管酸廓清能力下降
- B. 下食管括约肌压力降低
- C. 胃排空异常
- D. 夜间胃酸分泌过多
- E. 异常的下食管括约肌一过性松弛

34. 患者，女，66岁。反复上腹胀痛2年，进食后呕吐2个月，呕吐物含有宿食。查体：贫血貌，消瘦，上腹可见胃型，可闻及振水音。最有价值的辅助检查是

- A. B超
- B. 腹部CT
- C. 纤维胃镜
- D. 腹部X线平片
- E. MRI

35. 患者，女，66岁。反复上腹胀痛2年，进食后呕吐2个月，呕吐物含有宿食。查体：贫血貌，消瘦，上腹可见胃型，可闻及振水音。患者最早出现的酸碱失衡和水、电解质紊乱的类型是

- A. 低钾代谢性碱中毒
- B. 高钾血症、代谢性酸中毒
- C. 高钾血症、代谢性碱中毒
- D. 低钾血症、代谢性酸中毒
- E. 低氯血症、代谢性酸中毒

36. 患者，女，28岁。妊娠37周，诊断为先兆子痫，连用硫酸镁15g/日，治疗3天，发现膝腱反射消失，血Mg浓度 $>3.5\text{mmol/L}$ 。本例应首先选择的处理方法是

- A. 给20%甘露醇250ml 静脉快速静注
- B. 立即肌注冬眠合剂半量
- C. 立即停用硫酸镁，并给10%葡萄糖酸钙10ml 缓慢静注
- D. 静脉滴注低分子右旋糖酐500ml
- E. 静注呋塞米(速尿)40mg

37. 患者，女，26岁，风湿性心脏病患者，现妊娠45天出现心力衰竭，其处理原则应是

- A. 立即行负压吸宫术终止妊娠

- B. 控制心力衰竭后继续妊娠
- C. 边控制心力衰竭边终止妊娠
- D. 控制心力衰竭后行负压吸宫术
- E. 控制心力衰竭后行钳刮术

38. 特发性肺纤维化的患者，肺功能检查最具特征性的表现是

- A. FVC 降低
- B. FEV1 降低
- C. MVV 降低
- D. VC 减少
- E. RV 降低

39. 患者，女，30 岁。低热伴关节肿痛 3 个月，轻度贫血，抗核抗体(+)，抗双链 DNA 抗体(+)，疑患系统性红斑狼疮。治疗首选的免疫抑制剂是

- A. 环磷酰胺
- B. 甲氨蝶呤
- C. 长春新碱
- D. 依木兰
- E. 地塞米松

40. 类风湿关节炎最常见的关节外表现是

- A. 肺间质纤维化
- B. 类风湿结节
- C. 心包炎
- D. 脾肿大
- E. 血管炎

41. 患者，男，32 岁。由高处跌落，引起骨盆骨折及股骨开放性骨折，伤口大量出血，现场急救治疗首先应进行

- A. 抗休克
- B. 有伤下肢临时固定
- C. 清创缝合
- D. 加压包扎止血
- E. 给予输血

42. 患者，男，20 岁。被手榴弹炸伤右侧大腿 3 小时来院。查体：一般情况好，生命体征平稳，右大腿外侧有约 6cm×3cm 伤口，深达深筋膜表面，无活动性出血，检查无弹片残留。正确的处理是

- A. 彻底清创后，缝合伤口
- B. 不做彻底清创，切开深筋膜减压
- C. 清洗伤口，消毒、包扎
- D. 彻底清创后，开放伤口引流
- E. 彻底清创后，放置引流管、缝合伤口

43. 患者，男，43 岁。发热、乏力、食欲减退，左下腹痛、解稀烂便，后出现黏液脓血便，伴有里急后重感。诊断最可能是

- A. 急性胃肠炎

- B. 急性细菌性痢疾
- C. 肠伤寒
- D. 食物中毒
- E. 肠阿米巴痢疾

44. 患者，男，20岁。体型瘦高，活动时突感右胸部撕裂样痛。查体：大汗淋漓惊恐状，气促，气管左偏，叩诊右胸空瓮音，右侧呼吸音消失。该患者最可能的诊断为

- A. 大叶性肺炎
- B. 胸腔积液
- C. 干性胸膜炎
- D. 右侧张力性气胸
- E. 肺癌

45. 继发于大剂量应用抗生素后，大便为暗绿色水样便，镜检发现大量红细胞，诊断是

- A. 出血性大肠埃希菌肠炎
- B. 真菌性肠炎
- C. 金黄色葡萄球菌
- D. 侵袭性大肠杆菌肠炎
- E. 空肠弯曲菌肠炎

46. 起病急，高热 40℃，粪便呈粘液和脓血，诊断是

- A. 出血性大肠埃希菌肠炎
- B. 真菌性肠炎
- C. 金黄色葡萄球菌
- D. 侵袭性大肠杆菌肠炎
- E. 空肠弯曲菌肠炎

47. 患者，女，35岁。择期经上腹正中切口行胃大部切除术，并置切口内乳胶片引流。正常情况下，该患者拆线时间应为术后

- A. 2周
- B. 10~12天
- C. 7~9天
- D. 5~6天
- E. 3~4天

48. 患者长期胃肠减压，严格低盐饮食，出现嘴角抽搐，予补充葡萄糖酸钙后未见明显改善，可能的原因是

- A. 低钙血症
- B. 低镁血症
- C. 低钠血症
- D. 低钾血症
- E. 高钙血症

49. 某肺心病患者血气分析结果：PH7.25，BE+1.5，氧分压<60mmHg，二氧化碳分压>50mmHg，可能的诊断为

- A. 代偿期酸中毒
- B. 代偿期碱中毒
- C. 失代偿期呼吸性酸中毒

D. 失代偿期碱中毒

E. 呼酸合并代酸

50. 患者，男，41岁。上腹疼痛7小时。伴发热，体温38.5℃，频繁呕吐。查体发现上腹部肌紧张，压痛，无移动性浊音。血白细胞 $15 \times 10^9/L$ 。X线检查：膈下未见游离气体。如果患者治疗期间出现上腹部包块，首先考虑的诊断是

A. 腹膜转移癌

B. 粘连性肠梗阻

C. 胰腺假性囊肿

D. 胰腺癌

E. 结肠癌

51. 患者，男，41岁。上腹疼痛7小时。伴发热，体温38.5℃，频繁呕吐。查体发现上腹部肌紧张，压痛，无移动性浊音。血白细胞 $15 \times 10^9/L$ 。X线检查：膈下未见游离气体。该患者治疗最重要的措施是

A. 急诊手术

B. 禁食和胃肠减压

C. 腹腔穿刺引流

D. 腹腔镜切除胆囊

E. 应用大量广谱抗生素

52. 女，57岁，晚餐进食油饼后突发呕血3小时，呕吐物为鲜血，色红，量约500ml，既往乙型肝炎史16年。查体：T36℃，P100次/分，R20次/分，BP110/70mmHg。皮肤未见出血点，可见肝掌。双肺呼吸音清，未闻及干湿啰音，心律齐，腹软，无压痛，肝肋下未触及，脾肋下2cm。该患者发生呕血最可能的原因是

A. 十二指肠溃疡大出血

B. 急性胆道大出血

C. 食管胃底静脉曲张破裂

D. 胃溃疡大出血

E. 急性糜烂性胃炎

53. 男，反复便秘、腹痛10年。便前腹痛、腹部不适，便后缓解。工作紧张时症状加重。无便血及消瘦，睡眠差。最有可能的诊断是

A. 肠易激综合征

B. 克罗恩病

C. 肠结核

D. 结肠癌

E. 溃疡性结肠炎

54. 患者，男，55岁。乙型肝炎病史30余年。3小时前进食烧饼后突然出现呕血，量约1000ml。查体未发现全身皮肤、黏膜黄染和腹水。如果该患者需要接受急诊手术，最佳手术方式是

A. 经颈静脉肝内门体分流术

B. 非选择性门体分流术

C. 选择性门体分流术

D. 贲门周围血管离断术

E. 脾切除术

55. 患者，男，21岁。腹泻，呈黏液脓血便，大便隐血试验阳性，内镜示结肠多发腺瘤样息肉。自诉父亲曾有

“肠息肉病。该患者最适宜的治疗是

- A. 内镜下摘除息肉
- B. 经肛切除直肠息肉
- C. 行根治性结肠切除术
- D. 放射治疗
- E. 抗生素治疗

56. 转移性右下腹疼痛 4 天，体温 38℃，右下可触及 5cm×5cm 包块伴压痛、反跳痛。下列处理不合适的是

- A. 抗生素应用
- B. 可食流质饮食
- C. 中药辅助治疗
- D. 行阑尾切除术
- E. 针灸或理疗

57. 只做疝囊高位结扎而不做修补术的适应症是

- A. 嵌顿疝
- B. 绞窄疝
- C. 易复性疝
- D. 难复性疝
- E. 滑动性疝

58. 患者，男，慢性腹泻 5 年，大便有少量脓血。纤维结肠镜检查：直肠、乙状结肠散在小溃疡，治疗上首选

- A. 氢化可的松保留灌肠
- B. 口服强的松
- C. 口服氟哌酸
- D. 口服甲硝唑
- E. 口服 SASP

59. 患者，男，48 岁。突发呕血 300ml，黑便 200g 急诊入院，急诊胃镜检查发现十二指肠溃疡出血，伴血管外露，此时最合适的治疗是

- A. PPI
- B. PPI+内镜下治疗
- C. 血管断离术
- D. 补液、输血
- E. 应用氨甲环酸

60. 患者，男，35 岁，自觉肛门口坠胀感，伴发热、里急后重。查体：肛周无明显红肿。直肠指检直肠壁左侧饱满，有波动感，诊断应考虑

- A. 直肠肛管周围脓肿
- B. 坐骨肛管间隙脓肿
- C. 骨盆直肠间隙脓肿
- D. 肛周脓肿
- E. 直肠壁内脓肿

61. 患者，男，35 岁。右上腹部钝性损伤后 1 小时，查体：面色苍白，脉快，血压 70/45mmHg，腹膜刺激征明显。X 线检查发现右侧膈肌上升。诊断首先考虑

- A. 十二指肠损伤
- B. 肝破裂
- C. 脾破裂
- D. 胰腺损伤
- E. 小肠损伤

62. 患者，女，25岁。低热，便秘腹泻交替3年，右下腹5cm×5cm肿块，质中等，较固定，轻压痛，最具诊断意义的检查是

- A. 血沉
- B. 血常规
- C. 结肠镜检查
- D. X线钡剂透视
- E. 诊断性腹腔穿刺

63. 患者，男，45岁。工作强度大，心理压力大，常便秘，腹痛，便后缓解，检查均阴性。可能的诊断是

- A. 克罗恩病
- B. 溃疡性结肠炎
- C. 肠易激综合征
- D. 吸收不良综合征
- E. 炎症性肠病

64. 70岁老人，咳嗽时右侧腹股沟处可触及震动，平卧位时消失，按压内口疝不能突出。查体：腹部肿块，按压深环不突出，平卧位消失。可能的原因是

- A. 腹股沟直疝
- B. 腹股沟斜疝
- C. 精索鞘膜积液
- D. 股疝
- E. 交通性鞘膜积液

65. 患者，女，30岁。低热、乏力伴腹胀3月，查体：腹部膨隆，腹壁揉面感，有压痛和反跳痛。腹腔积液为渗出液。下列哪项检查对明确诊断最有意义

- A. 腹部B超
- B. 胃肠道钡剂检查
- C. 血沉
- D. 腹腔积液细菌培养
- E. 腹腔镜检查

66. 患者，女，28岁。反复右下腹痛2年，伴便秘、口腔溃疡、无发热及乏力。否认结核病史及结核密切接触史。查体：右下腹可触及边界不清的包块，可移动，压痛阳性。最先考虑的诊断是

- A. 结肠癌
- B. 溃疡性结肠炎
- C. 细菌性痢疾
- D. 克罗恩病
- E. 阑尾炎

67. 支配阑尾的神经是交感神经腹腔丛和以下哪个神经

- A. 内脏小神经
B. 第 10 胸神经
C. 第 12 胸神经
D. 内脏大神经
E. 坐骨神经
68. 肛瘘手术的关键步骤在于
A. 广泛切除瘘管周围瘢痕组织
B. 切除瘘管后应一期缝合
C. 确定外口和内口的位置
D. 必须用探针穿入肛管造成内口再切开
E. 麻醉选择
69. 溃疡性结肠炎的 X 线钡餐特征性表现是
A. 结肠呈铅管样
B. 回肠末端呈线样征
C. 回肠部呈跳跃征
D. 盲肠充盈缺损，肠腔狭窄
E. 盲肠运动加速，结肠袋加深，张力增强
70. 老年人肠道 X 线造影见“鸟嘴征”考虑哪种疾病
A. 克罗恩病
B. 肠套叠
C. 小肠扭转
D. 乙状结肠扭转
E. 肠结核
71. 车祸伤后腹腔淀粉酶 1000U/L，可能损伤的部位是
A. 肝
B. 脾
C. 胰腺
D. 肾
E. 胃
72. 对于发生在直肠的下缘距离肛门 10cm 的菜花样肿物，应行
A. Miles 手术
B. Dixon 手术
C. 拉下式直肠癌切除术
D. 局部切除术
E. Duhamel 手术
73. 下列关于低位性肠梗阻的描述错误的是
A. 梗阻多位于回肠末段
B. 腹胀及腹痛明显
C. 呕吐物多为粪性
D. 腹部 X 线检查可见多个阶梯状气液平面

E. 呕吐症状出现早

74. 女性股疝首选的手术方式是

A. Ferguson 法

B. Basini 法

C. Mcvay 法

D. Halsted 法

E. 疝囊高位结扎术

75. 成人每日消化道出血多少毫升出现黑粪

A. 5ml

B. 20ml

C. 30ml

D. 40ml

E. 50ml

76. 对诊断肾结核最有意义的是

A. PET

B. 尿路平片

C. B 超

D. 静脉尿路造影

E. 膀胱镜检

77. 孕妇感染后首选青霉素治疗的病原体是

A. 苍白螺旋体

B. 人乳头瘤病毒

C. 沙眼衣原体

D. 解脲支原体

E. 人免疫缺陷病毒

78. 孕妇感染后首选阿奇霉素治疗的病原体是

A. 苍白螺旋体

B. 人乳头瘤病毒

C. 沙眼衣原体

D. 解脲支原体

E. 人免疫缺陷病毒

79. 位于后纵隔脊柱旁肋脊区内最常见的纵隔肿瘤是

A. 畸胎瘤

B. 心包囊肿

C. 胸腺瘤

D. 神经源性肿瘤

E. 胸内甲状腺

80. 属于左心衰竭肺水肿典型表现的是

A. 咯血颜色鲜红

B. 铁锈色血痰

- C. 砖红色胶冻样黏痰
- D. 粉红色泡沫样痰
- E. 呕血

81. 患者，女，45岁。左下肢静脉曲张2年，长时间站立有酸胀感。查体：左下肢静脉呈串珠样曲张，局部皮肤色素沉着。Trendelenburg 试验(+)。最可能的诊断是

- A. 下肢深静脉血栓形成
- B. 原发性深静脉瓣膜功能不全
- C. 原发性下肢静脉曲张
- D. 下肢血栓性浅静脉炎
- E. 动静脉瘘

82. 患者，男，28岁，喜抽烟。左下肢间歇性跛行2年。既往反复静脉炎病史。查体：左脚背动脉搏动减弱。可能的原因是

- A. 动脉硬化性闭塞病
- B. 下肢静脉曲张
- C. 血栓闭塞性脉管炎
- D. 血栓性浅静脉炎
- E. 深静脉血栓形成

83. 患者，女，31岁。2年前因胃出血行胃大部切除术，近1年半来头晕、乏力，面色逐渐苍白，平时月经量稍多。检查：Hb76g/L，RBC 3.1×10^{12} /L，WBC 5.3×10^9 /L，网织红细胞0.015。在进行体格检查时，不可能出现的体征是

- A. 皮肤干燥，毛发干燥易脱落
- B. 步态不稳，深感觉减退
- C. 口腔炎，舌乳头萎缩
- D. 指甲变脆，变平或匙状甲
- E. 心尖部收缩期吹风样杂音

84. 患者，女，48岁。进餐后突发性上腹刀割样剧痛3小时。全腹压痛，板状腹，肝浊音界及肠鸣音消失。X线显示膈下新月形游离气体。既往有胃溃疡史25年。下列治疗中，最佳的手术方式是

- A. 胃大部切除术
- B. 全胃切除
- C. 迷走神经切断加胃窦切除术
- D. 高选择性迷走神经切断术
- E. 缝合穿孔后行迷走神经切断加胃空肠吻合术

85. 患者，女，54岁。肝硬化20年，腹部B型超声检查：腹水最大液深18cm，化验检查：血清Na142mmol/L，K6.3mmol/L，BUN23mmol/L，血肌酐 $224 \mu\text{mol/L}$ 。治疗措施错误的是

- A. 10%葡萄糖酸钙20ml 缓慢静脉注射
- B. 口服螺内酯
- C. 输白蛋白
- D. 控制液体入量
- E. 葡萄糖加胰岛素静点

86. 患者，男，64岁。右上腹剧痛17天，伴发热10天。乙肝病史20年，慢性支气管炎病史8年。查体：体

温 38.3℃，慢性病容，颈静脉无怒张，双肺呼吸音减弱，未闻及湿啰音，腹膨隆，肝右肋下 4cm，双下肢凹陷性水肿。肝功能检查正常。该患者肝大最可能的原因是

- A. 右心功能不全
- B. 淋巴瘤
- C. 胆道感染
- D. 肝硬化
- E. 胃癌

87. 患者，女，59 岁。因肝硬化失代偿期入院，发热，腹部膨隆，查血提示全血细胞减少，最主要的原因是

- A. 病毒感染
- B. 消化道出血
- C. 肝功能减退
- D. 脾功能亢进
- E. 肝功能亢进

88. 患者，男，50 岁。反复发作右上腹绞痛 10 年，无寒战发热，发作时检查右上腹有压痛。Murphy 征(+)，B 超检查显示胆囊壁增厚达 0.5cm，囊内见高回声区，2cm×1.5cm 大小，其后伴声影。诊断为胆囊结石，此患者首选的治疗为

- A. 腹腔镜下胆囊切除术
- B. 体外震波碎石
- C. 胆总管切开
- D. T 管引流术
- E. 胆囊切开取石术

89. 男性患者，既往溃疡病史，近日出现刺激性咳嗽，行胃镜检查未见异常，下一步治疗首选

- A. X 线钡餐检查
- B. 胃液酸碱度测定
- C. 24 小时食管 PH 监测
- D. 胸部 CT
- E. 腹部 B 超

90. 患者，男，80 岁，有基础疾病，胸上段食管癌，能改善患者生活质量的是

- A. 胃肠造瘘
- B. 放化疗
- C. 手术
- D. 气管切开
- E. 注射营养液

91. 对于胃黏膜之肠化和不典型增生，下列哪项错误

- A. 这类病变可逆
- B. 这类病变最终一般均会发展为胃癌
- C. 一些药物可能帮助其逆转
- D. 对患者要耐心解释，消除其恐癌心理
- E. 必要时定期复查胃镜

92. 黄疸患者合并肿大而无触痛的胆囊时，最可能诊断

- A. 肝癌
- B. 慢性胆囊炎、胆囊积水
- C. 胆囊颈部结石嵌顿
- D. 中下段胆管癌
- E. 胆总管下段结石

93. 胰腺癌首选的影像学检查是

- A. 腹部增强 CT
- B. 超声
- C. MRI
- D. 动脉造影
- E. ERCP

94. 下列指标无助于肝硬化判断病情的是

- A. 肝性脑病
- B. 腹水
- C. 白蛋白
- D. 血清电解质
- E. 凝血酶原时间

95. 肝癌筛查首选的影像学检查的是

- A. CT
- B. MRI
- C. 血管造影
- D. 放射性核素肝扫描
- E. 腹部 B 超

96. 急性糜烂出血性胃炎的常见病因不包括

- A. 幽门螺杆菌感染
- B. 脑外伤
- C. 乙醇
- D. 非甾体抗炎药
- E. 严重烧伤

97. 男, 55 岁, 突发胸痛伴大汗 3 小时, 有吸烟史, 首选的检查是

- A. 胸部 X 线片
- B. 心肌核磁显影
- C. 冠状动脉 CT 造影
- D. 心电图
- E. 超声心动图

98. 男, 62 岁。左胸痛 5 天, 胸闷、气促 2 天。查体: 双下肺呼吸音粗, 心率 108 次/分, P2>A2。胸部 X 线片示左下肺透亮度增加。对明确诊断最有价值的是

- A. CT 肺动脉造影 (CTPA)
- B. 胸部高分辨 CT
- C. 心电图

D. 血 D-二聚体

E. 超声心动图

99. 肺炎球菌肺炎

A. 咯血颜色鲜红

B. 铁锈色血痰

C. 砖红色胶冻样黏痰

D. 粉红色乳样痰

E. 粉红色浆液性泡沫样痰

100. 患者，女，65 岁。胆结石术后 5 天突发呼吸困难 2 小时，有 COPD 史 20 余年。查体：血压 110/80mmHg，端坐呼吸，烦躁不安，大汗，口唇发绀，双肺可闻及少量干、湿啰音，心率 130 次/分。常规吸氧疗法不能改善。该患者呼吸困难最可能的原因是并发

A. 急性呼吸窘迫综合征

B. 继发肺部感染

C. 急性左心衰竭

D. 自发性气胸

E. 右心衰竭

101. 患者，男，55 岁。咳嗽伴声音嘶哑 4 个月，右锁骨上窝触及一个肿大的淋巴结，质硬无压痛。诊断是

A. 喉炎

B. 肺癌

C. 胃癌

D. 肺炎

E. 肺不张

102. 患者，男，67 岁，有吸烟史。有慢性阻塞性肺疾病病史 30 余年，家属发现患者呼之不应半小时急送医院。查体：血压 150/50mmHg，浅昏迷状，球结膜水肿，双肺可闻及干、湿啰音，A2<P2，下肢水肿。为明确诊断首选的检查是

A. 动脉血气分析

B. 胸部 X 线片

C. 心脏超声

D. 动态心电图

E. 肺功能

103. 患者，男，40 岁。因发热、右侧胸痛、咳嗽 4 天入院。查体：T39.5℃，右锁骨下可闻及支气管呼吸音。该患者右上肺叩诊音可能出现

A. 清音

B. 浊音

C. 实音

D. 鼓音

E. 过清音

104. 患者，男，65 岁。因呼吸困难、下肢水肿 2 周就诊。既往 COPD 病史 15 年。经检查确定诊断为 COPD，慢性肺源性心脏病、心功能失代偿期。该患者体格检查时最不可能的体征是

A. 脾脏肿大

- B. 肝颈静脉回流征(+)
- C. 三尖瓣区收缩期杂音
- D. 腹部移动性浊音(+)
- E. 颈静脉怒张

105. 患者，女，22岁。患肺结核6年，近2个月来低热，咳嗽，痰中带血。1小时前突然咯血不止急诊入院。治疗应首选

- A. 抗结核治疗
- B. 输液
- C. 氧气吸入
- D. 镇咳剂
- E. 垂体后叶素

106. 患者，男，68岁。反复咳嗽、咳白痰、喘息2年。今早出现咳嗽较前频繁，痰量增多，可见脓痰，伴有胸闷、轻微劳动后气喘加重。查体：双肺语颤减弱、可闻及干湿啰音，心界缩小。P120次/分，R22次/分。该患者最可能的诊断为

- A. 慢阻肺急性加重
- B. 支气管哮喘
- C. 支气管扩张
- D. 肺结核
- E. 肺癌

107. 患者，男，50岁。从事烧烤店工作，反复咳嗽咳痰10年，发作时可自行好转，抗生素无效。查体：双肺可闻及散在哮鸣音，胸部X线片示双肺纹理增粗，该患者首先应考虑的诊断是

- A. 过敏性肺炎
- B. 支气管哮喘
- C. 支气管扩张
- D. 慢性阻塞性肺病
- E. 肺曲菌病

108. 患者，女，50岁。胸闷、气急半月，胸片示右侧大量胸腔积液，胸穿抽出淡黄色胸水约700ml，化验结果示：LDH900U/L，ADA9U/L，PPD(+)。CEA34μg/ml。最可能的诊断是

- A. 化脓性胸膜炎
- B. 结核性胸膜炎
- C. 恶性胸腔积液
- D. 乳糜样胸腔积液
- E. 结缔组织疾病

109. 女性肺癌患者，胸腔镜活检胸膜腺癌，考虑肺腺癌胸膜转移，EGFR(+)，首选治疗是

- A. 靶向治疗
- B. 放疗
- C. 化疗
- D. 内分泌治疗
- E. 手术治疗

110. 克雷伯杆菌肺炎的X线表现出叶间隙下坠，其机制是

- A. 肺泡内的渗出液由 Cohn 孔向周围肺泡蔓延所致
 - B. 病变中的炎性渗出液黏稠而重
 - C. 细菌在细胞内生长繁殖, 引起组织坏死、液化形成
 - D. 肺泡内的纤维蛋白渗出较多
 - E. 肺泡内的渗出含有较多的红白细胞
111. 关于胸膜间皮瘤所致胸腔积液的叙述正确的是
- A. 介于漏出液和渗出液之间
 - B. 是渗出液
 - C. 是漏出液
 - D. LDH 小于 200U
 - E. 比重小于 1.018
112. 急性呼吸窘迫综合征床边肺功能监测结果, 对严重性评价和疗效判断有意义的是
- A. 肺顺应性降低
 - B. 无效腔通气比例增加
 - C. 无呼气流速受阻
 - D. VD/VT
 - E. 以上都不是
113. 引起慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 肺动脉高压最重要的原因是
- A. 肺小动脉内膜增厚
 - B. 肺小动脉原位血栓形成
 - C. 肺小动脉痉挛
 - D. 肺小动脉壁纤维化
 - E. 肺静脉血栓
114. 支气管哮喘长期控制最常用的药物是
- A. 口服头孢他啶
 - B. 口服地塞米松
 - C. 吸入利多卡因
 - D. 吸入糖皮质激素
 - E. 口服阿托品
115. 胸片易出现空洞的肺炎是
- A. 支原体肺炎
 - B. 肺炎球菌肺炎
 - C. 军团菌肺炎
 - D. 衣原体肺炎
 - E. 金黄色葡萄球菌肺炎
116. 慢性支气管炎有小气道阻塞时, 最早出现的肺功能改变是
- A. 肺活量下降
 - B. 残气容积增加
 - C. 闭合容量减小
 - D. 肺最大通气量降低

E. 流量-容积曲线降低

117. 男, 体重 70kg。烧伤后 2 小时入院。查体: BP86/63mmHg, 心率 130 次/分, 脉搏细弱, 面色苍白, 口渴明显, 双下肢(包括双足、臀部、双大小腿)布满大小不等的水疱, 疱内可见透亮液体, 创面红润。该患者的烧伤面积是

- A. I 度 (45%)
- B. 浅 II 度 (46%)
- C. 深 II 度 (46%)
- D. 深 II 度 (47%)
- E. III 度 (60%)

118. 男, 体重 70kg。烧伤后 2 小时入院。查体: BP86/63mmHg, 心率 130 次/分, 脉搏细弱, 面色苍白, 口渴明显, 双下肢(包括双足、臀部、双大小腿)布满大小不等的水疱, 疱内可见透亮液体, 创面红润。第一个 24 小时内胶体补液量是

- A. 800ml
- B. 1200ml
- C. 1600ml
- D. 2000ml
- E. 2400ml

119. 男, 40 岁。患十二指肠球部溃疡穿孔, 急症上腹正中切口行胃大部切除术, 切口内置乳胶。一般拔除引流片的时间为术后

- A. 9-10 天
- B. 1-2 天
- C. 7-8 天
- D. 3-4 天
- E. 5-6 天

120. 男, 40 岁。患十二指肠球部溃疡穿孔, 急症上腹正中切口行胃大部切除术, 切口内置乳胶。正常情况下, 该患者拆线时间应为术后

- A. 5-6 天
- B. 10-12 天
- C. 12 天以上
- D. 7-9 天
- E. 3-4 天

121. 患者男性, 尿频尿急尿痛 3 天, 无发热, 伴腰酸, 乏力等, 查体肾区叩击痛阴性, 肛门指检前列腺肿大, 触痛明显。辅助检查: 尿常规: 白细胞 (+), 细菌 (++) , 亚硝酸盐 (+), 诊断考虑

- A. 急性前列腺炎
- B. 急性尿道炎
- C. 急性膀胱炎
- D. 急性肾盂肾炎
- E. 急性附睾炎

122. 女, 67 岁, 在导管室行冠脉介入治疗过程中突发心悸, 气短, 查体: BP80/70mmHg, 口唇无发绀, 颈静脉怒张, 心率 90 次/分, 心律齐, 心音低钝, 奇脉, 已停止冠脉介入治疗, 还应立即采取的治疗措施

- A. 皮下注射低分子肝素
- B. 静脉注射西地兰
- C. 心包穿刺抽液
- D. 呼吸机辅助呼吸
- E. 静脉滴注去甲肾上腺素

123. 患者突发昏迷，入院查心电图提示房颤，CT 提示脑大面积低密度影，考虑脑梗死，该患者血栓的来源是

- A. 左心房的混合血栓
- B. 左心室的附壁血栓
- C. 微血管透明血栓
- D. 基底节混合血栓
- E. 二尖瓣赘生物

124. 青年男性，口服 30ml 敌敌畏，治疗 48 小时，胸闷气短 2 小时。查体：稍烦躁，皮肤干燥，双侧瞳孔直径 5mm，眼睑下垂，颈部无力，呼吸浅快，双肺无干湿性啰音，心率 100 次/分。实验室检查血胆碱酯酶 1200U/L。造成该现象原因为

- A. 解毒剂使用过量
- B. 阿托品过量
- C. 中间型反应
- D. 迟发性多发神经病
- E. 胆碱分离现象

125. 男，38 岁，突发心悸、头晕 3 小时。查体：血压 70/40mmHg，心率 180 次/分，心电图提示：QRS 波增宽，心律不规则，间断可见 P 波后跟着一个窄的 QRS 波。该患者可能的诊断是

- A. 心动过缓-心动过速综合征
- B. 室上速
- C. 室速
- D. 窦性心律不齐
- E. 房颤

126. 男，38 岁，突发心悸、头晕 3 小时。查体：血压 70/40mmHg，心率 180 次/分，心电图提示：QRS 波增宽，心律不规则，间断可见 P 波后跟着一个窄的 QRS 波。该患者应采取的治疗措施主要是

- A. 利多卡因静滴
- B. 植入心脏起搏器
- C. 同步直流电复律
- D. 刺激迷走神经
- E. 口服美托洛尔

127. 女性，40 岁，车祸致右上腹疼痛，呼吸 100 次/分，血压 90/60mmHg，查体：压痛、反跳痛、肌紧张，影像学检查示右横膈上抬，活动受限。为明确诊断首选检查

- A. 胸片
- B. 血常规
- C. 诊断性腹腔穿刺
- D. 血细胞比容
- E. 腹部 B 超

128. 女性, 40 岁, 车祸致右上腹疼痛, 呼吸 100 次/分, 血压 90/60mmHg, 查体: 压痛、反跳痛、肌紧张, 影像学检查示右横膈上抬, 活动受限。损伤的脏器最可能是

- A. 胃
- B. 肝
- C. 胰腺
- D. 结肠
- E. 十二指肠

129. 男, 5 岁, 双下肢水肿, 尿少 3 天。查体: T37.2℃P80 次/分, R20 次/分, BP96/88mmHg, 神志清楚, 精神可, 双下肢凹陷性水肿。实验室检查: 白蛋白 24g/L, 胆固醇 6.3mmol/L, 血尿素氮 7.2mmol/L, 肌酐 56umol/L。尿常规+镜检: 尿蛋白(+++), RBC1-2/Hp, 24 小时尿蛋白 1.5g。该疾病最可能是

- A. 急性肾衰竭
- B. 单纯肾病综合征
- C. 肾炎性肾病综合征
- D. 急进性肾炎
- E. 急性肾炎

130. 男, 5 岁, 双下肢水肿, 尿少 3 天。查体: T37.2℃P80 次/分, R20 次/分, BP96/88mmHg, 神志清楚, 精神可, 双下肢凹陷性水肿。实验室检查: 白蛋白 24g/L, 胆固醇 6.3mmol/L, 血尿素氮 7.2mmol/L, 肌酐 56umol/L。尿常规+镜检: 尿蛋白(+++), RBC1-2/Hp, 24 小时尿蛋白 1.5g。首选的治疗药物

- A. 泼尼松+环磷酰胺
- B. 呋塞米
- C. 泼尼松
- D. 环磷酰胺
- E. 待补充

131. 男, 56 岁, 大便次数增多、里急后重、粘液脓血便 3 月余。查体: T36.5℃, P80 次/分, R20 次/分, BP130/80mmHg, 结膜、甲床稍苍白; 肠镜: 距肛门 8cm 可见菜花样肿物, 肠镜无法通过。术后首选用于预后判断的实验室指标是

- A. CA125
- B. CEA
- C. AFP
- D. ALP
- E. PSA

132. 最符合肝癌结节破裂的表现是

- A. 腹水呈血性
- B. 腹水呈乳糜性
- C. 腹水呈脓性
- D. 腹水比重 1.018, 蛋白 40g/L, 细胞总数 $600 \times 10^6/L$
- E. 腹水比重 1.012, 蛋白 20g/L, 细胞总数 $10 \times 10^6/L$

133. 患者男性, 45 岁, 乏力, 纳差 3 个月。查体: 睑结膜苍白, 可见蜘蛛痣。腹膨隆, 脐周静脉曲张。肝未及, 脾肋下 2cm, 移动性浊音+。血常规: Hb96g/L, WBC $3.6 \times 10^9/L$, plt $56 \times 10^9/L$, ALT56U/L, AST84U/L, 血清总胆红素 33.9, 结合胆红素 22.8, 血 HBsAg, HBeAg 及抗 HBc 阳性, 该患者肝组织的病理特征为

- A. 肝细胞水肿

- B. 肝细胞坏死
- C. 肝细胞再生
- D. 纤维组织增生
- E. 假小叶形成

134. 进展期食管癌的特征性症状是

- A. 进展性吞咽困难
- B. 间歇性吞咽困难
- C. 胸骨后疼痛
- D. 腹痛呕吐
- E. 反酸烧心

135. 迷走神经兴奋引起胃窦部 G 细胞分泌促胃液素的神经递质

- A. 铃蟾素
- B. 多巴胺
- C. 乙酰胆碱
- D. 组胺
- E. 5-羟色胺

136. 男, 76 岁, 左下肢间歇性跛行 3 年, 加重 1 个月, 既往高血压病病史 8 年, 冠心病病史 5 年, 曾行冠脉支架植入术。查体: BP150/90mmHg, 左足苍白, 左足及左下肢皮温明显降低, 左足背动脉、腘动脉搏动消失, 左股动脉可触及搏动, 最可能的诊断是左下肢

- A. 急性动脉栓塞
- B. 深静脉血栓形成
- C. 动脉硬化性闭塞症
- D. 血栓性静脉炎
- E. 血栓闭塞性脉管炎

137. 患者男性, 72 岁, 因失血性休克入院。既往有扩张型心肌病史, 在进行液体扩容治疗过程中, 测中心静脉压 15cmH₂O, 血压 80/60mmHg, 应该进行的治疗措施为

- A. 暂停补液
- B. 加快补液速度
- C. 控制补液速度, 加用强心剂
- D. 减慢补液速度
- E. 加用血管活性药物

138. 休克期反映器官血流灌注最简单可靠的指标是

- A. 收缩压
- B. 舒张压
- C. 脉压
- D. 脉率
- E. 尿量

139. 女, 25 岁。发热、咳嗽、流涕 2 周后热退, 但又出现胸闷、心悸, 心率 120 次/分, 心律不齐, 偶闻期前收缩。心电图: 低电压, T 波低平。应首先考虑

- A. 急性心包炎

- B. 扩张型心肌病
- C. 病毒性心肌炎
- D. 风湿性心肌炎
- E. 风湿性心脏病

140. 右壁心梗心电图表现是

- A. II、III、AVF, ST 段抬高
- B. I、AVL, ST 段抬高
- C. V1~V3, ST 段抬高
- D. V3R~V5R, ST 段抬高
- E. V1-V2, R/S 大于 1

141. 后壁心梗心电图表现是

- A. II、III、AVF, ST 段抬高
- B. I、AVL, ST 段抬高
- C. V1~V3, ST 段抬高
- D. V3R~V5R, ST 段抬高
- E. V1-V2, R/S 大于 1

142. 男, 60 岁。剧烈胸痛 2.5 小时。心电图示 II、III、aVF、V5~V6 导联 ST 段弓背向上抬高 0.4mV, 此时最可能升高的实验室检查指标是

- A. 肌钙蛋白 I
- B. 天门冬氨酸氨基转移酶
- C. 乳酸脱氢酶
- D. 肌酸激酶同工酶
- E. 肌红蛋白

143. 男, 80 岁。高血压病史 10 余年, 长期服用钙通道阻滞剂, 1 个月前因血压控制不满意加用美托洛尔 25mgbid, 近 1 周觉乏力、倦怠、间断黑矇。查体: BP110/70mmHg, 心率 50 次/分, 心律不齐, 各瓣膜听诊区未闻及杂音。心电图所示 PR 间期逐渐延长直至 QRS 波群脱落, 最恰当的处理是

- A. 将美托洛尔调整为 25mgqd
- B. 将美托洛尔调整为 12.5mgbid
- C. 植入永久起搏器
- D. 停用美托洛尔
- E. 将美托洛尔更换为地尔硫卓 30mg tid

144. 高血压支气管哮喘患者禁用

- A. 地尔硫卓
- B. 贝那普利
- C. 硝苯地平
- D. 氢氯噻嗪
- E. 美托洛尔

145. 高血压伴双肾动脉狭窄的患者降压不宜选用

- A. 地尔硫卓
- B. 贝那普利

- C. 硝苯地平
- D. 氢氯噻嗪
- E. 美托洛尔

146. 女, 50 岁。糖尿病肾病伴高血压, BP170/100mmHg, 心率 54 次/分, 血肌酐 158 μ mol/L。最适宜的治疗药物组合是

- A. 氢氯噻嗪、吲达帕胺
- B. 氢氯地平、缬沙坦
- C. 美托洛尔、维拉帕米
- D. 普奈洛尔、卡托普利
- E. 螺内酯、福辛普利

147. 无器质性心脏病慢性心房颤动患者静息心率的控制目标是

- A. 静息心率<110 次 / 分
- B. 静息心率<100 次 / 分
- C. 静息心率<90 次 / 分
- D. 轻微活动后心率<110 次 / 分
- E. 轻微活动后心率<100 次 / 分

148. 男性, 65 岁, 陈旧性广泛前壁心肌梗死 7 年, 活动后胸闷、心悸, 气短 2 年, 近 1 周出现夜间阵发性呼吸困难, 体检: 端坐呼吸, BP160/90mmHg, P120 次/分, P2 亢进, 心脏各瓣膜区未闻及杂音, 双肺底可闻及细湿啰音, 双肺散在哮鸣音, 腹平软, 肝脾肋下未触及, 双下肢无水肿, 空腹血糖 4.2mmol/L, 心电图: V1~V6 导联 ST 段压低 0.05~0.1mV, 血清肌钙蛋白正常, 该患者不宜立即使用

- A. 西地兰
- B. 卡维地洛
- C. 硝普钠
- D. 硝酸甘油
- E. 呋塞米

149. 最易引起急性心力衰竭的心律失常是

- A. 窦性心动过缓
- B. 一度房室传导阻滞
- C. 偶发室性期前收缩
- D. 快速心房颤动
- E. 偶发房性期前收缩

150. 低输出量性心力衰竭的是

- A. 二尖瓣关闭不全
- B. 维生素 B1 缺乏
- C. 动静脉瘘
- D. 严重贫血
- E. 甲状腺功能亢进

第四单元

1. 男孩, 7 岁。今年来多次从睡眠中惊叫一声醒来, 表情恐惧, 呼吸急促, 出汗。持续数分钟, 对家人的呼唤没有相应的反应。早晨起来后往往不能回忆。脑电图检查无特殊发现, 该患者最可能的诊断是

- A. 神经衰弱
- B. 分离性障碍
- C. 梦魇
- D. 夜惊
- E. 睡行症

2. 女性, 18 岁, 近 1 年来认为自己过胖, 每日专注于自己的体重、体型, 严格限制每日饮食, 偶有贪食情况, 但饱餐之后, 立即自行呕吐, 或服泻剂, 先出现畏寒, 体温偏低, 月经停止, 比标准体重减轻 25%, 经详细询问病史及各种检查既往无躯体疾病史, 最可能的诊断是

- A. 甲状腺功能不全
- B. 癌症
- C. 结核症
- D. 神经性厌食症
- E. 神经性贪食症

3. 女, 45 岁。当听到家中房子因洪水倒塌的消息后, 突然哭闹叫喊, 手足舞蹈, 拿砖头打砸旁边的房子, 表情恐惧而紧张, 1 天后恢复平静。该患者最可能的诊断是

- A. 精神分裂症
- B. 分离性障碍
- C. 急性应激障碍
- D. 躁狂发作
- E. 癫痫所致精神障碍

4. 男, 25 岁。3 天前受惊吓后突然不语不动, 不吃不喝, 肢体僵硬。口中唾液外流, 不知主动吐出, 晚间自己到厨房找吃的。患者 2 年前曾有凭空闻语, 捡拾垃圾等怪异行为, 持续一个月好转。患者最可能的诊断是

- A. 分离(转换)型障碍
- B. 急性应激障碍
- C. 脑器质性精神障碍
- D. 精神分裂症
- E. 妄想性障碍

5. 女, 30 岁, 工人, 医生检查问: “你在想什么?” 答: “详细讲就是细菌问题, 细菌在我们脑子里有些冲动力, 空气不大新鲜, 也不奇怪, 冻死苍蝇。”该患者的症状是

- A. 思维云集
- B. 音联意联
- C. 强直性思维
- D. 思维插入
- E. 思维破裂

6. 男, 31 岁。持续性头痛 6 天。自觉后枕部紧箍样疼痛, 无恶心, 无畏光畏声。查体: 体温 36.5℃, BP120/70mmHg, 眼压无异常, 张口颞颌关节无弹响, 双颞肌和枕肌明显压痛, 余神经检查无异常。脑 MRI 无异常。最可能的诊断

是

- A. 颈椎病
- B. 血管性头痛
- C. 紧张型头痛
- D. 无先兆偏头痛
- E. 颞颌关节紊乱

7. 男, 18 岁。急起四肢无力 3 天, 大小便正常。病前 1 周有“上感”史。查体: 双眼闭合无力, 双侧咽反射迟钝, 四肢肌力 1~2 级, 肌张力低, 腱反射消失, 无明显感觉障碍。最可能的诊断是

- A. 多发性肌炎
- B. 重症肌无力
- C. 吉兰巴雷综合征
- D. 急性脊髓炎
- E. 周期性瘫痪

8. 男, 15 岁, 突起四肢无力 2 天, 查体: 四肢肌力 II 级, 肌张力低, 腱反射消失, 病理征未引出, 无明显感觉障碍, 双侧腓肠肌握痛。最可能的诊断是

- A. 重症肌无力
- B. 周期性麻痹
- C. 吉兰-巴雷综合征
- D. 多发性肌炎
- E. 急性脊髓炎

9. 男性患者, 长期入睡困难, 一会就醒, 每周三到四次, 害怕睡眠, 越想越严重, 害怕社交, 怕自己免疫力降低。该患者目前的情况是

- A. 广泛性焦虑障碍
- B. 恐惧性焦虑障碍
- C. 失眠障碍
- D. 抑郁症
- E. 躁狂

10. 男性患者, 长期入睡困难, 一会就醒, 每周三到四次, 害怕睡眠, 越想越严重, 害怕社交, 怕自己免疫力降低。应如何治疗

- A. 认知疗法
- B. 催眠
- C. 生物反馈
- D. 口服地西洋
- E. 暗示疗法

11. 患者, 女, 23 岁。失恋后哭笑无常, 他人询问年龄, 奶声奶气地回答: “叔叔, 我 3 岁了。该患者的症状属于

- A. 刚塞综合征
- B. 童样痴呆
- C. 错构
- D. 谵妄状态

E. 虚构

12. 某人，性别不详，约 30 岁。等待执业医师成绩未果，表现为不认识亲人同事，凭空看到医考中心工作人员就站在自己对面，说：“你没过”，随即奔向医院停车场，同事劝阻也不理睬，大喊：“哈哈，我是傻逼，我没疯!!我真的没疯!”两天后突然清醒，对病情经过不能完全回忆。该患者的状态是

A. 幻觉妄想状态

B. 抑郁状态

C. 朦胧状态

D. 谵妄状态

E. 强迫状态

13. 不属于急性应激障碍治疗干预的基本原则是

A. 谈话

B. 及时

C. 就近

D. 简洁

E. 紧扣重点

14. 缺铁性贫血早期最可靠的诊断依据是

A. 血清铁减少

B. 血清铁蛋白降低

C. 血清总铁结合力增高

D. 运铁蛋白饱和度降低

E. 红细胞内原卟啉增高

15. 下列哪种疾病不会引起颅内压增高

A. 颅骨外生性肿瘤

B. 脑血管流量升高

C. 颅内感染

D. 颅腔狭小

E. 颅内实质体积增大

16. 帕金森病诊断标准中核心必备条件是

A. 左旋多巴有效

B. 运动迟缓

C. 静止性震颤

D. 肌强直

E. 姿势步态异常

17. 患者，男，48 岁。因意识不清、话多零乱、看见鬼怪入院，询问病史得知有长期饮酒史。患者可能属于

A. 酒精毒性幻想症

B. 酒精中毒性痴呆

C. 酒精中毒性情感障碍

D. 精神分裂症

E. 情感性精神障碍

选项 E: 情感性精神障碍，主要特征为显著而持久的心境或情感改变，与本题患者表现不符，所以排除此选项。

18. 患儿,男,6岁。因尿少、水肿入院,体检:两侧眼睑及下肢水肿,血压 150/90mmHg,尿镜检 RBC20 个/HP,蛋白(+++),血浆白蛋白 20.0g/L。最可能的诊断是

- A. 单纯性肾病
- B. 肾炎性肾病
- C. 泌尿系感染
- D. 急性肾小球肾炎
- E. 肾结石

19. 患儿,男,2岁。胸骨左缘 3~4 肋间可闻及 IV 级收缩期粗糙杂音,广泛传导,可触及收缩期震颤, P₂亢进,胸部 X 线显示主动脉结(弓)影缩小。最可能的诊断是

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛四联症
- E. 肺动脉狭窄

20. 男婴,足月顺产,出生体重 3.5kg,生后 10 小时出现黄疸,并有加重趋势,总胆红素 342mmol/L(20mg/dl),最可能的诊断是

- A. 生理性黄疸
- B. 新生儿肝炎
- C. 母乳性黄疸
- D. ABO 溶血病
- E. Rh 溶血病

21. 幼儿,3岁,出现发热 2 天,伴咽痛、皮疹。查体:体温 38.5℃,咽部充血,双侧扁桃体 II° 肿大,颈部可触及数个肿大淋巴结,脾肿大;全身皮肤见红色斑丘疹,压之退色。血常规检查:异型淋巴细胞可检出。可能的诊断是

- A. 川崎病
- B. 传染性单核细胞增多症
- C. 猩红热
- D. 风疹
- E. 麻疹

22. 7 岁小儿,神志淡漠,智力发育障碍,身材矮小,皮肤粗糙。以下症状哪个符合此病

- A. 食欲增加
- B. 心率快
- C. 肌张力亢进
- D. 肌力下降
- E. 反射亢进

23. 蛋白质、能量营养不良患儿皮下脂肪逐渐减少或消失,最后消失的部位

- A. 臀部
- B. 四肢
- C. 面颊
- D. 躯干

E. 腹部

24. 维生素 D 缺乏性佝偻病最可靠的早期诊断指标是

- A. 日光照射不足及维生素 D 摄入不足的病史
- B. 烦躁不安、夜惊、多汗等神经精神症状
- C. 血钙、磷、碱性磷酸酶水平异常
- D. 长骨 X 线检查异常及骨骼畸形
- E. 血 25-(OH)D₃ 与 1, 25-(OH)₂D₃ 水平下降

25. 肺循环血量增多, 并伴左心房、左心室血量增多的先天性心脏病应是

- A. 原发性房间隔缺损
- B. 继发性房间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 室间隔缺损
- E. 法洛四联症

26. 左向右分流型先心病最常见的并发症为

- A. 细菌性心内膜炎
- B. 脑血栓
- C. 脑脓肿
- D. 肺炎
- E. 心力衰竭

27. 小儿体格发育的两个高峰期是

- A. 新生儿期、学龄期
- B. 婴儿期、学龄期
- C. 幼儿期、学龄期
- D. 婴儿期、青春期
- E. 学龄前期、青春期

28. 动脉导管未闭的早产儿, 促进动脉导管闭合的首选药物是

- A. 青霉素
- B. 吲哚美辛
- C. 卡托普利
- D. 普萘洛尔
- E. 硝酸甘油

29. 腹泻患儿重度低渗性脱水扩容应首先选用

- A. 2:1 等张含钠液
- B. 4:3:2(2/3 张) 混合液
- C. 2:3:1(1/2 张) 混合液
- D. 1:4(1/5 张) 混合液
- E. 1:2(1/3 张) 混合液

30. 引起儿童先天性肾积水的主要原因是

- A. 输尿管结石
- B. 肿瘤

C. 先天性肾盂连接部狭窄

D. 精索静脉曲张

E. 尿道狭窄

31. 辅食过渡期该如何添加辅食

A. 加油加盐

B. 少量多餐

C. 循序渐进

D. 单一到多元化

E. 吃奶后辅食

32. 8 月会爬的婴儿，最不可能出现以下哪种动作

A. 发出 mama 的声音

B. 会换手

C. 会拍手

D. 指认身体的部位

E. 会扶站

33. 小儿 4 个月，规律接种疫苗，下一个接种的疫苗是

A. 乙肝疫苗第三针

B. 麻腮风疫苗第一针

C. 百白破疫苗第三针

D. 脊髓灰质炎疫苗第二针

E. 乙脑减毒活疫苗第一针

34. 婴儿，1 岁，71cm 高。下列情况最不可能的是

A. 每年增重 2kg

B. 体重为出生时的 4 倍

C. 3 个月为体重的 2 倍

D. 头围为 46cm

E. 乳牙 6 颗

35. 某哮喘急性发作患儿，吸入沙丁胺醇后症状缓解，下一步错误的治疗是

A. 继续吸入沙丁胺醇

B. 规律吸入糖皮质激素

C. 静脉注射氨茶碱

D. 避免过敏原

E. 适量运动

36. 患儿，女，3 岁。持续高热、频咳 4 天，喘憋加重伴精神萎靡 2 日就诊。就诊中突发全身发作性抽搐 1 次。

查体：体温 40℃，嗜睡，呼吸 58 次/分，心率 150 次/分，双肺少量湿啰音，右下肺闻及管状呼吸音，肝肋下 1cm。

血常规：白细胞计数 $12.0 \times 10^9/L$ 。X 线显示大小不等的片状病灶或融合性病灶，以两肺下野及右上肺多见。该

患儿最有可能的诊断是

A. 肺炎链球菌肺炎

B. 金黄色葡萄球菌肺炎

C. 支原体肺炎

D. 腺病毒性肺炎

E. 急性咽喉炎

37. 患儿，男，1岁。生后48小时内无胎便，之后即有顽固性便秘和腹胀。最常见的临床疾病是

A. 先天性肠闭锁

B. 功能性便秘

C. 中毒性巨结肠

D. 肠套叠

E. 先天性巨结肠

39. 女，54岁。阴道脱出肿物3年。妇科检查：阴道前壁膨出，宫颈光滑，用力时宫颈及部分宫体脱出阴道口外。该患者应诊断为阴道前壁膨出和子宫脱垂

A. II度轻型

B. I度重型

C. I度轻型

D. II度重型

E. III度

40. 某经产妇，妊娠41周，临产后7小时出现烦躁不安，下腹疼痛难忍，子宫强直性收缩。检查子宫可触及病理缩复环，下腹拒按，胎心不稳。目前可能的情况是

A. 胎膜早破

B. 子宫破裂

C. 先兆子宫破裂

D. 前置胎盘

E. 胎盘早剥

41. 小儿热退后，耳后、枕后淋巴结肿大，考虑

A. 手足口病

B. 麻疹

C. 幼儿急疹

D. 风疹

E. 水痘

42. 幼儿手足口臀部出现皮疹，口腔黏膜有溃疡，是

A. 手足口病

B. 麻疹

C. 幼儿急疹

D. 风疹

E. 水痘

43. 小儿热退一天后出疹，是

A. 手足口病

B. 麻疹

C. 幼儿急疹

D. 风疹

E. 水痘

44. 某患儿，足月产。出生后 3 天出现皮肤轻度黄染，一般情况好，吃奶好，无发热，无肝脾肿大。血清胆红素 $224 \mu\text{mol/L}$ 。应考虑为

- A. 生理性黄疸
- B. 溶血性黄疸
- C. 母乳性黄疸
- D. 新生儿胆道闭锁
- E. 新生儿肝炎

45. 某患儿，足月产。出生后 3 天出现皮肤轻度黄染，一般情况好，吃奶好，无发热，无肝脾肿大。血清胆红素 $224 \mu\text{mol/L}$ 。治疗为

- A. 功能测定
- B. 光照疗法
- C. 抗生素疗法
- D. 观察，监测胆红素值
- E. 换血疗法

46. 某新生儿出生后不久出现进行性呼吸困难缺氧。诊断为

- A. 湿肺
- B. 新生儿肺透明膜病
- C. 吸入性肺炎
- D. 急性呼吸窘迫综合征
- E. 肺部感染

47. 某新生儿出生后不久出现进行性呼吸困难缺氧。首要的治疗措施为

- A. 保温
- B. 表面活性物质替代治疗
- C. 无创通气
- D. 液体疗法
- E. ECMO 治疗

48. 某患儿，生后 48 小时内无胎便，之后出现腹胀明显，大便难解，需灌肠。该患儿可能的诊断是

- A. 先天性肠闭锁
- B. 功能性便秘
- C. 肠套叠
- D. 先天性肥厚性幽门狭窄
- E. 先天性巨结肠

49. 某患儿，生后 48 小时内无胎便，之后出现腹胀明显，大便难解，需灌肠。若灌肠症状缓解，几天后，患儿突发高热，腹胀再次加重，则可能出现的并发症是

- A. 脓毒症
- B. 肠穿孔
- C. 小肠结肠炎
- D. 肠梗阻
- E. 败血症

50. 1 岁小儿，出现稽留热，咳嗽、咳痰。查体：双肺未闻及干湿啰音。检查：血白细胞及分类均不高，考虑

什么感染

- A. 呼吸道合胞病毒
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. 腺病毒
- D. 支原体
- E. 衣原体

51. 小儿全身中毒症状重，伴发作性喘憋。检查：血白细胞正常；胸部 X 线片见点片状阴影和肺气肿。考虑什么感染

- A. 呼吸道合胞病毒
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. 腺病毒
- D. 支原体
- E. 衣原体

52. 起病急，体温 40℃，粪便呈粘液和脓血状，中毒症状明显，伴里急后重，考虑

- A. 病毒性肠炎
- B. 真菌性肠炎
- C. 侵袭性大肠埃希菌性肠炎
- D. 出血性大肠埃希菌性肠炎
- E. 金黄色葡萄球菌性肠炎

53. 应用多种抗生素后，出现呕吐、腹泻，呈暗绿色水样便，镜检发现大量脓细胞，考虑

- A. 病毒性肠炎
- B. 真菌性肠炎
- C. 侵袭性大肠埃希菌性肠炎
- D. 出血性大肠埃希菌性肠炎
- E. 金黄色葡萄球菌性肠炎

54. 男孩，7 岁，近期气短，乏力，查体：胸骨左缘第二肋间可闻及收缩期杂音，第二心音固定分裂，最可能的诊断是

- A. 肺动脉狭窄
- B. 主动脉导管未闭
- C. 室间隔缺损
- D. 房间隔缺损
- E. 法洛四联症

55. 苯丙酮尿症属于

- A. X 连锁显性遗传
- B. 常染色体数目异常
- C. 常染色体隐性遗传病
- D. X 连锁隐性遗传
- E. 常染色体显性遗传病

56. 冬春季好发，多见于 1 岁以内的婴幼儿，以阵发性喘憋为主要症状，血白细胞总数正常，胸片可见小片状阴影，有不同程度肺气肿最可能是

- A. 支原体肺炎
- B. 金黄色葡萄球菌肺炎
- C. 衣原体肺炎
- D. 腺病毒肺炎
- E. 呼吸道合胞病毒肺炎

57. 儿童死亡率最高的时期是

- A. 婴儿期
- B. 学龄前期
- C. 新生儿期
- D. 学龄期
- E. 幼儿期

58. 男孩, 1 岁。发热 8 天, 皮疹 3 天入院。外院抗生素治疗 7 天无效。查体: $T39^{\circ}\text{C}$, 烦躁不安, 全身淡红色斑丘疹, 双眼结膜充血, 口唇鲜红, 干裂, 草莓舌, 右颈淋巴结蚕豆大, 质硬, 有压痛。双肺呼吸音粗, 心率 130 次/分, 腹软, 肝、脾无肿大, 指、趾端硬性肿胀。实验室检查: 血 $\text{WBC}19 \times 10^9/\text{L}$, $\text{N}0.78$, $\text{L}0.22$, $\text{PLT}420 \times 10^9/\text{L}$, 血沉 120mm/h , 血培养 (-)。首选的治疗措施是

- A. 丙种球蛋白+糖皮质激素
- B. 对症治疗, 观察
- C. 丙种球蛋白+阿司匹林
- D. 阿司匹林+糖皮质激素
- E. 青霉素

59. 幼儿, 3 岁, 发热 1 天。查体: $T39^{\circ}\text{C}$, 眼结膜充血, 舌红, 呈草莓样, 皮肤有浅红色斑丘疹, 右颈淋巴结肿大。双肺呼吸音粗, 心率 120 次/分, 腹软, 肝、脾无肿大, 指、趾端水肿, 伴少许膜状脱皮。治疗首选

- A. 丙种球蛋白+阿司匹林
- B. 糖皮质激素+阿司匹林
- C. 丙种球蛋白+环磷酰胺
- D. 糖皮质激素+环磷酰胺
- E. 阿司匹林+环磷酰胺

60. 女, 28 岁, 结婚 5 年未孕。自月经初潮起即 35~60 天行经一次, 毛发浓密, 面部痤疮明显, 身高 158cm, 体重 76kg。最可能的诊断是

- A. Asherman 综合征
- B. 闭经泌乳综合征
- C. 多囊卵巢综合征
- D. 对抗性卵巢综合征
- E. 特纳综合征

61. 患者, 女, 35 岁。继发性痛经 5 年, 检查子宫后倾屈, $7.5\text{cm} \times 7.0\text{cm}$ 大, 质硬。本例不可能出现的临床表现

- A. 不孕
- B. 性交疼痛
- C. 经量过多
- D. 经期延长

E. 月经稀发

62. 某经产妇, 40 岁。已育两小孩, 安置宫内节育环后出现少量阴道流血, 后出现经期延长及经血量增多, 此时应该

- A. 随访观察
- B. 取出节育环
- C. 使用止血药物
- D. 抗感染治疗
- E. 卧床休息

63. 患者, 女, 35 岁。已婚, 2 年前行人工流产术, 术后未来月经。行雌孕激素试验无撤退性出血, 雌孕激素序贯试验阴性。闭经的原因是

- A. 下丘脑性闭经
- B. 垂体性闭经
- C. 卵巢性闭经
- D. Asherman 综合征
- E. 难以确定

64. 育龄期妇女, 多年未孕, 月经规则, 男伴精子正常, 下一步该做的检查是

- A. 经子宫输卵管造影
- B. 宫腔镜检查
- C. 腹腔镜检查
- D. B 超检测卵泡发育
- E. 女性激素测定

65. 患者, 女, 28 岁。结婚 5 年未孕。月经稀少, 多毛, 痤疮。B 超示卵巢多囊表现。该患者可能的诊断是

- A. 多囊卵巢综合征
- B. 生殖器结核
- C. 无排卵性功能失调性子宫出血
- D. 卵巢早衰
- E. 子宫内膜异位症

66. 患者, 女, 50 岁。停经 1 年, 自觉潮热、出汗、心悸。检查: FSH60U/L, E26pg/ml。考虑

- A. 绝经综合征
- B. 经前期综合征
- C. 甲亢
- D. 早期卵巢功能不全
- E. 神经衰弱

67. 老年女性患者, 阴道肿物脱出 1 年。妇科检查: 宫颈光滑, 屏气用力后阴道脱出宫颈和部分宫体, 该患者目前的情况为

- A. 子宫脱垂 II 度重型
- B. 子宫脱垂 III 度
- C. 子宫脱垂 II 度轻型
- D. 子宫脱垂 I 度重型
- E. 子宫脱垂 II 度中型

68. 最常见的子宫内膜异位症病灶部位在

- A. 子宫肌层
- B. 卵巢
- C. 宫颈
- D. 直肠子宫陷凹
- E. 宫骶韧带

69. 宫内节育器的抗生育原理主要是

- A. 抑制排卵
- B. 阻碍受精
- C. 抗孕激素
- D. 抗雌激素
- E. 干扰着床

70. 输卵管妊娠破裂出血需要输血治疗，输血首选

- A. 储存式自体输血
- B. 稀释性自体输血
- C. 回收式自体输血
- D. 回收式和稀释式自体输血
- E. 储存式和回收式自体输血

71. 患者，女，36岁。月经周期延长，月经量较前减少，且出现泌乳、体重下降。考虑诊断催乳素腺瘤，最适宜的治疗是

- A. 溴隐亭药物治疗
- B. 经鼻-蝶窦垂体腺瘤切除术
- C. 环磷酰胺化疗
- D. 放射治疗
- E. 黄体酮药物治疗

72. 可引起失血性休克的是

- A. 先兆流产
- B. 不全流产
- C. 稽留流产
- D. 难免流产
- E. 复发流产

73. 女，28岁。葡萄胎清宫术后阴道持续少量流血3个月。妇科检查：子宫如妊娠50天大小，质软，双侧附件均可触及囊性肿物，大小约5x4厘米，活动好。尿hCG阳性，盆腔超声示子宫肌层有一4cmx3cm不均质回声，血流信号丰富，两侧附件区有囊性低回声包块。首选的治疗为

- A. 卵巢囊肿切除术
- B. 放射治疗
- C. 子宫病灶切除术
- D. 清宫术
- E. 化学治疗

74. 盆腔炎性疾病的最低诊断标准是

- A. 红细胞沉降率升高
- B. 血 C 反应蛋白升高
- C. 宫颈举痛或子宫压痛或附件区压痛
- D. 宫颈脓性分泌物
- E. 体温超过 38.3°C

75. 卵巢纤维瘤常伴什么综合征

- A. 美尼尔综合征
- B. 唐氏综合征
- C. 梅格斯综合征
- D. 库欣综合征
- E. 类癌综合征

76. 子宫内膜癌最常见的类型是

- A. 腺癌伴鳞状上皮化生
- B. 浆液性腺癌
- C. 透明细胞癌
- D. 移行细胞癌
- E. 内膜样腺癌

77. 细菌性阴道病的首选治疗药物是

- A. 制霉菌素
- B. 甲硝唑
- C. 头孢菌素
- D. 青霉素
- E. 阿奇霉素

78. 早期流产最常见的原因是

- A. 孕妇黄体功能不足
- B. 胚胎染色体异常
- C. 孕妇生殖器官异常
- D. 孕妇宫颈内口松弛
- E. 孕妇免疫功能异常

79. 初产妇, 27 岁, 妊娠 39 周, 规律宫缩 6 小时, 枕左前位, 估计胎儿体重 2700g, 胎心 142 次/分。阴道检查: 宫口开大 3cm, 未破膜, S=+1, 骨盆外测量未见异常。此时恰当处理应是

- A. 抑制宫缩, 使其维持至妊娠 40 周
- B. 等待自然分娩
- C. 人工破膜加速产程进展
- D. 静脉滴注缩宫素
- E. 行剖宫产术

80. 患者, 女, 40 岁。外阴瘙痒伴烧灼感 4 天。妇科检查见外阴局部充血小阴唇内侧及阴道黏膜表面有白色片状薄膜或凝乳状物。诊断首先考虑什么病

- A. 细菌性阴道炎
- B. 滴虫性阴道炎

- C. 外阴阴道念珠菌病
- D. 淋病性阴道炎
- E. 萎缩性阴道炎

81. 某产妇，宫缩来临时，胎心监护见胎心降到 100 次/分，持续 10 秒左右迅速恢复，可能的原因是

- A. 胎头受压
- B. 胎儿宫内缺氧
- C. 脐带受压
- D. 脐带脱垂
- E. 胎盘功能不良

82. 某产妇，产后 5 天，突发下腹疼痛，有压痛，伴发热，乳房胀痛。妇科检查：宫颈损伤，阴道内见脓血性分泌物，宫旁组织增厚、压痛。目前考虑

- A. 子宫肌炎
- B. 急性宫颈炎
- C. 急性输卵管炎
- D. 急性乳腺炎
- E. 脓毒血症

83. 患者，女，60 岁。绝经 10 年，阴道流血伴流液 2 个月就诊，行分段诊刮，诊断为子宫内膜癌 I 期，首选的治疗方案为

- A. 子宫全切术
- B. 腔内放射治疗
- C. 盆腔外照射治疗
- D. 扩大子宫全切术及+双附件切除术
- E. 子宫广泛切除术+盆腔淋巴结清扫术

84. 患者，女，46 岁。阴道接触性出血 3 个月，病理活检提示：鳞状上皮基底及副基底样细胞增生，细胞核极性紊乱，核分裂像增多，异型细胞扩展至全层。可能的诊断是

- A. 子宫颈浸润癌
- B. 子宫颈鳞状上皮内病变
- C. 宫颈息肉
- D. 子宫内膜炎
- E. 宫颈糜烂

85. 某孕妇，孕 12 周，行 NT 检查 2.5mm，为预防遗传性疾病，下一步应做何检查

- A. 随访 NT
- B. 羊膜腔穿刺染色体检查
- C. 母亲血液中提取 DNA
- D. 血清学检查
- E. 基因检测

86. 某产妇，妊娠 39 周。既往风心病史，未产检，现心功能 III 级，临产 8 小时，宫口开大 6cm。下一步该如何做？

- A. 等待自然分娩
- B. 静滴催产素，加强宫缩

C. 剖宫产结束分娩

D. 产钳助产

E. 指导产妇屏气用力

87. 某产妇，产后不想母乳喂养，医生指导其母乳喂养，以下作用不属于的是

A. 增加母婴感情

B. 促进子宫复旧

C. 避孕

D. 提高婴儿免疫力

E. 预防产后出血

88. 患者，女，23岁。平素月经周期规律，末次月经为2000年5月17日，则预产期为

A. 2月26日

B. 2月27日

C. 2月28日

D. 2月23日

E. 2月24日

89. 维持子宫在正常位置是由

A. 盆底肌肉及筋膜的支托作用

B. 膀胱和直肠的支托

C. 子宫韧带和盆底肌肉筋膜的支托

D. 子宫四对韧带的作用

E. 腹腔压力作用

90. 有关OCT的说法不正确的是

A. 动脉注射缩宫素可以诱发宫缩

B. 乳头刺激法可以诱发宫缩

C. 需要用到胎儿监护仪

D. 正弦波形提示在观察时胎儿存在酸碱失衡

E. 必要时应紧急终止妊娠

91. 在进行OCT时，如果发现胎儿存在酸碱失衡或其他问题，应立即采取相应的措施，如改变孕妇体位、吸氧、停止缩宫素使用、抑制宫缩、纠正孕妇低血压等，如果这些措施都无效，应紧急终止妊娠。

纤维瘤常伴以下哪种疾病

A. 卵巢内胚窦瘤

B. 无性细胞瘤

C. 梅格斯综合征

D. 库肯勃瘤

E. 畸胎瘤

92. 急性盆腔炎性疾病的最低诊断标准是

A. 宫颈脓性分泌物

B. 下腹压痛及反跳痛

C. 阴道超声见输卵管增粗

D. 宫颈举痛

E. 体温超过 38.3°C

93. 孕激素的生理作用是

A. 刺激并维持女性第二性征

B. 宫颈黏液变稀薄

C. 促进乳腺腺管发育

D. 使体温升高 $0.3\sim 0.5^{\circ}\text{C}$

E. 促进水钠潴留

94. 可以出现双胎输血综合征的是

A. 双绒毛膜双羊膜囊双胎

B. 单绒毛膜双羊膜囊双胎

C. 双绒毛膜单羊膜囊双胎

D. 单绒毛膜单羊膜囊双胎

E. 联体双胎

95. 早期妊娠最具有特异性的症状是

A. 停经

B. 早孕反应

C. 乳房增大

D. 子宫增大

E. 黑加征

96. 患者，女，28岁。妊娠37周，诊断为先兆子痫，连用硫酸镁 $15\text{g}/\text{日}$ ，治疗3天，发现膝腱反射消失，血Mg浓度 $>3.5\text{mmol/L}$ 。本例应首先选择的处理方法是

A. 给20%甘露醇 250ml 静脉快速静注

B. 立即肌注冬眠合剂半量

C. 立即停用硫酸镁，并给10%葡萄糖酸钙 10ml 缓慢静注

D. 静脉滴注低分子右旋糖酐 500ml

E. 静注呋塞米(速尿) 40mg

97. 患者，女，26岁，风湿性心脏病患者，现妊娠45天出现心力衰竭，其处理原则应是

A. 立即行负压吸宫术终止妊娠

B. 控制心力衰竭后继续妊娠

C. 边控制心力衰竭边终止妊娠

D. 控制心力衰竭后行负压吸宫术

E. 控制心力衰竭后行钳刮术

98. 患者，28岁，经产妇。人工流产术后半年，术后断续阴道流血，量不多，术后一直避孕。尿妊娠试验阳性，查子宫鸭卵大，软。胸片见两肺中下部有多处散在棉絮团影。本例最可能的疾病是

A. 吸宫不全

B. 葡萄胎

C. 侵蚀性葡萄胎

D. 绒毛膜癌

E. 胎盘部位滋养细胞肿瘤

99. 患者，女，54岁。行人工流产后3个月，出现持续性的不规则阴道流血，刮宫病理检查提示无绒毛结构，

最可能的诊断是

- A. 葡萄胎
- B. 绒毛膜癌
- C. 侵蚀性葡萄胎
- D. 子宫内膜癌
- E. 转移性癌

100. 雌孕激素分泌失调导致乳腺实质性细胞增生过度 and 复旧不全, 造成

- A. 乳腺囊性增生病
- B. 乳腺癌
- C. 乳腺纤维腺瘤
- D. 乳管内乳头状瘤
- E. 乳腺炎

101. 小叶纤维细胞对雌激素敏感性异常增高, 引起

- A. 乳腺囊性增生病
- B. 乳腺癌
- C. 乳腺纤维腺瘤
- D. 乳管内乳头状瘤
- E. 乳腺炎

102. 患者, 男, 36 岁。车祸外伤致头颅骨折, 塌陷 2cm, 昏迷半小时, 醒来 4 小时, 意识清楚, 对答如流, 说头晕, 恶心, 呕吐, 随即又陷入昏迷。首先考虑为

- A. 硬脑膜下血肿
- B. 脑震荡
- C. 颅底骨折
- D. 硬脑膜外血肿
- E. 脑干损伤

103. 患者, 男, 35 岁。外伤后致小便障碍。查体: 四肢肌力、肌张力正常, 感觉运动正常。其受损的部位是

- A. 胸段脊髓
- B. 脊髓圆锥
- C. 颈段脊髓
- D. 传入神经
- E. 前角细胞

104. 老年男性患者, 既往高血压、脑梗病史。停药 1 个月。打麻将时右眼一过性黑朦, 之后身体感觉肌力下降, 数分钟后恢复。可能的诊断是

- A. 颈内 TIA
- B. 椎基底 TIA
- C. 脑出血
- D. 脑血栓形成
- E. 脑栓塞

105. 急性严重的锥体束损害的断联休克表现为

- A. 弛缓性瘫, 腱反射消失

- B. 痉挛性瘫，腱反射消失
- C. 弛缓性瘫，腱反射亢进
- D. 痉挛性瘫，腱反射亢进
- E. 完全性瘫，腱反射存在

106. 脊髓半横断(Brown-Sequard)综合征常见于

- A. 急性脊髓炎
- B. Guillam-Bare 综合征
- C. 急性硬脊膜外脓肿
- D. 脊髓外肿瘤
- E. 外伤

107. 脊髓休克见于

- A. 脊髓胶质瘤
- B. 脊髓蛛网膜粘连
- C. 急性横贯性脊髓炎
- D. 脊髓空洞症
- E. 脊髓后动脉血栓形成

108. 关于急性脑病综合征的意识障碍表现，错误的是

- A. 错觉
- B. 幻觉
- C. 被害妄想
- D. 关系妄想
- E. 逻辑障碍

109. 脑梗死的病因中，最重要的是

- A. 动脉硬化
- B. 高血压
- C. 动脉壁炎症
- D. 真性红细胞增多症
- E. 血高凝状态

110. 继发于大剂量应用抗生素后，大便为暗绿色水样便，镜检发现大量红细胞，诊断是

- A. 出血性大肠埃希菌肠炎
- B. 真菌性肠炎
- C. 金黄色葡萄球菌
- D. 侵袭性大肠杆菌肠炎
- E. 空肠弯曲菌肠炎

111. 起病急，高热 40℃，粪便呈粘液和脓血，诊断是

- A. 出血性大肠埃希菌肠炎
- B. 真菌性肠炎
- C. 金黄色葡萄球菌
- D. 侵袭性大肠杆菌肠炎
- E. 空肠弯曲菌肠炎

112. 宫颈癌最常见的病理类型是

- A. 透明细胞癌
- B. 腺鳞癌
- C. 内膜腺样癌
- D. 鳞状细胞癌
- E. 腺癌

113. 子宫内膜癌最常见的病理类型是

- A. 透明细胞癌
- B. 腺鳞癌
- C. 内膜腺样癌
- D. 鳞状细胞癌
- E. 腺癌

114. 患者，女，40岁，因患“子宫腺肌病”予住院进一步治疗。若行保留双附件的全子宫切除术，不需要切断的韧带是

- A. 骨盆漏斗韧带
- B. 卵巢固有韧带
- C. 子宫主韧带
- D. 子宫阔韧带
- E. 子宫骶骨韧带

115. 患者，女，40岁，因患“子宫腺肌病”予住院进一步治疗。若予保守治疗，药物宜选用

- A. 雌激素
- B. 孕激素
- C. GnRH- α
- D. 雌孕激素交替
- E. 镇痛药物

116. 宫颈上皮不典型增生病变累及2/3层以上到全层，但基底膜完整，属于

- A. CIN I
- B. CIN IV级
- C. CIN II级
- D. CIN III级
- E. 浸润癌

117. 葡萄胎患者行清宫术，需刮除的组织是

- A. 肌层绒毛
- B. 输卵管绒毛
- C. 子宫内绒毛
- D. 蜕膜组织
- E. 宫外绒毛

118. 初产妇，31岁。宫口已开全，阴道检查胎头矢状缝与骨盆横径一致，胎儿小囟门在3点位，大囟门9点位。根据目前情况，胎儿属于什么胎位

- A. LOT

B. LOP

C. LOA

D. ROA

E. ROT

119. 初产妇, 31 岁。宫口已开全, 阴道检查胎头矢状缝与骨盆横径一致, 胎儿小囟门在 3 点位, 大囟门 9 点位。分娩时要如何旋转才能正常娩出

A. 顺时针旋转 45°

B. 顺时针旋转 90°

C. 逆时针旋转 90°

D. 逆时针旋转 45°

E. 不需要旋转

120. 产妇产出胎儿 10 分钟后, 出现大量阴道流血, 子宫轮廓清晰。最可能的原因是

A. 胎盘早剥

B. 子宫收缩乏力

C. 凝血功能障碍

D. 胎盘剥离不全

E. 软产道损伤

121. 某产妇, 胎儿娩出后, 立即出现阴道流血, 数分钟内出鲜血 200ml, 出血的原因是

A. 胎盘早剥

B. 子宫收缩乏力

C. 凝血功能障碍

D. 胎盘剥离不全

E. 软产道损伤

122. 双胎生产, 第一胎顺产, 第二胎人工破膜后随即出血, 出血的原因是

A. 胎盘早剥

B. 子宫收缩乏力

C. 凝血功能障碍

D. 胎盘剥离不全

E. 软产道损伤

123. 最容易出现凝血功能障碍的流产是

A. 稽留流产

B. 不全流产

C. 复发性流产

D. 完全流产

E. 先兆流产

124. 最容易出现失血性休克的流产是

A. 稽留流产

B. 不全流产

C. 复发性流产

D. 完全流产

E. 先兆流产

125. 某产妇，正常分娩，分娩过程中胎头已出，左肩露出，后产程延长。目前情况考虑什么

- A. 肩难产
- B. 第二产程延长
- C. 小儿发育畸形
- D. 巨大儿
- E. 滞产

126. 某产妇，正常分娩，分娩过程中胎头已出，左肩露出，后产程延长。助产士手法助产后，顺娩一 4500g 胎儿，检查发现胎儿左手不能抬，可能的原因是

- A. 臂丛神经损伤
- B. 肌皮神经损伤
- C. 腋神经损伤
- D. 肱骨骨折
- E. 肌肉拉伤

127. 孕妇感染后首选青霉素治疗的病原体是

- A. 苍白螺旋体
- B. 人乳头瘤病毒
- C. 沙眼衣原体
- D. 解脲支原体
- E. 人免疫缺陷病毒

128. 孕妇感染后首选阿奇霉素治疗的病原体是

- A. 苍白螺旋体
- B. 人乳头瘤病毒
- C. 沙眼衣原体
- D. 解脲支原体
- E. 人免疫缺陷病毒

129. 患者，女，25 岁，突发下腹剧烈疼痛，面色苍白，停经 50 天，查 BP90/60mmHg，P110 次/分，R21 次/分；考虑异位妊娠破裂合并出血性休克的可能性大。应注意该患者可能并发

- A. 混合性酸中毒
- B. 代谢性碱中毒
- C. AG 正常型代谢性酸中毒
- D. 呼吸性酸中毒
- E. AG 升高型代谢性酸中毒

130. 了解子宫内膜周期性变化最可靠的诊断依据是

- A. B 超检查
- B. 基础体温测定
- C. 激素测定
- D. 诊断性刮宫
- E. 细胞学检查

131. 正常产程分娩中，可增加子宫对缩宫素的敏感性的激素是

- A. 雌激素
- B. 孕激素
- C. 雄激素
- D. 促性腺激素
- E. 生长激素

132. 男婴，8个月。腹泻伴呕吐3天，无尿6小时。大便10-15次/天，呈蛋花汤样伴黏液，有腥臭味。查体：T37.8℃，表情淡漠，前囟、眼窝明显凹陷，皮肤弹性差，可见花纹，四肢厥冷，双肺呼吸音清，心率120次/分，腹软，无明显压痛。实验室检查：粪镜检偶见白细胞，血钠134mmol/L。病原学最可能的诊断是

- A. 产毒性大肠埃希菌肠炎
- B. 空肠弯曲菌肠炎
- C. 金黄色葡萄球菌肠炎
- D. 轮状病毒肠炎
- E. 白色念珠菌肠炎

133. 男婴，8个月。腹泻伴呕吐3天，无尿6小时。大便10-15次/天，呈蛋花汤样伴黏液，有腥臭味。查体：T37.8℃，表情淡漠，前囟、眼窝明显凹陷，皮肤弹性差，可见花纹，四肢厥冷，双肺呼吸音清，心率120次/分，腹软，无明显压痛。实验室检查：粪镜检偶见白细胞，血钠134mmol/L。患儿脱水的程度和性质是

- A. 重度等渗性脱水
- B. 中度等渗性脱水
- C. 重度低渗性脱水
- D. 中度低渗性脱水
- E. 重度高渗性脱水

134. 男婴，8个月。腹泻伴呕吐3天，无尿6小时。大便10-15次/天，呈蛋花汤样伴黏液，有腥臭味。查体：T37.8℃，表情淡漠，前囟、眼窝明显凹陷，皮肤弹性差，可见花纹，四肢厥冷，双肺呼吸音清，心率120次/分，腹软，无明显压痛。实验室检查：粪镜检偶见白细胞，血钠134mmol/L。首批快速扩容静脉输液应给予

- A. 1/3张含钠液
- B. 2:1等张含钠液
- C. 2/3张含钠液
- D. 1/2张含钠液
- E. 4/5张含钠液

135. 男婴，8个月。腹泻伴呕吐3天，无尿6小时。大便10-15次/天，呈蛋花汤样伴黏液，有腥臭味。查体：T37.8℃，表情淡漠，前囟、眼窝明显凹陷，皮肤弹性差，可见花纹，四肢厥冷，双肺呼吸音清，心率120次/分，腹软，无明显压痛。实验室检查：粪镜检偶见白细胞，血钠134mmol/L。患儿输液后出现腹胀，肠鸣音减弱，膝跳反射消失。首先考虑的诊断是

- A. 低钾血症
- B. 低钙血症
- C. 低磷血症
- D. 低镁血症
- E. 低钠血症

136. 6个月婴儿易发生缺铁性贫血最常见的原因

- A. 生长过快

- B. 铁吸收障碍
- C. 铁丢失过多
- D. 未及时添加辅食
- E. 先天性储铁不足

137. 法洛四联症预后影响最大的是

- A. 主动脉骑跨
- B. 右心室肥厚
- C. 室间隔缺损
- D. 肺动脉狭窄
- E. 主动脉狭窄

138. 小儿，多次患肺炎。胸片：左心房、左心室增大，肺野充血，主动脉影增宽最可能的诊断

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛四联症
- E. 待补充

139. 肺炎支原体肺炎首选

- A. 万古霉素
- B. 阿米卡星
- C. 阿莫西林+克拉维酸钾
- D. 头孢曲松
- E. 阿奇霉素

140. 新生儿流感嗜血杆菌患者首选

- A. 万古霉素
- B. 阿米卡星
- C. 阿莫西林+克拉维酸钾
- D. 头孢曲松
- E. 阿奇霉素

141. 新生儿耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的肺炎首选

- A. 万古霉素
- B. 阿米卡星
- C. 阿莫西林+克拉维酸钾
- D. 头孢曲松
- E. 阿奇霉素

142. 女婴，发热，体温 39 摄氏度，一般情况好，咽充血，耳后淋巴结肿大，心肺无异常，肝脾未触及，现热退后出疹，该病易发年龄段是

- A. 2-6 岁
- B. 7 岁以内
- C. 幼儿
- D. 新生儿期

E. 1 岁以内

143. 男, 3 岁, 发热 5 天手足硬性水肿, 球结膜充血, 皮疹, 颈部淋巴结肿大, 口唇充血皲裂, 首选治疗方案

- A. 泼尼松
- B. 环磷酰胺
- C. 泼尼松+丙种球蛋白
- D. 阿司匹林+丙种球蛋白
- E. 观察

144. 能量的需要, 为小儿特有的所需是

- A. 基础代谢
- B. 活动
- C. 食物的特殊动力作用
- D. 排泄损失能量
- E. 生长发育

145. 男, 5 岁, 双下肢水肿, 尿少 3 天。查体: T37.2℃P80 次/分, R20 次/分, BP96/88mmHg, 神志清楚, 精神可, 双下肢凹陷性水肿。实验室检查: 白蛋白 24g/L, 胆固醇 6.3mmol/L, 血尿素氮 7.2mmol/L, 肌酐 56umol/L。尿常规+镜检: 尿蛋白 (+++), RBC1-2/Hp, 24 小时尿蛋白 1.5g。该疾病最可能是

- A. 急性肾衰竭
- B. 单纯肾病综合征
- C. 肾炎性肾病综合征
- D. 急进性肾炎
- E. 急性肾炎

146. 男, 5 岁, 双下肢水肿, 尿少 3 天。查体: T37.2℃P80 次/分, R20 次/分, BP96/88mmHg, 神志清楚, 精神可, 双下肢凹陷性水肿。实验室检查: 白蛋白 24g/L, 胆固醇 6.3mmol/L, 血尿素氮 7.2mmol/L, 肌酐 56umol/L。尿常规+镜检: 尿蛋白 (+++), RBC1-2/Hp, 24 小时尿蛋白 1.5g。首选的治疗药物

- A. 泼尼松+环磷酰胺
- B. 呋塞米
- C. 泼尼松
- D. 环磷酰胺
- E. 待补充

147. 初产妇, 26 岁, 妊娠 39 周, 临产 10 小时, 宫缩正常, 羊水清, 宫口开大 6cm, 头先露, S=+1, 4 小时后宫口仍是 6cm, 最可能的诊断

- A. 活跃期停滞
- B. 第二产程延长
- C. 潜伏期延长
- D. 正常产程
- E. 活跃期延长

148. 女, 30 岁妊娠 7 周, 恶心呕吐 1 周, 加重 3 天。查体: BP100/60mmHg, 精神稍差, 心率 90 次/分, 四肢尚暖。可用于缓解症状的维生素最适合的是

- A. 维生素 PP
- B. 维生素 B2

- C. 维生素 B6
- D. 维生素 B12
- E. 维生素 A

149. 女, 33 岁, G1P0 停经 40 天确诊早孕, 月经周期是 28 天末次, 月经是 2021 年 3 月 1 日, 受精卵着床大概是在什么时间

- A. 2021 年 3 月 31 日-4 月 1 日
- B. 2021 年 3 月 14 日-3 月 15 日
- C. 2021 年 4 月 8 日-4 月 9 日
- D. 2021 年 3 月 20 日-3 月 21 日
- E. 2021 年 3 月 28 日-3 月 29 日

150. 排尿反射的低级中枢是

- A. 大脑
- B. 脊髓
- C. 脑桥
- D. 中脑
- E. 延髓

临床执业医师 2021 年真题答案解析

第一单元

1. 【答案】B

【解析】

选项 A: 移情, 是指病人将自己对重要他人的情感转移到治疗师身上。这并不符合题干描述。

选项 B: 自由联想, 是精神分析的基本技术, 鼓励病人说出脑子里出现的任何事情或想法, 无论这些事情多么荒唐、多么违背伦理道德, 也无论这些想法多么不符合逻辑、多么难以启齿。这符合题干描述, 所以是正确答案。

选项 C: 释梦, 是指解读患者的梦境, 用以理解其内心的欲望和冲突。这并不符合题干描述。

选项 D: 阻抗, 是指患者在精神分析过程中出现的抵触情绪或行为, 阻碍治疗过程。这并不符合题干描述。

选项 E: 自我宣泄, 这通常指的是通过言语或行为表达内心的情感, 以减轻压力或紧张。这并不符合题干描述。

2. 【答案】B

【解析】

A. 惊恐障碍, 其核心特征是突然发作、不可预测、反复出现的惊恐体验。这与题干描述的症状不符, 所以排除。

B. 焦虑障碍, 主要表现为广泛的、持续的焦虑和担忧, 患者往往能够认识到这些担忧是过度和不恰当的, 但不能控制, 符合题干描述的症状, 所以是正确答案。

C. 强迫障碍, 主要症状是反复出现的强迫观念、强迫冲动和强迫行为, 与题干描述的症状不符, 所以排除。

D. 双相障碍, 既有躁狂症状也有抑郁症状, 题干中并未提及患者有躁狂或抑郁的表现, 所以排除。

E. 应激障碍, 通常在经历了一次极度惊吓、威胁或灾难性事件后发生, 题干中并未提及有明显的应激源, 所以排除。

3. 【答案】D

【解析】

A 选项: 保护后代原则, 主要是指医务人员有义务告知供精者, 对其供精出生的后代无任何的权利和义务; 建立完善的供精使用管理体系, 精子库有义务在匿名的情况下, 为未来人工授精后代提供有关医学信息的婚姻咨询服务。这与题目中的情境并无直接关联, 所以不是正确选项。

B 选项: 患者有利原则, 包括严格对供精者进行筛查, 精液必须经过检疫方可使用, 以避免或减少出生缺陷, 防止性传播疾病的传播和蔓延等。虽然这些原则是为了保护受精者的利益, 但在这个问题中, 医院拒绝了未婚女性的人工授精请求, 所以这个原则并未被违反。

C 选项: 保密原则, 主要涉及到供精者、受精者和后代之间的信息保密, 这与题目中的情境并无直接关联。

D 选项: 社会公益原则, 医务人员必须严格贯彻国家人口和计划生育法律法规, 不得对不符合国家人口和计划生育法规和条例规定的夫妇和单身妇女实施人类辅助生殖技术。在这个问题中, 医院拒绝了未婚女性的人工授精请求, 明显符合社会公益原则, 因此这是正确选项。

E 选项: 知情同意原则, 主要涉及到供精者和受精者的知情权和同意权。在这个问题中, 未婚女性明确表示了她的意愿, 所以知情同意原则并没有被违反。

4. 【答案】E

【解析】

A. 维护医务人员之间、医院间的和谐: 虽然医务人员确实需要保持和谐的关系, 但在这个情况下, 这并不是

小刘所做的主要行为。

B. 维护医务人员和医院的声誉：小刘的行为可能间接提升了医院的声誉，但他的主要目标是救助患者，而不是维护声誉。

C. 维护医务人员和医院的经济效益：这一选项与小刘的行为无关，他的行为是出于对患者的关怀和对社会公益的承担，而非经济考量。

D. 维护医务人员和医院的自身利益：同样，小刘的行为主要是基于他的职业道德和对患者的关怀，而非个人或医院的利益。

E. 维护患者的利益和社会公益：这是正确答案。在火灾中，小刘以患者的安全为优先，不顾个人安全，这体现了他对患者的利益和社会公益的维护。

5. 【答案】A

【解析】

选项 A：吊销其执业证书。这是正确答案，因为医生李某未经人体器官移植技术临床应用与伦理委员会审查同意就摘取了王某的一个肾脏，这种行为严重违反了医疗伦理和法律规定，应该受到严厉的处罚，包括吊销其执业证书。

选项 B：行政拘留。这个选项不正确，因为行政拘留一般是对轻微违法行为的处罚，而医生李某的行为已经构成了严重的违法行为。

选项 C：暂停其 6 个月以上 1 年以下执业活动。这个选项不正确，因为这种处罚对于医生李某的行为来说显然过轻。

选项 D：暂停其 1 年以上 2 年以下执业活动。这个选项也不正确，因为暂停执业活动的时间还是不够长，不能起到足够的惩罚效果。

选项 E：暂停其 2 年以上 3 年以下执业活动。这个选项也不正确，虽然暂停执业活动的时间较长，但仍然无法起到足够的惩罚效果。

6. 【答案】A

【解析】

选项 A：妊娠妇女且在 8~15 周孕期。这是正确答案，因为在这个孕期阶段，胎儿的器官发育正处于关键期，开放射相关的检查可能对胎儿造成影响。

选项 B：B 超即可诊断。这个选项错误，因为虽然 B 超可以用来诊断，但是不能作为拒绝开放射相关检查的唯一理由。

选项 C：就诊前服用止痛药。这个选项错误，患者服用止痛药与是否进行放射性检查无直接关系。

选项 D：根据病史即可诊断。这个选项错误，仅凭病史并不能完全确诊，需要结合实际检查结果。

选项 E：患者拒交相关费用。这个选项错误，医生的决定应以患者的健康为首要考虑，而不是费用问题。

7. 【答案】E

【解析】

选项 A：患者的表兄弟。虽然是亲戚，但不是直系亲属或者监护人，所以不能代替患者签署知情同意书。

选项 B：患者的爷爷。虽然是直系亲属，但不是患者的法定监护人，所以不适宜签署知情同意书。

选项 C：患者的老师。在法律上，老师并不是学生的法定监护人，所以不能代替患者签署知情同意书。

选项 D：患者本人。由于患者未满 18 岁，尚未具备完全民事行为能力，因此他本人不能签署知情同意书。

选项 E：患者的父母。作为患者的法定监护人，最适合签署知情同意书。这也是保护未成年患者的权益，确保手术风险得到充分的说明和理解。

8. 【答案】B

【解析】

选项 A: 等待家属清醒后签字。这个选项不适宜, 因为患者的病情是紧急的, 不能等待家属清醒后才进行手术。

选项 B: 医疗机构负责人。这个选项是正确的, 因为在无法取得患者或家属同意的情况下, 医疗机构负责人有权进行决定。

选项 C: 上报到市级卫生部门。这个选项不适宜, 因为时间紧急, 无法等待市级卫生部门的决定。

选项 D: 可直接行急诊手术。这个选项不适宜, 因为没有取得患者或家属的同意, 不能直接进行手术。

选项 E: 等患者清醒后签字。这个选项不适宜, 因为患者的病情是紧急的, 不能等待患者清醒后才进行手术。

9. 【答案】B**【解析】**

正确选项 (B): 社会公益原则在医学领域, 主要指医务人员必须严格贯彻国家人口和计划生育法律法规, 不得对不符合国家人口和计划生育法规和条例规定的夫妇和单身妇女实施人类辅助生殖技术。因此, 未婚单身的大龄女性被拒绝进行人工授精, 主要是因为这违反了社会公益原则。

错误选项 (A): 社会公正原则是指在医学服务中公平、正直地对待每一位病人的原则。包括形式公平和内容公平, 与本题未婚单身大龄女性进行人工授精的情境无关。

错误选项 (C): 全社会参与原则是指政府、社会、团体和公众的广泛参与, 与本题未婚单身大龄女性进行人工授精的情境无关。

错误选项 (D): 互助协同原则指需要不同领域中的人员之间的互助与协作, 与本题未婚单身大龄女性进行人工授精的情境无关。

错误选项 (E): 信息公开原则是指信息公开在预防疾病、防范和控制疫情方面起到警示的作用, 提醒人们关注和重视可能存在的公共卫生问题, 与本题未婚单身大龄女性进行人工授精的情境无关。

10. 【答案】C**【解析】**

选项 A: 健康责任, 是指个人、社会和国家对维护和促进自身和他人健康的责任。这是健康伦理学的一个重要内容, 但并非其核心。

选项 B: 健康权利, 是指个人享有的与健康相关的权益, 如生存权、健康知情权、选择权等。这是健康伦理学的一个重要内容, 但并非其核心。

选项 C: 健康公正, 也被称为健康正义, 是指在维护和促进健康的过程中, 各个个体和群体能公平享受到健康服务和资源的原则。这是健康伦理学的核心。

选项 D: 健康义务, 是指个人、社会和国家对维护和促进自身和他人健康的义务。这是健康伦理学的一个重要内容, 但并非其核心。

选项 E: 健康互助, 是指在维护和促进健康的过程中, 各个个体和群体相互帮助、相互支持的行为。这是健康伦理学的一个重要内容, 但并非其核心。

11. 【答案】D**【解析】**

A 选项: 辐射散热是指机体通过热射线的形式将体热传给外界温度较低物质的一种散热方式, 此选项与题干不符, 所以不正确。

B 选项: 传导散热是指机体的热量直接传给与之接触的温度较低物体的一种散热方式, 此选项与题干不符, 所以不正确。

C 选项: 对流散热是指通过气体流动而实现热量交换的一种散热方式, 此选项与题干不符, 所以不正确。

D 选项: 蒸发散热是指水分从体表气化时吸收热量而散发体热的一种方式, 分为不感蒸发和出汗两种形式。运

动时汗腺分泌汗液，通过汗液蒸发可以有效带走大量体热，因此运动出汗属于蒸发散热，所以此选项是正确的。

E 选项：以上均错误，但是 D 选项是正确的，所以此选项不正确。

12. 【答案】B

【解析】

选项 A：辐射散热是机体通过热射线的形式将体热传给外界温度较低物质的一种散热方式。这种方式在此题中不适用，因为冰帽降温并非通过热射线的方式。

选项 B：传导散热是指机体的热量直接传给与之接触的温度较低物体的一种散热方式。当冰帽接触到高热患者的头部，冰帽的低温会通过传导的方式吸收患者头部的热量，从而达到降温的效果。所以这是正确选项。

选项 C：对流散热是通过气体流动而实现热量交换的一种散热方式，与本题中冰帽降温的方式不符。

选项 D：蒸发散热是指水分从体表气化时吸收热量而散发体热的一种方式，与本题中冰帽降温的方式不符。

13. 【答案】D

【解析】

选项 A：血红素并非胆色素的主要成分，胆色素是体内铁卟啉类化合物的主要分解代谢产物，包括胆绿素、胆红素、胆素原和胆素。因此，A 选项错误。

选项 B：胆汁酸并非胆色素的代谢终产物。未被肠道吸收的小部分胆汁酸在肠菌的作用下，衍生成多种胆烷酸并由粪便排出。因此，B 选项错误。

选项 C：胆红素在单核吞噬系统细胞生成以后释放入血。在血浆中主要以胆红素-清蛋白复合体形式存在和运输，而并非与球蛋白结合运输。因此，C 选项错误。

选项 D：胆色素是体内铁卟啉类化合物的主要分解代谢产物，因此 D 选项正确。

选项 E：胆红素主要源于衰老红细胞的破坏，有少量胆红素来自其他各种含血红素蛋白如细胞色素 P450，因此是其降解产物，而不能转变成细胞色素。因此，E 选项错误。

14. 【答案】C

【解析】

正确选项（C）：维生素 B1 主要存在于豆类和种子外皮（如米糠）、胚芽、酵母和瘦肉中。因此，长期食用碾磨过分精白的米和面粉（其中的维生素 B1 大部分已被去除）会导致维生素 B1 的摄入不足，从而引发缺乏症。

错误选项（A）：维生素 C 主要存在于新鲜水果和蔬菜中，素食主义者一般不会缺乏。

错误选项（B）：维生素 A 主要存在于动物肝脏、奶制品和胡萝卜等食物中，素食主义者通过摄取胡萝卜等蔬菜也能获取足够的维生素 A。

错误选项（D）：维生素 D 可以通过日晒皮肤自体合成，不完全依赖食物摄入。

错误选项（E）：膳食纤维主要存在于粗粮、蔬菜和水果中，素食主义者一般不会缺乏。

15. 【答案】A

【解析】

正确选项（A）：葡萄糖-6-磷酸脱氢酶是红细胞中的一种重要酶，通过磷酸戊糖途径产生 NADPH，保持谷胱甘肽处于还原状态，从而保护红细胞免受氧化损伤。当这种酶缺乏时，红细胞更易遭受氧化损伤，导致溶血性黄疸。这种状况在食用蚕豆（强氧化剂）后更易出现，因此被称为蚕豆病。

错误选项（B）：苯丙氨酸羟化酶缺乏会导致苯丙酮尿症，这是一种由于体内不能正常代谢苯丙氨酸而引发的代谢疾病，与蚕豆病无关。

错误选项（C）：丙酮酸脱氢酶能够催化丙酮酸转化为乙酰辅酶 A，参与线粒体的反应。其缺乏会导致丙酮酸脱氢酶缺乏症，这是一种罕见的遗传疾病，与蚕豆病无关。

错误选项（D）：酪氨酸羟化酶负责将酪氨酸转变为左旋多巴。其缺乏会导致酪氨酸羟化酶缺乏症，也称为隐

性多巴反应性肌张力障碍，这是一种常染色体隐性遗传病，与蚕豆病无关。

错误选项（E）：肌酸激酶是一种酶，当心肌梗死时，血中 MB 型肌酸激酶的活性增高，因此可作为心肌梗死的辅助诊断指标之一，与蚕豆病无关。

16. 【答案】D

【解析】

选项 A：天冬酰胺是一种非必需氨基酸，它需要酶和维生素 B6 才能形成，是天冬氨酸的酰胺。这个选项与白化病无关，因此不是正确答案。

选项 B 和 C：谷氨酸和谷氨酰胺主要参与氨的代谢过程，与白化病的发生没有直接关系，因此也不是正确答案。

选项 D：酪氨酸在黑色素细胞中可以通过酪氨酸酶的作用，羟化生成多巴，后者经过一系列反应转变成黑色素。如果存在先天性酪氨酸酶缺乏，就会导致不能合成黑色素，皮肤毛发等发白，这就是白化病的发病机制，因此这是正确答案。

选项 E：精氨酸在人体内主要参与鸟氨酸循环，促进尿素的形成，与白化病无关，因此不是正确答案。

17. 【答案】C

【解析】

A 选项：下丘脑-垂体-甲状腺轴主要维持与甲状腺激素分泌相关的各级激素的稳态，但不直接导致心率加快、血压增高等应激反应。

B 选项：下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴主要影响类固醇激素的分泌，虽然应激反应时会增加糖皮质激素及醛固酮的分泌，但不是产生“心率加快、血压增高、呼吸加速和肌张力增强”的直接原因。

C 选项：交感-肾上腺髓质轴在应对紧急情况时会被激活，释放大量的儿茶酚胺类激素，使机体处于警觉状态，出现心率加快、血压增高等生理反应，因此是正确答案。

D 选项：下丘脑-垂体-性腺轴主要影响生殖功能，与本题的应激反应无关。

E 选项：下丘脑-神经垂体轴主要释放催产素与血管升压素，与本题的应激反应无关。

18. 【答案】C

【解析】

选项 A：二氧化碳是高脂溶性小分子，通过单纯扩散的方式进行跨膜扩散，所以不符合题意。

选项 B：维生素 D 属于固醇类，其本质是脂质，其跨膜运输的方式是自由扩散，所以不符合题意。

选项 C：氨基酸在小肠的吸收通过 Na^+ -氨基酸同向转运体以同向转运的方式进行，该转运方式为继发性主动转运，因此符合题意，是正确答案。

选项 D：神经纤维末梢释放神经递质是通过膜泡运输的方式进行跨膜运输，所以不符合题意。

选项 E：类固醇激素也是高脂溶性小分子，通过单纯扩散的方式进行跨膜扩散，所以不符合题意。

19. 【答案】E

【解析】

选项 A：11.1mmol/L，这个值超过了正常人体的肾糖阈，因此不正确。

选项 B：7.0mmol/L，这个值低于正常人体的肾糖阈，因此不正确。

选项 C：8.0mmol/L，这个值接近正常人体的肾糖阈，但仍略低，因此不正确。

选项 D：6.1mmol/L，这个值远低于正常人体的肾糖阈，因此不正确。

选项 E：10.0mmol/L，这个值在正常人体的肾糖阈范围内，因此是正确答案。

20. 【答案】A

【解析】

选项 A：心血管系统。心血管系统主要负责输送血液，提供营养和氧气，并清除废物。虽然心理压力可以间接

影响心血管系统，如引发心率加快，血压升高等，但并不是大脑直接调节，故选 A。

选项 B：交感神经系统。交感神经系统是自主神经系统的一部分，负责应对紧张和压力情况，例如“战斗或逃跑”反应。心理活动可以通过大脑直接影响交感神经系统，故不选 B。

选项 C：内分泌系统。内分泌系统负责体内的激素分泌，与神经系统共同参与调节身体的许多功能。心理活动可以通过大脑直接影响内分泌系统，故不选 C。

选项 D：自主神经系统。自主神经系统控制我们的内脏器官，如心脏、肠胃等。心理活动可以通过大脑直接影响自主神经系统，故不选 D。

选项 E：免疫系统。近年来的研究表明，心理活动如压力、情绪等可以影响免疫系统的功能，故不选 E。

21. 【答案】D

【解析】

A. 基础代谢率提高：这是正确的，因为当人体发热时，基础代谢会升高，一般情况下，体温每升高 1℃，基础代谢将升高 13% 左右。

B. 可发生代谢性酸中毒：这也是正确的，机体在发热时，由于葡萄糖的无氧酵解反应增加，导致组织内乳酸增加，因而会出现代谢性酸中毒。

C. 维生素 B 族和维生素 C 缺乏：这同样是正确的，发热时基础代谢会增高，使物质消耗明显增多，如果营养物质摄入不足，就会消耗自身物质，并易出现维生素 C 和 B 的缺乏。

D. 出现正氮平衡：这是错误的，高热病人的蛋白分解加强，尿氮比正常人增加 2~3 倍，可出现负氮平衡，即摄入未能补足消耗。

E. 脂肪分解增强：这是正确的，发热时脂肪分解也显著加强，由于糖代谢加强使糖原储备不足，摄入相对减少，乃动员储备脂肪，后者大量消耗而致消瘦。

22. 【答案】D

【解析】

A. 左侧中脑腹侧部，受损结构有左侧锥体束、右侧内侧丘系：不符合病例描述，因为患者的症状主要表现在右侧肢体和左侧舌下神经，而这些症状与中脑腹侧部损伤不符，所以排除。

B. 左侧脑桥腹侧部，受损结构有左侧锥体束、右侧内侧丘系：同样，病例的症状与脑桥腹侧部损伤不符，排除。

C. 右侧脑桥腹侧部，受损结构有右侧锥体束、左侧内侧丘系、左侧三叉神经核：虽然患者的症状在右侧，但这并不意味着损伤在脑桥的右侧，因为神经系统的控制是交叉的，所以排除。

D. 左侧延髓腹侧部，受损结构有左侧锥体束、左侧内侧丘系、左侧舌下神经核：符合病例描述，症状表现在右侧肢体和左侧舌下神经，这与延髓腹侧部损伤的症状相符，所以选择。

E. 右侧延髓腹侧部，受损结构有右侧锥体束、右侧内侧丘系、右侧舌下神经核：虽然症状表现在右侧，但损伤并不在延髓的右侧，因为神经系统的控制是交叉的，所以排除。

23. 【答案】E

【解析】

A 选项：处方超过规定用量。这个选项是错误的，因为题目中并未提到处方药的用量超过规定。

B 选项：一张处方中超过 5 种药品。这个选项也是错误的，C 选项：中药与西药开在同一张处方。这个选项同样是错误的，D 选项：家属未按规定签字。这个选项是错误的，因为处方的开具并不需要家属签字。

E 选项：处方已超过期限。这个选项是正确的，根据规定，处方的有效期是有限的。如果患者没有在规定的时间内取药，那么处方就会失效。

24. 【答案】E

【解析】

- A. 90 天：此选项不正确，因为哌醋甲酯用于治疗儿童多动症时，每张处方的常用量不得超过 15 天。
- B. 20 天：此选项不正确，原因同上。
- C. 30 天：此选项不正确，原因同上。
- D. 7 天：此选项不正确，虽然比 15 天少，但并非规定的处方常用量。
- E. 15 天：此选项正确，哌醋甲酯用于治疗儿童多动症时，每张处方的常用量不得超过 15 天。

25. 【答案】D

【解析】

- A. 生命权：此选项不正确，因为虽然患者被约束，但并没有威胁到他的生命。
- B. 健康权：此选项不正确，因为约束措施是为了防止患者伤人毁物，保护患者和他人的安全，而非损害其健康。
- C. 认知权：此选项不正确，此案例中并未涉及到患者的认知权。
- D. 知情权：此选项正确，医院在实施约束措施后，应当及时通知患者的监护人，但未做到，因此侵犯了患者的知情权。
- E. 名誉权：此选项不正确，此案例中并未涉及到患者的名誉权。

26. 【答案】C

【解析】

- A 选项：治性措施，这是指为了治疗疾病而采取的措施。在本题中，约束患者并非为了治疗其躁狂抑郁障碍，因此 A 选项不正确。
- B 选项：惩罚性措施，这是指对违法行为者采取的惩罚措施。在本题中，连某的行为是由其疾病引起的，并非违法行为，因此 B 选项不正确。
- C 选项：保护性医疗措施，这是指在没有其他可替代措施的情况下，为了保护患者自身和他人的安全，防止其发生伤害自身、危害他人安全、扰乱医疗秩序的行为，医疗机构及其医务人员可以实施的措施。在本题中，连某因病情恶化，出现伤人毁物等行为，医院在没有其他可替代措施的情况下，对其实施了约束身体的措施，这符合保护性医疗措施的定义，因此 C 选项是正确答案。
- D 选项：诊断性措施，这是指为了诊断疾病而采取的措施。在本题中，约束患者并非为了诊断其躁狂抑郁障碍，因此 D 选项不正确。
- E 选项：警告性措施，这是指为了警告患者改正行为而采取的措施。在本题中，连某的行为是由其疾病引起的，约束其并非为了警告其改正行为，因此 E 选项不正确。

27. 【答案】C

【解析】

- 选项 A：2 次，错误。医疗机构对无正当理由开具抗菌药物超常处方的医师提出警告的最低次数不是 2 次。
- 选项 B：6 次，错误。该选项大于实际规定的最低次数，故不正确。
- 选项 C：3 次，正确。根据相关规定，无正当理由开具抗菌药物超常处方达到 3 次以上的医师，医疗机构应予以警告，并限制其特殊使用级和限制级抗菌药物处方权。
- 选项 D：4 次，错误。该选项大于实际规定的最低次数，故不正确。
- 选项 E：5 次，错误。该选项大于实际规定的最低次数，故不正确。

28. 【答案】E

【解析】

- 选项 A：动员社会人员互助捐血，错误。在紧急情况下，动员社会人员捐血需要时间，并且还需要进行血液检

测等程序，无法满足紧急输血的需求。

选项 B：等待血站送血，错误。从题干中可以看出，血站送血需要 3 小时车程，这个时间对于失血性休克的患者来说可能是致命的。

选项 C：外借自体血液回输设备，错误。自体血液回输需要有足够的自体血液储备，而该患者已经处于失血性休克状态，无法进行自体血液回输。

选项 D：立即将患者转院，错误。患者已经处于失血性休克状态，转院需要时间，可能会加重患者的病情。

选项 E：临时采集血液，并确保采血用血安全，正确。根据《医疗机构临床用血管理办法》规定，在危及患者生命，急需输血，且无法及时从其他途径获取血液的情况下，医疗机构可以临时采集血液，并确保采血用血安全。

29. 【答案】B

【解析】

选项 A：“非法行医”是指无医生执业资格从事诊疗活动，包括在医疗机构中从事诊疗活动和擅自开业从事诊疗活动。在此案例中，该退休外科医生具有医师资格，但从事的医疗美容科目超出了其专业范围，因此不属于非法行医。

选项 B：“超范围执业”是指医生在具有医师资格的前提下，从事超出其专业范围的诊疗活动。在此案例中，该退休外科医生被聘请从事医疗美容科目，这超出了他的外科专业范围，因此属于超范围执业。

选项 C：“正常医疗行为”是指医生按照其专业范围和医疗机构的批准科目进行的诊疗活动。在此案例中，医院未经批准就新设医疗美容科，并聘请外科医生从事医疗美容科目，这不属于正常医疗行为。

选项 D：“特殊情况”通常是指因某些特殊原因，如紧急救援等，需要临时改变医生的工作范围或医疗机构的科目。在此案例中，医院的行为并非由于特殊情况引发，而是主动超越规定范围，因此不属于特殊情况。

选项 E：“开展新技术”是指医疗机构在得到相关批准后，引入和实施新的医疗技术或方法。在此案例中，医院未经批准就新设医疗美容科，这并不符合开展新技术的规定。

30. 【答案】B

【解析】

选项 A：错误。监测机构发现突发公共卫生事件后，向所在地县级人民政府卫生行政部门报告的时限是 2 小时，而不是 1 小时。

选项 B：正确。根据《突发公共卫生事件应急条例》规定，县医疗机构应在 2 小时内向所在县级人民政府卫生行政部门报告突发公共卫生事件。

选项 C：错误。3 小时超出了规定的报告时限，应当在 2 小时内报告。

选项 D：错误。4 小时远超出了规定的报告时限，应当在 2 小时内报告。

选项 E：错误。6 小时更是远超出了规定的报告时限，应当在 2 小时内报告。

31. 【答案】E

【解析】

选项 A：错误。进行性卫生知识、生育知识的教育属于婚前保健服务的内容，而不是婚前医学检查服务的内容。

选项 B：错误。进行遗传病知识的教育也属于婚前保健服务的内容，而不是婚前医学检查服务的内容。

选项 C：错误。对有关婚配问题提供医学意见同样属于婚前保健服务的内容，而不是婚前医学检查服务的内容。

选项 D：错误。对有关生育健康问题提供医学意见是婚前保健服务的内容，而不是婚前医学检查服务的内容。

选项 E：正确。婚前医学检查服务的内容是指对严重遗传疾病、指定传染病和有关精神病的检查。

32. 【答案】B

【解析】

选项 A：“予以警告，没收违法所得”，这是对于医疗机构未按规定供应、接收、采购疫苗的一种处罚方式，

符合《中华人民共和国疫苗管理法》的规定。

选项 B: “处 5 万元以上 50 万元以下的罚款”，这个选项是不正确的。根据《中华人民共和国疫苗管理法》，并没有明确规定对医疗机构未按规定供应、接收、采购疫苗的行为处以 5 万元以上 50 万元以下的罚款。

选项 C: “由县级以上人民政府卫生健康主管部门责令改正”，这也是对于医疗机构未按规定供应、接收、采购疫苗的一种处罚方式，符合《中华人民共和国疫苗管理法》的规定。

选项 D: “情节严重的，对负责人撤职处分”，如果医疗机构未按规定供应、接收、采购疫苗的行为情节严重，确实可以对负责人进行撤职处分。

选项 E: “责令负有责任的医疗卫生人员暂停 1 年以上 18 个月以下执业活动”，这也是对于医疗机构未按规定供应、接收、采购疫苗的一种处罚方式，符合《中华人民共和国疫苗管理法》的规定。

33. 【答案】D

【解析】

选项 A: 错误。该选项描述的是医师在执业活动中应享有的权利，而非执业规则。医师的人格尊严和人身安全应当得到保护，但这并不属于医师执业规则的内容。

选项 B: 错误。此选项描述的是医师在执业过程中应当遵守的法律法规和技术操作规范，这属于医师的职业责任和义务，而不是执业规则。

选项 C: 错误。该选项描述的是对考核不合格的医师的处理方式，是医师考核与培训制度的相关内容，而并非执业规则。

选项 D: 正确。根据《执业医师法》的规定，医师在执业过程中应当使用经国家有关部门批准使用的药品、消毒药剂和医疗器械，这是医师执业的基本规则之一，违反这一规定将承担法律责任。

选项 E: 错误。该选项描述的是对于医学专业技术有重大突破、作出显著贡献的医师的表彰或奖励，这并不属于医师执业规则。

34. 【答案】C

【解析】

A. 下行传染: 这是一种特定的感染方式，通常发生在同一系统的不同部位之间，例如肾脏感染随尿液扩散至膀胱。这道题中的情况并非下行传染。

B. 垂直传播: 这是指病原体在围生期通过胎盘、产道或哺乳由母亲传播给子代的传播方式。此题中的情况并非垂直传播。

C. 水平传播: 这是指病原体通过非遗传方式传播到同一个种群的其他个体。在这个例子中，HIV 通过输血（血液）传播，属于水平传播。

D. 接触传播: 包括直接接触传播和间接接触传播。直接接触传播是指病原体直接引起的感染，间接接触传播是指间接接触被污染的物品所造成的传播。此题中的情况并非接触传播。

E. 医源性传播: 这是指在医疗工作中人为造成的某些传染病的传播。此题中的情况虽然涉及到医疗活动（输血），但主要的传播方式仍然是水平传播。

35. 【答案】E

【解析】

选项 A: 乙肝是由 HBV 感染引起，注射抗生素无预防和治疗作用。抗生素主要对抗细菌感染有作用，而乙型肝炎是由病毒引起的，所以此选项错误。

选项 B: 注射丙种球蛋白可以提高免疫力，但对乙肝无预防作用。丙种球蛋白是一种广谱的免疫制剂，它能够增强机体的非特异性免疫力，但并不能针对乙型肝炎病毒产生特异性的保护效果，所以此选项错误。

选项 C: 注射乙型肝炎疫苗属于主动免疫，但诱导机体产生抗体的时间长，对于职业暴露预防，起效慢，不是

首选。乙型肝炎疫苗可以刺激机体产生特异性的抗乙型肝炎病毒的免疫应答，但这个过程需要一定的时间，不能立即起到预防作用，所以此选项错误。

选项 D: α -干扰素用于慢性乙肝及丙肝的抗病毒治疗，但对乙肝无预防作用。 α -干扰素是一种具有广泛抗病毒活性的生物制剂，主要用于治疗慢性乙肝和丙肝，但并不能预防乙型肝炎病毒的感染，所以此选项错误。

选项 E: 乙型肝炎免疫球蛋白(HBIG)属于被动免疫，主要用于 HBV 感染母亲的新生儿及暴露于 HBV 的易感者，应及早注射，保护期为 3 个月。因此对于该护士应首选注射 HBIG。乙型肝炎免疫球蛋白含有大量的抗乙型肝炎病毒的抗体，可以立即结合并中和体内的乙型肝炎病毒，阻止其对肝脏的侵害，所以此选项正确。

36. 【答案】C

【解析】

A. 肺下界：此选项是错误的。虽然肺下界是肺的最低部位，但并不是胸膜腔的最低点。
B. 膈上界：此选项也是错误的。膈上界是膈肌的上边缘，虽然它位于胸膜腔内，但并不是胸膜腔的最低点。
C. 肋膈隐窝：此选项是正确的。肋膈隐窝是由肋胸膜与膈胸膜转折形成的半环形腔隙，是胸膜腔的最低部位，胸腔积液首先聚集于此。

D. 纵隔下界：此选项是错误的。纵隔是胸膜腔内的一个重要结构，但其下界并不是胸膜腔的最低点。

E. 心包下界：此选项也是错误的。心包是心脏的外覆结构，其下界并不是胸膜腔的最低点。

37. 【答案】D

【解析】

正确答案为 D. 软脊膜。齿状韧带是由软脊膜增厚并向外突出形成的，其主要功能是稳定脊髓和防止其在椎管内移动。

A. 硬脊膜：硬脊膜是由致密结缔组织构成，形成长筒状的硬脊膜囊，围绕脊髓提供保护，但并不构成齿状韧带。

B. 蛛网膜：蛛网膜位于硬脊膜和软脊膜之间，其主要功能是存储和循环脑脊液，但并不构成齿状韧带。

C. 软脑膜：软脑膜紧贴于脑表面，伸入大脑的沟裂和脑室内，形成脉络丛，分泌脑脊液，但并不构成齿状韧带。

E. 硬脑膜：硬脑膜是围绕大脑的最外层的膜，其主要功能是保护大脑，但并不构成齿状韧带。

38. 【答案】B

【解析】

A. 磷酸果糖激酶-1 是糖酵解作用里一种重要的酶，与此病例无直接关系，因此排除。

B. 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶是蚕豆病的主要病因，该病患者会有这种酶的缺乏，因此这是正确答案。

C. 丙酮酸羧化酶存在于线粒体中，为一种变构酶，在三羧酸循环中，它是供给草酰乙酸的主要补充反应，与此病例无直接关系，因此排除。

D. 过氧化物酶是一类氧化还原酶，它们能催化很多反应，是以过氧化氢为电子受体催化底物氧化的酶，与此病例无直接关系，因此排除。

E. ATP 合成酶参与氧化磷酸化和光合磷酸化，在跨膜质子动力势的推动下合成 ATP，与此病例无直接关系，因此排除。

39. 【答案】C

【解析】

选项 A: 脑积水是由于炎症渗出物粘连堵塞脑室内脑脊液流出通道或炎症破坏蛛网膜颗粒，或颅内静脉窦栓塞致脑脊液重吸收障碍，造成的。但其不是化脓性脑膜炎最易并发的疾病。

选项 B: 脑脓肿是由化脓性细菌引起的脑组织的化脓性感染，病原可分为耳源性、鼻源性、血源性、隐源性或

损伤性。主要表现为隐性感染、颅内压增高及脑局灶性症状和体征，但也不是化脓性脑膜炎最易并发的疾病。

选项 C：硬脑膜下积液是化脓性脑膜炎的常见并发症。约 30%~60% 的化脓性脑膜炎并发硬脑膜下积液，若加上无症状者，其发生率可高达 80%，因此，化脓性脑膜炎患者最易并发硬脑膜下积液。

选项 D：偏瘫是指同一侧上下肢、面肌和舌肌下部的运动障碍，是急性脑血管病的常见症状，不是化脓性脑膜炎最易并发的疾病。

选项 E：亚急性硬化性全脑炎是一种以大脑白质和灰质损害为主的全脑炎，由于缺损型麻疹病毒慢性持续感染所致的一种罕见的致命性中枢神经系统退变性疾病，不是化脓性脑膜炎最易并发的疾病。

40. 【答案】A

【解析】

选项 A：肺炎，正确。室间隔缺损的患者由于心脏功能的异常，容易导致肺部的血液循环不畅，从而引发肺部感染，如肺炎。因此，肺炎是室间隔缺损患者最常见的并发症。

选项 B：化脓性脑膜炎，错误。这是一种由各种化脓性细菌引起的脑膜炎，但它并不是室间隔缺损的患者最常见的并发症。

选项 C：脑血栓，错误。脑血栓形成是缺血性脑血管病的一种，多见于中老年人，它是由于脑血管壁本身的病变引起的，不是室间隔缺损的患者最常见的并发症。

选项 D：脑脓肿，错误。脑脓肿是由化脓性细菌引起的脑组织的化脓性感染，但它并不是室间隔缺损的患者最常见的并发症。

选项 E：脑栓塞，错误。脑栓塞是指血液中的各种栓子随血流进入脑动脉而阻塞血管，但它并不是室间隔缺损的患者最常见的并发症。

41. 【答案】B

【解析】

选项 A：急性应激障碍通常是由于遭受强烈的精神刺激，如自然灾害或战争等引起，病程短暂，具有分离症状、茫然状态等。在此案例中，学生并未遭受强烈的精神刺激，因此不选 A。

选项 B：适应障碍是指在面对重大生活事件或者生活压力时，个体无法有效地调整 and 适应，从而出现显著的情绪反应或行为症状。在这个案例中，学生的情况符合适应障碍的描述，因此选择 B。

选项 C：创伤后应激障碍是指经历过异常威胁性或灾难性事件后，出现强烈的无助、恐惧焦虑等心理反应，通常具有延迟发作的特点。在这个案例中，学生并未经历过异常威胁性或灾难性事件，因此不选 C。

选项 D：分离障碍常表现为解离性和转换性两种障碍，与该学生的表现不符，因此不选 D。

选项 E：强迫障碍是有意识的强迫和反强迫并存，该学生未表现出强迫表现，因此不选 E。

42. 【答案】C

【解析】

A. 儿童：儿童阶段，流体智力与晶体智力都在逐渐增长，因此不符合题目描述，故不选。

B. 青少年：青少年阶段，流体智力与晶体智力都在增长，达到 25 岁左右时达到高峰，因此不符合题目描述，故不选。

C. 中年人：在中年阶段，晶体智力（包括一般知识、词汇、数理推理等）通常保持上升，而流体智力（包括处理速度、工作记忆等）开始缓慢下降，符合题目描述，故选。

D. 老年人：老年人阶段，流体智力呈下降趋势，而晶体智力则相对稳定，因此不符合题目描述，故不选。

E. 婴幼儿：在婴幼儿阶段，流体智力与晶体智力都在初期发展阶段，因此不符合题目描述，故不选。

43. 【答案】C

【解析】

选项 A: 癌症。C 型行为模式（压抑、顺从）被认为与癌症有关，而 A 型行为模式（急躁、竞争）与之无关，所以选项 A 不正确。

选项 B: 溃疡病。应激和情绪障碍如焦虑、抑郁可能通过影响生活习惯等方式与消化性溃疡有关，但这并非 A 型行为模式的特点，所以选项 B 不正确。

选项 C: 冠心病。A 型行为模式（急躁、竞争）被认为与冠心病有关，因此选项 C 是正确的。

选项 D: 功能性胃肠病。应激、焦虑等可以导致胃肠功能紊乱，进而引发功能性胃肠病，但这并非 A 型行为模式的特点，所以选项 D 不正确。

选项 E: 哮喘。对于哮喘，以往认为特定的人格特征和特殊的潜意识冲突是导致其的主要原因，但这并非 A 型行为模式的特点，所以选项 E 不正确。

44. 【答案】C

【解析】

选项 A: 气质、性格和能力并不是心理过程的组成部分。气质是个体生物学上的特性，性格是个体的稳定的行为方式，能力则是个体完成某项任务的技能。这三者更多的是个体的特性，而非过程。

选项 B: 动力、活动和评价同样并不构成心理过程。动力是驱动个体行为的内在力量，活动则是个体的外在表现，评价是对事物价值的判断。这些元素虽然在心理活动中有重要作用，但并不直接构成心理过程。

选项 C: 认知、情感和意志是心理过程的三个主要组成部分。认知过程包括感知、记忆、思考等，是对外界信息的处理和理解；情感过程涉及到个体的情绪反应，如喜、怒、哀、乐等；意志过程则是个体的自我控制和决定行为的过程。所以，选项 C 是正确答案。

选项 D: 认知、人格和活动并不构成心理过程。人格是个体的行为特征和心理特性的总和，活动是个体的行为表现，这两者并不直接构成心理过程。

选项 E: 动力、情感和意志并不能完全覆盖心理过程的全部内容。动力只是推动心理过程的因素，而非过程的一部分。

45. 【答案】D

【解析】

A. 轮廓乳头：轮廓乳头位于舌尖和舌边，呈圆锥形，表面有许多小凹陷，这些小凹陷中含有大量的味蕾，因此选项 A 不符合题意。

B. 菌状乳头：菌状乳头分布在舌的全部表面，特别是舌尖和舌边，且每一个乳头上都有味蕾存在，所以选项 B 也不符合题意。

C. 软腭的黏膜上皮：软腭的黏膜上皮中也含有味蕾，对各种味觉有感应作用，因此选项 C 不符合题意。

D. 丝状乳头：丝状乳头是舌上最小且数量最多的乳头，主要位于舌中部和舌根部。然而，丝状乳头并不含有味蕾，无味觉功能，因此选项 D 符合题意。

E. 会厌的黏膜上皮：会厌的黏膜上皮中同样含有味蕾，因此选项 E 不符合题意。

46. 【答案】A

【解析】

A. 收集健康信息-正确。在健康管理的过程中，首要步骤是收集健康信息，包括个体的生活习惯、疾病史、遗传史等，这些都是进行健康管理的基础。

B. 人群的健康体检-错误。人群的健康体检是在收集了健康信息后的一个步骤，通过体检可以了解个体的健康状况，为制定健康计划提供依据。

C. 健康维护计划的制定-错误。制定健康维护计划需要在收集和评估健康信息后进行，因此这不是首要步骤。

D. 健康维护计划的实施-错误。实施健康维护计划是在制定计划后的步骤，不是首要步骤。E. 疾病危险度评估

-错误。疾病危险度评估是在收集了健康信息后的一个步骤，通过评估可以确定个体的健康风险，为制定健康计划提供依据。

47. 【答案】C

【解析】

A. 巨幼红细胞性贫血是由于叶酸或维生素 B12 缺乏或某些影响核苷酸代谢的药物导致 DNA 合成障碍所致。骨髓象中，红系可见胞体大，胞质较胞核成熟，即“核幼浆老”现象，与题目描述不符，故非正确答案。

B. 急性红白血病是急性髓系白血病的一种类型，主要表现为骨髓中幼红细胞 $\geq 50\%$ ，NEC 中原始细胞（I 型+II 型） $\geq 30\%$ 。骨髓象中可见大量有核细胞，以原始细胞为主，没有明显的“核老浆幼”现象，故非正确答案。

C. 是正确答案，缺铁性贫血。在缺铁性贫血中，由于体内贮存铁耗尽，导致红细胞内铁缺乏，最终引起小细胞低色素性贫血及其他异常。骨髓象中可见“核老浆幼”现象。

D. 骨髓增生异常综合征是一组起源于造血干细胞，以血细胞病态造血，高风险向急性髓系白血病转化为特征的异质性髓系肿瘤性疾病。主要表现为持续一系或多系血细胞减少。骨髓增生度多在活跃以上，少部分呈增生减低，没有明显的“核老浆幼”现象，故非正确答案。

E. 再生障碍性贫血，是一种可能由不同病因和机制引起的骨髓造血功能衰竭症。主要表现为骨髓造血功能低下、全血细胞减少及所致的贫血、出血、感染综合征。可见多部位骨髓增生减低或重度减低，巨核细胞明显减少或缺如，没有明显的“核老浆幼”现象，故非正确答案。

48. 【答案】A

【解析】

选项 A：正确。米索前列醇是前列腺素 E1（PGE1）的类似物，主要用于诱导堕胎、药物流产和治疗胃溃疡等。

选项 B：错误。PGE2 是另一种前列腺素，与米索前列醇无关。

选项 C：错误。PGD 是前列腺素 D，与米索前列醇无关。

选项 D：错误。PGF 是前列腺素 F，与米索前列醇无关。

选项 E：错误。PGA 是前列腺素 A，与米索前列醇无关。

49. 【答案】C

【解析】

选项 A：错误。地西泮是一种苯二氮卓类药物，主要用于治疗焦虑、失眠等症状，不属于阿片类药物。

选项 B：错误。甲基苯丙胺是一种中枢神经系统刺激剂，也被滥用为兴奋剂，不属于阿片类药物。

选项 C：正确。美沙酮是一种阿片类药物，主要用于治疗阿片类药物的依赖和戒断症状。-选项 D：错误。麦角酸二乙酰胺（LSD）是一种强力的致幻剂，不属于阿片类药物。

选项 E：错误。可拉明（卡拉马胆碱）是一种中枢神经系统刺激药，不属于阿片类药物。

50. 【答案】E

【解析】

选项 A：错误。虽然糖皮质激素可以用于血液病的联合治疗，但在停药时，检查血细胞并不是主要的注意事项。

选项 B：错误。长期使用糖皮质激素可能导致胃粘膜损伤，但在停药时，了解胃黏膜有无损伤并不是主要的注意事项。

选项 C：错误。长期使用糖皮质激素可能造成负氮平衡，需要补充蛋白质，但这并不是停药的主要注意事项。

选项 D：错误。停药时，并不需要使用抗糖皮质激素药物。

选项 E：正确。长期使用糖皮质激素后，不能突然停药，需要逐渐减量，以避免出现反跳现象。

51. 【答案】C

【解析】

选项 A: 血管紧张素转换酶抑制剂 (ACEI) 可以用于各型高血压, 但它并不会引起反射性心率加快。实际上, ACEI 的主要副作用是刺激性干咳和血管性水肿。因此, 选项 A 错误。

选项 B: ACEI 对肾脏有保护作用, 它可以减少尿蛋白, 对肾脏受损的高血压病人具有较好的疗效。因此, 选项 B 错误。

选项 C: ACEI 确实可以改善心室重塑, 这是由于它能够阻止血管紧张素 II 的生成, 从而减轻心室负荷和心肌纤维化, 改善心室功能。因此, 选项 C 正确。

选项 D: ACEI 的长期使用副作用是高血钾, 而不是低血钾。因此, 选项 D 错误。

选项 E: ACEI 并不抑制高血压患者的前列腺素生成, 相反, 它通过抑制缓激肽降解而增加由缓激肽介导的前列腺素的生成, 从而发挥扩血管作用。因此, 选项 E 错误。

52. 【答案】C

【解析】

选项 A: 流感病毒是有包膜的 RNA 病毒, 包膜来源于宿主细胞的细胞膜, 因此选项 A 的说法正确。

选项 B: 流感病毒表面有两种重要的蛋白质, 血凝素 (HA) 和神经氨酸酶 (NA)。这两种蛋白质都是刺突状的, 因此选项 B 的说法正确。

选项 C: 流感病毒的两种表面蛋白 HA 和 NA 容易发生抗原性变异, 这就是为什么人们每年都需要接种新的流感疫苗的原因。因此, 选项 C 的说法是错误的。

选项 D: 流感病毒的基因组由 8 段分节的 RNA 组成, 这些 RNA 与核蛋白 (NP) 一起形成核壳。因此, 选项 D 的说法正确。

选项 E: 如选项 B 所述, 流感病毒的表面有血凝素 (HA) 刺突, 因此选项 E 的说法正确。

53. 【答案】C

【解析】

选项 A: 国家医疗保险是由政府通过税收筹集医疗保险基金, 主要为了保障公民的基本医疗需求。此选项错误, 因为它不是通过市场机制筹集费用和提供服务。

选项 B: 社会医疗保险的基金来源主要是由雇主 (或参保单位) 和雇员 (或参保人员) 按一定比例缴纳, 政府适当补贴。此选项错误, 因为它并非完全依赖市场机制。

选项 C: 商业医疗保险也称为市场医疗保险模式, 主要通过市场机制来筹集费用和提供服务。此选项正确, 因为它符合题目的要求。

选项 D: 储蓄医疗保险模式通过立法, 强制劳方或劳资双方缴费, 这并非市场机制。此选项错误。

选项 E: 企业医疗保险并不是一个标准的医疗保险模式类别。此选项错误。

54. 【答案】B

【解析】

选项 A: 国家医疗保险是通过税收筹集的医疗保险基金, 主要由政府负责运营和管理。这种模式下, 个人和雇主不直接缴纳保费, 因此选项 A 不符合题目描述。

选项 B: 社会医疗保险的保险基金主要来源于雇主和雇员按一定比例缴纳的保费, 同时政府会提供适当的补贴。这种模式通常通过法律强制实施, 与题目描述相符, 因此选项 B 是正确答案。

选项 C: 商业医疗保险主要通过市场机制来筹集费用和提供服务, 与雇主和雇员缴纳保费的模式不符, 因此选项 C 不是正确答案。

选项 D: 储蓄医疗保险通过立法强制劳方或劳资双方缴费, 虽然有立法强制实施的特点, 但其保费主要来源于劳方或劳资双方, 而非雇主和雇员, 因此选项 D 不符合题目描述。

选项 E: 企业医疗保险并不是医疗保险模式的一种, 它更多地是指企业为员工提供的一种福利, 因此选项 E

不是正确答案。

55. 【答案】C

【解析】

选项 A: 16%。此为乳腺癌妇女筛查结果阳性的比例, 与灵敏度无关, 所以不选 A。

选项 B: 84%。此为乳腺癌妇女筛查结果阴性的比例, 与灵敏度无关, 所以不选 B。

选项 C: 64%。此为乳腺癌妇女筛查结果阳性的比例, 即为灵敏度, 所以选择 C。

选项 D: 36%。此为乳腺癌妇女筛查结果阴性的比例, 与灵敏度无关, 所以不选 D。

选项 E: 74%。此数值在题目中没有出现, 与灵敏度无关, 所以不选 E。

56. 【答案】B

【解析】

选项 A: 16%。这是乳腺癌妇女筛查结果阳性的人数占比, 与特异度无关, 故排除。

选项 B: 84%。特异度表示实际无病而按该筛检试验的标准被正确地判为无病的百分比。它反映筛检试验排除无病人的能力。特异度=真阴性人数÷金标准阴性人数=84/100=84%, 故选 B。

选项 C: 64%。这是乳腺癌妇女筛查结果阳性的人数占比, 与特异度无关, 故排除。

选项 D: 36%。这是乳腺癌妇女筛查结果阴性的人数占比, 与特异度无关, 故排除。

选项 E: 74%。

57. 【答案】E

【解析】

选项 A: 16%。这是乳腺癌妇女筛查结果阳性的人数占比, 与粗一致率无关, 故排除。

选项 B: 84%。这是乳腺癌妇女筛查结果阴性的人数占比, 与粗一致率无关, 故排除。

选项 C: 64%。这是乳腺癌妇女筛查结果阳性的人数占比, 与粗一致率无关, 故排除。

选项 D: 36%。这是乳腺癌妇女筛查结果阴性的人数占比, 与粗一致率无关, 故排除。

选项 E: 74%。粗一致率是试验所检出的真阳性和真阴性例数之和占受试人数的百分比。粗一致率=(真阳性例数+真阴性例数)÷总人数=(64+84)÷200=74%, 故选 E。

58. 【答案】E

【解析】

选项 A: 病例对照研究是在已经有病因假设的前提下, 通过比较病例组与对照组中各因素的暴露比例, 来检验病因假设是否正确。然而在这个情况下, 我们还不清楚导致集体腹泻的具体原因, 因此病例对照研究并不适用。

选项 B: 队列研究是将特定人群按是否暴露于某可疑因素或暴露程度分为不同的亚组, 追踪观察各组成员结局发生的情况, 比较各组之间结局发生率的差异。这种方法通常用于验证暴露与结局的因果关系, 但在找出病因线索方面耗时间较多, 所以队列研究在这个情况下并不适用。

选项 C: 临床试验主要用于评价药物、副作用或治疗方法的效果, 在医院或其他医疗照顾环境下进行。这种方法并不适合寻找病因及流行病学的线索, 因此在这个情况下也不适用。

选项 D: 理论流行病学研究通过数学模型模拟疾病流行的过程, 探讨疾病流行的动力学, 为疾病的预防和控制、卫生策略的制定服务。但这种方法并不适用于寻找病因及流行病学的线索, 故不选 D。

选项 E: 现况调查是在某时点或某时期内对某特定范围人群当时的疾病和健康状况以及相关特征和因素的调查分析。这种方法能快速获取大量的信息, 有利于寻找病因线索, 因此是最佳选择。

59. 【答案】A

【解析】

A 选项: 病例对照研究。这种研究方法适用于在有病因假设的前提下, 初步检验病因假设是否正确。在这个情

况下，已经有了一个初步的病因假设，即腹泻可能与食堂饭菜有关，因此可以进行病例对照研究，以检验这个线索是否正确。所以，A 选项是正确的。

B 选项：队列研究。这是一种观察性研究方法，适用于验证暴露与结局的因果关系。但这种方法耗费时间较多，难以快速找出病因线索，因此在这个情况下不适用。

C 选项：现况调查研究。这种研究方法主要用于描述某特定范围人群的疾病和健康状况及相关特征和因素的分布情况，探索疾病病因线索，但并不适用于验证病因假设，所以在这个情况下不适用。

D 选项：理论流行病学研究。通过数学模型模拟疾病流行的过程，为疾病的预防和控制、卫生策略的制定服务。但这种研究方法并不适用于验证病因假设，所以在这个情况下不适用。

E 选项：临床试验研究。这种方法常用于评价药物、副作用或治疗方法的效果，也并不适用于验证病因假设，所以在这个情况下不适用。

60. 【答案】B

【解析】

选项 A：化学预防是指对无症状的人使用药物、营养素（包括无机盐）、生物制剂或其他天然物质作为一级预防为主的措施，提高人群抵抗疾病的能力，以防止某些疾病。

选项 B：健康筛查是应用快速、简便的检验、检查手段，从表面健康者中查出可能患病者，以便进一步诊治的过程。

选项 C：预防接种是用人工方法将免疫原或免疫效应物质输入到机体内，使机体通过人工自动免疫或人工被动免疫的方法获得防治某种传染病的能力。

选项 D：危险度评价即基于毒理学试验资料，化学物接触资料 and 人群流行病学资料等科学数据的分析，确定接触外源化学物后对公众健康危害的可能性，发生损害效应的性质、强度、概率，确定可接受危险度水平和相应的实际安全剂量。

选项 E：健康咨询指的是通过健康咨询的技术与方法，为求助者解除健康问题提供咨询服务。

61. 【答案】A

【解析】

选项 A：化学预防是指对无症状的人使用药物、营养素（包括无机盐）、生物制剂或其他天然物质作为一级预防为主的措施，提高人群抵抗疾病的能力，以防止某些疾病。孕妇服用叶酸主要是为了预防胎儿出生缺陷，属于化学预防。

选项 B：健康筛查是应用快速、简便的检验、检查手段，从表面健康者中查出可能患病者，以便进一步诊治的过程。孕妇服用叶酸不属于检验、检查手段。

选项 C：免疫接种是用人工方法将免疫原或免疫效应物质输入到机体内，使机体通过人工自动免疫或人工被动免疫的方法获得防治某种传染病的能力。叶酸不属于免疫原或免疫效应物质。

选项 D：危险度评价即基于毒理学试验资料，化学物接触资料 and 人群流行病学资料等科学数据的分析，确定接触外源化学物后对公众健康危害的可能性，发生损害效应的性质、强度、概率，确定可接受危险度水平和相应的实际安全剂量，为管理部门制定和修正卫生标准，制定相应法规，确定污染治理的先后次序，评价治理效果提供科学依据。孕妇服用叶酸不涉及此项。

选项 E：健康咨询指的是通过健康咨询的技术与方法，为求助者解除健康问题提供咨询服务。孕妇服用叶酸不涉及健康咨询的技术与方法。

62. 【答案】E

【解析】

选项 A：卡方检验通常用于比较多个率或多个构成比，而本题是要比较两种药物的效果，因此不适用卡方检验。

选项 B: t 检验主要用于样本含量较小, 总体标准差未知的正态分布。但在本题中, 药物效果的评定并不一定符合正态分布, 因此不适用 t 检验。

选项 C: 方差分析要求各处理条件下的样本分布必须为正态分布。然而在比较两种药物的效果时, 并不能保证满足这个要求, 因此不适用方差分析。

选项 D: 回归分析用于确定两种或两种以上变量间相互依赖的定量关系, 但本题并未要求确定药物效果的这种关系, 因此不适用回归分析。

选项 E: 秩和检验是一种非参数检验, 适用于等级资料及两端无确定值的资料。在比较两种药物的效果是否有差别时, 效果为等级资料且药物效果分布形式未知, 适用于秩和检验来检验配对的试验数据所在总体的分布位置有无显著差异。

63. 【答案】E

【解析】

A. 国家、地区和城乡分布: 这是对疾病地理分布的描述, 但不全面, 因此不选。

B. 职业、家庭和环境分布: 这主要涉及到人群分布, 但并未包含时间和地区分布, 因此不选。

C. 短期波动、季节性和周期性分布: 这主要描述的是时间分布, 但并未包含人群和地区分布, 因此不选。

D. 年龄、性别和种族分布: 这主要描述的是人群分布的一部分, 但并未包含时间和地区分布, 因此不选。

E. 时间、地区和人群分布: 这是正确的答案, 疾病的三间分布就是指在时间、地区和人群三个方面的分布。

64. 【答案】D

【解析】

选项 A: 实际支付能力。卫生服务的需求并不仅仅取决于消费者的实际支付能力, 即使消费者有足够的支付能力, 如果他们的健康状况良好, 他们可能并不需要卫生服务。因此, 这个选项是错误的。

选项 B: 购买愿望。购买愿望只是影响卫生服务需求的一个方面, 它不能完全决定卫生服务的需求。因此, 这个选项也是错误的。

选项 C: 购买愿望和支付能力。虽然这两个因素都会影响卫生服务的需求, 但是它们并不能完全决定卫生服务的需求, 因为消费者的健康状况也是一个非常重要的因素。因此, 这个选项是错误的。

选项 D: 自身健康状况。这是正确的选项。卫生服务的需求主要取决于消费者的健康状况, 如果消费者的健康状况良好, 他们可能并不需要卫生服务, 反之, 如果他们的健康状况较差, 他们可能会有更大的卫生服务需求。

选项 E: 健康状况和购买愿望。虽然这两个因素都会影响卫生服务的需求, 但是购买愿望并不能完全决定卫生服务的需求, 因为消费者的支付能力也是一个非常重要的因素。因此, 这个选项是错误的。

卫生服务的需求还会受到其他一些因素的影响, 比如消费者的知识、态度、行为等, 这些都可能影响他们对卫生服务的需求。

65. 【答案】A

【解析】

选项 A: 正确。孕妇服用叶酸是为了预防胎儿神经管缺陷, 这属于化学预防的范畴。化学预防是利用药物或营养素等提高人体抵抗疾病的能力, 从而防止疾病的发生。

选项 B: 错误。筛查是指通过简便、快速的检验、检查手段, 从健康者中找出潜在的疾病者, 以便进行进一步的诊断和治疗。孕妇服用叶酸并不属于筛查。

选项 C: 错误。健康咨询是指为求助者解决健康问题提供咨询服务。孕妇服用叶酸并不涉及到健康咨询的技术和方法。

选项 D: 错误。免疫接种是将免疫原或免疫效应物质引入到机体内, 使机体获得对某种疾病的防治能力。叶酸并不属于免疫原或免疫效应物质。

选项 E: 错误。药物治疗是指使用具有治疗或预防作用的物质来治疗机体的疾病,使疾病好转或痊愈,保持身体健康。孕妇服用叶酸是为了预防,而非治疗疾病。

66. 【答案】D

【解析】

A. 慢性病: 矽肺可以是慢性疾病,但这并不能完全描述此患者的病情,因为他的疾病是由于长期在采矿场工作而引起的,因此不选择 A。

B. 急性病: 虽然矽肺可能表现为急性病,但这同样不能全面反映患者的病情。此外,患者的病情是由于长期在采矿场工作导致的,因此不选择 B。

C. 工伤: 工伤通常指的是由于工作过程中发生的意外事件导致的身体伤害,而不是由于长期接触有害物质所引起的疾病。因此,矽肺不能被归类为工伤,不选择 C。

D. 职业病: 职业病是指在职业活动中,由于接触有毒、有害物质等因素引起的疾病。患者的矽肺是由于长期在采矿场工作,吸入大量的二氧化硅粉尘引起的,符合职业病的定义。因此,选择 D。

E. 与职业无关: 患者的矽肺病是由于长期在采矿场工作,吸入大量的二氧化硅粉尘引起的,明显与其职业有关,因此不选择 E。

67. 【答案】C

【解析】

A. 选择、中心、混杂偏倚: 此选项不正确。在流行病学中,没有“中心偏倚”这一概念,因此该选项错误。

B. 中心、信息、混杂偏倚: 此选项不正确。同样,“中心偏倚”并非流行病学中的概念,所以该选项错误。

C. 选择、信息、混杂偏倚: 此选项正确。流行病学中的三类偏倚就是选择偏倚、信息偏倚和混杂偏倚。选择偏倚指的是在研究对象的选取过程中产生的系统性误差;信息偏倚则是由于测量或资料收集方法的误差导致的系统性误差;混杂偏倚是指暴露因素与疾病发生的相关程度受到其他因素的歪曲或干扰。

D. 选择、信息、中心偏倚: 此选项不正确。如前所述,“中心偏倚”并非流行病学中的概念,所以该选项错误。

E. 选择、数据、混杂偏倚: 此选项不正确。在流行病学中,没有“数据偏倚”这一概念,因此该选项错误。

68. 【答案】A

【解析】

A. $P \leq 0.05$: 正确选项。在统计学中, P 值(概率值)是用来量化统计显著性的一种方法。习惯上,我们将 P 值小于或等于 0.05 的事件称为小概率事件,这意味着如果零假设(null hypothesis)是正确的,那么观察到的数据(或更极端的数据)发生的概率不超过 5%。

B. $P \leq 0.01$: 虽然 P 值小于或等于 0.01 的事件确实是小概率事件,但这个定义比 A 选项更严格。通常,我们将 $P \leq 0.01$ 的事件视为非常小的概率事件。

C. $0.01 \leq P \leq 0.05$: 此范围内的 P 值确实可以被视为小概率事件,但是这个定义比 A 选项更狭窄,它排除了 P 值小于 0.01 的事件。

D. $0.05 \leq P \leq 0.1$: 在这个范围内的 P 值通常不被视为小概率事件,因为它们的发生概率超过了 5%。

E. $P \leq 0.1$: 这个定义太宽泛,包含了很多并不被视为小概率事件的情况。

69. 【答案】D

【解析】

选项 A: 氟和氮。氟是特种塑料、橡胶和冷冻机(氟氯烷)中的关键元素,氟化物可造成大气污染,而氮是水体富营养化的元素之一,但两者并不都与水体富营养化密切相关。

选项 B: 汞和氟。水体被无机汞污染后被人体摄入可造成水俣病,而氟则与大气污染有关,两者都不与水体富营养化有直接关系。

选项 C: 铅和汞。铅是常见的土壤重金属污染物, 汞在水体中过量则可能引发水俣病, 两者都不与水体富营养化有直接关系。

选项 D: 氮和磷。这两种元素是水体富营养化的主要原因, 因为它们是水生生物生长所需的主要营养元素, 过多的输入会导致水体中生物过度生长, 引发水体富营养化。

选项 E: 碘和磷。碘是人体的必需微量元素之一, 缺乏可导致地方性甲状腺肿、地方性克汀病等, 而磷是水体富营养化的元素之一, 但两者并不都与水体富营养化密切相关。

70. 【答案】B

【解析】

选项 A: 性别分布、民族分布、地区分布并不构成流行病学中的疾病三间分布。虽然这些因素可能影响疾病的发生, 但它们并不是疾病分布的主要考虑因素。(不选 A)

选项 B: 疾病的三间分布指人群分布、时间分布、地区分布。这是流行病学中用来描述疾病分布的基本框架, 以此可以了解疾病的流行情况和变化趋势, 对预防和控制疾病具有重要意义。(选 B)

选项 C: 历史分布、地区分布、职业分布并不构成流行病学中的疾病三间分布。虽然这些因素可能影响疾病的发生, 但它们并不是疾病分布的主要考虑因素。(不选 C)

选项 D: 年龄分布、季节分布、地区分布并不构成流行病学中的疾病三间分布。虽然这些因素可能影响疾病的发生, 但它们并不是疾病分布的主要考虑因素。(不选 D)

选项 E: 由于选项 B 正确, 所以选项 E 不正确。(不选 E)

71. 【答案】A

【解析】

选项 A: 维生素 C, 严重摄入不足可引起坏血病。这是一个正确的选项。

选项 B: 维生素 B 族包括维生素 B1、维生素 B2、维生素 B6、维生素 B12 等。维生素 B1 缺乏时可引起脚气病; 维生素 B2 缺乏时可出现口角炎、眼睑缘炎等。这是一个错误的选项。

选项 C: 维生素 A 缺乏时可导致暗适应能力下降, 严重可致夜盲症。这是一个错误的选项。

选项 D: 健康人对维生素 K 的需要量低而膳食中含量比较多, 原发性维生素 K 缺乏不常见, 临床上能见到的由于维生素 K 缺乏所致的表现是继发性出血如伤口出血, 大片皮下出血和中枢神经系统出血等。这是一个错误的选项。

选项 E: 在生长发育期由于维生素 D 缺乏使骨骼钙化障碍而影响骨成长的病变, 即佝偻病。成年人维生素 D 缺乏可引起骨质疏松。这是一个错误的选项。

72. 【答案】C

【解析】

A. 运动记忆: 运动记忆是以身体的运动状态或动作形象为内容的记忆。它是形象记忆的一种形式, 只是记忆的对象不是静态的人物、物体或自然景物的直观形象, 而是各种运动的动作形象。在这个问题中, 描述旅游风景并不涉及到身体的运动状态或动作, 因此 A 选项不正确。

B. 逻辑记忆: 逻辑记忆是以词语、概念、原理为内容的记忆。这种记忆所保持的不是具体的形象, 而是反映客观事物本质和规律的定义、定理、公式、法则等。在这个问题中, 描述旅游风景更多的是对具体形象的记忆, 而不是概念或原理, 因此 B 选项不正确。

C. 形象记忆: 形象记忆以感知过的事物形象为内容的记忆。如对日常生活中的人物面貌、自然景色、音乐、绘画等各种形象的记忆, 直接对客观事物的形状、大小、体积、颜色、声音、气味、味道、软硬和温冷等具体形象或外貌的记忆。在这个问题中, 描述旅游风景正是对感知过的自然景色形象的记忆, 因此 C 选项是正确的。

D. 情绪记忆: 情绪记忆是对曾经体验过的情绪和情感的记忆。在这个问题中, 虽然旅游可能会引发一些情绪

和情感，但是题目中描述的是旅游风景，与情绪记忆无关，因此 D 选项不正确。

E. 瞬时记忆：瞬时记忆亦称“感觉记忆”，记忆系统的一种，刺激作用于感觉器官所引起的短暂记忆。通常是指 1 秒钟左右的时间，即刚刚感觉到所注意的信息时间。在这个问题中，描述旅游风景需要的是长期的记忆，而不是瞬时的感觉，因此 E 选项不正确。

73. 【答案】A

【解析】

A. 隔离：隔离通常用于防止传染性疾病的传播，如流感、肺结核等。而慢性非传染性疾病，如高血压、糖尿病、心脏病等，不会通过接触传播，因此不需要隔离。

B. 预防性治疗：预防性治疗是指在疾病发生之前采取的治疗措施，如接种疫苗、定期体检等，属于慢性非传染性疾病的一级预防。

C. 化学预防：化学预防是指通过药物或其他化学物质来预防疾病的发生，如服用降压药预防高血压，也属于慢性非传染性疾病的一级预防。

D. 健康筛查：健康筛查是指通过筛查检查来早期发现和治疗疾病，如定期进行血压、血糖检测，也属于慢性非传染性疾病的一级预防。

E. 健康咨询：健康咨询是指通过提供健康信息和建议来帮助人们改善生活方式，预防疾病的发生，如提供健康饮食、适度运动的建议，也属于慢性非传染性疾病的一级预防。

74. 【答案】D

【解析】

选项 A：抗病毒治疗，这是对已经感染新型冠状病毒的患者的治疗措施，虽然能够帮助患者恢复，但不能阻止病毒的传播。

选项 B：及时报告疫情，这是一个重要的公共卫生措施，能够帮助政府及时了解疫情的发展情况并采取相应的控制措施，但也无法直接阻止病毒的传播。

选项 C：隔离，这是一个有效的控制病毒传播的手段，可以防止病毒从患者身上传播到其他人，但需要在人们已经感染后才能实施。

选项 D：疫苗接种，这是预防新型冠状病毒最有效的措施。疫苗通过模拟病毒感染，使得体内产生免疫反应，从而在真正接触病毒时，身体已经有了抵抗病毒的能力，大大降低了感染的可能性。

选项 E：咽拭子筛查，这是一种诊断手段，用于检测是否感染了新型冠状病毒，但不能阻止病毒的传播。

75. 【答案】A

【解析】

A. 维生素 B1：正确选项。维生素 B1 主要存在于米、面的表皮和胚芽中，也就是在精米和精面粉加工过程中被去除的部分。因此，长期食用精面粉会导致维生素 B1 的摄入不足，产生缺乏症。

B. 维生素 B12：错误选项。维生素 B12 主要存在于动物性食品中，如肉类、蛋类、奶类等，与精面粉的摄入无直接关系。

C. 维生素 B6：错误选项。维生素 B6 的食物来源广泛，包括动物性和植物性食物，长期食用精面粉并不会直接导致维生素 B6 的缺乏。

D. 维生素 B2：错误选项。维生素 B2 在各类食品中都有，尤其是动物性食品中的含量较高，如肝脏、肾脏、心脏、蛋黄等，长期食用精面粉并不会直接导致维生素 B2 的缺乏。

E. 维生素 C：错误选项。维生素 C 主要存在于新鲜的蔬菜和水果中，与精面粉的摄入无直接关系。

76. 【答案】B

【解析】

A 选项：氟中毒。氟中毒是生物地球化学性疾病之一，主要由于长期食用含氟过多的饮食或饮水引起。

B 选项：镉中毒。镉中毒主要是吸入镉烟尘或镉化合物粉尘引起，属于职业病，不属于生物地球化学性疾病。

C 选项：砷中毒。砷中毒也属于生物地球化学性疾病，主要由于长期食用含砷过多的饮食或饮水引起。

D 选项：碘缺乏。碘缺乏病是一种生物地球化学性疾病，主要因为食物中碘元素的含量过低而引起。

E 选项：克山病。克山病是一种由于某些地区的水和（或）土壤中某些元素过多或过少，而引起的特异性疾病，属于生物地球化学性疾病。

77. 【答案】C

【解析】

A：预防为主，这是公共卫生的基本原则之一，但并不是新公共健康的特有精神。

B：三级预防，这是预防医学工作的基本原则与核心策略，包括初级预防、二级预防和三级预防，但并不是新公共健康的特有精神。

C：强化社区行动，这是新公共健康的主要精神之一，所以这是正确答案。

D：人人享有卫生保健，这是 1977 年第 30 届世界卫生大会确立的全球战略目标，但并不是新公共健康的特有精神。

E：群众性自我保健，虽然这是健康教育的一种方式，但并不是新公共健康的特有精神。

78. 【答案】A

【解析】

选项 A：罹患率，它表示短时间内新发病例的频率，因此是衡量人群中在短时间内新发病例的频率的最佳指标。这是正确的答案。

选项 B：发病率，它描述了在一定期间内，一定人群中某病新发生的病例出现的频率。虽然它也反映了疾病对人群健康的影响和描述了疾病的分布状态，但它并不专门用于衡量短时间内新发病例的频率。

选项 C：患病率，也称为现患率，它指的是某特定时间内总人口中某病新旧病例之和所占的比例。它并不适用于测量短时间内新发病例的频率。

选项 D：感染率，它是指在某个时间内能检查的整个人群样本中，某病现有感染者人数所占的比例。感染率的性质与患病率相似，但它并不适用于衡量短时间内新发病例的频率。

选项 E：续发率，也称为二代发病率，它是指一个家庭、病房、集体宿舍、托儿所、幼儿园班组中第一个病例发生后，在该病的最短潜伏期到最长潜伏期之间，易感接触者中因受其感染而发病的续发病例占所有易感接触者总数的百分率。它主要用于描述传染病的传播情况，而不是用于衡量短时间内新发病例的频率。

79. 【答案】D

【解析】

正确选项（D）：克山病，又称地方性心肌病，是一种主要在硒缺乏区发生的心肌病。它首先在我国黑龙江省克山县发现，后来在其他硒缺乏地区也有所发现。这种疾病的主要病理改变是心肌纤维变性、坏死和纤维化。目前科学研究认为，硒元素缺乏是引发克山病的主要原因。

错误选项（A）：铅中毒时可出现贫血、胃黏膜破坏、心肌炎等症状，但与克山病无直接关联。

错误选项（B）：汞中毒主要表现为口腔炎、神经系统损伤等症状，同样与克山病无直接关联。

错误选项（C）：砷中毒时可导致严重的胃肠炎、休克、周围神经疾病、肝损害等症状，但与克山病无直接关联。

错误选项（E）：镉中毒时可导致急性胃肠炎、肾脏损伤等症状，但与克山病无直接关联。

80. 【答案】C

【解析】

- A. 铅中毒主要表现为贫血、胃黏膜破坏、心肌炎等，这与乌脚病的症状并不相符，所以不选 A。
- B. 高浓度汞蒸气可导致口腔炎，但乌脚病主要是由于长期摄入含砷水源引发，所以不选 B。
- C. 乌脚病是由于长期摄入含砷的水源引发的一种疾病，因此答案选 C。
- D. 硒元素缺乏主要与克山病相关，所以不选 D。
- E. 镉中毒主要表现为急性胃肠炎，这与乌脚病的症状并不相符，所以不选 E。

81. 【答案】C

【解析】

选项 A：苯具有很强的亲脂性，可影响细胞膜蛋白功能，干扰细胞膜脂质和磷脂代谢，抑制细胞膜的氧化还原功能，导致中枢系统麻醉。然而，虽然苯可以对中枢神经系统产生影响，但它对造血系统的损害更为严重。

选项 B：苯中毒对循环系统的影响不明显，因此这个选项是错误的。

选项 C（正确答案）：苯的代谢产物可以抑制骨髓基质生成造血干细胞，干扰细胞增殖和分化的调节因子，阻断造血干细胞分化过程而诱发白血病。其代谢产物还可以直接毒害造血细胞，加重溶血性贫血。因此，造血系统是苯中毒最主要侵犯的系统。

选项 D&E：苯中毒可以对泌尿系统和呼吸系统产生一定影响，但这些影响并不如对造血系统的损害严重。

82. 【答案】D

【解析】

选项 A：急性脑卒中一般都有长期心脑血管病病史，且发病时典型表现为头晕头痛、呕吐、视乳头水肿等。此选项与题干描述的有机磷中毒后几天出现的症状不符，因此排除。

选项 B：有机磷中毒加重时以 M 样及 N 样症状加重为主要表现，一般不会出现急性呼吸困难及意识障碍，且不会发生在几天以后。所以这个选项也被排除。

选项 C&E：有机磷中毒迟发性脑病及迟发性多发神经根病一般发生在中毒病人症状消失后 2-3 周而不是几天以后，因此这两个选项也不能作为正确答案。

选项 D：重度有机磷中毒的患者中毒后 24-96 小时内及胆碱酯酶（ChE）复能药用量不足的病人，在经治疗胆碱能危象消失、意识清醒未恢复和迟发性神经病恢复之前，若突然出现上睑下垂、眼外展障碍、面瘫和呼吸机麻痹，引起通气障碍性呼吸困难或衰竭，严重者可导致死亡，此又称中间型综合征，一般发生在中毒后几天内，为题干描述最有可能出现的情况。

83. 【答案】E

【解析】

A 选项：错误。一氧化碳并非与细胞色素氧化酶中三价铁和谷胱甘肽结合，而是与血红蛋白结合形成羧血红蛋白。

B 选项：错误。一氧化碳中毒并不会引起氧分压增加，反而会使血液中的氧分压降低，因为一氧化碳与血红蛋白结合后，血液中的氧无法被组织细胞有效利用。

C 选项：错误。一氧化碳中毒使血氧饱和度降低，而非增加，因为一氧化碳与血红蛋白结合后，血液中的氧无法被组织细胞有效利用。

D 选项：错误。一氧化碳并非与氧化型细胞色素氧化酶中的二价铁结合，而是与血红蛋白结合形成羧血红蛋白。

正确答案是 E，一氧化碳中毒主要是因为一氧化碳与血红蛋白结合形成羧血红蛋白，这种物质的氧携带能力极弱，导致血液中的氧无法被组织细胞有效利用，从而引发低氧血症和组织缺氧。

84. 【答案】C

【解析】详细选项分析：A. T11：第十一胸椎，乳糜池并不临近此椎体，所以选项 A 错误。B. T12：第十二胸椎，乳糜池并不临近此椎体，所以选项 B 错误。C. L1：第一腰椎，乳糜池就位于此椎体前方，所以选项 C 正确。

D. L2: 第二腰椎, 乳糜池并不临近此椎体, 所以选项 D 错误。E. L3: 第三腰椎, 乳糜池并不临近此椎体, 所以选项 E 错误。

85. 【答案】A

【解析】

A. 颈外静脉: 正确选项。颈外静脉通常不显露, 但在心脏疾病或上腔静脉阻塞引起回流不畅的情况下, 会引起颈外静脉显著充盈, 即颈静脉怒张。

B. 颈内静脉: 错误选项。颈内静脉主要负责引流头部深部的静脉血液回流入心脏, 临床上常用于静脉采血、中心静脉置管。

C. 颈前静脉: 错误选项。颈前静脉起自颈下方的浅静脉, 沿颈前正中线两侧下行, 注入颈外静脉末端或锁骨下静脉, 但颈静脉怒张指的是颈外静脉。

D. 颈静脉弓: 错误选项。左、右颈前静脉在胸骨柄上方常吻合成颈静脉弓, 气管切开时应注意颈静脉弓的存在。

E. 甲状腺静脉: 错误选项。甲状腺静脉起自腺体表面, 汇集成甲状腺上、中、下静脉, 与颈静脉怒张关系不大。

86. 【答案】E

【解析】

选项 A: 膀胱位于盆腔上方。这个选项是错误的, 因为膀胱在空虚时全部位于盆腔内, 而不是位于盆腔上方。

选项 B: 膀胱位置浅表, 不必打开腹膜腔。这个选项也是错误的, 膀胱在空虚时位于盆腔内, 此时位置较深, 并非表浅。

选项 C: 膀胱是腹膜间位器官。这个选项同样是错误的, 膀胱在空虚时, 其上面仅有腹膜覆盖, 属于腹膜外位器官。只有在充盈时, 膀胱的位置会上移, 此时才会变成腹膜间位器官。

选项 D: 膀胱体直接与腹前壁相邻。这个选项是错误的, 膀胱前方实际上是耻骨联合, 而非腹前壁。

选项 E: 膀胱随尿液充盈程度不同而发生位置变化。这个选项是正确的, 当膀胱充盈时, 膀胱腹膜返折线可上移至耻骨联合上方, 此时可以在耻骨联合上方进行穿刺术, 既不会伤及腹膜, 也不会污染腹膜腔。

87. 【答案】A

【解析】

正确选项 (A): 速尿是一种利尿剂, 长期使用可能导致体内钠离子排泄过多, 从而引发低钠血症。因此, A 选项是造成低容量性低钠血症的可能原因。

错误选项 (B): 肾上腺皮质功能亢进通常会导致钠离子的保留, 而不是排泄, 所以不会引发低钠血症。

错误选项 (C): 幽门梗阻患者可能出现各种电解质紊乱, 但主要是由于胃液丢失引起的, 与低容量性低钠血症无直接关系。

错误选项 (D): 大面积烧伤可能会引发全身性炎症反应, 导致钠离子在血管外液中沉积, 但这是一种假性低钠血症, 并非真正的低钠血症。

错误选项 (E): 大量出汗虽然会导致钠离子丢失, 但通常体内的调节机制能够通过增加饮食摄入来补充, 所以不会引发低钠血症。

88. 【答案】A

【解析】

选项 A: 增加了心肌复极 2 期时 Ca^{2+} 的内流。这是错误的, 因为在高钾血症中, 血液中的钾离子浓度过高会导致心肌细胞膜电位的改变, 不会直接影响到心肌复极 2 期时 Ca^{2+} 的内流。

选项 B: 动作电位 0 期心肌细胞膜内电位上升的速度减慢。这是正确的, 因为在高钾血症中, 由于血液中的钾

离子浓度过高，会使得心肌细胞膜内电位上升的速度减慢，这是引发心脏骤停的一种可能机制。

选项 C：细胞膜处于部分去极化。这是正确的，高钾血症会导致细胞膜静息电位升高，即细胞膜处于部分去极化状态。

选项 D：动作电位时间和有效不应期均缩短。这是正确的，高钾血症会导致心肌细胞动作电位时间和有效不应期缩短，这也是引发心脏骤停的一种可能机制。

选项 E：细胞内 K^+ 的外流比正常时加快。这是正确的，高钾血症会导致细胞内 K^+ 的外流比正常时加快。

89. 【答案】D

【解析】

A. 低张性缺氧：当 PaO_2 降低，即动脉血氧分压降低时，会引发低张性缺氧。在这道题中， PaO_2 为 50mmHg，虽然低于正常值，但仅凭此不能确定为低张性缺氧。

B. 血液性缺氧：当血液无法携带足够的氧气到达身体各部位时，会导致血液性缺氧。在这道题中，血氧容量为 20ml/dl，动脉血氧含量为 15ml/dl，没有明显异常，因此不是血液性缺氧。

C. 淤血性缺氧：当血液流速过慢，使得血液中的氧气被组织消耗过多，导致血液中的氧气含量降低，称为淤血性缺氧。在这道题中，没有给出相关参数，无法判断是否为淤血性缺氧。

D. 组织性缺氧：当血液中的氧气无法有效地被组织细胞利用，就会导致组织性缺氧。在这道题中，动-静脉血氧含量差为 4ml/dl，说明血液中的氧气未被组织充分利用，因此是组织性缺氧。

E. 循环性缺氧：当血液循环障碍，导致血液无法将氧气输送到需要的组织，就会发生循环性缺氧。在这道题中，没有给出相关参数，无法判断是否为循环性缺氧。

90. 【答案】E

【解析】

A. 局部红肿、热、痛不明显：这个描述是错误的，因为气性坏疽在早期就会有局部红肿、热、痛等症状。

B. 一般白细胞不升高：这个描述也是错误的，因为气性坏疽会导致病情急剧恶化，全身情况在 12-24 小时内迅速恶化，白细胞计数一般会升高。

C. 体温正常：这个描述是错误的，气性坏疽的临床特点是病情急剧恶化，体温会逐步上升。

D. 休克发生早：这个描述是错误的，虽然气性坏疽可以导致全身情况迅速恶化，但并不是早期就会发生休克。

E. 局部肌坏死，有血性分泌物，恶臭：这个描述是正确的，气性坏疽因为组织分解、液化、腐败和大量产气，伤口会有恶臭。

91. 【答案】B

【解析】

A. 股圆韧带内的小凹动脉损伤：股圆韧带内的小凹动脉虽然是股骨头的供血来源之一，但并非主要供血来源。因此，其损伤并不是导致股骨头缺血坏死的主要原因。

B. 旋股内侧动脉损伤：旋股内侧动脉分为髂外侧动脉、干骺端上侧动脉和干骺端下侧动脉，这些动脉进入股骨头，其中髂外侧动脉供应股骨头 2/3~4/5 区域的血液循环，是股骨头最主要的供血来源。因此，旋股内侧动脉损伤是导致股骨头缺血坏死的主要原因。

C. 股骨干的滋养动脉升支损伤：股骨干的滋养动脉升支也是股骨头的供血来源之一，但并非主要供血来源。因此，其损伤并不是导致股骨头缺血坏死的主要原因。

D. 闭孔动脉损伤：闭孔动脉并非股骨头的供血来源，因此，其损伤并不会导致股骨头坏死。

E. 阴部外动脉损伤：阴部外动脉同样并非股骨头的供血来源，因此，其损伤并不会导致股骨头坏死。

92. 【答案】A

【解析】

选项 A: 内侧半月板中部外缘与内侧胫副韧带的深层纤维相连, 限制了其活动度。在膝关节旋转时, 内侧半月板受力更大, 因此更易损伤。这是正确答案。

选项 B: 半月板损伤通常是由于屈膝时股骨与胫骨同时反方向旋转导致的, 而非单纯的股骨内旋, 因此此选项错误。

选项 C: 腓肌不适当地牵拉并非半月板损伤的直接原因, 此选项错误。

选项 D: 实际上, 内侧半月板较大, 外侧半月板较小, 因此此选项错误。

选项 E: 内、外侧半月板均与前交叉韧带相连, 交叉韧带向后推时, 内、外侧半月板均受力, 因此此选项不能作为鉴别点, 此选项错误。

93. 【答案】A

【解析】

选项 A (正确): 胫前肌主要负责伸踝关节 (背屈) 和使足内翻。所以, 当患者出现足不能内翻的症状时, 很可能是胫前肌腱受到了损伤。

选项 B (错误): 外侧副韧带的主要作用是维持踝关节的稳定性, 其损伤后会导致踝关节的不稳定, 而不会影响足的内翻能力。

选项 C (错误): 腓骨长肌主要负责屈踝关节 (跖屈) 和使足外翻。因此, 其损伤不会导致足不能内翻。

选项 D (错误): 下胫腓韧带同样维持踝关节稳定性, 其损伤会导致踝关节的不稳定, 而不会影响足的内翻能力。

选项 E (错误): 腓总神经的损伤会导致足内翻下垂畸形, 出现踝背伸、外翻功能障碍, 但不会影响内翻活动。

94. 【答案】E

【解析】

正确选项 (E): 梨状肌。根据题干信息, 患者端坐时出现腰腿痛, 直腿抬高试验阳性, 加强试验阴性, 这是典型的梨状肌综合征表现。梨状肌综合征是指坐骨神经在臀部受到梨状肌的卡压引起的一系列症状, 包括腰腿疼痛等。

错误选项 (A): 闭孔内肌。闭孔内肌位于坐骨神经的深层, 不会压迫坐骨神经, 因此 A 不符合题意。

错误选项 (B、C、D): 臀小肌、臀中肌、臀大肌。这些肌肉的收缩均不会压迫到坐骨神经, 与本题患者的腰腿痛无关。

95. 【答案】A

【解析】

A 选项: 溴隐亭是一种多巴胺受体激动剂, 可以抑制垂体前叶释放催乳素, 因此对于功能性或肿瘤引起的催乳素水平升高均能产生抑制作用, 是治疗催乳素腺瘤的首选药物。

B 选项: 经鼻-蝶窦垂体腺瘤切除术是一种手术治疗方式, 适用于药物治疗无效或者肿瘤压迫造成明显神经系统症状的情况。在本题中, 患者并未出现这些情况, 故排除。

C 选项: 环磷酰胺是一种抗肿瘤药物, 主要用于治疗恶性肿瘤和某些自身免疫疾病, 对于催乳素腺瘤没有治疗效果, 故排除。

D 选项: 放射治疗适用于不能坚持或耐受药物治疗者; 不愿手术者; 不能耐受手术者。但其显效慢, 可能引发垂体功能低下、视神经损伤、诱发肿瘤等并发症, 不主张单纯放疗, 故排除。

E 选项: 黄体酮药物治疗适用于体内有一定内源性雌激素水平的 I 度闭经患者, 不适用于治疗催乳素腺瘤, 故排除。

96. 【答案】C

【解析】

选项 A: 糖代谢这个选项不正确。虽然糖代谢是人体的一个重要生理过程,但是在这个问题中,患者的症状(关节炎和尿路结石)与糖代谢无关。

选项 B: 脂代谢这个选项也不正确。脂代谢主要涉及到脂肪酸的生成、分解和转化,这与患者的症状无关。

选项 C: 嘌呤核苷酸代谢这是正确答案。痛风症是由于嘌呤代谢异常,导致尿酸在血液中积聚,形成尿酸盐晶体沉积在关节等处,引起疼痛。患者进食肉类食物后病情加重,可能是因为肉类食物富含嘌呤,会增加尿酸的生成。

选项 D: 嘧啶核苷酸代谢这个选项不正确。嘧啶核苷酸主要参与 DNA 和 RNA 的合成,与这个问题中的症状无关。

选项 E: 氨基酸代谢这个选项不正确。氨基酸代谢主要涉及到蛋白质的合成和分解,这与患者的症状无关。

97. 【答案】C

【解析】

选项 A: 尿黑酸氧化酶是一种存在于人体中的酶,其缺乏会导致尿黑酸尿症。这种疾病表现为尿液中尿黑酸含量增加,但与白化病无关。

选项 B: 组氨酸酶是一种可以催化组氨酸生成组胺的酶。如果组氨酸酶缺乏,会导致组胺的生产异常,但并不会引发白化病。

选项 C: 酪氨酸酶是一种能够催化酪氨酸合成黑色素的酶。如果人体内酪氨酸酶缺乏,就不能正常合成黑色素,导致皮肤、毛发等变白,出现白化病。

选项 D: 精氨酸酶是一种参与尿素生产过程的酶,其缺乏会导致尿素生产障碍,但与白化病无关。

选项 E: 苯丙氨酸羟化酶是一种能够催化苯丙氨酸转化为酪氨酸的酶。其缺乏会导致苯丙酮尿症,但并不会引发白化病。

98. 【答案】E

【解析】

选项 A: 竞争性抑制是指抑制剂与底物竞争酶的活性中心。奥美拉唑并不是通过与底物竞争酶的活性中心来发挥作用,因此这个选项是错误的。

选项 B: 非竞争性抑制是指抑制剂与酶的活性中心外的结合点相结合,不影响酶与底物的结合,底物也不影响酶与抑制剂的结合。然而,奥美拉唑的作用机制并不符合这种描述,所以这个选项也是错误的。

选项 C: 可逆性抑制是指抑制剂与酶非共价可逆性结合,使酶活性降低或者消失。但奥美拉唑与 H^+-K^+-ATP 酶的结合是不可逆的,所以这个选项是错误的。

选项 D: 反竞争抑制是指没有底物结合时,酶不能与抑制剂结合,当酶与底物结合后,酶才与抑制剂结合。这与奥美拉唑的作用机制不符,因此这个选项是错误的。

选项 E: 不可逆性抑制是指抑制剂与酶结合后,酶无法恢复其活性。奥美拉唑的作用机制就是通过与 H^+-K^+-ATP 酶结合,使其发生不可逆性失活,因此这个选项是正确的。奥美拉唑是一种广泛使用的质子泵抑制剂,主要用于治疗胃酸过多和胃病。它的作用机制是通过不可逆性抑制胃壁细胞内的 H^+-K^+-ATP 酶,从而减少胃酸的分泌。

99. 【答案】A

【解析】

选项 A: 呼吸链中各递氢体可将 H^+ 从线粒体膜内转运到膜外。这个说法是错误的,复合体的质子泵功能,驱动 H^+ 从线粒体基质侧泵出至内膜的膜间腔侧,而非直接转运到膜外。

选项 B: H^+ 不能自由通过线粒体内膜。这个说法是正确的, H^+ 不能自由穿过线粒体内膜返回基质。

选项 C: 在线粒体膜内外形成电化学梯度而储存能量。这个说法是正确的,质子的泵出引起内膜两侧的质子浓度和电位的差别,从而形成跨线粒体内膜的质子电化学梯度 (H^+ 浓度梯度和跨膜电位差),储存电子传递释放的能量。

选项 D: 线粒体膜内外形成的电化学梯度包括 H^+ 浓度梯度和跨膜电位差。这个说法是正确的, 正如选项 C 所述, 质子电化学梯度包括 H^+ 浓度梯度和跨膜电位差。

选项 E: 当质子顺浓度梯度回流时驱动 ADP 与 P_i 生成 ATP。这个说法是正确的, 质子顺浓度梯度回流至基质时驱动 ADP 与 P_i 生成 ATP。

100. 【答案】E

【解析】

A 选项: 原癌基因广泛存在于生物界, 这是正确的。从单细胞酵母、无脊椎动物到脊椎动物乃至人类的正常细胞都存在原癌基因, 故此选项错误。

B 选项: 原癌基因在进化上高度保守, 这也是正确的。这说明了原癌基因在生物进化中的重要性, 故此选项错误。

C 选项: 原癌基因的作用是通过其表达产物来实现的, 这也是正确的。原癌基因的表达产物对细胞正常生长、增值和分化起着精确的调控作用, 故此选项错误。

D 选项: 原癌基因通常处于静止或低表达状态, 这是正确的。在多种理化因素, 如病毒感染、放射线、有害物质等的作用下, 可能会激活原癌基因表达, 故此选项错误。

E 选项: 所有原癌基因都有致癌性, 这是错误的。原癌基因在正常条件下不具有致癌活性, 只有当它们发生突变或过度表达时, 才可能转变为致癌基因, 故此选项正确。

101. 【答案】E

【解析】

A 选项: 原癌基因广泛存在于生物界, 这是正确的。从单细胞酵母、无脊椎动物到脊椎动物乃至人类的正常细胞都存在原癌基因, 故此选项错误。

B 选项: 原癌基因在进化上高度保守, 这也是正确的。这说明了原癌基因在生物进化中的重要性, 故此选项错误。

C 选项: 原癌基因的作用是通过其表达产物来实现的, 这也是正确的。原癌基因的表达产物对细胞正常生长、增值和分化起着精确的调控作用, 故此选项错误。

D 选项: 原癌基因通常处于静止或低表达状态, 这是正确的。在多种理化因素, 如病毒感染、放射线、有害物质等的作用下, 可能会激活原癌基因表达, 故此选项错误。

E 选项: 所有原癌基因都有致癌性, 这是错误的。原癌基因在正常条件下不具有致癌活性, 只有当它们发生突变或过度表达时, 才可能转变为致癌基因, 故此选项正确。

102. 【答案】D

【解析】

A 选项: 胆色素的 80% 来源于衰老红细胞破坏释放的血红蛋白的分解, 而非肌红蛋白, 因此 A 选项错误。

B 选项: 胆色素中的胆红素属于脂溶性物质, 不是水溶性物质, 因此 B 选项错误。

C 选项: 胆红素与蛋白结合后形成的是胆红素蛋白复合物, 这种复合物在体内循环中易溶于水, 因此 C 选项错误。

D 选项: 胆色素确实是铁卟啉类化合物的分解代谢产物, 包括胆绿素、胆红素、胆素原和胆素。其中胆红素居于胆色素代谢的中心, 是人体胆汁中的主要色素, 因此 D 选项正确。

E 选项: 胆色素在肠道中并不会分解成尿胆红素, 而是经过肠道菌群的作用转化为胆绿素和胆红素, 因此 E 选项错误。

103. 【答案】C

【解析】

选项 A: 正确。产气荚膜梭菌确实是有荚膜无鞭毛的, 这是其一种重要的生物学特性。

选项 B: 正确。产气荚膜梭菌属于专性厌氧菌, 这意味着它在没有氧的环境下生长最好。

选项 C: 错误。产气荚膜梭菌是革兰染色阳性的粗大杆菌, 而不是短小杆菌。这是对产气荚膜梭菌形态描述的误解。

选项 D: 正确。产气荚膜梭菌在牛乳培养基中可以出现“汹涌发酵”现象, 这是其一种特征性的生物学表现。

选项 E: 正确。产气荚膜梭菌的致病机制主要是通过产生外毒素。

104. 【答案】C

【解析】

选项 A: 错误。微动脉主要受神经调节和体液调节, 其是交感缩血管神经纤维分布密度最高的血管类型, 而非主要受局部代谢产物调节。

选项 B: 错误。通血毛细血管(直捷通路)即为后微动脉的移行部分, 其管壁平滑肌逐渐减少至消失, 一般不受局部代谢产物的调节。

选项 C: 正确。毛细血管前括约肌在微循环中主要受局部代谢产物的调节。当毛细血管前括约肌收缩时, 毛细血管关闭, 导致毛细血管周围组织代谢产物积聚、 O_2 分压降低。而这些积聚的代谢产物和低氧状态可以反过来引起毛细血管前括约肌舒张, 从而使毛细血管开放, 清除局部组织的代谢产物。

选项 D: 错误。真毛细血管管壁没有平滑肌, 由单层内皮细胞构成, 外面包被一薄层基膜, 是血液和组织液之间进行交换的主要场所, 而非主要受局部代谢产物调节。

选项 E: 错误。毛细血管后括约肌主要接受神经调节, 而非局部代谢产物的调节。

105. 【答案】A

【解析】

选项 A: IgG, 是唯一能通过胎盘的免疫球蛋白。IgG 分子量小, 且可选择性与滋养细胞的 FcRn 结合, 从而转移到滋养层细胞内, 并主动进入胎儿血液循环中。所以选项 A 是正确答案。

选项 B: IgA, 其分子量较大, 无法通过胎盘血液屏障, 因此不能通过胎盘。所以选项 B 是错误答案。

选项 C: IgM, 其分子量较大, 无法通过胎盘血液屏障, 因此不能通过胎盘。所以选项 C 是错误答案。

选项 D: IgD, 其在正常人血液中浓度较低, 无法通过胎盘血液屏障。所以选项 D 是错误答案。

选项 E: IgE, 其在正常人血液中浓度最低, 无法通过胎盘血液屏障。所以选项 E 是错误答案。

106. 【答案】A

【解析】

选项 A: 急性排斥反应通常在移植术后数天至 2 周左右出现, 临床表现为发热、移植部位胀痛和移植器官功能减退。患者病理提示大量淋巴细胞浸润, 这符合急性排斥反应的特征, 所以选项 A 是正确答案。

选项 B: 超急性排斥反应通常在移植器官与受者血管接通后数分钟至 24 小时内发生, 与患者 2 周后才出现症状的情况不符, 所以选项 B 错误。

选项 C: 慢性排斥反应通常在移植后数月, 甚至数年后发生, 表现为进行性移植器官的功能减退直至丧失, 与患者 2 周后就出现症状的情况不符, 所以选项 C 错误。

选项 D: 移植肾衰竭通常由多种原因引起, 包括肾前性或肾后性、加速或急性排异反应、环孢素 A(CsA)中毒、感染等。但是患者并不具备这些诱因, 所以选项 D 错误。

选项 E: 急性肾炎表现为突然起病的血尿, 红细胞管型, 轻度蛋白尿, 时常伴有高血压, 水肿和氮质血症, 结合患者病理表现并不满足该诊断, 所以选项 E 错误。

107. 【答案】E

【解析】

选项 A: 同种异型抗原是同一种属不同个体之间存在的不同抗原, 也被称为同种抗原或同种异体抗原。人类的红细胞、白细胞和免疫球蛋白上都有同种异型抗原。其中, HLA 抗原是人体最复杂的同种异型抗原, 主要引起移植排斥反应。这个选项与题目无关, 所以排除。

选项 B: 异嗜性抗原是一类与种属特异性无关的, 存在于人、动物、植物、微生物组织间的共同抗原。这个选项与题目无关, 所以排除。

选项 C: 耐受原是指可诱导机体产生免疫耐受的抗原。这个选项与题目无关, 所以排除。

选项 D: 超抗原是一类只需极低浓度 (1-10ng/ml) 即可激活大量的 T 细胞克隆, 产生极强免疫应答的抗原物质, 其实质为多克隆激活剂。这个选项与题目无关, 所以排除。

选项 E: 变应原是引起超敏反应的抗原性物质。它可以是完全抗原 (如异种动物血清、组织细胞、微生物、寄生虫、植物花粉、兽类皮毛等), 也可以是半抗原 (如青霉素、磺胺、非那西汀等药物, 或生漆等低分子物质)。这个选项与题目要求一致, 所以是正确答案。

108. 【答案】B

【解析】

A. 先天性胸腺发育不全: 先天性胸腺发育不全是迪格奥尔格综合征的特征之一, 会导致 T 细胞缺乏, 而慢性肉芽肿病是由于吞噬细胞功能缺陷引起的, 因此选项 A 错误。

B. 吞噬细胞功能缺陷: 慢性肉芽肿病 (CGD) 的主要发病机制就是吞噬细胞中的 NADPH 氧化酶缺陷, 这种酶复合体对吞噬细胞的呼吸爆发起关键作用, 因此选项 B 正确。

C. T、B 细胞混合缺陷: T、B 细胞混合缺陷会导致循环淋巴细胞极度减少和各种 Ig 缺乏, 但这并非慢性肉芽肿病的发病机制, 所以选项 C 错误。

D. 补体某些组分缺陷: 补体某些组分缺陷可能导致遗传性血管神经性水肿和阵发性夜间血红蛋白尿, 而非慢性肉芽肿病, 因此选项 D 错误。

E. B 细胞发育和功能异常: B 细胞发育和功能异常可能导致抗体生产及功能障碍, 属于原发性免疫缺陷病, 但并非慢性肉芽肿病的发病机制, 因此选项 E 错误。

109. 【答案】A

【解析】

A 选项: 酮体。正确。在食物摄入不足或饥饿状态下, 身体会通过分解脂肪产生酮体来提供能量。在本题的情况下, 患者由于妊娠剧吐导致恶心、厌食、乏力, 葡萄糖供应不足, 因此心肌和脑组织的主要供能物质是酮体。

B 选项: 脂肪酸。错误。虽然脂肪酸可以作为能源供应, 但它们主要在肝脏被氧化, 而不是直接供给心肌和脑组织。

C 选项: 蛋白质。错误。蛋白质主要用于身体的修复和增长, 而不是作为主要的能源供应。

D 选项: 氨基酸。错误。氨基酸主要用于蛋白质的合成, 而不是作为主要的能源供应。

E 选项: 乙酰乙酸。错误。乙酰乙酸是酮体代谢的中间产物, 不能直接作为能源供应。

110. 【答案】D

【解析】

选项 A: 吸宫不全会导致术后阴道不规则出血和尿妊娠试验阳性, 但不会出现肺部转移的情况。因此, 该选项不符合病例描述。

选项 B: 葡萄胎是新发疾病, 不会继发于正常的妊娠, 且葡萄胎会导致子宫异常增大, 这与题干所述情况不符。

选项 C: 侵蚀性葡萄胎全部继发于葡萄胎, 而病例中的患者上次妊娠为正常宫内妊娠, 因此, 该选项不适用。

选项 D: 绒毛膜癌可继发于葡萄胎或非葡萄胎妊娠, 且在血行转移中, 最常见的转移部位为肺。因此, 根据病例描述, 选项 D 是最可能的疾病。

选项 E: 胎盘部位滋养细胞肿瘤起源于胎盘种植部位, 大多数情况下不会发生转移。病例中的患者已经进行过人工流产术, 胎盘尚未形成, 且已发生肺部转移, 因此, 该选项不适用。

111. 【答案】B

【解析】

A 选项: 葡萄胎是一种异常的妊娠, 由于受精卵的染色体异常导致。在显微镜下, 葡萄胎会表现出水肿的绒毛结构, 而题干中的病理结果是无绒毛结构, 因此排除此选项。

B 选项: 绒毛膜癌是一种罕见的妊娠滋养细胞疾病, 常在流产、分娩或葡萄胎治疗后发生。题干中的病理结果无绒毛结构, 符合绒毛膜癌的特点, 因此这是正确答案。

C 选项: 侵蚀性葡萄胎是葡萄胎的一种并发症, 其特点是水泡状组织侵入子宫肌层, 有绒毛结构及滋养细胞增生或异型, 但题干中的病理结果无绒毛结构, 因此排除此选项。

D 选项: 子宫内膜癌是一种常见的妇科恶性肿瘤, 主要症状是阴道出血。然而, 题干中的病理结果无绒毛结构, 并且患者有人流术后持续性阴道流血的病史, 更偏向考虑妊娠滋养细胞疾病, 因此排除此选项。

E 选项: 转移性癌是指癌细胞从原发病灶转移到其他部位形成的新病灶。然而, 题干中的病理结果无绒毛结构, 并且患者有人流术后持续性阴道流血的病史, 更偏向考虑妊娠滋养细胞疾病, 因此排除此选项。

112. 【答案】C

【解析】

选项 A: 流行性脑脊髓膜炎主要在冬春季节流行, 儿童多见, 症状包括明显的头痛, 喷射性呕吐, 脑膜刺激征阳性。皮肤瘀点主要在下身, 血象显示为细菌感染相, 脑脊液呈化脓性脑膜炎改变。这与患者的症状不符, 因此排除。

选项 B: 败血症通常有原发病灶, 表现为寒战高热, 全身中毒症状重, 但无渗出体征。血象显示为细菌感染相, 异型淋巴细胞少见。血培养阳性可确诊。这与患者的症状不符, 因此排除。

选项 C: 流行性出血热的流行病学特点符合患者的情况, 即青壮年农民, 居住地鼠类活动频繁。其临床表现为急性起病, 高热、低血压、出血、肾损害, 患者的症状与此相符。此外, 病毒性感染时白细胞总数通常减少或正常, 但流行性出血热与流行性乙型脑炎患者的白细胞总数往往增加, 因此此选项为正确答案。

选项 D: 钩端螺旋体病多发于夏、秋季节, 有疫水接触史, 症状包括高热、乏力, 同时伴腓肠肌压痛和全身淋巴结肿大, 异型淋巴细胞少见。血液镜检查出钩端螺旋体或培养阳性可确诊。这与患者的症状不符, 因此排除。

选项 E: 传染性单核细胞增多症的典型临床三联征为发热、咽峡炎和淋巴结肿大, 可合并肝脾肿大, 外周淋巴细胞和异性淋巴细胞比例增高, 不会出现低血压和肾脏损害。这与患者的症状不符, 因此排除。

113. 【答案】B

【解析】

A. 通过钙与组织因子形成复合物: 这个选项是错误的。虽然钙离子在凝血过程中起到重要作用, 但它并不直接参与 DIC 的形成。

B. 激活凝血酶原, 促进凝血酶生成: 这个选项是正确的。在急性胰腺炎的情况下, 病变的胰腺会释放大量的酶, 其中就包括能够激活凝血酶原的酶, 从而促进凝血酶的生成, 引发 DIC。

C. 导致血管内皮广泛损伤: 这个选项是错误的。虽然血管内皮损伤可能会导致 DIC, 但在急性胰腺炎的情况下, 主要的机制还是通过激活凝血酶原。

D. 促使大量组织因子入血: 这个选项是错误的。虽然组织因子的释放可以启动外源性凝血系统, 但在急性胰腺炎的情况下, 主要的机制还是通过激活凝血酶原。

E. 引起激肽释放酶原激活: 这个选项是错误的。激肽释放酶参与启动内源性凝血系统, 但在急性胰腺炎的情况下, 主要的机制还是通过激活凝血酶原。

114. 【答案】E

【解析】

选项分析：A. 甲状腺大部切除术：用于抗甲状腺药物治疗无效或者过敏的妊娠病人，但是该患者没有表现出对药物治疗无效或者过敏的情况，所以不选择。B. 核素 ^{131}I ：妊娠和哺乳期禁止放射碘治疗，因为可能对胎儿有害，所以不选择。C. 丙基硫氧嘧啶：在妊娠早期（T1 期）可以使用，因为其致胎儿畸形的风险较小。但是该患者已经进入 T2 期，应当改用其他药物，所以不选择。D. 大剂量心得安：主要用于控制临床症状，阻断甲状腺激素对心脏的兴奋作用，阻断外周组织 T4 向 T3 的转化，主要在 ATD 治疗初期使用，但不作为首选，所以不选择。E. 甲巯咪唑：妊娠 16 周属于 T2 期，甲巯咪唑致畸风险减少，可以使用甲巯咪唑治疗，所以选择。

115. 【答案】D

【解析】

选项 A：CIN I 级是指宫颈上皮轻度不典型增生。病变局限于上皮层的下 1/3，细胞略大，核大深染，核分裂象少；排列虽不整齐，但存在极性。与题干描述不符，故不选 A。

选项 B：WHO 女性生殖器肿瘤分类标准中无 CINIV 级，故不选 B。

选项 C：CIN II 级是指宫颈上皮中度不典型增生。病变局限于上皮层的下 2/3，细胞核大，异型明显，染色质加深，核分裂象多；细胞排列紊乱。与题干描述不符，故不选 C。

选项 D：CIN III 级是指包括宫颈上皮重度不典型增生及原位癌。其中宫颈重度不典型增生病变累及 2/3 层以上或全部上皮层。细胞异型显著，核大、深染、染色质分布不均，有核分裂象；上皮极性几乎均消失，与题干描述一致，故答案为 D。

选项 E：题干显示宫颈上皮不典型增生病变累及 2/3 层以上到全层，但基底膜完整，故不属于浸润癌，不选 E。

116. 【答案】C

【解析】

选项 A：肌层绒毛是指绒毛侵入子宫肌层，多见于胎盘植入，并非葡萄胎所致，故不选 A。

选项 B：输卵管绒毛在输卵管妊娠时出现，非葡萄胎时可见，故不选 B。

选项 C：葡萄胎因妊娠后胎盘绒毛滋养细胞增生、间质水肿而形成的大小不一的水泡，水泡间借蒂相连成串，形如葡萄而名之，也称水泡状胎块。葡萄胎的确诊需要刮除子宫内绒毛并进行组织学检查，故选 C。

选项 D：蜕膜组织是子宫内膜间质受蜕膜化诱导因子刺激而增殖和再分化形成的一种特殊组织，它对于妊娠的建立和维持至关重要，并非葡萄胎清宫组织，故不选 D。

选项 E：宫外绒毛多见于宫外孕时，非题干所述葡萄胎，故不选 E。

117. 【答案】C

【解析】

A 选项：美托洛尔是 β 受体拮抗剂，可以降低心室率，抑制心肌重塑，对于左心室射血分数（LVEF）小于 40% 的扩张型心肌病患者有益，因此不应禁用。

B 选项：呋塞米是一种利尿剂，能够排除钾离子，对于本例中的高钾血症患者有利，因此不应禁用。

C 选项：螺内酯是一种保钾利尿剂，会导致血钾增高。对于本例中已经存在高钾血症的患者，使用螺内酯可能会加重高钾血症，因此应禁用。

D 选项：地高辛可以改善心力衰竭症状，并且可以减慢房颤的心室率，因此不应禁用。

E 选项：华法林是一种抗凝药物，对于存在房颤风险的患者有益，因此不应禁用。

118. 【答案】B

【解析】

选项 A：冠状动脉痉挛通常会引发变异型心绞痛，但不是阵发性室上性心动过速引发晕厥的直接原因。

选项 B: 阵发性室上性心动过速时, 由于心室率过快, 导致心输出量和脑血流量锐减, 或者由于心动过速突然停止, 窦房结未能及时恢复自律性, 导致心搏停顿, 这些都可能引发晕厥。因此, 这是阵发性室上性心动过速引发晕厥的主要原因。

选项 C: 心肌炎主要与柯萨奇 B 组病毒感染有关, 而非阵发性室上性心动过速的直接原因。

选项 D: 阵发性室上性心动过速并不会引起自发性气胸。

选项 E: 心脏舒张受限是一种心脏舒张功能障碍的特征, 主要见于肥厚型心肌病、高血压性心肌病和缩窄性心包炎等疾病, 并非阵发性室上性心动过速的直接原因。

119. 【答案】E

【解析】

选项 A: 冠心病患者的膳食原则之一就是控制膳食总热量, 其中脂肪热量占总热量不超过 30%, 这有助于控制血脂水平, 降低冠心病发生的风险。

选项 B: 冠心病患者应减少胆固醇摄入, 每日摄入量不超过 200mg。过量的胆固醇会在血管壁沉积, 形成斑块, 从而引发冠心病。

选项 C: 冠心病患者应提高植物性蛋白的摄入, 因为植物性蛋白可以有效降低血脂, 对预防冠心病有积极作用。

选项 D: 冠心病患者应增加蔬果等膳食纤维的摄入量, 因为膳食纤维可以帮助降低血脂水平, 减轻体重, 从而降低冠心病的风险。

选项 E (正确答案): 冠心病患者应限制食盐摄入, 合理摄入量 $< 6\text{g/d}$, 而不是 $6-10\text{g}$ 。过量的食盐会导致血压升高, 加重冠心病的病情。

120. 【答案】E

【解析】

A. 自身免疫性溶血: 此选项错误。自身免疫性溶血性贫血是由于体内免疫功能失调, 产生自身抗体和 (或) 补体吸附在红细胞表面, 通过抗原-抗体反应加速红细胞破坏而引起的贫血, 这与慢性萎缩性胃炎出现贫血的机制不符。

B. 营养不良: 此选项错误。虽然营养不良可以引起贫血, 如巨幼细胞性贫血和缺铁性贫血, 但这主要是由于缺乏叶酸、维生素 B12 或铁元素, 而非慢性萎缩性胃炎的直接结果。

C. 铁吸收减少: 此选项错误。铁吸收减少会导致缺铁性贫血, 但这并不是慢性萎缩性胃炎出现贫血的主要原因。

D. 再生障碍: 此选项错误。再生障碍性贫血是由于骨髓造血功能衰竭引起的全血细胞减少, 这与慢性萎缩性胃炎无直接关系。

E. 内因子缺乏: 此选项正确。慢性萎缩性胃炎中, 胃酸及内因子的分泌减少, 导致维生素 B12 的吸收受阻, 继而引发巨幼细胞性贫血。

121. 【答案】C

【解析】

A. 血脂肪酶增高: 血脂肪酶在急性胰腺炎发生后 24-72 小时开始升高, 持续 7-10 天, 但其升高与病情程度无明显关联, 因此不能作为出血坏死性胰腺炎的诊断依据。

B. 血淀粉酶增高: 血淀粉酶在急性胰腺炎发生后 2-12 小时开始升高, 48 小时开始下降, 持续 3-5 天, 同样, 其升高与病情程度无明显关联, 因此不能作为出血坏死性胰腺炎的诊断依据。

C. 血钙降低: 出血坏死性胰腺炎时, 由于大量脂肪酸与钙结合形成皂化物沉积在坏死组织中, 使得血钙浓度降低。当血钙 $< 2\text{mmol/L}$, 提示 Ca^{2+} 内流入腺泡细胞, 胰腺坏死, 因此, 血钙降低是出血坏死性胰腺炎的重要诊断依据。

D. 血胆红素增高：血胆红素升高主要提示胆道梗阻或肝损伤，与出血坏死性胰腺炎无直接关联，因此不能作为出血坏死性胰腺炎的诊断依据。

E. B 超检查胰腺增大：急性胰腺炎时 B 超检查可见胰腺增大，但对出血坏死性胰腺炎诊断不具特异性，因此不能作为出血坏死性胰腺炎的诊断依据。

122. 【答案】B

【解析】

A. 利福平：其主要不良反应为胃肠不适、肝脏损害和药物热，而并未明显涉及到视神经的损害。

B. 乙胺丁醇：乙胺丁醇是一种抗结核药物，其通过抑制结核菌 RNA 合成发挥抗菌作用。然而，乙胺丁醇的不良反应包括球后视神经炎，因此在出现视神经炎的情况下，应立即停用。

C. 异烟肼：异烟肼的不良反应主要包括周围神经炎、中枢神经系统中毒和肝脏损害，但并未直接涉及到视神经的损害。

D. 链霉素：链霉素的主要不良反应为听觉神经损伤，并未涉及到视神经的损害。

E. 吡嗪酰胺：吡嗪酰胺的常见不良反应为药物性肝炎和高尿酸血症，也未涉及到视神经的损害。

123. 【答案】D

【解析】

选项 A：急性黄疸性普通型肝炎，主要表现为肝细胞广泛的肿胀变性（水样变），伴有气球样变，因肝细胞体积增大，排列紊乱拥挤，肝细胞坏死轻微，可见点状坏死与嗜酸性小体，毛细胆管内带有淤胆和胆栓形成。但题干中描述的病变特征不符合，所以不选 A。

选项 B：重度慢性肝炎，主要表现为重度的碎片状坏死与大范围的桥接坏死，坏死区出现肝细胞不规则再生。但题干中描述的病变特征不符合，所以不选 B。

选项 C：急性重型肝炎，主要表现为肝细胞坏死广泛而严重，弥漫性大片坏死，从肝小叶中央开始并迅速向四周扩展，仅小叶周边部残留少许变性的肝细。但题干中描述的病变特征不符合，所以不选 C。

选项 D：亚急性重型肝炎，镜下特点为既有肝细胞的亚大块坏死，又有结节状肝细胞再生。坏死区网状纤维支架塌陷和胶原化（无细胞硬化），呈结节状。这与题干中的描述完全吻合，所以选择 D。

选项 E：门脉性肝硬化，正常肝小叶结构破坏，被假小叶替代，肝细胞排列紊乱，变性坏死，中央静脉缺如，偏位或 2 个以上。但题干中描述的病变特征不符合，所以不选 E。

124. 【答案】E

【解析】

选项 A：蜂窝织炎，是指疏松结缔组织的弥漫性化脓性炎，表现为皮肤红、肿、热、痛，常伴有全身症状如发热、寒战等。本题中的情况并非蜂窝织炎，所以 A 选项错误。

选项 B：溃疡，是指较大的坏死灶不易被完全溶解吸收时，表皮黏膜的坏死物可被分离，形成组织缺损。皮肤、黏膜浅表的组织缺损称为糜烂，较深的组织缺损称为溃疡。本题中的情况并非溃疡，所以 B 选项错误。

选项 C：空洞，是指肺、肾等内脏坏死物液化后，经支气管、输尿管等自然管道排出，所残留的空腔称为空洞。本题中的情况并非空洞，所以 C 选项错误。

选项 D：窦道，是指组织坏死后形成的只开口于皮肤黏膜表面的深在性盲管。本题中的情况并非窦道，所以 D 选项错误。

选项 E：瘻管，是连接两个内脏器官或从内脏器官通向体表的通道样缺损。本题中的情况正是瘻管，所以 E 选项正确。

125. 【答案】E

【解析】

选项 A: 肺结核。虽然题干中提到有坏死、空洞形成以及类上皮细胞、多核巨细胞及淋巴细胞出现, 这些都是结核的病理表现, 但是忽视了患者长期在石英粉厂工作的重要病史, 以及同心圆排列的玻璃样的胶原纤维呈漩涡状排列的病理特征, 这是硅沉着病的特征。

选项 B: 硅沉着病。该选项没有考虑到结核的病理表现, 因此是错误的。

选项 C: 肺纤维化。虽然题干中提到了肺泡间隔可见纤维组织增生, 这是纤维化的表现, 但是并非特指肺纤维化, 而且忽视了其他的病理特征和病史, 所以是错误的。

选项 D: 石棉肺。题干中没有提到吸入石棉粉尘的病史, 也没有提到石棉小体等石棉肺的病理特征, 所以是错误的。

选项 E: 硅沉着病合并结核病。这个选项完全符合题干的所有信息, 包括病史、病理特征等, 是正确答案。

126. 【答案】B

【解析】

选项 A: 类风湿性关节炎主要表现为对称性双手、腕、足等多关节肿痛, 伴有晨僵和全身症状如乏力、低热、肌肉酸痛、体重下降等, 这与题目中的症状不符, 故排除 A。

选项 B: 类 Arthus 反应是由于抗原与相应的 IgG 类抗体在组织中形成免疫复合物, 引发局部炎症反应。糖尿病患者反复注射胰岛素, 可能导致此类反应, 符合题目描述的症状, 故选择 B。

选项 C: 血清病通常出现在初次大量注射抗毒素后 1~2 周, 主要症状为发热、皮疹、淋巴结肿大、关节肿痛和一过性蛋白尿等, 这与题目中的症状不符, 故排除 C。

选项 D: 免疫复合物型肾小球性肾炎一般发生于某些感染后, 体内产生相应抗体, 与相应抗原结合形成循环免疫复合物, 沉积在肾小球基底膜上, 引起肾炎, 这与题目中的症状不符, 故排除 D。

选项 E: SLE 是一种全身性自身免疫病, 主要症状为血管炎、红斑等, 这与题目中的症状不符, 故排除 E。

127. 【答案】C

【解析】

A. 血尿: 血尿通常是由于肾脏或泌尿系统的疾病, 如肾小球肾炎、尿路感染等引起。在新月体性肾小球肾炎中, 由于新月体的形成主要阻塞了肾小囊, 因此不会直接导致血尿。

B. 蛋白尿: 蛋白尿是指尿液中蛋白质含量超过正常值, 通常是由于肾小球的滤过功能障碍引起。在新月体性肾小球肾炎中, 虽然肾小球受到影响, 但主要表现为少尿或无尿, 而不是蛋白尿。

C. 少尿: 这是新月体性肾小球肾炎的典型症状。新月体的形成阻塞了肾小囊, 导致肾小球毛细血管受压, 肾小球的滤过率下降, 从而引起少尿或无尿。

D. 管型尿: 管型尿是指尿液中出现大量管型, 通常是由于肾小管疾病引起。在新月体性肾小球肾炎中, 主要影响的是肾小球而非肾小管, 因此不会出现管型尿。

E. 多尿: 多尿通常是由于肾小管重吸收功能减弱引起。在新月体性肾小球肾炎中, 由于新月体的形成阻塞了肾小囊, 导致肾小球的滤过功能降低, 因此会出现少尿, 而非多尿。

128. 【答案】C

【解析】

A. 合并肺肉质变肺肉质变又称机化性肺炎, 是大叶性肺炎的并发症。这个阶段的特点是肺组织的纤维化, 但并不会导致明显的发绀等缺氧症状。

B. 充血水肿期充血水肿期是大叶性肺炎的早期阶段, 此时患者因毒血症而出现寒战, 高热, 但并未出现发绀等缺氧症状。

C. 红色肝样变期红色肝样变期是大叶性肺炎的中期阶段, 若病变范围较广, 患者动脉血中氧分压因肺泡换气和肺通气功能障碍降低, 可出现发绀等缺氧症状。

D. 灰色肝样变期灰色肝样变期是大叶性肺炎的后期阶段, 此时患者缺氧状况得以改善, 铁锈色痰逐渐转为粘液浓痰, 所以并不会出现发绀等缺氧症状。

E. 溶解消散期溶解消散期是大叶性肺炎的恢复阶段, 此时机体防御能力显著增强, 各项临床表现得到缓解, 也不会出现发绀等缺氧症状。

129. 【答案】D

【解析】

A. 凝固性坏死: 此种坏死形式, 组织的基本结构被保留, 但细胞已经死亡。肉眼观察时呈灰黄色、干燥、质实状态, 与健康组织间界限较明显。因此, 这种坏死可以通过肉眼观察得出。

B. 液化性坏死: 液化性坏死是由于细菌或某些真菌感染引起的脓肿、缺血缺氧引起的脑软化, 以及由细胞水肿发展而来的溶解性坏死。肉眼观察时, 表面湿润、偏软、组织易破坏。因此, 这种坏死也可以通过肉眼观察得出。

C. 脂肪坏死: 脂肪坏死后, 释出的脂肪酸和钙离子结合, 形成肉眼可见的灰白色钙皂。因此, 这种坏死也可以通过肉眼观察得出。

D. 纤维素样坏死: 纤维素样坏死是结缔组织及小血管壁常见的坏死形式。由于结缔组织及小血管壁无法直接肉眼观察, 需要用显微镜才能看到, 因此, 这种坏死不能通过肉眼观察得出。

E. 干酪样坏死: 干酪样坏死是结核病时因病灶中含脂质较多, 坏死区域成黄色, 状似干酪。因此, 这种坏死也可以通过肉眼观察得出。

130. 【答案】C

【解析】

选项分析: A. 鳞状细胞癌: 鳞状细胞癌是一种起源于表皮的肺癌, 其特点是细胞内有角质形成, 但并不会出现燕麦细胞, 所以 A 选项错误。B. 腺癌: 腺癌是一种起源于腺体的肺癌, 其特点是细胞内有腺体形成, 但也不会出现燕麦细胞, 所以 B 选项错误。C. 小细胞肺癌: 小细胞肺癌的特点就是细胞小, 核大, 且常见燕麦细胞, 所以 C 选项正确。D. 大细胞癌: 大细胞癌的特点是细胞大, 核大, 但并不会出现燕麦细胞, 所以 D 选项错误。E. 腺鳞癌: 腺鳞癌是一种同时具有腺癌和鳞状细胞癌特征的肺癌, 但并不会出现燕麦细胞, 所以 E 选项错误。

131. 【答案】D

【解析】

A 选项: 表面有少量炎性渗出物。这是正确的, 因为在十二指肠溃疡的早期, 会有炎性细胞浸润和炎性渗出。

B 选项: 可见坏死组织。这也是正确的, 因为在溃疡形成过程中, 受到炎症影响的组织会发生坏死。

C 选项: 增殖性动脉内膜炎。这同样是正确的, 因为在溃疡愈合过程中, 常常可以看到底部的动脉内膜发生增殖性变化, 这是身体自身修复机制的一部分。

D 选项: 可见异型增生细胞。这是错误的, 因为在十二指肠溃疡中, 一般不会出现异型增生细胞。异型增生细胞通常与肿瘤或癌前病变有关, 而不是炎症性病变。

E 选项: 底部神经节细胞变性。这也是正确的, 因为在溃疡底部, 由于炎症刺激和缺血, 神经节细胞和神经纤维常常会发生变性。

132. 【答案】C

【解析】

A. 胃癌可转移至盆腔: 此选项正确。胃癌可以通过种植的方式转移到盆腔, 特别是在胃肠道粘液癌中, 常见于卵巢等器官, 形成所谓的 Krukenberg 瘤。

B. 乳腺癌可转移至锁骨上淋巴结: 此选项正确。乳腺癌的淋巴转移路径首先是同侧腋窝淋巴结, 然后可能逆行转移到锁骨上淋巴结。

C. 交界性肿瘤不出现转移：此选项错误。交界性肿瘤指的是一种既有良性也有恶性特征的肿瘤，有些交界性肿瘤具有发展为恶性的倾向，恶性潜能者可能发生转移。

D. 肝癌可出现脑转移：此选项正确。肝癌晚期可以通过肝静脉转移到肺、肾上腺、脑和肾等地。

E. 肺癌可出现骨转移：此选项正确。肺癌的血道转移常见于脑、肾上腺、骨等器官和组织。

133. 【答案】D

【解析】

A 选项：最大呼气流量显著降低。这是哮喘发作时的常见现象，但不能反映气道可逆性，所以不能明确诊断为哮喘。

B 选项：一秒钟用力呼气容积降低。这也是哮喘发作时的常见现象，但同样不能反映气道可逆性，所以不能明确诊断为哮喘。

C 选项：最大呼气中段流量降低。这同样是哮喘发作时的常见现象，但不能反映气道可逆性，所以不能明确诊断为哮喘。

D 选项：支气管舒张试验阳性。支气管舒张试验是诊断哮喘的重要方法，如果结果阳性，说明气道有可逆性狭窄，这是哮喘的重要特征，所以可以明确诊断为哮喘。

E 选项：抗生素治疗有效。抗生素主要用于治疗感染，而哮喘不是由感染引起的，所以抗生素治疗效果不能作为诊断哮喘的依据。

134. 【答案】B

【解析】

A. IgG：此选项错误。IgG 是人体内含量最多的免疫球蛋白，主要见于再次应答和抗感染，但在支气管哮喘中并不起主要作用。

B. IgE：此选项正确。支气管哮喘是一种以慢性气道炎症和气道高反应性为特征的异质性疾病，属于 I 型超敏反应，而 IgE 是 I 型超敏反应的主要免疫球蛋白。

C. IgM：此选项错误。IgM 主要见于初次应答及早期防御，但在支气管哮喘中并不起主要作用。

D. IgA：此选项错误。IgA 主要见于粘膜免疫，但在支气管哮喘中并不起主要作用。

E. IgD：此选项错误。IgD 是 B 细胞标志，并不直接参与支气管哮喘的发病过程。

135. 【答案】D

【解析】

A. 设区的市医疗协会：不正确。医疗协会主要负责医疗行业内部的学术交流和专业技能培训，而不直接负责医疗事故的技术鉴定。

B. 县级卫生行政部门：不正确。县级卫生行政部门主要负责本地区的公共卫生和医疗服务管理，但医疗事故的技术鉴定并不归其管辖。

C. 设区的市卫生行政部门：不正确。设区的市卫生行政部门虽然负责监督和管理本地区的医疗机构和医疗行为，但医疗事故的技术鉴定不由其执行。

D. 设区的市相关鉴定医疗协会：正确。医疗事故技术鉴定由医学会组织专家鉴定组进行，设区的市级地方医学会负责组织首次医疗事故技术鉴定工作。

E. 待补充：不正确。已经有明确的答案，不需要补充其他选项。

136. 【答案】A

【解析】

选项 A：有利患者，这是医生在实施辅助生殖技术时必须遵循的原则之一。在本例中，医生为了提高患者的受孕率，一次性将多个胚胎植入患者体内，这种行为虽然可能会提高受孕率，但也增加了多胎妊娠的风险，对患者

的身体健康造成潜在威胁，因此违背了有利患者的原则。

选项 B：保护后代，这一原则指的是通过人类辅助生殖技术出生的后代享有的权利和义务。在本题中，这一原则并未被违反。

选项 C：防止商业化，这一原则是指不能受经济利益驱动而滥用人类辅助生殖技术，供精、供卵只能是以捐赠助人为目的，禁止买卖。在本题中，这一原则并未被违反。

选项 D：社会公益，这一原则是指遵守国家人口和计划生育、母婴保健法等法律法规。在本题中，这一原则并未被违反。

137. 【答案】A

【解析】

A. 善恶：正确选项。道德是以善恶为评判标准，调节人们之间和个人与社会之间的行为规范。医学道德则是依据一定的医学道德理论和原则制定的，用以调整医学实践中各种利益关系，评价医学行为的善恶。

B. 黑白：错误选项。黑白在道德评判中并非具有明确的评判标准，它更多的是用在对事物的明确性或者是对错的判断中，而非道德的评判。

C. 美丑：错误选项。美丑更多的是审美的评判标准，而并非道德的评判标准。

D. 良善：错误选项。良善是道德的一部分，但不是评判标准。良善体现了道德的积极面，但道德评判标准还包括负面的恶。

E. 是非：错误选项。是非更多的是用来评判事实的对错，而并非道德的评判标准。

138. 【答案】A

【解析】

选项分析：A. 胃：正确。左锁骨上淋巴结肿大，最常见的是胃癌转移，因此选 A。B. 肝：错误。肝癌转移至淋巴结较少，尤其是锁骨上淋巴结，因此不选 B。C. 食管：错误。虽然食管癌也可能转移到左锁骨上淋巴结，但其发生率远低于胃癌，因此不选 C。D. 胸腺：错误。胸腺瘤淋巴转移较少见，因此不选 D。E. 肺：错误。肺癌转移到淋巴结的过程通常是先侵入邻近的肺段或肺叶支气管周围淋巴结，然后到达肺门或隆突下淋巴结，最后可能累及锁骨上淋巴结，但与胃癌相比，其发生率较低，因此不选 E。

139. 【答案】E

【解析】

正确选项（E）：碳酸氢钠是一种抗酸药，它的作用机制是通过中和胃酸来缓解胃酸过多引起的症状，如胃痛、胃灼热感等。然而，它并不能抑制胃酸的分泌，因此不能抑制胃酸。

错误选项（A）：西咪替丁是 H₂ 受体阻断药，可以抑制胃酸分泌。

错误选项（B）：奥美拉唑是 H⁺-K⁺-ATP 酶抑制药，也被称为质子泵抑制剂，它可以抑制胃酸分泌。

错误选项（C）：雷尼替丁也是 H₂ 受体阻断药，可以抑制胃酸分泌。

错误选项（D）：莫法替丁同样是 H₂ 受体阻断药，可以抑制胃酸分泌。

140. 【答案】B

【解析】

正确选项（B）：奥美拉唑是 H⁺-K⁺-ATP 酶抑制药，也被称为质子泵抑制剂，它可以直接抑制胃酸的分泌，是目前世界上应用最广泛、效果最强的抑制胃酸分泌的药物。

错误选项（A）：西咪替丁是 H₂ 受体阻断药，虽然可以抑制胃酸分泌，但其效果不如质子泵抑制剂强。

错误选项（C）：雷尼替丁同样是 H₂ 受体阻断药，其抑制胃酸分泌的效果也不如质子泵抑制剂强。

错误选项（D）：法莫替丁也是 H₂ 受体阻断药，其抑制胃酸分泌的效果也不如质子泵抑制剂强。

错误选项（E）：碳酸氢钠是一种抗酸药，主要通过中和胃酸来缓解症状，但并不能抑制胃酸的分泌。

141. 【答案】A

【解析】

选项 A（正确）：阿托品是一种胆碱能受体阻断剂，主要阻断 M 型胆碱受体。在心脏，阿托品主要阻断窦房结和房室结的 M1 受体，从而解除迷走神经对心脏的抑制作用，使心率加快。

选项 B（错误）：去甲肾上腺素主要激动 α 肾上腺素受体，但也具有较弱的 β_1 受体激动作用，可以增强心肌收缩性并加快心率。然而，其对于解除迷走神经对心脏的抑制作用不如阿托品明显。

选项 C（错误）：异丙肾上腺素是一个强效的 β_1 受体激动剂，可以增强心肌收缩性和加快心率，但它并不直接影响迷走神经对心脏的抑制。

选项 D（错误）：肾上腺素既能激动 α 受体，也能激动 β 受体，包括心脏的 β_1 和 β_2 受体，从而加强心肌收缩性和加快心率。然而，它并不直接影响迷走神经对心脏的抑制。

选项 E（错误）：多巴胺在高浓度下能够激动心脏的 β_1 受体，增强心肌收缩力，增加心排出量，但它并不直接影响迷走神经对心脏的抑制。

142. 【答案】B

【解析】

A. 大脑皮层：地西洋并非主要作用于大脑皮层，因此这个选项是错误的。

B. 边缘系统：地西洋的抗焦虑作用是通过边缘系统中的 BZ 受体的作用而实现的。边缘系统包括海马、杏仁核等，这些部位在情绪调节中起着关键作用。因此，这个选项是正确的。

C. 黑质纹状体：地西洋并不直接作用于黑质纹状体，它主要影响的是神经递质的释放和传输，而不是特定的脑区。因此，这个选项是错误的。

D. 下丘脑：地西洋并非主要作用于下丘脑，下丘脑与自主神经功能和内分泌调节有关，但并非主要的焦虑反应区域。因此，这个选项是错误的。

E. 脑干网状结构：地西洋并非主要作用于脑干网状结构，脑干网状结构主要与觉醒和睡眠等生理功能有关，而不是情绪反应。因此，这个选项是错误的。

143. 【答案】A

【解析】

A. LD50/ED50：这是治疗指数的正确计算方式，因此这是正确答案。

B. LD99/ED1：这个比值并不代表治疗指数，因为它使用的是 99%致死剂量和 1%有效剂量，这与治疗指数的定义不符。

C. LD95/ED5：这个比值同样不代表治疗指数，它使用的是 95%致死剂量和 5%有效剂量，这也与治疗指数的定义不符。

D. ED1/LD99：这个比值更符合治疗指数的定义，因为它将有效剂量放在了分子，致死剂量放在了分母。

E. ED95/LD5：这个比值的计算方式也完全颠倒了治疗指数的定义。

144. 【答案】C

【解析】单个选项详细分析：A. 纤维化：良性高血压病时一般不见细动脉壁纤维化，故选项 A 错误。B. 水肿：良性高血压病时一般不见细动脉壁水肿，故选项 B 错误。C. 玻璃样变性：细小动脉硬化是良性高血压病的主要病变特征，表现为细小动脉玻璃样变，故选项 C 正确。D. 纤维素样坏死：坏死性细动脉炎管壁发生纤维素样坏死为恶性高血压特征性病变，故选项 D 错误。E. 脂质沉着：脂质沉着常见于动脉粥样硬化斑块，与本题无关，故选项 E 错误。

145. 【答案】C

【解析】

- A. DC（树突状细胞）主要负责把抗原信息传递给 T 细胞，启动特异性免疫应答，不直接分泌穿孔素。
- B. B 细胞是产生抗体的主要细胞，通过分泌抗体来中和病原体，不直接分泌穿孔素。
- C. CTL（细胞毒性 T 淋巴细胞）是主要的细胞免疫效应器官，它们可以直接杀伤被病原体感染的细胞或者肿瘤细胞。CTL 通过分泌穿孔素和颗粒酶，形成孔道，使颗粒酶等细胞毒蛋白进入靶细胞，从而诱导靶细胞凋亡。
- D. 肥大细胞主要在过敏反应中起作用，通过释放组胺等物质引发炎症反应，不直接分泌穿孔素。
- E. 嗜酸性粒细胞主要在寄生虫感染和过敏反应中起作用，可以分泌一些具有杀虫活性的蛋白质，但不直接分泌穿孔素。

146. 【答案】B

【解析】

A 选项：扩散作用。这个选项是错误的，因为磷壁酸并不具有扩散作用。纤维蛋白溶酶和透明质酸酶才能帮助细菌扩散。

B 选项：粘附作用。这个选项是正确的，磷壁酸可以与纤连蛋白结合，介导细菌黏附。

C 选项：自溶作用。这个选项是错误的，磷壁酸并不具有自溶作用。

D 选项：溶血作用。这个选项是错误的，磷壁酸并不具有溶血作用。

E 选项：毒素作用。这个选项是错误的，虽然革兰阳性菌可以产生多种毒素，但磷壁酸并不具有毒素作用。

147. 【答案】A

【解析】

选项 A：有氧运动是指以躯干、四肢等大腿肌肉群参与为主的，有节律、时间较长，能够维持在一个稳定状态的身体活动。这种运动需要大量的氧气供应，因此被称为有氧运动。例如：慢跑、游泳、骑自行车等。

选项 B：无氧运动是指以无氧代谢为主要功能途径的身体活动形式，一般为肌肉的强力收缩活动。例如：重量训练、短距离疾跑等。这类运动强度大，时间短，不能维持长时间。

选项 C：阻力活动是一种通过对抗阻力来进行的身体活动，主要是为了增加肌肉力量和耐力。例如：举重、做哑铃等。

选项 D：体适能是指人体具备完成各种身体活动的能力，包括力量、速度、耐力、灵活性、协调性等多个方面。

选项 E：协调性运动主要是指提高人体的平衡和协调能力的运动，例如：瑜伽、太极等。

148. 【答案】E

【解析】

A 选项：“调动参与”原则鼓励患者参与到自身的健康管理中来，但这并不意味着医生会替患者做决定，所以 A 选项错误。

B 选项：“保守秘密”原则要求医生对患者的信息严格保密，这与题目描述的情况无直接关联，所以 B 选项错误。

C 选项：“建立友好的关系”原则强调医生与患者之间建立良好的信任关系，但这并不涉及到医生是否为患者做决定，所以 C 选项错误。

D 选项：“移情”原则要求医生理解和接受患者的感受，而不仅仅是同情他们，这与题目描述的情况也无直接关联，所以 D 选项错误。

E 选项：“识别需求”原则要求医生设法了解到服务对象存在的问题并让他（她）识别出自身存在的问题。医生在这个过程中需要倾听患者的意见，但不能替患者做决定，这与题目描述的情况完全一致，所以 E 选项正确。

149. 【答案】A

【解析】

选项 A：胰岛 α 细胞分泌的是胰高血糖素，这是正确的。胰高血糖素主要作用是提高血糖浓度。

选项 B: 胰岛 β 细胞分泌胰岛素, 胰岛素的主要作用是降低血糖浓度, 与题目描述不符。

选项 C: 促胃液素是由胃窦、十二指肠、空肠上段黏膜中 G 细胞分泌, 与题目描述不符。

选项 D: 胰多肽是胰岛 F (PP) 细胞分泌, 其作用主要在于调节胃液和胰液的分泌, 与题目描述不符。

选项 E: 生长抑素是由胰岛 δ 细胞分泌, 与题目描述不符。

150. 【答案】A

【解析】

选项 A: 继发性主动转运, 这是正确答案。继发性主动转运不直接利用 ATP 的分解, 而是利用原发性主动转运机制建立起的 Na^+ 或 H^+ 的浓度梯度, 在 Na^+ 或 H^+ 离子顺浓度梯度扩散的同时使其他物质逆浓度梯度和 (或) 电位梯度跨膜转运。氨基酸自肠腔进入黏膜上皮细胞的过程就属于继发性主动转运。

选项 B: 原发性主动转运, 这个选项是错误的。原发性主动转运是指细胞直接利用代谢产生的能量将物质逆浓度梯度和 (或) 电位梯度转运的过程, 如同时转运 Na^+ 和 K^+ 的钠钾泵、转运 Ca^{2+} 的钙泵、转运 H^+ 离子的质子泵等。

选项 C: 易化扩散, 这个选项也是错误的。易化扩散是指非脂溶性的小分子物质或带电离子在跨膜蛋白帮助下, 顺浓度梯度和 (或) 电位梯度进行的跨膜转运, 如 Na^+ 、 K^+ 经通道异化扩散, 乙酰胆碱经载体易化扩散等。

选项 D: 单纯扩散, 这个选项也是错误的。经单纯扩散转运的物质都是脂溶性 (非极性) 物质或少数不带电荷的极性小分子物质, 如 O_2 、 CO_2 、 N_2 、类固醇激素、乙醇、尿素、甘油、水等。

选项 E: 入胞转运, 这个选项也是错误的。入胞是指细胞外大分子物质或物质团块如细菌、死亡细胞和细胞碎片等被细胞膜包裹后以囊泡形式进入细胞的过程。

第二单元

1. 【答案】A

【解析】选项分析：

A. ABVD 方案：这是霍奇金淋巴瘤的标准化疗方案，包括多种药物联合使用。由于题干中提到患者淋巴结活检找到 R-S 细胞，这是霍奇金淋巴瘤的特征，因此首选 ABVD 方案。

B. CHOP 方案：这是非霍奇金淋巴瘤的一种常用化疗方案，但由于患者被诊断为霍奇金淋巴瘤，所以这个选项不正确。

C. COP 方案：这也是非霍奇金淋巴瘤的一种常用化疗方案，同样由于患者被诊断为霍奇金淋巴瘤，所以这个选项不正确。

D. HA 方案：这是急性髓系白血病的一种化疗方案，与本题的病情不符，所以这个选项不正确。

E. DVL P 方案：这是急性淋巴细胞白血病的一种化疗方案，与本题的病情不符，所以这个选项不正确。

2. 【答案】A

【解析】

A. 霍奇金淋巴瘤：正确答案。霍奇金淋巴瘤的特征性表现就是淋巴结活检中发现 R-S 细胞，也就是 Reed-Sternberg 细胞，这是霍奇金淋巴瘤的特异性标志。

B. 淋巴结转移癌：不正确。如果是淋巴结转移癌，那么胸水中应该能看到相对应的癌症细胞，而非淋巴瘤细胞。

C. 非霍奇金淋巴瘤：不正确。非霍奇金淋巴瘤并不会在淋巴结活检中发现 R-S 细胞。

D. 急性淋巴细胞白血病：不正确。如果是急性淋巴细胞白血病，骨髓象中应该能看到大量原始、幼稚淋巴细胞。

E. 急性粒细胞白血病：不正确。如果是急性粒细胞白血病，外周血或骨髓原始细胞应该超过 20%。

3. 【答案】C

【解析】

选项 A：维生素 B12 缺乏会导致巨幼细胞性贫血，但这主要见于胃大部切除术后患者，因为胃大部切除术可能导致内因子减少，进而影响维生素 B12 的吸收。

选项 B：泛酸是胆固醇合成的主要原料，与巨幼细胞性贫血无直接关系。

选项 C：叶酸是制造红细胞的重要物质，妊娠期妇女需求量增加，食物中摄入不足容易导致叶酸缺乏，引起巨幼细胞性贫血。

选项 D：蛋白质缺乏通常导致的贫血多为缺铁性贫血，多见于儿童及老年人，与巨幼细胞性贫血关系不大。

选项 E：铁是制造红细胞的重要元素，缺乏铁主要导致缺铁性贫血，与巨幼细胞性贫血关系不大。

4. 【答案】B

【解析】

A. $0.2 \times 10^9/L$ ：这个值虽然低于正常范围，但不符合粒细胞缺乏症的诊断标准，因此选择 A 是错误的。

B. $0.5 \times 10^9/L$ ：这是粒细胞缺乏症的诊断标准，即外周血中性粒细胞绝对计数低于 $0.5 \times 10^9/L$ ，所以选择 B 是正确的。

C. $4.0 \times 10^9/L$ ：这个值在正常范围内，不符合粒细胞缺乏症的诊断标准，因此选择 C 是错误的。

D. $1.5 \times 10^9/L$ ：这个值在正常范围内，不符合粒细胞缺乏症的诊断标准，因此选择 D 是错误的。

E. $3.0 \times 10^9/L$ ：这个值在正常范围内，不符合粒细胞缺乏症的诊断标准，因此选择 E 是错误的。

5. 【答案】C

【解析】

A. 酸溶血试验 (Ham 试验): 主要用于诊断阵发性睡眠性血红蛋白尿症, 此病患者会出现肉眼可见的血红蛋白尿, 但本题患者无此表现, 故不选 A。

B. 自体溶血试验: 主要用于溶血性贫血的病因诊断, 如遗传性球形红细胞增多症、遗传性非球形红细胞溶血性贫血等, 但本题患者没有明确的遗传性疾病表现, 故不选 B。

C. Coombs 试验: 主要用于诊断自身免疫性溶血性贫血, 本题患者的临床表现和实验室检查均符合此病的特征, 因此 C 为正确答案。

D. 血红蛋白电泳: 主要用于诊断如地中海贫血等血红蛋白病, 但本题患者没有相关表现, 故不选 D。

E. 血沉: 主要用于诊断一些感染性疾病和风湿免疫性疾病, 但本题患者没有相关表现, 故不选 E。

6. 【答案】A**【解析】**

选项 A: 非溶血性发热性输血反应是最常见的输血反应, 主要表现为输血过程中发热、寒战。患者在输血后 20 分钟出现寒战、发热, 符合这种反应的特征, 故此选项正确。

选项 B: 溶血性输血反应主要表现为输血过程中或输血后, 输入的红细胞或受血者本身的红细胞被过量破坏, 常出现高热、寒战、心悸、气短、腰背痛、血红蛋白尿甚至无尿、急性肾衰竭等。患者没有这些表现, 故此选项错误。

选项 C: 过敏反应主要表现为输血过程中或输血后, 受血者出现荨麻疹、血管神经性水肿, 重者为全身皮疹、喉头水肿、支气管痉挛、过敏性休克等。患者没有这些表现, 故此选项错误。

选项 D: 出血并不属于输血不良反应的范畴, 故此选项错误。

选项 E: 一次过量输血可引起急性心功能不全、左心衰竭、肺淤血等。患者没有这些表现, 故此选项错误。

7. 【答案】B**【解析】**

A. 新鲜全血: 新鲜全血一般在失血量超过总血容量 30% 时使用, 但此患者血压稳定, 无大量失血的可能, 因此不选 A。

B. 浓缩红细胞: 该患者 Hb60g/L, 明显低于成年男性贫血诊断标准 Hb<120g/L, 提示存在贫血。术前需输注浓缩红细胞以纠正贫血, 因此选 B。

C. 去白细胞的红细胞: 此类血液制品通常用于多次输血后产生白细胞抗体或预期需要长期或反复输血的患者, 与此患者情况不符, 因此不选 C。

D. 浓缩红细胞和血浆: 输入新鲜冰冻血浆主要为预防和治疗因凝血异常所致的出血, 本题患者未提及有凝血功能异常, 因此不选 D。

E. 去白细胞的红细胞和血浆: 此选项结合了 C 和 D 的内容, 同样不符合此患者的情况, 因此不选 E。

8. 【答案】A**【解析】**

选项 A: 原发性免疫性血小板减少症 (ITP) 是一种自身免疫性疾病, 由于自身抗体破坏血小板导致血小板数量减少, 常见的临床表现有出血倾向, 如皮肤瘀斑、鼻出血、月经过多等。患者的年龄、性别、临床症状及实验室检查结果与 ITP 的特征相符, 所以选 A。

选项 B: 血友病是一种先天性血浆凝血因子缺乏或功能缺陷引起的出血性疾病, 主要见于男性, 且多有家族病史。本题患者为女性, 无明显家族史, 故排除 B。

选项 C: 过敏性紫癜是一种血管变态反应性出血性疾病, 主要表现为非血小板减少性紫癜、关节炎或关节痛、腹痛、胃肠道出血及肾炎。本题患者并未表现出这些症状, 故排除 C。

选项 D: 弥散性血管内凝血 (DIC) 是一种严重的全身性出血和/或血栓性疾病, 表现为休克、多发微血管栓塞等症。本题患者并未表现出这些症状, 故排除 D。

选项 E: 原发性血小板增多症, 主要特征为外周血血小板持续 $\geq 450 \times 10^9/L$, 与本题患者的血小板数值不符, 故排除 E。

9. 【答案】C

【解析】

A 选项: A 型血。错误。因为次侧凝集, 说明被试者 (小李儿子) 的红细胞存在 B 抗原。而 A 型血的红细胞只携带 A 抗原, 血清中存在 B 抗体, 与题目描述不符。

B 选项: B 型血。错误。因为主测不凝, 说明被试者的血清无 A 抗体。而 B 型血的红细胞携带 B 抗原, 血清中存在 A 抗体, 与题目描述不符。

C 选项: AB 型血。正确。AB 型血的红细胞存在 A、B 两种抗原, 血清中无抗体。这与主测不凝集 (说明血清无 A 抗体) 和次侧凝集 (说明红细胞存在 B 抗原) 的结果相符。

D 选项: O 型血。错误。因为次侧凝集, 说明被试者的红细胞存在 B 抗原。而 O 型血的红细胞无 A、B 抗原, 血清中有 A、B 抗体, 与题目描述不符。

E 选项: A 型或 B 型血。错误。根据 A、B 两选项的分析, 被试者的血型既不能是 A 型也不能是 B 型。

10. 【答案】D

【解析】

A. 纤维蛋白生成障碍: 此类疾病通常会导致凝血酶时间 (TT) 及 PT 延长, 但在题目中, 患者的凝血酶原时间是正常的, 所以排除此项。

B. 凝血酶生成障碍: 此类疾病的特点是出血时间正常, 但凝血时间和凝血酶原时间都会延长, 而在题目中, 患者的凝血酶原时间是正常的, 所以排除此项。

C. 血小板异常: 此类疾病通常会导致出血时间延长, 但在题目中, 患者的出血时间是正常的, 所以排除此项。

D. 凝血活酶生成障碍: 此类疾病的特点是出血时间正常, 凝血时间延长, 凝血酶原时间正常, 与题目中患者的表现一致, 所以此项为正确答案。

E. 血管壁功能异常: 此类疾病通常会导致出血时间延长, 但在题目中, 患者的出血时间是正常的, 所以排除此项。

11. 【答案】E

【解析】

选项 A: M1 型, 急性髓细胞白血病微分化型。原粒细胞占骨髓非红系有核细胞的 90% 以上, 其中至少 3% 以上细胞为 MPO 阳性。本题中, 患者骨髓中原始细胞占 80%, 并无明确的 MPO 阳性信息, 所以不选择 A。

选项 B: M2 型, 急性粒细胞白血病部分分化型。原粒细胞占骨髓非红系有核细胞的 30%~89%, 其他粒细胞 $\geq 10\%$ 单核细胞 $< 20\%$ 。在本题中, 原始细胞占比过高, 并且没有提到其他粒细胞和单核细胞的比例, 所以不选择 B。

选项 C: M3 型, 急性早幼粒细胞白血病。骨髓中以颗粒增多的早幼粒细胞为主, 此类细胞在非红系有核细胞中 $\geq 30\%$ 。可见 PML-RARA 融合基因, 易发生 DIC。在本题中, 没有明确的早幼粒细胞增多和 PML-RARA 融合基因的信息, 所以不选择 C。

选项 D: M4 型, 急性粒-单核细胞白血病。骨髓中原始细胞占非红系有核细胞的 30% 以上, 各阶段粒细胞 $\geq 20\%$, 各阶段单核细胞 $\geq 20\%$ 。在本题中, 原始细胞占比过高, 并且没有提到各阶段粒细胞和单核细胞的比例, 所以不选择 D。

选项 E: M5 型, 急性单核细胞白血病。在本题中, 患者有牙龈肿胀出血症状 (提示 M4 及 M5 急性白血病可能性大), 结合骨髓检查 POX 染色部分呈弱阳性, 非特异性酯酶染色阳性, NaF 可抑制, 符合 M5 型的特征, 所以选择 E。

E。

12. 【答案】C

【解析】

选项 A：高剂量阿糖胞苷主要用于急性非淋巴细胞白血病的巩固及维持治疗。但在这个情况下，患者的原始粒细胞占 15%，处于加速期，因此不适用。

选项 B 和 D：小剂量高三尖杉酯碱+阿糖胞苷（HA 方案）和小剂量柔红霉素+阿糖胞苷是慢粒急变期可选择的化疗方案之一。然而，患者仍处于加速期，并未进入急变期，因此这两个方案也不适用。

选项 C：酪氨酸激酶抑制剂是针对慢性粒细胞白血病加速期的首选治疗方案，因此是正确答案。

选项 E：单独应用羟基脲通常限于高龄、具有合并症、TKI 和 IFN- α 均不耐受的病人以及用于高白细胞淤滞时的降白细胞处理。在这种情况下，患者既没有显示出对 TKI 或 IFN- α 的不耐受，也没有表现出高白细胞淤滞，因此该选项不适用。

13. 【答案】A

【解析】

选项 A：霍乱的典型症状是剧烈腹泻，水样便，无腹痛，伴有恶心和呕吐，严重时会出现脱水和低血容量性休克。此外，粪动力试验阳性是诊断霍乱的重要依据，因此该患者最有可能的诊断是霍乱。

选项 B：细菌性痢疾的主要症状是腹痛，粘液脓血便和里急后重，与该患者的症状不符。

选项 C：细菌性食物中毒常表现为恶心、呕吐，上腹痛，腹泻，但极少出现严重脱水及休克，与该患者的症状不符。

选项 D：急性胃肠炎主要表现为腹痛、腹泻和呕吐，也极少出现严重脱水及休克，与该患者的症状不符。

选项 E：胃肠型感冒主要表现为发热、食欲不振，恶心呕吐和腹泻等，与该患者的症状不符。

14. 【答案】C

【解析】

选项 A：静脉点滴抗生素。此选项不正确。虽然抗生素可以用于治疗某些类型的感染，但对于这个患者来说，最重要的问题是他脱水症状，而不是可能的感染。因此，首要任务应该是恢复他的液体平衡。

选项 B：静脉点滴碳酸氢钠。此选项不正确。碳酸氢钠可以用于治疗酸中毒，但在这个病例中，患者的主要问题是脱水，所以优先需要补充的是液体和电解质。

选项 C：静脉补充电解质和液体。此选项正确。患者的症状（包括腹泻、恶心、呕吐、皮肤弹性差等）都表明他正在经历严重的脱水，因此，最重要的治疗措施就是立即补充液体和电解质。

选项 D：口服补液盐。此选项不正确。虽然口服补液盐是轻度脱水时的常见治疗方法，但对于这个患者来说，他的脱水症状已经相当严重，需要立即通过静脉进行补液。

选项 E：口服止泻药。此选项不正确。止泻药只是对症治疗，并不能解决患者脱水的问题。至关重要的是立即补充液体和电解质。

15. 【答案】A

【解析】

选项 A：正确。麻疹主要通过空气中的飞沫传播，当患者咳嗽、打喷嚏或说话时，可以将病毒散布到空气中，其他人吸入这些飞沫就可能感染麻疹。

选项 B：错误。麻疹不是通过消化道传播的，它主要通过呼吸道飞沫传播。

选项 C：错误。虽然接触到被麻疹病毒污染的物体或者直接接触患者也有可能造成感染，但主要的传播方式仍然是空气中的飞沫传播。

选项 D：错误。麻疹并不是通过虫媒传播的，它主要通过呼吸道飞沫传播。

选项 E：错误。麻疹主要通过呼吸道飞沫传播，而非血液、体液传播。

16. 【答案】D

【解析】

选项 A：呼吸道传播。疟疾并非通过呼吸道传播。这是因为疟原虫需要通过雌性按蚊的叮咬才能进入人体。

选项 B：消化道传播。疟疾不通过消化道传播。疟原虫不能通过食物或水进入人体，所以消化道传播并非疟疾的传播方式。

选项 C：接触传播。疟疾也不是通过接触传播的。即使是直接接触病人的血液，也无法引起疟疾，除非这些血液被雌性按蚊摄取并叮咬其他人。

选项 D：虫媒传播。这是疟疾的主要传播方式。疟原虫在雌性按蚊体内完成一部分生命周期后，通过按蚊叮咬人体，将寄生虫传播给人。

选项 E：血液、体液传播。虽然理论上疟原虫可以通过血液传播，但这并非其主要传播方式。只有在罕见的情况下，如输血或器官移植，才可能发生。

17. 【答案】C

【解析】

A. 流行性脑脊髓膜炎主要临床表现为发热、头痛、呕吐、颈项强直等脑膜刺激征，脑脊液呈化脓性改变，与题干描述的症状不完全符合。

B. 斑疹伤寒的临床特点为急性起病、发热、皮疹、淋巴结肿大、肝脾肿大和被恙螨幼虫叮咬处出现焦痂，与题干描述的症状不符。

C. 肾综合征出血热的临床表现包括发热、头痛、眼眶痛、出血点及肾脏损害，与题干描述的症状完全符合。

D. 钩端螺旋体病的临床特征是起病急骤，早期有高热，全身酸痛、软弱无力、结膜充血、腓肠肌压痛、表浅淋巴结肿大等钩体毒血症。但钩端螺旋体传播与啮齿动物有关，因此排除。

E. 败血症一般为急性起病、寒战、高热、呼吸急促、心动过速，以及皮疹、关节肿痛、肝脾肿大和精神、神志改变等。严重者可出现急性器官功能障碍。与题干描述的症状不符。

18. 【答案】C

【解析】

选项 A：肥达-外斐试验主要用于伤寒、副伤寒诊断的参考以及立克次体病的辅助诊断，与本题的症状和病史不符，因此排除。

选项 B：尿培养主要用于鉴别尿路感染的致病菌，虽然患者有尿蛋白(+++)的症状，但并不能确定是由尿路感染引起，因此不能作为首选检查，排除。

选项 C：血清特异性抗体检测可以帮助医生明确诊断肾综合征出血热，这与患者的症状和病史相符，因此是最佳选择。

选项 D：血常规检查在肾综合征出血热中可见白细胞升高，但这种现象并无特异性，不能作为明确诊断的依据，因此排除。

选项 E：咽拭子培养主要用于鉴别呼吸道感染病原体，与本题的症状和病史不符，因此排除。

19. 【答案】C

【解析】

选项 A（四环素）：四环素是一种广谱抗生素，主要用于治疗由敏感菌引起的各种感染，对汉坦病毒引起的肾综合征出血热无效。

选项 B（环丙沙星）：环丙沙星是一种氟喹诺酮类抗生素，主要用于治疗各种由敏感菌引起的感染，对汉坦病毒引起的肾综合征出血热无效。

选项 C (利巴韦林): 利巴韦林是一种抗病毒药物, 对于肾综合征出血热的治疗有明显效果, 因此是正确答案。

选项 D (金刚烷胺): 金刚烷胺是一种抗流感病毒药物, 对汉坦病毒引起的肾综合征出血热无效。

选项 E (青霉素): 青霉素是一种抗生素, 主要用于治疗由敏感菌引起的各种感染, 对汉坦病毒引起的肾综合征出血热无效。

20. 【答案】A

【解析】

选项 A: 伤寒。根据题干中女性患者的症状, 如持续高热、相对缓脉、玫瑰疹、肝脾肿大、表情淡漠等, 这些都是伤寒极期的典型表现。同时, 外周血象示白细胞总数降低, 也符合伤寒的特点。因此, 选项 A 是正确的。

选项 B: 疟疾。疟疾的主要表现为周期性规律发作, 全身发冷、发热、多汗, 长期多次发作后, 可引起贫血和脾肿大, 与题干描述的患者症状不符, 所以排除。

选项 C: 斑疹伤寒。斑疹伤寒的临床特点为急性起病、发热、皮疹、淋巴结肿大、肝脾肿大和被恙螨幼虫叮咬处出现焦痂, 这与题干描述的患者症状不完全吻合, 所以排除。

选项 D: 肾综合征出血热。此病以发热、出血、充血、低血压休克及肾脏损害为主要临床表现, 与题干描述的患者症状不符, 所以排除。

选项 E: 败血症。败血症一般为急性起病、寒战、高热、呼吸急促、心动过速, 以及皮疹、关节肿痛、肝脾肿大和精神、神志改变等。严重者可出现急性器官功能障碍, 与题干描述的患者症状不符, 所以排除。

21. 【答案】E

【解析】

A. 粪便培养: 虽然粪便培养可以帮助诊断伤寒, 但在病程的第 2 周起阳性率才逐渐增加, 因此不是最有意义的检查。

B. 外斐反应: 这是用于诊断立克次体病的试验, 与伤寒的诊断无关。

C. 肥达反应: 虽然肥达试验可以作为伤寒、副伤寒的参考, 但是其阳性率较低, 因此也不是最有意义的检查。

D. 血涂片查疟原虫: 这是用于诊断疟疾的方法, 与伤寒的诊断无关。

E. 血培养: 伤寒患者血培养在病程的第 1-2 周阳性率最高, 可达 80-90%, 因此是该患者的首选辅助检查。

22. 【答案】B

【解析】

A. 自身免疫肝炎通常是由自身免疫反应介导的慢性进行性肝脏炎症性疾病, 该患者病程短且无相关自身抗体检测指标, 因此排除。

B. 急性病毒性肝炎的病程较短, 常见的症状包括乏力、食欲减退、尿黄等, 此外, ALT 显著升高并出现黄疸也是重要的诊断依据。

C. 脂肪肝是以肝细胞脂肪过度贮积和脂肪变性为特征的临床病理综合征, 常见的危险因素包括肥胖、饮酒、糖尿病、营养不良、部分药物、妊娠以及感染等, 与该患者急性起病表现不符。

D. 慢性肝炎急性发作通常需要有既往的肝炎病史, 而该患者没有这样的病史, 所以可以排除。

E. 药物性肝炎通常是由服用损害肝药物引起的, 该患者没有这样的用药史, 所以可以排除。

23. 【答案】D

【解析】

选项 A (急性胃肠炎): 虽然症状有发热、腹痛、腹泻, 但是急性胃肠炎的大便通常为黄色或黄绿色, 少量黏液或白色皂块, 粪质不多, 不会出现脓血便, 因此排除。

选项 B (急性阑尾炎): 急性阑尾炎的主要表现为转移性右下腹痛, 与这个患者的表现不符, 因此排除。

选项 C (急性病毒性腹泻): 急性病毒性腹泻的临床特点为起病急、恶心、呕吐、腹痛、腹泻 (排水样便或稀

便)，不会出现脓血便，因此排除。

选项 D（急性细菌性痢疾）：患者在进食后出现发热、腹痛、腹泻，排脓血便，这是菌痢的典型临床表现。血常规白细胞总数增多，以中性粒细胞为主；粪便镜检可见白细胞、红细胞，这些都符合急性细菌性痢疾的特征。

选项 E（食物中毒）：食物中毒通常以恶心、呕吐、腹痛、腹泻等急性胃肠炎症状为主要特征，不会出现脓血便，因此排除。

24. 【答案】B

【解析】

选项 A：梅毒是由梅毒螺旋体引起的全身性疾病，典型表现为硬下疳、梅毒疹和皮肤粘膜损害，不会出现挖空细胞，因此不符合题干描述。

选项 B：尖锐湿疣由人乳头瘤病毒 (HPV) 感染引起，常在肛门和外生殖器皮肤粘膜形成赘生物，挖空细胞是其典型病理学特征，因此与题干描述相符，应该选择此选项。

选项 C：淋病主要表现为泌尿生殖系统化脓性感染，不会出现外生殖器赘生物，因此不符合题干描述。

选项 D：细菌性阴道病表现为阴道分泌物增多，呈稀薄状且有鱼腥味，与题干描述的外阴灰白色疣状物不符。

选项 E：滴虫性阴道炎主要表现为阴道分泌物增多及外阴，阴道口瘙痒，分泌物稀薄或脓性，泡沫状，有异味。与题干描述的外阴灰白色疣状物不符。

25. 【答案】B

【解析】

选项 A：病毒血症。虽然病毒血症在肾综合征出血热中是常见的现象，但它并不是导致早期休克的主要原因。病毒血症主要是病毒在血液中的存在，而休克的发生更多的是与血流动力学改变有关。

选项 B：血浆外渗。这是正确答案。肾综合征出血热早期休克的主要原因是由于病毒及免疫反应广泛损伤全身小血管和毛细血管，加上血管活性物质的作用，导致血管扩张，血管通透性增加，血浆外渗使血容量下降。

选项 C：心肌损害。心肌损害在肾综合征出血热中可能会发生，但它并非早期休克的主要原因。心肌损害通常是休克的继发原因，而非主要原因。

选项 D：微血管痉挛。微血管痉挛也可能在肾综合征出血热中发生，但这并非导致早期休克的主要原因。微血管痉挛可能会导致局部血流减少，但并不会直接导致全身性的血流动力学改变，所以不是休克的主要原因。

选项 E：电解质紊乱。电解质紊乱在肾综合征出血热中也可能发生，但它并非早期休克的主要原因。电解质紊乱主要影响到细胞内外环境的稳定，而不是直接导致血流动力学改变，所以不是休克的主要原因。

26. 【答案】B

【解析】

选项 A：抗感染首选喹诺酮类抗生素。这是正确的，因为第三代喹诺酮类药物对沙门氏菌具有良好的抗菌活性，是治疗伤寒的经验首选药物。

选项 B：便秘时用高压灌肠。这是错误的。伤寒患者存在肠穿孔的风险，因此在便秘时应避免使用高压灌肠和泻剂。可以使用生理盐水进行低压灌肠，如果无效，可以改用 50% 甘油或液体石蜡。

选项 C：少进食豆奶等产气食物。这是正确的。伤寒患者常常会出现腹胀的情况，此时应减少豆奶、牛奶等容易产气的食物的摄入。

选项 D：低糖低脂饮食。这是正确的。伤寒患者在腹泻时，应选择低糖低脂肪的食物，以避免加重病情。

选项 E：禁止用新斯的明等促进肠蠕动药。这是正确的。伤寒患者不应使用促进肠蠕动的药物，如新斯的明，因为这可能加重肠道的病变。

27. 【答案】C

【解析】

选项 A: HCV 抗体检测可以作为丙型肝炎的筛查手段,但不能用于确诊。因为抗体阳性可能表示现症感染也可能是既往感染。

选项 B: HCV-DNA 检测在丙型肝炎的诊断中并无实际意义,因为 HCV 是 RNA 病毒,不存在 DNA。

选项 C: HCV-RNA 检测是丙型肝炎的确诊检查方法,它能直接反映出病毒的存在和复制情况。

选项 D: 肝功能检查可以反映肝脏受损情况,但不能确定病原体,因此不能作为丙型肝炎的确诊手段。

选项 E: 腹部 CT 等影像学检查有助于鉴别肝脏病变,但不能确诊 HCV 感染。

28. 【答案】B**【解析】**

选项 A: 中性粒细胞绝对计数低于 $0.2 \times 10^9/L$,虽然是一个较低的值,但并不是粒细胞缺乏症的诊断标准。因此,选项 A 不正确。

选项 B: 中性粒细胞绝对计数低于 $0.5 \times 10^9/L$ 是粒细胞缺乏症的诊断标准。因此,选项 B 是正确答案。

选项 C: 中性粒细胞绝对计数为 $4.0 \times 10^9/L$,这个值在正常范围内,不符合粒细胞缺乏症的诊断标准。因此,选项 C 不正确。

选项 D: 中性粒细胞绝对计数低于 $1.5 \times 10^9/L$,虽然这个值低于正常范围,但并不是粒细胞缺乏症的诊断标准。因此,选项 D 不正确。

选项 E: 中性粒细胞绝对计数为 $3.0 \times 10^9/L$,这个值在正常范围内,不符合粒细胞缺乏症的诊断标准。因此,选项 E 不正确。

29. 【答案】B**【解析】**

选项 A: 心功能检查主要用于评估心脏的泵血能力,包括心率、心律、心音等,但无法明确诊断具体的心脏疾病,因此不是首选的检查。

选项 B: 超声心动图是一种无创的心脏检查方式,可以通过声波反射显示出心脏的形态、大小、功能等信息,对于诊断心脏结构性疾病如房间隔缺损有很大帮助。在这个病例中,超声心动图是首选的检查。

选项 C: 磁共振成像(MRI)可以提供心脏的详细影像,对于诊断复杂的心脏疾病有较大帮助,但是对于简单的房间隔缺损,MRI 并非首选的检查,且成本高,不适合作为初步筛查的手段。

选项 D: 心导管检查是一种侵入性的检查方式,通常用于评估和治疗严重的心脏疾病,如冠状动脉疾病、严重的心脏瓣膜病等,对于这个病例中的房间隔缺损,不需要进行心导管检查。

选项 E: 心电图主要反映心脏的电活动,可以用于诊断心律不齐、心肌梗塞等电生理改变,但对于结构性心脏疾病,如房间隔缺损,其诊断价值有限。

30. 【答案】E**【解析】**

选项 A: 流行性乙型脑炎主要经蚊传播,多见于夏秋季,临床表现为高热、意识障碍、惊厥、强直性痉挛和脑膜刺激征等,但一般无皮肤瘀点、瘀斑,与患儿表现不符。

选项 B: 钩端螺旋体病脑膜脑炎型多发生在病程的第 4~7 病日,患者头痛加剧,伴恶心、呕吐、颈部抵抗,脑膜刺激征阳性等脑膜炎的症状。脑实质损害明显者可反复抽搐,重者出现意识障碍。与患儿表现不符。

选项 C: 流行性出血热又称肾综合征出血热,是由流行性出血热病毒(汉坦病毒)引起的,以鼠类为主要传染源的自然疫源性疾病。以发热、出血、充血、低血压休克及肾脏损害为主要临床表现,与患儿表现不符。

选项 D: 脑型疟疾是人类中枢神经系统中最常见、最严重的寄生虫感染性疾病,但患儿无疟疾流行区居住或旅行史,不支持。

选项 E: 10 岁男孩+发热、头痛、呕吐（流行性脑脊髓膜炎的常见临床表现）+精神萎靡，全身皮肤有散在瘀点、瘀斑（流行性脑脊髓膜炎的典型体征），故该患儿最可能诊断为流行性脑脊髓膜炎。

31. 【答案】C

【解析】

A 选项：血培养。考察的是对于细菌感染的诊断方法，但是在这个病例中，患者没有出现发热等细菌感染的体征，所以血培养并没有明显的意义，因此 A 选项错误。

B 选项：大便常规。这个选项考察的是对于消化系统病变的诊断方法，虽然患者的大便中出现白条状物，但是大便常规只能检测自身消化系统病变，不能确诊为猪带绦虫病，应该进行粪便微生物检查，因此 B 选项错误。

C 选项：皮下结节活检。这个选项是正确答案，因为患者颈部有一圆形皮下结节，质地较硬，活动好，无压痛，这可能是猪带绦虫病的一个重要表现，通过活检可以直接发现囊尾蚴，从而确诊。

D 选项：血象。这个选项考察的是对于钩虫的诊断方法，虽然钩虫病患者会出现贫血，但是猪带绦虫病患者一般不会出现贫血，因此血象检查在这个病例中并无明显意义，D 选项错误。

E 选项：环卵沉淀试验。这个选项考察的是对于虫卵抗原性的检测方法，虽然这种方法可以用于猪带绦虫病的诊断，但是它具有一定的阴性率，并且对于这个病例来说，皮下结节考虑为囊尾蚴形成，结节活检更为简便准确，因此 E 选项错误。

32. 【答案】D

【解析】

选项 A: 血小板计数。再障和白细胞不增多型白血病都可能出现血小板减少，因此通过血小板计数不能有效鉴别两者。

选项 B: 外周血找幼稚白细胞。白细胞不增多型白血病患者的外周血中幼稚细胞的数量很少，难以被捕捉到，所以这个选项也不能有效鉴别两者。

选项 C: 外周血找红细胞。再障和白细胞不增多型白血病患者，外周血中均可能出现红细胞减少的状态，因此这个选项也不能有效鉴别两者。

选项 D: 骨髓细胞学检查。骨髓细胞学检查是鉴别再障和白细胞不增多型白血病最重要的检查。再障患者多部位骨穿可见骨髓中明显的三系增生减低，“一片荒芜”。而白细胞不增多型白血病患者则可以在骨髓象中发现原始细胞。因此，这个选项是最能有效鉴别两者的。

选项 E: 网织红细胞计数。网织红细胞常用来反应骨髓红系增生是否旺盛，与鉴别再障和白细胞不增多型白血病关系不大，故该选项不能鉴别。

33. 【答案】E

【解析】

A. 造血干细胞移植-造血干细胞移植在慢性粒细胞白血病（CML）慢性期不作为一线选择。仅用于移植风险很低且对 TKI 耐药、不耐受以及进展期的 CML 病人。

B. 改用羟基脲治疗-单独应用羟基脲目前限于高龄、具有合并症、TKI 和 IFN- α 均不耐受的病人以及用于高白细胞淤滞时的降白细胞处理。

C. 改用 α 干扰素治疗-干扰素 α （IFN- α ）是分子靶向药物出现之前的首选药物。目前应用于不适合 TKI 和 allo-HSCT 的病人。

D. 脾切除-除非出现巨脾压迫症状或加速期贫血和血小板明显减少等相关指征，否则不行脾切除治疗。目前尚没有数据证明脾切除后慢粒患者预后明显改善。

E. 改用二代 TKI 进行治疗-伊马替尼治疗无效时，应监测是否存在相关耐药基因突变位点，首选换用二代 TKI 进行治疗。

34. 【答案】C

【解析】

选项 A: 急性粒细胞白血病, 虽然其中部分类型可见到绿色瘤, 常累及骨膜, 以眼眶部位最常见, 可引起眼球突出、复视或失明, 但并不是易出现睾丸浸润肿大和较易累及中枢神经系统的类型。

选项 B 和 D: 急性单核细胞白血病和急性粒-单核细胞白血病, 这两种类型的白血病可能出现由于白血病细胞浸润造成的牙龈增生、肿胀; 皮肤可出现蓝灰色斑丘疹, 局部皮肤隆起、变硬, 呈紫蓝色结节。但是, 它们并不是题目中描述的易出现睾丸浸润肿大和较易累及中枢神经系统的类型。

选项 E: 急性早幼粒细胞白血病, 该类型的白血病易发生 DIC (弥散性血管内凝血), 但并不是易出现睾丸浸润肿大和较易累及中枢神经系统的类型。

正确答案 C: 急性淋巴细胞白血病, 此类型的白血病是中枢神经系统浸润及睾丸浸润的常见类型, 符合题目描述, 所以选择 C。

35. 【答案】B

【解析】

A. 肾淀粉样变性: 这是一种由于慢性炎症、恶性肿瘤或遗传因素引起的一种全身性疾病, 其中包括肾脏。但它主要影响中老年人, 不是儿童继发性肾炎最常见的类型。

B. 紫癜性肾炎: 紫癜性肾炎是一种小血管炎症, 以皮肤、关节、胃肠道和肾脏受累为特征。在儿童中, 它是最常见的继发性肾炎。

C. 肾病综合征: 肾病综合征是一组临床表现, 包括蛋白尿、低蛋白血症、高脂血症和水肿。但它通常是原发性肾病的表现, 不属于继发性肾炎。

D. 狼疮肾炎: 狼疮肾炎是系统性红斑狼疮的一种表现, 虽然在青少年中相对常见, 但不如紫癜性肾炎更常见。

E. 膜性肾病: 膜性肾病是一种导致肾小球基底膜增厚的疾病, 通常与免疫系统异常有关。但它也主要是原发性肾病的表现, 不属于继发性肾炎。

36. 【答案】E

【解析】

选项 A: 肾淀粉样变性。此为一种特殊的蛋白质沉积病, 与慢性肾炎的病理类型无关, 因此选项 A 不正确。

选项 B: 紫癜性肾炎。此为一种由免疫反应引发的小血管炎, 同样与慢性肾炎的病理类型无关, 因此选项 B 不正确。

选项 C: 肾病综合征。这是一种临床表现, 包括大量蛋白尿、水肿、高脂血症和低白蛋白血症, 而非慢性肾炎的病理类型, 因此选项 C 不正确。

选项 D: 狼疮肾炎。这是一种由系统性红斑狼疮 (SLE) 引发的肾病, 也并非慢性肾炎的病理类型, 因此选项 D 不正确。

选项 E: 膜性肾病。这是一种常见的慢性肾炎病理类型, 主要表现为肾小球毛细血管壁的扩张和肥厚, 因此选项 E 是正确答案。

37. 【答案】B

【解析】

选项 A: 急性肾小球肾炎的特点是起病急, 病程短, 通常在 3-4 周内自行恢复。患者的病史已有一年, 且表现出持续的蛋白尿、高血压和肾功能损害, 因此不符合急性肾小球肾炎的特征。

选项 B: 慢性肾小球肾炎的特征包括尿检异常 (如蛋白尿、血尿)、伴或不伴水肿及高血压等, 病史达 3 个月以上。患者的症状和病史与此相符, 因此这是最可能的诊断。

选项 C: 肾病综合征的诊断标准包括大量蛋白尿、低白蛋白血症、水肿和高脂血症。患者未出现低白蛋白血症

和高脂血症，因此不符合肾病综合征的诊断。

选项 D：急性肾小球肾炎是一种肾功能快速恶化的疾病，病理类型为新月体肾炎。患者的病情并未表现出快速恶化，因此不符合此项诊断。

选项 E：高血压肾损害包括良性高血压肾硬化症和恶性高血压肾损害，但题干中未提及患者高血压病程及是否有头痛或视力下降等症状，因此不考虑该患者为高血压肾损害。

38. 【答案】B

【解析】

选项 A：袢利尿剂在一些情况下可以用于慢性肾小球肾炎的降压治疗，但因其效果不如血管紧张素转换酶抑制剂，所以不是首选。

选项 B：血管紧张素转换酶抑制剂（ACEI）是慢性肾小球肾炎的首选降压药物。它不仅能有效控制高血压，还能减少尿蛋白，从而延缓肾功能的恶化。

选项 C：钙通道阻滞剂也可以用于慢性肾小球肾炎的降压治疗，但效果不如血管紧张素转换酶抑制剂，所以不是首选。

选项 D：β 受体拮抗剂同样可以用于慢性肾小球肾炎的降压治疗，但效果不如血管紧张素转换酶抑制剂，所以不是首选。

选项 E：α 受体拮抗剂虽然也可以用于慢性肾小球肾炎的降压治疗，但效果不如血管紧张素转换酶抑制剂，所以不是首选。

39. 【答案】A

【解析】

选项 A：急性膀胱炎。根据患者年龄、性别、症状以及尿沉渣镜检查结果，最可能的诊断为急性膀胱炎。急性膀胱炎常见于女性，主要症状为尿频、尿急、尿痛，尿常规可见白细胞增多。

选项 B：急性肾小球肾炎。该疾病以急性肾功能衰竭为主要临床表现，通常伴有血尿、蛋白尿、水肿和高血压等症状，与患者症状不符。

选项 C：急性间质性肾炎。该疾病的主要症状为急性肾损伤，如乏力、纳差、恶心、呕吐、尿量减少和尿色加深等，与患者症状不符。

选项 D：急性肾小球肾炎。该疾病的典型临床表现为急性肾炎综合征，包括血尿、蛋白尿、水肿、高血压等，与患者症状不符。

选项 E：急性肾盂肾炎。该疾病的主要症状为全身症状（如发热、寒战等）、泌尿系统症状（如尿频、尿急、尿痛等）和腰痛，患者虽有泌尿系统症状，但无发热和腰痛，不符合急性肾盂肾炎的诊断。

40. 【答案】B

【解析】

选项 A：膀胱再造术。这个选项不合适，因为患者已经有了重度的积水伴尿毒症，膀胱再造术并不能马上缓解积水，而且这个手术通常在肾结核治疗 3-6 月后，对侧肾正常的情况下进行。

选项 B：右肾造瘘术。这是正确的选项。患者左肾结核，右肾重度积水伴膀胱挛缩，此时最重要的是引流右侧尿液，减轻梗阻，行右侧肾造瘘是最首选的处理。

选项 C：左肾切除术。这个选项也不合适，因为左肾切除术对于右肾积水来讲，并无作用。

选项 D：膀胱造瘘术。这个选项也不合适，对小容量膀胱来讲，属于禁忌证。

选项 E：抗结核治疗。这个选项虽然是肾结核治疗的一部分，但并非解决肾积水伴尿毒症的措施。

41. 【答案】E

【解析】

A. 针灸：虽然针灸可能对前列腺增生有一定的治疗效果，但不能立即缓解尿潴留的症状，因此不是首选治疗方法。

B. 耻骨上膀胱穿刺：这是一种通过注射器抽吸膀胱内尿液的方法，可以暂时缓解尿潴留，但由于其有创操作，不作为首选。

C. 药物治疗：药物治疗可能对前列腺增生有一定的效果，但不能立即解决尿潴留问题，因此不是首选治疗方法。

D. 耻骨上膀胱造瘘：这是一种在导尿失败后的替代治疗方法，不是首选治疗方法。

E. 导尿并保留导尿管：这是最直接有效的方法来解决尿潴留问题，因此是首选治疗方法。

42. 【答案】E

【解析】

选项 A：降压治疗。虽然患者有高血压症状，但是此时的主要问题是严重的肾功能衰竭，尿毒症症状明显，因此降压治疗虽然是必要的，但不是首选。

选项 B：利尿剂。患者有水肿症状，利尿剂可以帮助排除体内多余的水分，但是在肾功能严重受损的情况下，利尿剂的效果可能会大打折扣，因此也不是首选。

选项 C：纠正贫血。患者的 Hb 值偏低，存在贫血症状，需要进行纠正，但是这也不是当前最紧急的问题，因此也不是首选。

选项 D：禁食疗法。慢性肾脏病患者需要注意饮食，但是并不能通过禁食来解决问题，而且可能会导致患者营养不良，因此这个选项是错误的。

选项 E：血液透析。患者的 SCr 值极高，说明肾脏的排毒功能已经严重受损，出现了尿毒症症状，此时最有效的治疗方法就是进行血液透析，帮助患者清除体内的毒素，因此这是最正确的选择。

43. 【答案】C

【解析】

选项 A：尿道会师术是一种治疗尿道损伤的手术方法，但需要在患者生命体征平稳的状态下进行。当前这位患者处于休克状态，因此不宜进行此种手术。

选项 B：膀胱造瘘术可以解决患者的排尿问题，但在抗休克治疗之前进行可能会加重患者的病情。

选项 C：抗休克治疗后进行膀胱造瘘术是最佳的选择。首先应对患者进行抗休克治疗，稳定其生命体征，然后再进行膀胱造瘘术以解决排尿问题。

选项 D：止痛止血镇静消炎是一般性治疗，对解决患者的排尿问题无效。

选项 E：尿道缝合术一般不用于一期尿道损伤的修复，因为这会增加尿道狭窄的风险。此外，患者当前的生命体征不稳定，不适合进行此类手术。

44. 【答案】D

【解析】

选项 A：经 11 肋间切口，主要用于肾上腺或肾的手术，对于本题患者的情况，由于需要全面探查腹部可能的损伤，该切口无法满足需求，所以不选。

选项 B：经 12 肋下切口，也主要用于肾上腺或肾的手术，同样无法满足全面探查腹部可能的损伤的需求，所以不选。

选项 C：腰背部切口，主要用于腰椎或某些特殊部位的肾脏手术，无法进行全面的腹部探查，所以不选。

选项 D：经腹切口，可以进行全面的腹部探查，包括肾脏和其他可能受伤的腹部脏器，符合本题患者的情况，所以选择 D。

选项 E：胸腹联合切口，主要用于食管癌等疾病的手术，无法进行全面的腹部探查，所以不选。

45. 【答案】E

【解析】

选项 A: 下肢深静脉血栓形成, 主要表现为下肢肿胀、压痛, D-二聚体升高。患者的临床表现并不符合。

选项 B: 下肢动脉粥样硬化, 主要表现为间歇性跛行, 伴肢端麻木和搏动消失等表现, 与患者表现不符。

选项 C: 普萘洛尔的副作用主要为 β 受体阻滞引起的支气管痉挛、呼吸困难以及心跳过缓, 与患者的症状不符。

选项 D: 卡托普利的副作用主要为刺激性干咳, 与患者的症状不符。

选项 E: 辛伐他汀的副作用主要为横纹肌溶解, 会出现肌肉酸痛和肌酸激酶水平升高, 与患者的症状相符。

46. 【答案】B

【解析】

选项 A: 氟康唑是一种抗真菌药物, 主要用于治疗深部真菌感染, 包括念珠菌、曲霉菌和其他真菌感染。但对于口腔白膜这种表面性的白色念珠菌感染, 制霉菌素是更好的选择。

选项 B: 制霉菌素是一种抗真菌药物, 主要用于治疗由念珠菌引起的感染, 特别是口腔和食管的白色念珠菌感染。因此, 对于这种情况, 制霉菌素是最佳的治疗选择。

选项 C: 两性霉素是一种强效抗真菌药物, 主要用于治疗严重的系统性真菌感染。然而, 对于口腔白膜这种轻度的表面性感染, 使用两性霉素可能过于强烈且不必要。

选项 D 和 E: 青霉素和红霉素都是抗细菌药物, 对于真菌感染没有治疗效果。

47. 【答案】E

【解析】

选项 A: 洗胃是中毒早期的处理方式, 此时患者已经出现意识障碍, 洗胃不再适用。

选项 B: 阿托品主要用于缓解 M 样症状, 对 N 受体无明显作用, 此时患者的主要问题是呼吸困难和意识障碍, 需要立即支持呼吸, 而不是药物治疗。

选项 C: 抗休克治疗并不适合这位患者, 因为她的主要问题是呼吸道问题, 需要保持呼吸道通畅。

选项 D: 安定主要用于抗癫痫和抗惊厥的治疗, 此时患者没有这类症状, 因此不应该使用安定。

选项 E: 气管插管是正确的选择, 因为患者出现了呼吸困难和意识障碍, 需要立即进行人工机械通气。

48. 【答案】A

【解析】

A. 纳洛酮: 正确答案。纳洛酮是一种阿片受体拮抗剂, 主要用于治疗阿片类药物中毒的急性期, 能够迅速逆转阿片类药物引起的昏迷、呼吸抑制等症状。

B. 阿托品: 错误选项。阿托品主要用于有机磷杀虫药中毒的解毒治疗, 而非阿片类药物中毒。

C. 解磷定: 错误选项。解磷定也是用于有机磷中毒的药物治疗, 与本题无关。

D. 乙酰胺: 错误选项。乙酰胺是有机氟类灭鼠药的中毒后药物治疗, 与本题无关。

E. 维生素 K1: 错误选项。维生素 K1 用于溴鼠隆中毒后的特效对抗剂, 也是一类灭鼠药中毒后的救治药物, 与本题无关。

49. 【答案】B

【解析】

A. 0.9%氯化钠: 这是等渗液, 主要用于治疗等渗性脱水。患者现在的状况是高渗性缺水, 因此这不是最佳选择。

B. 0.45%氯化钠: 这是低渗液, 用于治疗高渗性脱水。由于患者的血清钠 155mmol/L, 远超过正常范围, 说明患者处于高渗性缺水状态, 因此, 这是最佳选择。

C. 5%碳酸氢钠：这主要用于重症代谢性酸中毒（血浆 HCO_3^- 低于 10mmol/L 或 $\text{pH} < 7.2$ ）和高钾血症的治疗，而非高渗性脱水，所以这不是正确的选择。

D. 1.25%碳酸氢钠、E. 1.86%乳酸钠：这两种都是等渗液，主要用于治疗等渗性脱水，对于高渗性脱水的患者不适用。

50. 【答案】C

【解析】

A 选项：左下肢皮肤牵引，这是一种保守的治疗方式，主要用于不稳定的骨折。但在这个病例中，患者已经出现了股骨头缺血性坏死，仅仅进行牵引是无法解决问题的。

B 选项和 D 选项：切开复位钢板内固定和闭合复位内固定，这两种都是治疗骨折的手术方式。但在这个病例中，患者的问题是股骨头缺血性坏死，而非骨折，所以这两种方法都不适用。

E 选项：卧床休息对症治疗，这是一种非常保守的治疗方式，适用于轻度病变或等待手术的患者。但在这个病例中，患者的病情已经进展到需要手术治疗的阶段，仅仅卧床休息对症治疗无法改善病情。

C 选项：人工关节置换术，这是治疗股骨头缺血性坏死的有效方法。患者的病情已经进展到 ARCO 分期 III 期或 IV 期，已经符合进行人工关节置换术的条件。

51. 【答案】B

【解析】

A. 疼痛，呼吸运动减弱：这是肋骨骨折的常见症状，但并不是最严重的生理改变。因为疼痛和呼吸运动减弱可以通过止痛和呼吸训练来改善。

B. 胸壁软化，反常呼吸：这是多根多处肋骨骨折最严重的生理改变。胸壁失去肋骨支撑，导致胸壁软化和反常呼吸，可能出现低通气状态，严重者可出现呼吸衰竭，危及生命。

C. 咳嗽，血痰：这也是肋骨骨折的常见症状，但并不是最严重的生理改变。咳嗽和血痰通常是由于肺部刺激和损伤引起的，但一般不会对生命造成威胁。

D. 严重皮下气肿：这是一种可能的并发症，但在多根多处肋骨骨折时并不常见。且尽管皮下气肿严重，但不如反常呼吸导致的急性呼吸衰竭危险。

E. 肺内出血：这也是一种可能的并发症，但一般不会对生命造成威胁，而急性呼吸衰竭可短期致命，因此不是最严重的生理改变。

52. 【答案】A

【解析】

A. 紧附于胫侧副韧带：正确。内侧半月板中部外缘与内侧胫副韧带的深层纤维相连，限制了其活动度，因此在膝关节旋转时内侧半月板受力更大，比外侧半月板更易损伤。

B. 屈膝时股骨内旋：错误。屈膝时股骨与胫骨同时反方向旋转，这是导致膝关节旋转的原因，但并非半月板损伤的直接原因。

C. 腘肌不适当地牵拉：错误。腘肌的不适当牵拉并非半月板损伤的直接原因。

D. 形态较小：错误。实际上，内侧半月板较大，外侧半月板较小，所以这个选项的描述是错误的。

E. 运动时被前交叉韧带向后推：错误。内、外侧半月板均与前交叉韧带相连，因此交叉韧带向后推时，内、外侧交叉韧带均受力，因此不具备鉴别点。

53. 【答案】D

【解析】

选项 A：风湿性关节炎的症状主要包括晨僵、关节疼痛肿胀、关节活动受限及畸形等，主要为低热而不是高热。因此，这个选项不符合题目中的症状描述，可以排除。

选项 B: 膝关节结核的症状包括低热、乏力、疲倦、食欲缺乏、消瘦等全身症状, 膝关节位置表浅, 因此肿胀和积液十分明显。这与题目中的症状不符, 可以排除。

选项 C: 骨关节炎主要发生在承重关节, 如膝关节、髋关节等, 症状包括疼痛、僵硬、关节肿大、关节无力、活动障碍, 多见于中老年人。这与题目中的症状和患者年龄不符, 可以排除。

选项 D: 急性血源性骨髓炎的症状包括恶寒、高热、呕吐, 呈脓毒症样发作, 早期患区剧痛, 因疼痛抗拒作主动与被动活动, 局部皮温增高, 有局限性压痛, 肿胀并不明显。这完全符合题目中的症状描述, 是正确答案。

选项 E: 化脓性关节炎多见于儿童, 有寒战高热等症状, 病变关节迅速出现疼痛与功能障碍, 浅表的关节, 如膝关节局部红、肿、热、痛明显, 但题目中无明显肿胀, 因此可以排除。

54. 【答案】D

【解析】

选项 A: 包扎伤口。这是正确的, 因为在紧急情况下, 对于创口出血, 应立即进行止血和包扎, 防止血液过多流失, 同时也可以防止外部污物进入伤口, 引起感染。

选项 B: 妥善地外固定。这也是正确的, 对于骨折的处理, 应该进行妥善的外固定, 以防止骨折端移位, 加重伤情。

选项 C: 首先抢救生命。这是最基本的原则, 任何时候, 都应该以患者的生命安全为第一要务。

选项 D: 外露的骨折端立即复位。这是错误的, 开放性骨折若骨折端已经戳出伤口, 并已污染, 又未压迫重要血管、神经者, 不应将其复位, 以免将污物带到伤口深处。

选项 E: 迅速运往医院。这是正确的, 应尽快将患者送往医院进行专业的医疗救治。

55. 【答案】B

【解析】

选项 A: 关节结核会呈现出结核中毒症状、关节疼痛、肿胀、积液, 并有压痛, X 线上表现为区域性骨质疏松和周围少量钙化的骨质破坏病灶, 周围可见软组织肿胀影。但在这个案例中, 患者的 X 线并未显示这些特征, 因此可以排除。

选项 B: 肩周炎主要表现为肩部疼痛, 同时伴有肩关节活动受限, 严重时患肢不能梳头, X 线肩关节结构正常。在这个案例中, 患者的症状和 X 线结果都符合肩周炎的诊断, 因此这是正确答案。

选项 C: 风湿性关节炎的症状包括晨僵、关节疼痛肿胀、关节活动受限及畸形等, X 线上关节间隙逐渐变窄。但在这个案例中, 患者并未出现这些症状, X 线结果也并未显示关节间隙变窄, 因此可以排除。

选项 D: 肩部肿瘤主要表现为肩部肿块、压痛及活动受限。X 线上可发现肩部有肿块影。但在这个案例中, 患者并未出现肿块, X 线结果也并未显示肩部肿块影, 因此可以排除。

选项 E: 骨关节炎主要表现为疼痛、僵硬、关节肿大、关节无力、活动障碍。X 线上非对称性关节间隙变窄, 软骨下骨硬化和囊性变, 关节边缘增生和骨赘形成。但在这个案例中, 患者并未出现这些症状, X 线结果也并未显示关节间隙变窄等特征, 因此可以排除。

56. 【答案】C

【解析】

A 选项: 腓总神经主要分布在下肢, 负责下肢的感觉和运动, 与题干中的手部症状不符。

B 选项: 桡神经损伤主要表现为伸腕、伸拇、伸指、前臂旋后障碍及手背桡侧(虎口区)感觉异常。典型的畸形是垂腕, 而本题感觉障碍区域及症状不相符。

C 选项: 正中神经损伤常由儿童肱骨髁上骨折和腕部切割伤引起, 表现为拇指对掌功能障碍和手的桡侧半感觉障碍, 特别是示、中指远节感觉消失。本题中, 患者出现了对应的症状, 因此 C 是正确答案。

D 选项: 尺神经损伤表现为环、小指爪形手畸形及手指内收、外展障碍和 Froment 征以及手部尺侧半和尺侧一

个半手指感觉障碍，因此与本题感觉障碍区域及症状不相符。

E 选项：腋神经损伤后主要表现为上肢外展困难、外旋无力，三角肌萎缩、麻痹，同时有肩关节前侧及外侧疼痛、三角肌皮肤表面感觉障碍，与本题症状不相符。

57. 【答案】E

【解析】

A. 软骨肉瘤：这是一种软骨性的恶性肿瘤，常见于成人和老年人，主要症状为疼痛和肿胀。X 线表现为一密度减低的溶骨性破坏，边界不清，病灶内有散在的钙化斑点或絮状骨化影。根据题干，患者年龄及 X 线表现不符合，所以排除。

B. 骨肉瘤：主要症状为局部疼痛，多为持续性，逐渐加重，夜间尤重。X 线可见 Codman 三角或呈“日光射线”形态。本题患者的症状和 X 线表现均与此不符，因此排除。

C. 纤维肉瘤：主要症状为疼痛和肿胀，X 线表现为骨髓腔内溶骨性破坏，呈虫蚀样，边界不清，很少有骨膜反应。而本题的 X 线边界清楚，所以排除。

D. 骨巨细胞瘤：好发于 20-40 岁，女性略多。主要症状为疼痛和肿胀，X 线特征为骨端偏心位、溶骨性、囊性破坏而无骨膜反应，病灶膨胀生长、骨皮质变薄，呈肥皂泡样改变。与本题年龄及 X 线不相符，所以排除。

E. 骨囊肿：常见于儿童和青少年，多数无症状，有时局部有隐痛或肢体局部肿胀。X 线表现为干骺端圆形或椭圆形界限清楚的溶骨性病灶。根据题干，患者年龄、症状及 X 线检查结果均符合骨囊肿的表现，因此最可能为骨囊肿。

58. 【答案】D

【解析】

A 选项：腰椎间盘突出症的典型表现为腰痛及下肢的放射性疼痛，查体可见直腿抬高试验及加强试验阳性，题干中未有此类表现，故不选 A。

B 选项：腰椎骨质增生症是常见的腰椎退变性改变，多见于中老年人，本题患者为年轻人，同时腰椎骨质增生症也不会伴随低热盗汗等结核中毒征象，故不选 B。

C 选项：腰椎骨质一般不会出现变化，因此其骨质不会出现肥大改变，故不选 C。

D 选项：题干信息描述，患者青年男性既往腰腿痛并发有低热盗汗等表现，此为结核中毒的典型表现，而脊柱结核疾患可导致腰腿痛。患者影像学资料显示椎间隙狭窄及椎旁软组织影增宽，此为脊柱结核侵犯椎间盘导致椎间盘狭窄或消失所致，同时椎旁脓肿可致软组织影增宽，故选 D。

E 选项：强直性脊柱炎患者一般有明显的家族遗传史，实验室检查 HLA-B27 常为阳性，影像学检查脊柱常呈竹节样改变，题干中未提及，故不选 E。

59. 【答案】A

【解析】

选项 A：“手法复位不必固定”，是正确答案。桡骨小头半脱位多由牵拉伤引起，一般采用手法复位，无需固定。关键在于避免再次暴力牵拉。

选项 B：“切开复位内固定”，是错误的。因为桡骨小头半脱位并非骨折，不需要进行切开复位和内固定。

选项 C：“切开复位韧带修复”，也是错误的。虽然桡骨小头半脱位时环状韧带可能会受到损伤，但是儿童的韧带修复能力较强，并且这种情况下通常是韧带损伤而非撕裂，所以不需要进行切开和韧带修复。

选项 D：“手法复位外固定”，同样是错误的。手法复位后，一般无需进行外固定。

选项 E：“切开复位外固定”，也是错误的。桡骨小头半脱位并非骨折，不需要进行切开复位和外固定。

60. 【答案】E

【解析】

A 选项：在脊柱骨折患者转运过程中，应选择硬质材料，如木板。在将患者转运至木板上时，应选择平托的方式，此种方式可尽可能保证脊柱的稳定性。因此，A 选项是错误的。

B 选项：同样地，将患者转运至担架上也应选择平托的方式，以保证脊柱的稳定性。因此，B 选项也是错误的。

C 选项：在转移患者时，应多人同时用手平托搬运患者，这样可以保证患者脊柱的稳定性，避免加重脊髓损伤。因此，C 选项是错误的。

D 选项：将患者躯干成一整体滚动也可以保证搬运中脊柱的稳定性，避免在搬运过程中脊柱活动从而加重脊髓损伤。因此，D 选项是错误的。

E 选项：脊柱骨折患者进行搬运时，无论采用哪种搬运方法，都应该注意脊柱部位的稳定性，避免脊柱及脊髓的二次损伤。一人抬足一人抬头的方式使脊柱处于张力状态，此种搬运方式会加重脊髓的损伤，是脊柱骨折患者严禁使用的搬运方式。因此，E 选项是正确的。

61. 【答案】B

【解析】

选项 A：胫骨上 1/3 骨折，由于其较好的血液供应和肌肉覆盖，骨折愈合速度相对较快，不易发生延迟愈合。

选项 B：胫骨中、下 1/3 骨折，这部分的骨折由于血液供应相对较差，且周围软组织较薄，容易发生延迟愈合或不愈合。这是成人最常见的延迟愈合的骨折类型。

选项 C：胫骨中上 1/3 骨折，同样由于较好的血液供应和肌肉覆盖，骨折愈合速度相对较快，不易发生延迟愈合。

选项 D：胫骨下 2/3 骨折，尽管血液供应较差，但因为其承受的压力相对较小，所以延迟愈合的可能性也较小。

选项 E：腓骨颈骨折，腓骨周围有很多肌肉附着，且不承担主要体重，骨折愈合速度较快，不易发生延迟愈合。

62. 【答案】D

【解析】

A. 肥皂泡样变：这是骨巨细胞瘤的特征表现，它在 X 线片上显示为肿瘤边缘不规则、模糊，内部多发性囊变，形成肥皂泡状表现。此选项与本题考察的骨肉瘤无关，所以不选 A。

B. 乒乓球样改变：这也是骨巨细胞瘤的典型表现，其特点是肿瘤边缘薄而透明，类似乒乓球壁。此选项与本题考察的骨肉瘤无关，所以不选 B。

C. “溶冰征”改变：这是恶性淋巴瘤在 X 线平片下的表现，表现为骨质被均匀、逐渐地侵蚀，形成“溶冰征”。此选项与本题考察的骨肉瘤无关，所以不选 C。

D. “日光射线”现象：这是骨肉瘤的典型表现，其特点是肿瘤破坏周围骨皮质，形成新骨，这些新骨在 X 线片上表现为放射状，类似日光射线，所以选 D。

E. “葱皮状”改变：这是尤文肉瘤的典型 X 线表现，其特点是肿瘤周围骨质反应形成层叠的新骨，形成“葱皮”样表现。此选项与本题考察的骨肉瘤无关，所以不选 E。

63. 【答案】A

【解析】

A 选项：孟氏骨折，是尺骨上 1/3 骨干骨折合并桡骨小头脱位，符合题目描述，所以是正确答案。

B 选项：盖氏骨折，是桡骨干下 1/3 骨折合并桡骨小头脱位，与题目描述不符，所以是错误答案。

C 选项：柯力氏骨折，为伸直型的桡骨远端骨折，与题目描述不符，所以是错误答案。

D 选项：巴通氏骨折，是桡骨远端关节面骨折伴腕关节脱位，与题目描述不符，所以是错误答案。

E 选项：斯密氏骨折，为屈曲型的桡骨远端骨折，与题目描述不符，所以是错误答案。

64. 【答案】A

【解析】

A 选项：咪康唑栓是一种常用的抗真菌药，对假丝酵母菌有良好的抑制和杀灭作用，因此是治疗外阴阴道假丝酵母菌病的有效药物。

B 选项：甲硝唑主要用于治疗厌氧菌和原虫感染，对假丝酵母菌无效，因此不适合作为治疗外阴阴道假丝酵母菌病的药物。

C 选项：己烯雌酚主要用于治疗萎缩性阴道炎，对假丝酵母菌无效，因此不适合作为治疗外阴阴道假丝酵母菌病的药物。

D 选项：氢化可的松是一种激素类药物，主要用于治疗各种皮肤病，对假丝酵母菌无效，因此不适合作为治疗外阴阴道假丝酵母菌病的药物。

E 选项：0.5%醋酸液清洗外阴，虽然可以改善阴道环境，但不能针对病因治疗外阴阴道假丝酵母菌病。

65. 【答案】C

【解析】

A. 肾素增多：尿毒症的患者由于肾脏的损伤，会导致肾素-血管紧张素-醛固酮系统（RASS）反馈性地激活，肾素增多会引起血管收缩，从而导致血压升高。但这并非尿毒症患者高血压的主要原因。

B. 促红细胞生成素减少：在尿毒症的患者中，由于肾脏功能丧失，会导致促红细胞生成素的生成减少，从而引发肾性贫血。但这并不是导致尿毒症患者高血压的主要原因。

C. 水钠潴留：尿毒症患者高血压的主要原因是由于肾单位大量丢失，导致水钠潴留和细胞外容量增加，从而引起血压升高。

D. 血管升压素增多：尿毒症的患者由于肾脏的损伤，导致 RASS 系统反馈性地激活，血管升压素增多，血管收缩会导致血压升高，但并非主要原因。

E. 交感神经兴奋：尿毒症的患者由于毒素的蓄积、睡眠障碍等多种因素，会导致患者交感神经活性增强，从而引起血管收缩，导致血压升高，但并非主要原因。

66. 【答案】D

【解析】

选项 A：风湿性关节炎常见于 15 岁的儿童和青少年，常有感染前驱症状，关节疼痛很少持续一个月以上，通常在 2 周内消退。本题中，患者为 25 岁男性，并且腰背疼痛症状持久，因此不符合风湿性关节炎的典型表现。

选项 B：类风湿关节炎以侵蚀性、对称性多关节炎为主要临床表现，以对称性双手、腕、足等多关节肿痛为首发表现，80%发病于 35~50 岁，女性多发，辅助检查可有类风湿因子阳性。而患者为 25 岁男性，以腰背疼痛伴僵硬为主要临床表现，无类风湿因子阳性的辅助检查结果，故诊断暂不考虑类风湿关节炎。

选项 C：脊柱结核患者除疼痛、脊柱活动受限等局部表现外，亦伴有结核全身中毒症状，如午后低热、疲倦、消瘦、盗汗、食欲缺乏与贫血等。而本题中患者的临床表现与之不符，故不考虑该诊断。

选项 D：强直性脊柱炎发病年龄多在 20~30 岁，首发症状常为下腰背痛伴晨僵，查体可见脊柱前屈、后伸、侧弯和转动受限，90%左右的病人 HLA-B27 阳性，X 线片检查脊柱可有“竹节样”变。该患者为 25 岁男性，有腰背疼痛症状，查体见腰背僵硬，提示脊柱活动受限，实验室检查 HLA-B27 阳性，X 线片显示脊柱呈“竹节”样改变，根据上述症状、体征及辅助检查结果，考虑该患者诊断为强直性脊柱炎。

选项 E：腰椎间盘突出症患者亦可出现腰痛及腰部活动受限情况，但查体可见病变椎间隙压痛，直腿抬高试验阳性，可伴有感觉异常、肌力下降等神经系统表现，行 X 线平片检查可表现为完全正常，或腰椎侧弯、椎间隙狭窄情况，而非脊柱呈“竹节”样改变。根据题干信息，该患者诊断不考虑腰椎间盘突出症。

67. 【答案】C

【解析】

选项 A：“不出现关节畸形”，这是错误的。类风湿关节炎的病程进展，会导致关节畸形和功能丧失，因此选

项 A 是错误的。

选项 B: “多发生于儿童和青少年”, 这也是错误的。类风湿关节炎可发生在任何年龄, 但 80% 的患者是在 35-50 岁之间发病, 所以并非多发于儿童和青少年。

选项 C: “常侵犯腕关节和近端指间关节”, 这是正确的。类风湿关节炎的临床表现个体差异大, 但最常见的部位是腕、掌指、近端指间关节。

选项 D: “非对称性”, 这是错误的。类风湿关节炎是一种以侵蚀性、对称性多关节炎为主要临床表现的疾病, 因此选项 D 是错误的。

选项 E: “为感染性疾病”, 这也是错误的。类风湿关节炎是一种全身性自身免疫性疾病, 而非感染性疾病。

68. 【答案】E

【解析】

A 选项: 病程多呈慢性经过。风湿性疾病大多是慢性疾病, 其病程通常较长, 可能需要数月甚至数年才能得到控制。因此, 该选项描述准确。

B 选项: 临床表现差异很大。风湿性疾病的类型和病因多种多样, 因此其临床表现也会有很大的差异。一些病人可能只有轻微的症状, 而另一些病人可能会出现严重的症状。因此, 该选项描述准确。

C 选项: 反复发作与缓解交替出现。风湿性疾病的一个主要特点就是反复发作与缓解交替出现。在疾病活动期, 症状可能会加重; 而在疾病缓解期, 症状可能会减轻或完全消失。因此, 该选项描述准确。

D 选项: 免疫学异常表现复杂。风湿性疾病大多是由于免疫系统错误地攻击自身组织而引起的, 因此, 这些疾病的免疫学表现通常会很复杂。此外, 不同类型的风湿性疾病可能会有不同的免疫学表现。因此, 该选项描述准确。

E 选项: 对治疗反应的个体差异不大。风湿性疾病的治疗反应通常会因人而异。这主要是因为每个人的身体状况、疾病类型和严重程度都可能不同, 因此对治疗的反应也会有所不同。因此, 该选项描述不准确。

69. 【答案】A

【解析】

选项 A: 环磷酰胺。这是正确答案, 环磷酰胺是一种强力的免疫抑制剂, 被广泛用于治疗严重的系统性红斑狼疮, 特别是当患者出现狼疮肾炎时。

选项 B: 甲氨蝶呤。虽然它也是一种免疫抑制剂, 但在治疗 SLE 狼疮肾炎时, 并非首选药物。

选项 C: 长春新碱。它主要用于抗肿瘤治疗, 不是治疗 SLE 的常用免疫抑制剂。

选项 D: 依木兰 (硫唑嘌呤)。它是 SLE 的常用免疫抑制剂之一, 但并非首选药物。

选项 E: 雷公藤。虽然它也是 SLE 的常用免疫抑制剂之一, 但并非首选药物。

70. 【答案】C

【解析】

正确选项 (C): 原发性醛固酮增多症指肾上腺皮质分泌过量醛固酮, 导致体内潴钠、排钾、血容量增多、肾素-血管紧张素系统活性受抑, 临床主要表现为高血压伴低血钾。因此, 如果患者有高血压并且低血钾, 首先应考虑原发性醛固酮增多症。

错误选项 (A): 皮质醇增多症病人有高血压, 同时有向心性肥胖、满月脸、水牛背、皮肤紫纹、毛发增多、血糖增高等表现, 但并无低血钾表现, 所以这个选项是错误的。

错误选项 (B): 嗜铬细胞瘤临床表现变化多端, 典型的发作表现为阵发性血压升高伴心动过速、头痛、出汗、面色苍白, 但并无低血钾, 所以这个选项是错误的。

错误选项 (D): 继发性慢性肾炎的高血压的特点为血压升高伴蛋白尿、血尿和贫血、肾小球滤过功能减退、肌酐清除率下降, 但并无低血钾, 所以这个选项是错误的。

错误选项 (E): 肾动脉狭窄会出现高血压, 体检时在上腹部或背部肋脊角处可闻及血管杂音, 但无低血钾, 所以这个选项是错误的。

71. 【答案】C

【解析】

A. 内分泌疾病: 虽然内分泌疾病如原发性醛固酮增多症、嗜铬细胞瘤等会引起继发性高血压, 但它们并不是最常见的继发性高血压病因。

B. 妊娠期合并高血压: 这种情况下的高血压通常在妊娠期间或分娩后出现, 并且在产后 6 周内消失, 因此也不是最常见的继发性高血压病因。

C. 肾实质性高血压: 这是最常见的继发性高血压病因, 包括急慢性肾小球肾炎、糖尿病肾病、慢性肾盂肾炎、多囊肾以及肾移植后等疾病。这些疾病都可能导致肾单位大量丢失, 引发水钠潴留和细胞外容量增加, 同时激活肾脏 RAAS 系统, 减少排钠。

D. 肥厚型心肌病: 这是一种基因突变导致的心肌疾病, 表现为心肌的非对称增厚, 虽然可能引起高血压, 但不是继发性高血压的常见病因。

E. 糖尿病: 虽然糖尿病患者中高血压的比例较高, 但糖尿病本身并不直接导致高血压, 而是通过并发的糖尿病肾病等方式间接影响血压。

72. 【答案】A

【解析】

A. T₃、T₄ 降低, TSH 增高: 这是甲状腺功能减退的典型指标。甲状腺激素对下丘脑和腺垂体都有负反馈的抑制作用, 甲减时甲状腺激素分泌减少, 导致下丘脑受到的抑制作用降低, TSH 增多, T₄ 和 FT₄ 均降低, 血清 T₃、FT₃ 早期正常, 晚期减低。B. T₃ 降低, T₄、TSH 增高: 这不符合甲状腺功能减退的典型指标, 因为在甲减时, T₃ 和 T₄ 应当降低, 而 TSH 应该增高。C. T₃、T₄ 降低, TSH 降低: 这也不符合甲状腺功能减退的典型指标, 在甲减时, 虽然 T₃ 和 T₄ 会降低, 但是 TSH 应该增高。D. T₃ 增高, TSH 降低: 这是甲状腺功能亢进的典型指标, 与本题考察的甲状腺功能减退相反。E. T₃、T₄、TSH 正常: 这是甲状腺功能正常的指标, 与本题考察的甲状腺功能减退不符。

73. 【答案】E

【解析】

A 选项: T₃、T₄ 降低, TSH 增高, 这是甲状腺功能减退的表现, 与单纯性甲状腺肿不符, 所以排除。

B 选项: T₃ 降低, T₄、TSH 增高, 这种情况在临床上较少见, 也不符合单纯性甲状腺肿的特点, 所以排除。

C 选项: T₃、T₄ 降低, TSH 降低, 这是甲状腺功能减退伴下丘脑-垂体-甲状腺轴功能障碍的表现, 与单纯性甲状腺肿不符, 所以排除。

D 选项: T₃ 增高, TSH 降低, 这是甲状腺功能亢进的表现, 与单纯性甲状腺肿不符, 所以排除。

E 选项: T₃、T₄、TSH 正常, 这是单纯性甲状腺肿的典型表现, 因为单纯性甲状腺肿多数甲状腺功能正常。

74. 【答案】A

【解析】

选项 A: 甲状腺危象, 患者的症状如心悸、消瘦、甲状腺 II 度肿大、血管杂音、高热、腹泻、谵语等都是甲状腺危象的典型表现。此外, 患者的体温和血压也符合甲状腺危象的临床表现。

选项 B: 感染性休克, 虽然患者有高热和低血压, 但并无其他感染性休克的典型症状, 如白细胞增多或 CRP 升高。同时, 感染性休克不会出现甲状腺肿大。

选项 C: 甲状腺功能亢进症合并肠炎, 患者的腹泻可能由甲状腺功能亢进引起, 但并无其他肠炎的明显症状, 如血便, 该诊断依据不足。

选项 D: 甲亢性心脏病, 虽然患者有心动过速、心律不齐等症状, 但主要症状是休克、谵语, 与甲亢性心脏病

的主要症状不符。

选项 E: 急性甲状腺炎, 虽然患者有发热, 但并无甲状腺局部疼痛等急性甲状腺炎的典型症状。

75. 【答案】B

【解析】

A 选项: 餐后 2 小时血糖。这是糖尿病的一个重要诊断指标, 但它并不能替代口服葡萄糖耐量试验 (OGTT)。

B 选项: 用药后测血糖。这种方法会受到药物的影响, 因此不适用于糖尿病的初步诊断。

C 选项: 口服葡萄糖耐量试验。这是诊断糖尿病的“金标准”, 能够反映出患者对于葡萄糖的耐受性, 是最有意义的实验室检查。

D 选项: 糖化血红蛋白。虽然它能反映过去 8-12 周的平均血糖水平, 但不能反映瞬时血糖水平及血糖波动情况, 因此不适用于糖尿病的初步诊断。

E 选项: 24 小时尿糖定量。这种方法不能代表血糖的变化, 因此不适用于糖尿病的初步诊断。

76. 【答案】B

【解析】

选项 A: 重症肌无力主要表现在眼部肌群, 如上眼睑下垂、眼球活动障碍等, 与题目中的病人症状不符, 故不选。

选项 B: 周期性麻痹的典型症状包括双下肢无力且不能活动, 同时伴有血钾偏低。这与题目中病人的症状完全吻合, 应为正确答案。

选项 C: 周围神经炎主要表现为感觉障碍, 通常是糖尿病的常见并发症, 在甲亢中罕见, 因此不选。

选项 D: 甲亢性肌病主要表现为近端肌群肌无力、萎缩, 主要累及肩胛带和骨盆带肌群, 很少累及下肢, 故不选。

选项 E: 肌营养不良症是一种遗传性疾病群, 主要表现为进行性加重的骨骼肌萎缩和无力, 不会出现血钾偏低, 与题目中的病人症状不符, 故不选。

77. 【答案】B

【解析】

选项 A: 双胍类口服降糖药主要通过抑制肝葡萄糖输出、改善外周组织对胰岛素的敏感性、增加对葡萄糖的摄取和利用而降低血糖。其主要副作用为消化道反应, 单独用药极少引起低血糖。

选项 B: 磺脲类口服降糖药主要作用为刺激 β 细胞分泌胰岛素, 其作用于 β 细胞膜上的 ATP 敏感的钾离子通道 (KATP), 促进钙离子内流及细胞内钙离子浓度增高, 刺激含有胰岛素的颗粒外移和胰岛素释放, 使血糖下降。低血糖是其最常见的不良反应。

选项 C: α 葡萄糖苷酶抑制剂通过抑制 α 葡萄糖苷酶从而延迟碳水化合物吸收, 降低餐后高血糖。其常见不良反应为胃肠道反应, 单用本药不引起低血糖。

选项 D: 胰岛素增敏剂通过增加靶组织对胰岛素作用的敏感性而降低血糖, 单独使用时不导致低血糖, 体重增加和水肿是胰岛素增敏剂的常见副作用。

选项 E: GLP-1 受体激动剂与胰腺 β 细胞的 GLP-1 受体结合后, 可葡萄糖依赖性地刺激胰岛素合成和分泌, 减少胰高血糖素释放从而降低血糖。常见的不良反应包括恶心呕吐、腹泻、消化不良、上呼吸道感染和注射部位结节, 低血糖的发生率很低。

78. 【答案】D

【解析】

选项 A: 微血管瘤是糖尿病眼病 I 期的典型表现, 因此 A 选项错误。

选项 B: 机化物增生主要见于糖尿病眼病 V 期, 因此 B 选项错误。

选项 C: 玻璃体积血主要见于糖尿病眼病Ⅳ期, 因此 C 选项错误。

选项 D: 棉絮状软性渗出是糖尿病眼病Ⅲ期的典型表现, 因此 D 选项正确。

选项 E: 视网膜脱离主要见于糖尿病眼病Ⅵ期, 因此 E 选项错误。

79. 【答案】A

【解析】

选项 A: 丙硫氧嘧啶的作用机制是抑制甲状腺过氧化物酶, 阻止碘离子氧化, 从而减少甲状腺激素的合成。这一点与题目描述相符, 因此是正确答案。

选项 B: 丙硫氧嘧啶并不直接降低促甲状腺素 (TSH) 分泌, 而是通过减少甲状腺激素的合成来达到降低 TSH 分泌的效果。因此, 这个选项是错误的。

选项 C: 丙硫氧嘧啶对已经合成的 T₃、T₄ 没有影响, 它的作用主要在于抑制甲状腺激素的合成。因此, 这个选项是错误的。

选项 D: 丙硫氧嘧啶没有破坏甲状腺组织的作用, 它的作用主要在于抑制甲状腺激素的合成。因此, 这个选项是错误的。

选项 E: 丙硫氧嘧啶的独特作用是在周围组织中抑制 T₄ 转化为 T₃, 但这不是其抑制甲状腺素合成的主要机制。因此, 这个选项是错误的。

80. 【答案】C

【解析】

选项 A: 丙硫氧嘧啶在妊娠早期 (1-3 个月) 是首选药物, 因为其对胎儿的致畸作用较小。然而, 丙硫氧嘧啶的肝毒性较大, 对于妊娠 20 周的孕妇, 更安全的选择是甲巯咪唑。

选项 B: 普萘洛尔是一种 β 阻滞剂, 可以快速控制甲亢的临床症状, 但并不直接治疗甲亢, 因此不作为首选药物。

选项 C: 甲巯咪唑是妊娠中期 (4-6 个月) 和晚期 (7-9 个月) 首选的抗甲状腺药物, 因为其肝毒性较小, 对胎儿的影响也较小, 所以是正确答案。

选项 D: 碘剂通常只在手术前和甲状腺危象时使用, 因为它可能会增加甲亢的风险, 所以并不适合作为妊娠期甲亢的首选治疗。

选项 E: 抗甲状腺药包括丙硫氧嘧啶和甲巯咪唑, 这个选项过于宽泛, 不具有指导性, 因此也不是正确答案。

81. 【答案】A

【解析】

选项 A: 胰岛素是 1 型糖尿病的首选治疗药物, 因为这种类型的糖尿病是由于胰岛素绝对缺乏引起的, 必须通过外源性胰岛素补充来控制血糖。

选项 B: 格列喆酮是一种胰岛素增敏剂, 主要用于 2 型糖尿病, 它能提高身体对胰岛素的敏感性。在 1 型糖尿病中, 虽然也可以用于降糖治疗, 但必须联合胰岛素使用, 不是首选药物。

选项 C: 二甲双胍是 2 型糖尿病的一线治疗药物, 它通过促进葡萄糖摄取和利用, 抑制肝脏生成葡萄糖而发挥降糖作用。在 1 型糖尿病中, 虽然可以减少胰岛素用量和控制血糖波动, 但仍需要与胰岛素联合应用, 不是首选药物。

选项 D: 普伐他汀是一种降血脂药物, 主要用于治疗高血脂症, 与糖尿病的治疗无直接关系。

选项 E: 阿卡波糖是一种 α -糖苷酶抑制剂, 适用于以碳水化合物为主要食物成分, 或空腹血糖正常 (或不太高) 而餐后血糖明显升高者。在 1 型糖尿病中, 可以作为辅助用药, 但不是首选药物。

82. 【答案】A

【解析】

A. MRI：正确。股骨头坏死早期 X 线检查可能无明显异常，而 MRI 可以更早地发现股骨头的信号改变，是早期诊断股骨头坏死的有效方法。

B. B 超：错误。B 超主要用于软组织、血管等的检查，对股骨头坏死的诊断价值有限。

C. 关节液检查：错误。关节液检查主要用于关节炎、感染等疾病的诊断，对股骨头坏死的诊断价值有限。

D. 结核菌素试验：错误。结核菌素试验主要用于结核病的筛查和诊断，与本题的疾病情况不符。

E. CT：错误。虽然 CT 能够显示骨质的形态和密度，但对于股骨头坏死的早期诊断，其敏感性不如 MRI。

83. 【答案】A

【解析】

选项 A：股骨头缺血性坏死。这种病症是由于股骨头血供中断或受损，引起骨细胞及骨髓成分死亡及随后的修复，导致股骨头结构改变，股骨头塌陷，引起病人关节疼痛、关节功能障碍的疾病。病因包括创伤性因素（骨折、外伤等）、非创伤性因素（肾上腺糖皮质激素、乙醇中毒等）。根据患者的症状和病史，最可能的诊断就是股骨头缺血性坏死。

选项 B：髋关节结核。这种病症多见于儿童，起病缓慢，有低热、乏力、倦怠、食欲缺乏、消瘦及贫血等全身症状，早期症状为疼痛，随着疼痛的加剧出现跛行。然而，患者并无全身症状，且发病年龄较大，因此，髋关节结核的可能性较小。

选项 C：类风湿关节炎。这是一种以侵蚀性、对称性多关节炎为主要临床表现的慢性、全身性自身免疫性疾病，以对称性双手、腕、足等多关节肿痛为首发表现，常伴有晨僵，可伴有乏力、低热、肌肉酸痛、体重下降等全身症状。但患者仅单侧髋关节疼痛，无晨僵、乏力等症状，故不考虑该诊断。

选项 D：强直性脊柱炎。这种病症以中轴关节受累为主，首发症状常为下腰背痛伴晨僵，症状在夜间休息或久坐时较重，活动后可以减轻，晚期可有腰椎各方向活动受限和胸廓活动度减低。然而，患者无腰背痛及晨僵情况，其髋关节疼痛与体位及活动无明显相关性，未出现腰椎活动受限等情况，故不考虑该诊断。

选项 E：骨关节炎。这是一种以关节软骨退行性变和继发性骨质增生为特征的慢性关节疾病。好发于负重较大的膝关节、髋关节等部位。主要症状为疼痛，活动多时疼痛加剧，休息后好转。X 线检查可见非对称性关节间隙变窄，软骨下骨硬化和囊性变，关节边缘增生和骨赘形成或伴有不同程度的关节积液，部分关节内可见游离体。然而，患者髋部为进行性疼痛，无活动时加剧及休息后好转情况，且 X 线检查未见明显异常，故骨关节炎的诊断不正确。

84. 【答案】C

【解析】

选项 A：口服糖皮质激素是导致股骨头坏死的非创伤性因素之一，而非治疗措施，故该选项错误。

选项 B：髋关节融合是治疗髋关节严重破坏或畸形的一种手术方法，该患者尚未出现上述病变，故无需进行该手术，该选项错误。

选项 C：髓芯减压术可降低骨内压，减轻疼痛，改善静脉回流，有助于血管长入，是股骨头坏死的手术疗法之一。该选项正确。

选项 D：适合进行滑膜切除的疾病有类风湿性关节炎、退行性关节炎以及肿瘤或肿瘤样疾病，该患者为股骨头缺血性坏死，故无需进行该项手术，该选项错误。

选项 E：股骨头坏死的非手术疗法包括保护性负重、药物治疗、物理治疗及康复锻炼等，并非避免负重，故该选项错误。

85. 【答案】D

【解析】

选项 A：股骨颈骨折的典型表现为髋部疼痛，下肢活动受限，不能站立和行走，患肢出现外旋畸形。在本题中，

患者没有出现外旋畸形，因此排除选项 A。

选项 B 和 C：股骨粗隆间骨折和股骨粗隆下骨折的典型表现为明显的外翻畸形及骨折特有体征，而本题中，患者并未出现这些表现，因此排除选项 B 和 C。

选项 D：髋关节后脱位的典型表现为髋关节剧痛，髋关节运动障碍，处于屈曲、内收、内旋畸形状态。本题中，患者的表现符合这一描述，因此选项 D 是正确答案。

选项 E：髋关节前脱位的典型表现为强大暴力所致外伤史，患肢呈外展、外旋和屈曲畸形，与本题的情况不符，因此排除选项 E。

86. 【答案】C

【解析】

选项 A：Hippocrates 法是一种用于肩关节脱位的复位手法，与本题中的髋关节脱位情况不符，所以选项 A 不正确。

选项 B：Kocher 法同样是用于肩关节脱位的复位手法，也与本题中的髋关节脱位情况不符，所以选项 B 不正确。

选项 C：Allis 法，即提拉法，是一种常用的髋关节脱位复位手法。在全身麻醉或椎管内麻醉下进行，需要肌肉完全松弛。因此，对于本题中的髋关节脱位情况，选项 C 是正确的。

选项 D：骨牵引主要用于骨折的治疗，如股骨骨折，胫骨骨折等，与本题中的髋关节脱位情况不符，所以选项 D 不正确。

选项 E：皮肤牵引对于髋关节后脱位应在复位后使用 2-3 周，卧床期间进行股四头肌功能锻炼。但这并非直接的治疗方法，所以选项 E 不正确。

87. 【答案】A

【解析】

选项 A：正确。髋关节后脱位可能合并坐骨神经损伤，出现足下垂、趾背伸无力和足背外侧感觉障碍等症状。

选项 B：错误。股神经在腰丛发出后，在腰大肌与髂肌之间下行，并随同该肌经肌腔隙入股，在股前面分为数支，而本题考察的是髋关节后脱位，故很难损伤到股神经。

选项 C：错误。闭孔神经沿小骨盆侧壁至闭孔管穿出骨盆，随分为前、后 2 支，多见于髋关节前脱位，典型表现包括内收肌大部分功能瘫痪，而本题为髋关节后脱位，可排除。

选项 D 和 E：错误。胫神经是坐骨神经的延续，而腓总神经沿腓窝上外缘经股二头肌内缘下行，至腓骨头后方并绕过腓骨颈，向前穿腓骨长肌起始部，胫神经和腓总神经位于胫腓骨处，可排除。

88. 【答案】C

【解析】

选项 A：骨盆骨折通常由于强大的外部暴力引起，多发生严重的多发伤和休克。虽然骨盆周围有许多动脉和静脉丛，血液供应丰富，但骨折后通常不会延迟愈合。

选项 B：肱骨髁上骨折多发生在 10 岁以下的儿童，骨折可能会损伤内侧的尺神经和外侧的桡神经。如果骨折线穿过骨骺，可能会影响骨骺的发育，导致肘部内翻或外翻畸形。

选项 C：股骨颈骨折后，股骨头的血供可能会受到严重影响，因为旋股内、外侧动脉的分支是股骨头、颈的主要供血来源。这可能导致股骨头缺血性坏死或骨折不愈合。

选项 D：锁骨骨折可能会损伤后方的臂丛神经，但一般不会影响骨折愈合。

选项 E：Colles 骨折是桡骨远端的伸直型骨折，虽然受伤后可出现典型的“银叉”或“刺刀样”畸形，但通常不会影响骨折愈合。

89. 【答案】B

【解析】

选项 A: 骨盆骨折多由强大的暴力外伤引起, 常伴有严重的多发伤和休克, 而不是外翻畸形。

选项 B: 肱骨髁上骨折常发生在 10 岁以下的儿童, 因为在肱骨髁的内侧有尺神经, 外侧有桡神经, 都容易因骨折而受损。此外, 儿童期的肱骨下端有骨骺, 如果骨折线穿过骺板, 可能影响骨骺的发育, 从而导致肘部内翻或外翻畸形。

选项 C: 股骨颈骨折后, 股骨头的血供会受到严重影响, 易发生股骨头缺血性坏死或骨折不愈合, 而非外翻畸形。

选项 D: 锁骨后面有臂丛神经, 如果受到强大的暴力作用, 可能会导致锁骨骨折并损伤臂丛神经, 但不会引起外翻畸形。

选项 E: Colles 骨折是桡骨远端伸直型骨折, 受伤后可能出现“银叉”或“刺刀样”畸形, 而非外翻畸形。

90. 【答案】A

【解析】

这道题目考察的是对髌关节后脱位及其可能合并的神经损伤的理解和判断。

选项 A: 坐骨神经损伤。坐骨神经是最大的身体神经, 从骶骨出发, 经过髌关节, 向下分支到大腿、小腿和脚部。髌关节后脱位时, 由于髌关节的位置和结构, 易导致坐骨神经受压或拉伸, 因此可能产生坐骨神经损伤。这也是本题的正确答案。

选项 B: 股神经损伤。股神经主要在腿部前侧发挥作用, 与髌关节的位置关系不大, 因此在髌关节后脱位中, 股神经损伤的可能性相对较小。

选项 C: 闭孔神经损伤。闭孔神经主要在骨盆内部发挥作用, 髌关节后脱位更多影响的是骨盆外部的神经, 因此闭孔神经损伤的可能性不大。

选项 D 和 E: 胫神经和腓总神经损伤。这两种神经主要在腿部下半部分发挥作用, 与髌关节的位置关系不大, 因此在髌关节后脱位中, 胫神经和腓总神经损伤的可能性相对较小。

91. 【答案】D

【解析】

选项 A (错误): 胫骨上 1/3 骨折, 可能导致胫后动脉损伤, 引发下肢严重血液循环障碍, 从而导致骨的缺血性坏死。因此, 这与题目中的胫骨下 1/3 骨折不符。

选项 B (错误): 同样, 胫骨上 1/3 骨折可能会导致血管损伤, 但并非胫骨下 1/3 骨折的主要并发症。

选项 C (错误): 腓总神经由腘窝后、外侧斜向下外方, 经腓骨颈进入腓骨长、短肌及小腿前方肌群, 因此腓骨颈有移位的骨折可引起腓总神经损伤, 而不是胫骨下 1/3 骨折。

选项 D (正确): 胫骨下 1/3 处, 由于血液供应减少和几乎无肌肉附着, 远端获得的血液循环很少, 所以骨折愈合较慢, 容易出现延迟愈合或不愈合的情况。

选项 E (错误): 小腿的肌筋膜与胫骨、腓骨和胫腓骨间膜一起构成四个筋膜室, 胫骨中 1/3 骨折后出血, 可能引发骨筋膜室综合征, 但这并非胫骨下 1/3 骨折的主要并发症。

92. 【答案】C

【解析】

选项 A: 尺骨骨折, 这个选项不正确。尺骨骨折是指尺骨的连续性和完整性中断, 可能由外力、暴力打击引起, 也可能由间接的暴力扭转引起骨头断裂, 伴或不伴桡骨小头脱位。在本题中, 尺骨骨折并不能准确描述病人的情况, 因为除了尺骨骨折, 还伴有桡骨小头脱位。

选项 B: Galeazzi 骨折, 这个选项也不正确。Galeazzi 骨折是指桡骨干下 1/3 骨折合并尺骨小头脱位。与题目中的尺骨近端 1/3 骨折伴桡骨小头脱位不符。

选项 C: Monteggia 骨折, 这个选项正确。Monteggia 骨折是指尺骨上 1/3 骨干骨折可合并桡骨小头脱位, 与题目中的情况完全相符。

选项 D: Colles 骨折, 这个选项不正确。Colles 骨折多为腕关节处于背伸位、手掌着地、前臂旋前时受伤。X 线拍片可见骨折远端向桡骨、背侧移位, 近端向掌侧移位, 这与题目中描述的情况不符。

选项 E: 肘关节脱位, 这个选项不正确。肘关节脱位是指摔倒手掌着地或受外力时, 暴力沿尺、桡骨向近端传导, 尺骨鹰嘴处产生杠杆作用, 关节囊撕裂, 使尺、桡骨向肱骨滑车内脱出, 这与题目中描述的情况不符。

93. 【答案】A

【解析】

选项 A: 新月体性肾小球肾炎。这个选项是正确的。患者的临床表现, 包括血尿、蛋白尿、水肿、高血压以及肾功能快速恶化, 都符合急进性肾小球肾炎的特点。加上 B 超显示双肾增大, 这进一步支持了新月体性肾小球肾炎的诊断。

选项 B: 急性肾盂肾炎。这个选项是错误的。急性肾盂肾炎主要表现为发热、寒战、腰痛以及尿频、尿急、尿痛等症状, 这与患者的临床表现不符。

选项 C: 微小病变型肾炎。这个选项是错误的。微小病变型肾炎主要表现为大量蛋白尿和低白蛋白血症, 而患者的症状并未完全符合。

选项 D: 膜性肾小球肾炎。这个选项是错误的。膜性肾小球肾炎主要表现为肾病综合征, 包括大量蛋白尿、低白蛋白血症、水肿和高脂血症, 与患者的临床表现不符。

选项 E: 系膜增生性肾小球肾炎。这个选项是错误的。系膜增生性肾小球肾炎主要表现为肾病综合征, 包括大量蛋白尿、低白蛋白血症、水肿和高脂血症, 与患者的临床表现不符。

94. 【答案】B

【解析】

A. 直肠癌: 直肠癌的常见症状包括便血、便频、便细、里急后重等, 肿块以直肠为中心。此患者的症状与直肠癌不符, 因此排除。

B. 前列腺癌: 此患者中老年男性, 有下尿路梗阻症状(排尿困难), 直肠指检前列腺增大, 质地硬, 超声提示前列腺结节, 这些都是前列腺癌的典型表现, 因此该选项正确。

C. 睾丸肿瘤: 睾丸肿瘤多发生于青壮年男性, 典型表现为病侧阴囊内单发无痛性肿块。此患者的症状与睾丸肿瘤不符, 因此排除。

D. 膀胱癌: 膀胱癌一般表现为无痛性全程肉眼血尿, 肿瘤位于膀胱区。此患者的症状与膀胱癌不符, 因此排除。

E. 前列腺增生症: 前列腺增生症的典型表现为前列腺表面光滑, 质韧有弹性, 边缘清楚, 中间沟变浅或消失。此患者的症状与前列腺增生症不符, 因此排除。

95. 【答案】D

【解析】

选项 A: 抗感染。虽然患者有发热症状, 可能存在感染, 但这只是一般的对症治疗, 不能作为首选处理方法。

选项 B: 严密观察随访。考虑到恶性肿瘤对身体健康的危害, 应尽早识别并进行治疗, 因此该选项不妥当。

选项 C: 导尿管导尿。虽然这个方法可以缓解患者排尿困难, 但它并不是首选处理方法。

选项 D: 穿刺活检。这是病理确诊前列腺癌的主要方法。对于这个患者来说, 首先需要明确是否为前列腺癌, 因此这是首选处理方法。

选项 E: 化疗。化疗在晚期前列腺癌, 尤其是去势抵抗性前列腺癌(CRPC)的治疗中具有价值, 但在明确诊断之前, 化疗并不是首选处理方法。

96. 【答案】D

【解析】

选项 A: 左肾造瘘术适用于并发对侧输尿管扩张肾积水明显者, 而本题患者的左肾显影尚好, 仅伴轻度肾积水, 不符合左肾造瘘术的手术指征, 因此排除。

选项 B: 虽然患者曾有肾结核病史, 但已经进行了抗结核治疗超过 6 个月, 尿常规白细胞正常, 提示膀胱结核已痊愈, 因此无需继续抗结核治疗, 排除。

选项 C: 左输尿管皮肤造瘘术适用于并发对侧输尿管扩张肾积水明显者, 与本题患者不符, 排除。

选项 D: 患者肾结核并发挛缩膀胱, 已切除患肾, 并已行抗结核治疗大于 6 个月, 尿常规白细胞正常, 提示膀胱结核已痊愈, 静脉尿路造影见左肾显影尚好, 轻度肾积水, 符合膀胱扩大术手术指征, 因此选择。

选项 E: 膀胱造瘘术适用于并发对侧输尿管扩张肾积水明显者, 与本题患者不符, 排除。

97. 【答案】A

【解析】

选项 A: 经尿道膀胱镜取石或碎石是对于小于 2~3cm 的膀胱结石的首选治疗方式, 因此是正确答案。

选项 B: 大量饮水无法使膀胱结石排出, 因此不是正确答案。

选项 C: 多饮水+药物治疗无法解决膀胱结石问题, 因此不是正确答案。

选项 D: 膀胱切开取石是传统的开放手术方式, 适用于结石过大、过硬或膀胱憩室病变, 但对于本题中的 1.8cm 结石来说, 不是首选方案, 因此不是正确答案。

选项 E: 服用中药排石无法针对性地解决膀胱结石问题, 因此不是正确答案。

98. 【答案】B

【解析】

A. 毛细血管血压增高: 这是心源性水肿的常见原因, 如心功能不全。在这种情况下, 毛细血管内的流体静压增高, 促进了组织液的生成。但这与本题的病例不符, 所以不选 A。

B. 血浆胶体渗透压降低: 这是肾病性水肿的主要原因。由于大量蛋白尿, 血浆蛋白过低, 导致血浆胶体渗透压降低, 从而使液体从血管内渗入组织间隙, 产生水肿。这与本题的病例相符, 所以答案为 B。

C. 淋巴回流受阻: 这会导致淋巴水肿, 常见于淋巴管和淋巴结慢性炎症、肉芽肿形成、丝虫虫体等引起淋巴系统阻塞。但这与本题的病例不符, 所以不选 C。

D. 组织液静水压降低: 这会使液体由毛细血管外向内重吸收力量减弱, 液体由毛细血管移至组织液内, 但对于组织液的生产影响较小。所以不选 D。

E. 组织液胶体渗透压升高: 当毛细血管通透性异常增高, 血浆蛋白随液体渗出毛细血管, 致组织胶体渗透压升高, 有效滤过压增大, 结果导致组织液生成过多而出现水肿, 常见于严重烧伤、化脓性感染、轻中度热损伤, 或者是 X 线、紫外线照射, 以及某些细菌毒素等。但这与本题的病例不符, 所以不选 E。

99. 【答案】E

【解析】

A 选项: 1 周内, 错误。急性肾小球肾炎患者在病发初期, 血清 C3 及总补体会出现下降, 但是这个过程并不会在 1 周内就恢复正常。

B 选项: 2 周内, 错误。同样, 补体的恢复需要一个相对较长的时间, 2 周内恢复正常的可能性较小。

C 选项: 4 周内, 错误。虽然补体恢复正常的已经相对延长, 但是对于急性肾小球肾炎患者来说, 4 周内恢复正常仍然较为困难。

D 选项: 6 周内, 错误。尽管时间已经进一步延长, 但是对于急性肾小球肾炎患者来说, 补体在 6 周内恢复正常的可能性仍然较小。

E 选项：8 周内，正确。急性肾小球肾炎患者的血清 C3 及总补体在病发初期会下降，一般在 8 周内可以逐渐恢复正常。

100. 【答案】D

【解析】

选项 A：2 点、7 点、11 点，这不是内痔的典型好发部位，所以此选项错误。

选项 B：2 点、6 点、10 点，这同样不是内痔的典型好发部位，所以此选项错误。

选项 C：3 点、9 点、12 点，虽然包含了 3 点，但是缺少了 7 点和 11 点，所以此选项错误。

选项 D：3 点、7 点、11 点，这是内痔的典型好发部位，所以此选项正确。

选项 E：4 点、8 点、12 点，这同样不是内痔的典型好发部位，所以此选项错误。

101. 【答案】B

【解析】

A. 恶化型心绞痛：疼痛的频率、程度、诱发因素经常变动，进行性恶化。主要是心肌缺血严重，病变局部并没有血栓形成，无需溶栓。

B. ST 段抬高型心肌梗死：紧急溶栓适用于 ST 段抬高型心肌梗死，可以开通闭塞的冠状动脉，使得心肌得到再灌注，挽救濒临坏死的心肌或缩小心肌梗死的范围，减轻梗死后心肌重塑。

C. 非 ST 段抬高型心肌梗死：以白色血栓为主，溶栓主要溶的是红色血栓，所以不会起到溶栓的效果，还可能增加出血等副作用，增加病人的危险。

D. 初发型心绞痛：病人过去未发生过心绞痛或心肌梗塞，现在发生由心肌缺血缺氧引起的心绞痛，但休息症状可好转。此时病变局部并没有血栓形成，无需溶栓。

E. 变异型心绞痛：由冠状动脉短暂痉挛引起的心肌缺血、缺氧，休息时也可发病，但病变局部并没有血栓形成，无需溶栓。

102. 【答案】A

【解析】

A. 恶化型心绞痛：在 1 个月内心绞痛的频率、程度、时限增加，呈进行性恶化的心绞痛称为恶化型心绞痛。这里的患者原为稳定型心绞痛患者，在同等体力活动下心脏症状发作时间延长，符合恶化型心绞痛的特点。

B. ST 段抬高型心肌梗死：由于心脏的供应血管有急性血栓形成，突然导致相应的区域出现透壁性心肌梗死。主要表现突发的剧烈胸痛，含服硝酸甘油不缓解，与题干患者不符合。

C. 非 ST 段抬高型心肌梗死：冠心病急性冠脉综合征的一种形式，通常是由冠状动脉粥样硬化斑块破裂，引起血栓形成导致。症状表现为剧烈胸痛，硝酸甘油不缓解，心电图 ST 不抬高，而是压低或者 T 波倒置。题干中患者主要是发病时间延长，无其他增加的严重表现，如冒汗、晕厥等，故应考虑恶化型心绞痛，暂无血栓形成可能。

D. 初发型心绞痛：指病人过去未发生过心绞痛或心肌梗塞，而现在发生由心肌缺血缺氧引起的心绞痛，时间尚在 1~2 个月内，与题干不符，题干患者已是稳定性心绞痛。

E. 变异型心绞痛：发作与活动无关，疼痛多发生在安静时，发作时心电图 ST 段抬高，发作过后 ST 段下降，不出现病理 Q 波。与题干患者情况不符。

103. 【答案】C

【解析】

A. β 受体阻断药：在急性左心衰中禁用，因其有负性肌力、负性心率作用，会加重肺水肿，加重患者心衰症状。所以此选项不对。

B. 地高辛：急性心肌梗死禁用洋地黄制剂如地高辛。此选项也不对。

C. 硝普钠：硝普钠是动静脉血管扩张剂，起效快，能很好的改善心衰情况。符合题干的需求，因此是正确答案。

案。

D. 卡托普利口服：卡托普利主要用于降血压，但题干患者主要是改善心功能，其作用不大。所以此选项不对。

E. 硝酸甘油：硝酸甘油可以扩张小静脉，降低回心血量，使左室舒张末压及肺血管压降低，但效果不如硝普钠快速明显。所以此选项也不对。

104. 【答案】D

【解析】

选项 A：急性心肌梗死的典型特征是胸骨后压榨性疼痛和心电图的相邻导联 ST 段弓背向上型抬高，这与题干中的病例描述不符。因此，选项 A 是错误的。

选项 B：扩张型心肌病一般有较长的病史，主要表现为活动时呼吸困难和活动耐量下降，而且没有前驱感染史，这与题干中的病例描述不符。因此，选项 B 是错误的。

选项 C：风湿性二尖瓣关闭不全的特点是突发呼吸困难，心尖区全收缩期吹风样杂音，这与题干中的病例描述不符。因此，选项 C 是错误的。

选项 D：患者有“感冒”史，持续发热一周，这是前驱感染史。目前存在活动后心慌、气短、胸痛等症状，提示疾病影响到心功能。查体频发早搏，听诊奔马律及 III 级全收缩期杂音，CK-MB 升高提示心肌损伤。这些都是急性病毒性心肌炎的典型表现。因此，选项 D 是正确的。

选项 E：急性风湿热的临床表现主要为游走性关节炎、心脏炎等，而患者无上述症状，可以排除。因此，选项 E 是错误的。

105. 【答案】C

【解析】

A. 静脉注射利多卡因：利多卡因是一种抗心律失常药物，主要用于治疗室性心律失常，但在有明显血流动力学障碍的情况下，其可能导致低血压，因此不适用于本题患者。

B. 静脉注射普鲁卡因酰胺：普鲁卡因酰胺同样是抗心律失常药物，主要用于治疗室性心律失常，但同样在有血流动力学障碍的情况下可能导致低血压，所以不适用。

C. 直流电复律：直流电复律是室性心动过速合并血流动力学紊乱的首选治疗方法，能迅速恢复正常心律，改善血流动力学状态，因此是正确选项。

D. 静脉注射普罗帕酮：普罗帕酮是一种 β 受体阻滞剂，虽然能用于无显著血流动力学障碍的室速复律，但在有明显血流动力学障碍的情况下，可能导致低血压，因此不适用。

E. 静脉注射胺碘酮：胺碘酮是一种抗心律失常药物，主要用于治疗室性和房性心律失常，但在有明显血流动力学障碍的情况下，可能导致低血压，因此不适用。

106. 【答案】C

【解析】

选项 A：毛花苷丙和选项 B：地高辛都属于洋地黄类药物，这类药物在心力衰竭中主要的作用是减慢心室率，改善症状。在 ACEI (ARB)、 β 受体拮抗剂、MRA 治疗后仍有症状，或者不能耐受 β 受体拮抗剂的扩心病患者中，洋地黄类药物可以起到一定的疗效。但是，对于本题中的患者来说，其主要问题是体液潴留，洋地黄类药物无法改善这一症状，因此选项 A 和选项 B 都不是最佳选择。

选项 C：呋塞米是利尿剂，能够通过增加尿量来减少体液潴留，改善患者的症状。在本题中的患者，由于伴有肝大、下肢水肿等体液潴留的症状，因此使用呋塞米是最佳的治疗选择。

选项 D：硝普钠是一种可扩张血管的药物，能够降低血压，但是对于本题中的患者，其主要问题是体液潴留，而硝普钠并不具有利尿作用，因此不是最佳的治疗选择。

选项 E：高流量吸氧是心衰病人的一种常规治疗手段，但是对于本题中的患者，其主要问题是体液潴留，高流

量吸氧无法改善这一症状，因此也不是最佳的治疗选择。

107. 【答案】A

【解析】

选项 A：主动脉瓣膜置换术是治疗成人主动脉瓣狭窄的主要方法，特别是对于有心绞痛、晕厥、心力衰竭症状的患者。本题中，患者出现快走时心前区憋闷，已经出现心功能不全，因此首选人工瓣膜置换术。

选项 B：主动脉瓣球囊成形术主要用于高龄、有心力衰竭等手术高危病人，用于改善左心室功能和症状。本题中患者并非手术高危病人，因此不选此项。

选项 C：心脏移植主要是针对晚期充血性心力衰竭和严重冠状动脉疾病进行的外科移植手术。本题中患者还未出现严重的心力衰竭情况，可以优先选择瓣膜置换。

选项 D：冠状动脉搭桥术是针对冠脉狭窄的血管采取的一种治疗方案，保证血流通畅，改善心肌供血。本题中患者主要是瓣膜病变，此治疗方法不适合。

选项 E：主动脉瓣修补术可用于主动脉瓣狭窄患者的治疗，但主动脉瓣膜置换术是首选方法。

108. 【答案】B

【解析】

A. 高压性气胸：此病的特点是突发胸痛或呼吸困难，X 线可见明确的气胸线，即萎缩肺组织与胸膜腔内的气体交界线，呈外凸线条影，气胸线外为无肺纹理的透光区，线内为压缩的肺组织，心电图无典型表现，故可排除。

B. 急性心包炎：患者中年女性，急性起病，剧烈胸痛伴发热，心电图提示 ST 段除 aVR 导联以外呈弓背向下型抬高，此为心包炎的心电图表现之一。故综上考虑诊断急性心包炎。

C. 急性心肌梗死：急性心肌梗死的典型心电图特点为相邻导联 ST 段弓背向上抬高，而不是弓背向下，故可排除。

D. 主动脉夹层动脉瘤破裂：此病的疼痛为撕裂样，程度较剧烈，多位于胸骨后或背部，可向下肢放射，超声心动图有助于诊断，增强 CT 有助于揭示破口所在位置。与患者症状不符，可排除。

E. 变异型心绞痛：此病可出现胸痛症状，但无发热，且 ST 段表现为一过性抬高，故可排除。

109. 【答案】A

【解析】

A. 左冠状动脉前降支：正确答案。左前降支以接近直角的角度从左冠状动脉发出，当心脏收缩时前降支随之弯曲，心脏舒张时随之伸直。左房、左室的大部分是靠前降支供血的，故前降支内的血流量较大，易导致内皮受损，形成动脉粥样硬化斑块，发生血管堵塞。

B. 右冠状动脉：错误选项。虽然右冠状动脉也可能发生堵塞，但由于其血流量相对较小，堵塞的概率低于左冠状动脉前降支。

C. 左冠状动脉主干：错误选项。左冠状动脉主干的堵塞虽然会导致严重的心肌梗死，但其发生频率低于左冠状动脉前降支。

D. 右冠状动脉加左冠状动脉回旋支：错误选项。这两个部位的堵塞虽然也会引起心肌梗死，但其发生频率低于左冠状动脉前降支。

E. 右冠状动脉主干：错误选项。右冠状动脉主干的堵塞虽然也会引起心肌梗死，但其发生频率低于左冠状动脉前降支。

110. 【答案】B

【解析】

选项 A：洋地黄中毒可以引起室上性心动过速，但这并不是最常见的心律失常。

选项 B：洋地黄中毒最常见的心律失常是室性期前收缩二联律。洋地黄对心肌有直接作用，可引起自律性增高

和传导性降低，从而导致室性期前收缩二联律。

选项 C：洋地黄中毒可以引起心房纤颤，但这并不是最常见的心律失常。

选项 D：洋地黄中毒可以引起房室传导阻滞，但这并不是最常见的心律失常。

选项 E：洋地黄中毒可以引起房性期前收缩，但这并不是最常见的心律失常。

111. 【答案】E

【解析】

选项 A：胸骨右缘第二肋间收缩期吹风样杂音是主动脉瓣狭窄的典型体征，而非二尖瓣狭窄。

选项 B：胸骨左缘第二肋间连续机械样杂音是动脉导管未闭的典型体征，而非二尖瓣狭窄。

选项 C：胸骨左缘第三肋间舒张期叹气样杂音是主动脉瓣关闭不全的典型体征，而非二尖瓣狭窄。

选项 D：心尖部收缩期吹风样杂音是二尖瓣关闭不全的典型体征，而非二尖瓣狭窄。

选项 E：心尖部舒张期隆隆样杂音是二尖瓣狭窄的典型体征，因此选 E。

112. 【答案】E

【解析】

A. 三尖瓣关闭不全：三尖瓣关闭不全会导致右心室血流有一部分返流入右心房，从而增加右心房的压力，而非左心室的前负荷。

B. 高血压：高血压主要会引起左心室后负荷（即压力负荷）增加，因为左心室需要克服更大的阻力来泵出血液。

C. 主动脉瓣狭窄：主动脉瓣狭窄时，左心室泵出血液的压力会增大，因此主要引起左心室后负荷（即压力负荷）增加。

D. 二尖瓣狭窄：二尖瓣狭窄会导致血流主要积聚在左心房中，从而引起左心房容量负荷增加，而非左心室的前负荷。

E. 二尖瓣关闭不全：二尖瓣关闭不全时，左心室每搏喷出的血流一部分会返流入左心房，使得前向血流减少，从而增加左心室的前负荷（也就是容量负荷）。

113. 【答案】C

【解析】

选项 A：奇脉是吸气时脉搏显著减弱或消失，常见于右心衰竭、心包积液、缩窄性心包炎及严重哮喘，不是缩窄性心包炎的特异性体征。

选项 B：颈静脉怒张提示静脉压增高，见于右心功能不全、缩窄性心包炎、心包积液、限制性心肌病或者上腔静脉综合征，不是缩窄性心包炎的特异性体征。

选项 C：心包叩击音是缩窄性心包炎最具有特异性的体征，由于心包增厚，阻碍心室舒张以致心室在舒张过程中被迫骤然停止，导致室壁震动而产生的声音。

选项 D：肝大可以见于肝源性水肿、心源性水肿和营养不良性水肿，不是缩窄性心包炎的特异性体征。

选项 E：心包炎积液量大时可于左肩胛骨下出现叩浊音，听诊闻及支气管呼吸音，称为心包积液征(Ewart 征)，并非缩窄性心包炎的特异性体征。

114. 【答案】B

【解析】

选项 A：二尖瓣狭窄通常是由风湿性心脏病引起的，而非心肌梗死的直接并发症。

选项 B：急性心肌梗死最常见的并发症是二尖瓣关闭不全，可能是由于乳头肌功能失调或断裂导致的，发生率可以高达 50%。

选项 C：心肌梗死后的 1-2 周内，可能会出现动脉栓塞，但其发生率（1%-6%）远低于二尖瓣关闭不全。

选项 D: 心肌梗死后可能会形成心室壁瘤, 主要发生在左心室, 但其发生率 (5%-20%) 也不如二尖瓣关闭不全常见。

选项 E: 心肌梗死后综合征在心梗数周至数月后出现, 可能表现为心包炎、胸膜炎、肺炎等, 可能与自身免疫有关, 但其发生率 (1%-5%) 远低于二尖瓣关闭不全。

115. 【答案】C

【解析】

A. 6 个月: 虽然急性心肌梗死支架术后, 病人需要长期服用抗血小板药物, 但服用双联抗血小板药物的时间至少为 12 个月, 而非 6 个月。

B. 8 个月: 同样, 此选项的时间长度也不足, 不符合双联抗血小板药物的最低服用时长。

C. 12 个月: 这是正确答案。急性心肌梗死支架术后, 病人需要至少连续服用 12 个月的双联抗血小板药物, 以降低心肌梗死和死亡的发生。

D. 18 个月: 虽然服用双联抗血小板药物的时长可以超过 12 个月, 但至少应服用 12 个月。因此, 这个选项并不准确。

E. 24 个月: 同 D 选项, 这个选项的时间长度超过了最低要求, 但并不代表最低服用时长。

116. 【答案】B

【解析】

A 选项: 低氯、高钾性碱中毒。此选项错误, 因为长期呕吐会导致胃液 (含有大量的氯和钾) 丧失, 从而引发低氯和低钾, 而非高钾。另外, 由于胃液是酸性的, 其丧失会导致体内环境偏向碱性, 而不是酸性。

B 选项: 低氯、低钾性碱中毒。此选项正确, 长期呕吐会导致胃液 (含有大量的氯和钾) 丧失, 从而引发低氯和低钾, 并且由于胃液是酸性的, 其丧失会导致体内环境偏向碱性。

C 选项: 低氯、高钾性酸中毒。此选项错误, 因为长期呕吐会导致胃液 (含有大量的氯和钾) 丧失, 从而引发低氯和低钾, 而非高钾。另外, 由于胃液是酸性的, 其丧失会导致体内环境偏向碱性, 而不是酸性。

D 选项: 低氯、低钾性酸中毒。此选项错误, 因为虽然长期呕吐会导致胃液 (含有大量的氯和钾) 丧失, 从而引发低氯和低钾, 但是由于胃液是酸性的, 其丧失会导致体内环境偏向碱性, 而不是酸性。

E 选项: 低氯、低钾血症。此选项错误, 虽然长期呕吐确实会导致低氯和低钾, 但是这并不能完全解释患者的全部症状, 因为还缺少了“碱中毒”这一重要的部分。

117. 【答案】D

【解析】

A. 心包积液: 心包积液的主要症状是呼吸困难, 大量积液还可导致静脉回流受阻, 发生体循环淤血。但是这并不符合题目的病人腹胀和脐周静脉曲张的症状, 所以 A 选项不正确。

B. 上腔静脉阻塞: 上腔静脉阻塞主要表现为上肢及面部水肿及青紫, 胸壁静脉曲张。这与题目中的病人症状不符, 所以 B 选项不正确。

C. 下腔静脉阻塞: 下腔静脉阻塞的主要症状是下肢水肿和静脉曲张。这并不符合题目中的病人症状, 所以 C 选项不正确。

D. 门静脉高压: 门静脉高压引起的临床表现是门体侧支循环的形成, 这与题目中的病人症状相符, 所以 D 选项是正确答案。

E. 肝静脉阻塞: 肝静脉阻塞, 又称布加综合征, 常伴有下腔静脉高压为特点的一种肝后门脉高压症。但是, 这与题目中的病人症状不完全符合, 所以 E 选项不正确。

118. 【答案】C

【解析】

选项 A: 重型病毒性肝炎可以引起脾功能亢进, 后者可以破坏血小板, 使血小板数量减少, 但主要影响血栓形成, 并不是出血的主要原因。

选项 B: 毛细血管脆性增加通常与过敏性紫癜相关, 这是一种常见的血管变态反应性疾病, 但并非重型病毒性肝炎出血的主要原因。

选项 C (正确答案): 血浆中的凝血因子大部分在肝中合成, 重型病毒性肝炎时, 凝血因子生成减少, 可出现凝血功能障碍。这是重型病毒性肝炎出血的最主要原因。

选项 D: 肝素样抗凝物增多见于肝素治疗、AT 缺乏症、严重肝脏疾病、DIC、SLE、肾病综合征、出血热、急性白血病、恶性肿瘤等疾病, 但并非重型病毒性肝炎出血的主要原因。

选项 E: 骨髓造血功能受抑制多见于慢性再生障碍性贫血, 但并非重型病毒性肝炎出血的主要原因。

119. 【答案】E

【解析】

选项 A: 腺癌是一种源自腺体或腺状结构的恶性肿瘤, 它在膀胱癌中的发病率相对较低, 只占膀胱肿瘤的 2%~3%, 因此此选项不正确。

选项 B: 鳞状细胞癌起源于鳞状上皮, 虽然可以发生在膀胱, 但其在膀胱癌中的比例同样只有 2%~3%, 所以此选项也不正确。

选项 C: 非上皮性肿瘤指的是起源于非上皮组织 (如肌肉、神经、血管等) 的肿瘤, 这类肿瘤在膀胱癌中的比例极低, 因此此选项不正确。

选项 D: 小细胞癌主要发生在肺部, 是一种高度恶性的肿瘤, 虽然理论上可以发生在任何器官, 但在膀胱中十分罕见, 所以此选项不正确。

选项 E: 移行细胞癌起源于移行上皮, 是膀胱癌最常见的类型, 约占膀胱肿瘤的 95%, 因此此选项是正确答案。

120. 【答案】C

【解析】

这道题目考察的是药理学中非甾体抗炎药塞来昔布的应用。

选项 A: 胃溃疡。塞来昔布虽然是选择性 COX-2 抑制药, 相比传统的非甾体抗炎药对胃黏膜损害较小, 但仍不适用于胃溃疡治疗。因为塞来昔布还是有一定的胃黏膜损害作用, 可能加重胃溃疡。

选项 B: 痛风。非甾体抗炎药确实可以用于缓解急性痛风关节炎症状, 但塞来昔布并非首选药物。常用药物有吲哚美辛、双氯芬酸、依托考昔等。

选项 C: 骨关节炎。此为正确答案。塞来昔布是选择性的 COX-2 抑制药, 具有抗炎、镇痛和解热作用, 可用于风湿性、类风湿关节炎和骨关节炎的治疗。

选项 D: 支气管哮喘。非甾体抗炎药在支气管哮喘的治疗中并无明显效果, 且塞来昔布可能引起哮喘患者症状加重。

选项 E: 肾绞痛。肾绞痛的治疗以解痉止痛为主, 虽然塞来昔布具有镇痛作用, 但非首选药物。常用的止痛药物包括非甾体类镇痛抗炎药如双氯芬酸钠、吲哚美辛及阿片类镇痛药如哌替啶、曲马多等。

121. 【答案】C

【解析】

选项 A: 干酪样坏死多发生在结核病中, 因病灶中含脂质较多, 坏死区呈黄色, 状似干酪。这与患者的症状不符。

选项 B: 固缩性坏死是凋亡的老说法, 凋亡是活体内局部组织中单个细胞程序性细胞死亡, 凋亡多为散在的单个细胞的主动性死亡, 不引起周围组织炎症反应和修复再生, 不会导致肢体坏死, 这与题干描述的情况不符。

选项 C: 干性坏疽常见于动脉阻塞但静脉回流尚通畅的四肢末端, 因水分散失较多, 故坏死区干燥皱缩呈黑色。

这与患者的症状完全一致，故为正确答案。

选项 D：湿性坏疽多发生于与外界相通的内脏，如肺、肠、子宫、阑尾及胆囊等。坏死区水分较多，腐败菌易于繁殖，故肿胀呈蓝绿色，这与患者的症状不符。

选项 E：细胞可逆性损伤的形态学变化称变性，是指细胞或细胞间质受损伤后，由于代谢障碍，使细胞内或细胞间质内出现异常物质或正常物质异常蓄积的现象，常有细胞功能低下。这是可逆性损伤，与患者肢体发黑皱缩，明显不属于以上变性，属于不可逆的改变，与题干不符。

122. 【答案】E

【解析】

选项 A (L2) 和 B (L3)：这两个选项指的是腰椎 2 和腰椎 3 神经根，但是在这种情况下，患者通常不会出现坐骨神经痛，因此这两个选项可以排除。

选项 C (L4)：L3-L4 节段突出可能压迫 L4 神经根，但其特征表现为膝跳反射减弱，与题干描述不符，故不选 C。

选项 D (L5)：L4-L5 节段突出可能压迫 L5 神经根，其主要表现为足背、小腿外侧感觉减退，踝反射无变化、而足趾背伸肌力的下降，与题干描述不符，故不选 D。

选项 E (S1)：L5-S1 节段突出可能压迫 S1 神经根，其表现为踝反射减弱、足跖屈无力，符合题干描述，故选 E。

123. 【答案】D

【解析】

选项 A：股骨转子间骨折，通常表现为患者的大腿外旋畸形明显，甚至可以达到 90° 。在这个病例中，患者的大腿是内旋的，所以这个选项是错误的。

选项 B：骨盆骨折，一般会出现骨盆分离、挤压试验阳性和肢体长度不等的症状。但是，这种情况下往往没有下肢的旋转畸形，所以这个选项也是错误的。

选项 C：股骨颈骨折，一般会出现患肢外旋的症状。在这个病例中，患者的大腿是内旋的，所以这个选项也是错误的。

选项 D：髌关节后脱位，当发生这种情况时，股骨会上移，导致患肢缩短。同时，由于前侧肌群的作用力相对增加，会引起大腿向内收缩和内旋转，髌关节呈屈曲状。这与病例中的症状相符，所以这个选项是正确的。

选项 E：髌关节前脱位，当发生这种情况时，后侧肌群的作用力会相对增加，在髌关节屈曲畸形的基础上，会出现大腿外展和外旋的症状。这与病例中的症状不符，所以这个选项是错误的。

124. 【答案】C

【解析】

A. 前交叉韧带：前交叉韧带主要限制胫骨的前滑。损伤后，会引起抽屉试验时关节前移幅度增加，而不会导致外翻范围增大。

B. 胫腓韧带：胫、腓骨骨干之间通过胫腓前后韧带连结，主要限制小腿两股之间的相对活动，与外翻范围无直接关系。

C. 内侧副韧带：内侧副韧带位于股骨内上髁与胫骨内髁之间，主要维持膝关节内侧间隙适当宽度，限制关节过度外翻。因此，其损伤后会引引起外翻范围增大。

D. 外侧副韧带：外侧副韧带位于股骨外上髁与胫骨外髁之间，主要维持膝关节外侧间隙适当宽度，限制关节过度内翻。因此，其损伤后会引引起内翻范围增大。

E. 髌韧带：髌韧带连结髌骨，其损伤时髌骨的活动范围增加，对膝关节活动度增加影响较小，不会导致外翻范围增大。

125. 【答案】E

【解析】

选项 A: 尿道损伤。骨盆骨折往往由于收到巨大的外部冲击, 耻骨支移位可能会引起尿道损伤。因此, 尿道损伤是骨盆骨折的常见并发症。

选项 B: 坐骨神经损伤。虽然脊髓不位于骨盆, 但其底部发出的腰骶神经丛、坐骨神经会由此进入下肢等部位, 骨盆骨折时可能会合并对应神经损伤。

选项 C: 直肠损伤。同样, 骨盆骨折通常是由于受到巨大的外部冲击, 可能会导致其内容脏器的损伤, 如直肠。

选项 D: 腹膜后血肿。骨盆主要由松质骨构成, 邻近丰富的血管网, 骨折损伤时容易引起广泛出血, 延腹膜后疏松结缔组织进展, 形成腹膜后血肿。

选项 E: 脊髓损伤。骨盆由两块髌骨与脊柱下方的骶尾骨组成, 由于神经组织、骨骼发育速度不同, 脊髓神经位置会高于对应脊柱节段, 成人脊髓下段一般达第 1 腰椎下缘, 故骨盆骨折时不会损伤到脊髓。

126. 【答案】C

【解析】

A 选项: 韧带重建。这是一种针对韧带完全断裂或严重损伤的治疗方法。在此题中, 患者的韧带只是部分撕裂, 并且踝关节稳定, 因此不需要进行韧带重建。

B 选项: 局部理疗。对于踝关节扭伤, 局部理疗如冷敷、热敷等可以帮助减轻疼痛、消肿, 但不能解决韧带撕裂的问题, 因此不是首选的治疗方法。

C 选项: 支具外固定。对于部分撕裂但踝关节稳定的情况, 通过支具外固定可以减少韧带的张力, 促进其自然愈合, 因此是最佳的选择。

D 选项: 踝关节置换。这是一种针对踝关节严重损伤或退行性改变的治疗方法。在此题中, 患者的踝关节并未发生严重的结构性损伤, 因此不需要进行踝关节置换。

E 选项: 非甾体类抗炎药。这种药物主要用于缓解疼痛和减少炎症, 但不能直接修复韧带的损伤, 因此也不是首选的治疗方法。

127. 【答案】D

【解析】

A. 整块切除受累肌肉: 这是正确的处理措施。在气性坏疽中, 受感染的肌肉应尽快切除, 以阻止感染的进一步扩散。

B. 术后勤换敷料: 这也是正确的处理措施。由于渗液量大, 术后应勤换敷料, 保持伤口清洁, 避免继续感染。

C. 应用高压氧治疗: 这同样是正确的处理措施。高压氧治疗可以提高组织间含氧量, 有利于抑制厌氧菌的生长。

D. 首选氨基糖苷类抗生素: 这是不正确的处理措施。气性坏疽为产气厌氧菌感染所致, 氨基糖苷类抗生素对厌氧菌无效, 应首选青霉素。

E. 病变区多处切开: 这是正确的处理措施。在治疗气性坏疽的时候, 应该将病变区多处切开引流, 以便清除脓液和坏死组织。

128. 【答案】A

【解析】

选项 A (正确): 破伤风梭菌感染后迅速繁殖产生大量痉挛毒素, 与神经细胞突触结合抑制神经突触释放抑制性递质, 运动神经元失去中枢抑制而表现为兴奋性增强, 导致随意肌紧张与痉挛, 通常最先受累的是咀嚼肌, 特征性的张口困难、苦笑面容。

选项 B (错误): 饮水可以引发破伤风患者的痉挛发作, 但恐水不是其临床症状, 主要表现在狂犬病患者。

选项 C（错误）：发热是各类感染都有的常见症状，稽留热还可见于大叶性肺炎等，不具有特异性。

选项 D（错误）：昏迷是重度感染、中枢系统受累的表现，严重的脓毒症均可以出现，也不具有特异性。

选项 E（错误）：破伤风主要致病物质是破伤风外毒素，而坏疽是局部组织坏死继发腐败菌感染，往往分泌有溶组织蛋白酶等，是产气荚膜梭菌等病原体的特征，而非破伤风梭菌。

129. 【答案】A

【解析】

A 选项：联合应用抗菌药物。这是二重感染的主要原因之一。长期使用广谱抗生素，可以抑制敏感菌，但同时允许不敏感菌（如真菌等）在体内繁殖生长，造成菌群交替，这就是二重感染。所以 A 选项正确。

B 选项：致病菌量过多。虽然致病菌数量过多可能导致感染，但它并不直接导致二重感染。二重感染主要是由于菌群交替，而不仅仅是因为有大量的致病菌。所以 B 选项错误。

C 选项：使用免疫抑制剂。使用免疫抑制剂会降低人体的免疫力，使得人体更容易受到感染。但这不是引发二重感染的主要原因，因为二重感染主要是由于菌群交替。所以 C 选项错误。

D 选项：营养不良。营养不良会降低人体的免疫力，使得人体更容易受到感染。但这不是引发二重感染的主要原因，因为二重感染主要是由于菌群交替。所以 D 选项错误。

E 选项：全身免疫力降低。全身免疫力降低会使得人体更容易受到感染。但这不是引发二重感染的主要原因，因为二重感染主要是由于菌群交替。所以 E 选项错误。

130. 【答案】B

【解析】

A. 反应性浆细胞增多症多见于感染等情况，主要表现为成熟浆细胞增多，一般无 M 蛋白带。因此，这个选项不符合题干描述。B. 多发性骨髓瘤的主要特征包括中度贫血、幼稚浆细胞明显升高、血清蛋白电泳可见 M 蛋白带、尿蛋白阳性以及骨质破坏等，完全符合题干描述，为正确答案。C. 骨转移癌常见于肺癌、乳腺癌等，通常会伴有原发病的表现，不会出现幼稚浆细胞增多，因此这个选项不符合题干描述。D. 慢性肾小球肾炎的主要表现为肾功能异常引起的一系列症状，不会出现幼稚浆细胞增多，因此这个选项不符合题干描述。E. 霍奇金淋巴瘤的主要特征是颈部和锁骨上颈部淋巴结无痛性肿大，外周血或骨髓可发现典型的 RS 细胞，因此这个选项不符合题干描述。

131. 【答案】E

【解析】

选项 A：特发性血小板减少性紫癜（ITP）的主要表现是血小板减少，骨髓中巨核细胞数目增加伴成熟障碍。本例中，患者全血细胞均有减少，骨髓中未见巨核细胞，所以排除此项。

选项 B：再生障碍性贫血三系均减少，但其骨髓象为骨髓多部位增生减低。本例中，患者骨髓增生活跃，不符合再障的特点，故排除此项。

选项 C：阵发性睡眠性血红蛋白尿为血管内溶血，骨髓会有相应增生改变，但不会见不到巨核细胞。本例中，骨髓中未见巨核细胞，故排除此项。

选项 D：慢性失血性贫血以原发病伴贫血表现为主，较少出现白系、血小板降低，网织红一般升高，骨髓中红系增生活跃，巨核细胞不会消失。本例中，全血细胞均减少且骨髓中未见巨核细胞，故排除此项。

选项 E：患者为青年女性，有贫血、出血表现，血象示全血细胞减少，骨髓象示骨髓增生活跃，巨核细胞消失提示病态造血（由单核分叶变为多核为巨核系病态造血表现），故高度怀疑为骨髓增生异常综合征。

132. 【答案】A

【解析】

选项 A：尖锐湿疣是由人乳头瘤病毒（HPV）引起的性传播疾病，主要病原体是 HPV6 型和 11 型。因此，选项 A 是正确答案。

选项 B: 单纯疱疹病毒主要分为两型, HSV-1 型主要引起唇疱疹、疱疹性角膜结膜炎, 而 HSV-2 型主要引起生殖系统的疱疹。因此, 选项 B 不是尖锐湿疣的病原体。

选项 C: 苍白密螺旋体是梅毒的病原体, 与尖锐湿疣无关。因此, 选项 C 不是尖锐湿疣的病原体。

选项 D: 淋病奈瑟菌是淋病的病原体, 主要引发泌尿生殖系统感染。因此, 选项 D 不是尖锐湿疣的病原体。

选项 E: 钩端螺旋体主要引发钩体病, 人通常是通过接触疫水后感染的。因此, 选项 E 不是尖锐湿疣的病原体。

133. 【答案】C

【解析】

选项 A: 结核感染在艾滋病患者中确实常见, 但主要影响的是呼吸系统, 并不常引起腹泻, 因此不选 A。

选项 B: 肺孢子菌感染也是艾滋病患者常见的并发症, 但主要影响的是呼吸系统, 不常引起腹泻, 因此不选 B。

选项 C: 隐孢子虫感染在艾滋病患者中较常见, 并且会引发严重的腹泻, 因此这是正确答案。

选项 D: 链球菌感染不是艾滋病患者常见的感染, 尤其不常引起腹泻, 因此不选 D。

选项 E: 菌痢感染虽然可以引起腹泻, 但在艾滋病患者中并不常见, 因此不选 E。

134. 【答案】E

【解析】

A 选项: 支原体是一类无细胞壁的微生物, 它们的大小介于病毒和细菌之间。常见的疾病是支原体肺炎, 所以 A 选项不正确。

B 选项: 螺旋体是一类形状为螺旋状的细菌, 能够引起钩虫病、梅毒等疾病, 所以 B 选项不正确。

C 选项: 立克次体是一类革兰氏阴性的细菌, 它们通常寄生在昆虫或蜱内, 通过媒介传播给人类, 引发如流行性斑疹伤寒等疾病, 所以 C 选项不正确。

D 选项: 原虫是一类单细胞的微生物, 它们可以引发如阿米巴病等疾病, 所以 D 选项不正确。

E 选项: 日本血吸虫病的病原体是日本血吸虫, 属于蠕虫类, 所以 E 选项正确。

135. 【答案】B

【解析】

A 选项: 哌喹, 主要用于耐氯喹虫株的治疗, 而不是预防疟疾复发, 所以此选项不正确。

B 选项: 伯氨喹, 它可以杀灭红细胞内的疟原虫配子体和肝细胞内的迟发型子孢子, 从而防止疟疾的传播和复发。因此, 此选项是正确的。

C 选项: 青蒿素, 主要用于治疗疟疾, 但并不能防止疟疾复发, 所以此选项不正确。

D 选项: 奎宁, 是治疗恶性疟疾的主要化学药物, 但并不能防止疟疾复发, 所以此选项不正确。

E 选项: 乙胺嘧啶, 主要作为进入疫区前的预防性用药, 而不是用于预防疟疾复发, 因此此选项不正确。

136. 【答案】E

【解析】

A 选项: 鸡和鸭不是钩端螺旋体的主要宿主和传染源, 所以 A 选项不正确。

B 选项: 虽然猪是钩端螺旋体的一种主要宿主, 但蚊并非其主要传染源, 所以 B 选项不正确。

C 选项: 虱和跳蚤并非钩端螺旋体的主要宿主和传染源, 所以 C 选项不正确。

D 选项: 虽然病人和带菌者可以传播钩端螺旋体, 但由于人类带菌时间短, 排菌量小, 且钩端螺旋体不易在人类酸性的尿液中生存, 因此人类不是主要的传染源, 所以 D 选项不正确。

E 选项: 鼠和猪是钩端螺旋体病的主要储存宿主和传染源, 鼠类是我国南方稻田型钩体病的主要传染源, 猪是我国北方钩体病的主要传染源, 均能长期带菌, 是主要的储存宿主, 所以 E 选项正确。

137. 【答案】A

【解析】

A 选项：正确。乙型脑炎的主要传染源是猪，尤其是仔猪，感染率几乎可达 100%，且感染后病毒数量多、毒血症时间长，容易在蚊-猪-蚊之间形成动物循环。

B 选项：错误。乙脑病毒携带者并非主要传染源。虽然人在被感染后会出现短暂的病毒血症，但病毒数量少，且持续时间短，因此人不是本病的主要传染源。

C 选项：错误。同 B 选项，乙脑患者并非主要传染源。

D 选项：错误。乙脑主要通过蚊叮咬而传播，蚊虫属于其传播途径，而非传染源。

E 选项：错误。野鼠是肾综合征出血热的主要传染源，而非乙型脑炎。

138. 【答案】C

【解析】

选项 A：聚乙二醇干扰素是一种用于治疗慢性乙型和丙型肝炎的药物，不适合作为暴露后的预防措施。因此，选项 A 不正确。

选项 B：丙种球蛋白是一种广谱的免疫球蛋白，虽然可以提高机体的免疫力，但对乙肝病毒没有特异性的保护效果。因此，选项 B 不正确。

选项 C：乙肝免疫球蛋白是一种含有大量乙肝表面抗体的制剂，可以迅速结合并清除体内的乙肝病毒，是暴露后预防乙肝的首选措施。因此，选项 C 是正确答案。

选项 D：恩替卡韦是一种抗病毒药物，主要用于治疗乙型肝炎，不适合作为暴露后的预防措施。因此，选项 D 不正确。

选项 E：乙肝疫苗是通过刺激机体产生免疫反应，从而实现预防乙肝的目的。但是，疫苗需要一定的时间才能产生免疫效果，不能在短时间内提供保护。因此，对于已经暴露的人来说，单独接种乙肝疫苗不能提供及时的保护。因此，选项 E 不正确。

139. 【答案】C

【解析】

A. 支原体：支原体是一类介于病毒和细菌之间的微生物，它们不能自我合成 ATP，依赖宿主细胞提供能量。常见的疾病如支原体肺炎，由肺炎支原体引起。

B. 螺旋体：螺旋体是一种弯曲的、能自由运动的细菌，形状像螺旋。螺旋体引起的疾病有钩虫病、梅毒等。

C. 立克次体：立克次体是一种类似细菌的微生物，能在人体或动物体内及蚤、虱等昆虫体内存活。流行性斑疹伤寒的病原体是普氏立克次体，而地方性斑疹伤寒的病原体是莫氏立克次体。

D. 原虫：原虫是一种单细胞的微生物，它们属于最低等的动物，如阿米巴病就是由原虫引起的。

E. 蠕虫：蠕虫是多细胞的寄生虫，可以在人体内外生活，如日本血吸虫病就是由蠕虫引起的。

140. 【答案】B

【解析】

单个选项详细分析：

选项 A（急性膀胱炎）：急性膀胱炎通常表现为尿频、尿急、尿痛，但一般不会引起发热或肾区叩痛，所以此选项不符合病例描述。

选项 B（急性肾盂肾炎）：急性肾盂肾炎的症状包括发热、尿频和肾区叩痛，这与病例描述完全一致，因此此选项是正确答案。

选项 C 和 D（慢性肾小球肾炎、慢性肾盂肾炎）：慢性疾病的病程通常较长，且起病隐匿。本病例中，患者的病程仅数天，属于急性起病，因此这两个选项都不适用。

选项 E（泌尿系结核）：泌尿系结核通常表现为慢性病程，且有典型的终末血尿。尽管患者的尿液检查显示红细胞和白细胞增多，但并未出现抗酸染色阳性，所以此选项不符合病例描述。

141. 【答案】B

【解析】

A 选项：上皮细胞管型主要出现在肾小管发生坏死的情况下，患者的临床表现和尿沉渣检查结果并不支持此选项。

B 选项：急性肾盂肾炎时，白细胞会大量渗出，形成白细胞管型。患者的临床表现（发热、尿频、肾区叩痛）和尿沉渣检查结果（RBC20-40/HP，WBC30-40/HP，尿细菌+）均符合急性肾盂肾炎的诊断，因此选择 B 选项。

C 选项：颗粒管型主要出现在肾实质性病变伴有肾单位瘀滞的情况下，患者的临床表现和尿沉渣检查结果并不支持此选项。

D 选项：红细胞管型多提示肾小球病变，患者的临床表现和尿沉渣检查结果并不支持此选项。

E 选项：脂肪管型主要出现在肾小管损伤、肾小管上皮细胞脂肪变性的情况下，患者的临床表现和尿沉渣检查结果并不支持此选项。

142. 【答案】E

【解析】

选项 A：心肌收缩力增强。甲状腺激素会促进心肌细胞肌质网释放 Ca^{2+} ，激活与心肌收缩有关的蛋白质，增强肌球蛋白重链 ATP 酶的活性，从而加强心肌的收缩力。但这是甲亢患者心率加快的原因，而不是用力快速蹬踏后心率加快的原因。

选项 B：每搏输出量增加。每搏输出量指一侧心室一次心脏搏动所射出的血液量，甲亢患者每搏输出量增加是由于心肌收缩力增强。但这并不能解释该患者用力快速蹬踏后心率的增加。

选项 C 和 D：外周阻力降低、动脉压升高。这两个因素可以影响心脏的后负荷，从而影响心输出量，但对心率的影响并不大，所以这两个选项都不正确。

选项 E：心肌对 β 受体的敏感性增强。这是正确答案。甲状腺激素可以增加心肌细胞膜上 β 受体的数量和亲和力，提高心肌对儿茶酚胺的敏感性，可使心率加快。这是患者用力快速蹬踏后心率加快的主要原因。

143. 【答案】D

【解析】

A. 抗结核治疗：肾结核的主要治疗原则是药物治疗，但在本题中，已经明确一侧肾结核无功能，对侧肾正常，此时单纯的药物治疗无法达到理想效果。

B. 病灶清除术：这种手术适用于结核病变位于肾实质表面、与集合系统不相通的闭合性病灶，但在本题中，已明确一侧肾结核无功能，因此不适用。

C. 肾部分切除术：这种手术适用于病灶局限在病肾一极、抗结核治疗无效的患者。但在本题中，已明确一侧肾结核无功能，因此不适用。

D. 肾切除术：对于严重破坏的病例，为避免病灶继续播散，在对侧肾功能正常基础上，应抗结核治疗后积极切除病肾。此选项符合题干描述，为正确答案。

E. 肾造瘘：若对侧肾存在肾积水，则先进行造瘘等积水引流，待肾功能恢复后再手术。但在本题中，已明确一侧肾结核无功能，对侧肾正常，因此不适用。

144. 【答案】E

【解析】

选项 A：凝血因子 II，也称为凝血酶原，是共同凝血途径的最后一步，其缺乏会导致 PT 和 APTT 双增。因此，A 选项不符合题意。

选项 B：凝血因子 V 是共同凝血途径中的一个辅助因子，其缺乏同样会导致 PT 和 APTT 双增。因此，B 选项不符合题意。

选项 C: 凝血因子 X 在共同凝血途径中起关键作用, 其缺乏也会导致 PT 和 APTT 双增。因此, C 选项不符合题意。

选项 D: 纤维蛋白原 (凝血因子 I) 是凝血过程的最后产物, 其缺乏会导致 PT 和 APTT 双增。因此, D 选项不符合题意。

选项 E: 凝血因子 VIII 主要影响内源性凝血途径, 即使其缺乏, PT 值也不会受影响, 只有 APTT 会增长。因此, E 选项符合题意, 是正确答案。

145. 【答案】B

【解析】

A 选项: 凝血因子 II (凝血酶原) 在凝血过程中起着重要作用, 但它并非外源性凝血途径的启动因素。

B 选项: 凝血因子 III (组织因子) 是外源性凝血途径的启动因素。当血管受到损伤时, 血液接触到组织因子, 从而触发外源性凝血途径。这是正确答案。

C 选项: 凝血因子 IV (钙离子) 在凝血过程中起着重要作用, 但它并非外源性凝血途径的启动因素。

D 选项: 凝血因子 XII (Hageman 因子) 是内源性凝血途径的启动因素, 与外源性凝血途径无关。

E 选项: 凝血因子 IX (Christmas 因子) 在凝血过程中起着重要作用, 但它并非外源性凝血途径的启动因素。

146. 【答案】B

【解析】

A 选项: DA 方案是急性髓系白血病 (非 APL) 的治疗方案, 包括蒽环类药物联合去甲氧柔红霉素或柔红霉素组成。因此, 这不是侵袭性非霍奇金淋巴瘤的首选治疗方案, 所以 A 选项错误。

B 选项: CHOP 方案是侵袭性非霍奇金淋巴瘤的标准治疗方案, 包括环磷酰胺、多柔比星、长春新碱和强的松四种药物的联合化疗。这个方案的 5 年无病生存率高达 41%~80%, 因此, B 选项是正确答案。

C 选项: MOPP 方案是霍奇金淋巴瘤的治疗方案, 包括醋酸美法兰、长春新碱、丙硫异氰酸酯和强的松四种药物的联合化疗。因此, 这不是侵袭性非霍奇金淋巴瘤的首选治疗方案, 所以 C 选项错误。

D 选项: VDLP 方案是急性粒细胞白血病的治疗方案, 包括长春新碱、泼尼松、柔红霉素、L-ASP (门冬酰胺酶) 四种药物的联合化疗。因此, 这不是侵袭性非霍奇金淋巴瘤的首选治疗方案, 所以 D 选项错误。

E 选项: ABVD 方案是霍奇金淋巴瘤的治疗方案, 包括多柔比星、漂白霉素、长春新碱和地塞米松四种药物的联合化疗。因此, 这不是侵袭性非霍奇金淋巴瘤的首选治疗方案, 所以 E 选项错误。

147. 【答案】A

【解析】

选项 A: 正确。急性髓系白血病 (非 APL) 的常用治疗方案为 DA 方案, 即柔红霉素与阿糖胞苷的联合应用。这种方案有效地控制了病情的发展。

选项 B: 错误。CHOP 方案是侵袭性非霍奇金淋巴瘤的标准治疗方案, 不适用于急性髓系白血病。

选项 C: 错误。MOPP 方案是霍奇金淋巴瘤的一种常用治疗方案, 不适用于急性髓系白血病。

选项 D: 错误。VDLP 方案主要用于急性粒细胞白血病的治疗, 不适用于急性髓系白血病。

选项 E: 错误。ABVD 方案也是霍奇金淋巴瘤的一种常用治疗方案, 不适用于急性髓系白血病。

148. 【答案】A

【解析】

A 选项: 继发性低钾血症。正确。在糖尿病酮症酸中毒的情况下, 体内环境中 H^+ 离子过多, 会和细胞内的钾离子进行代偿性交换, 导致钾离子从细胞内部移动到外部。此时如果过早补充碳酸氢钠, 会纠正体内环境的酸中毒状态, 使得原先移出的钾离子重新向细胞内部移动, 导致血液中钾离子水平降低, 即出现继发性低钾血症。

B 选项: 继发性低钠血症。错误。在糖尿病酮症酸中毒的治疗过程中, 过早补充碳酸氢钠并不会导致继发性低

钠血症。

C 选项：继发性低钙血症。错误。在糖尿病酮症酸中毒的治疗过程中，过早补充碳酸氢钠也不会导致继发性低钙血症。

149. 【答案】D

【解析】

A 选项：CM(乳糜微粒)是饮食脂肪的主要运输形式，虽然与心血管疾病有关，但并非糖尿病降脂治疗的首要目标。

B 选项：VLDL(极低密度脂蛋白)主要承载内源性三酯，其含量增加可能导致心血管疾病，但在糖尿病降脂治疗中，优先级低于降低 LDL。

C 选项：HDL(高密度脂蛋白)被认为是“好的”胆固醇，因为它可以将脂肪从血管壁运送回肝脏进行分解和排泄。提高 HDL 是糖尿病降脂治疗的次要目标。

D 选项：LDL(低密度脂蛋白)被认为是“坏的”胆固醇，因为它携带的胆固醇可在血管壁上形成斑块，增加心脏病和中风的风险。降低 LDL-C 是糖尿病降脂治疗的首要目标。

E 选项：IDL(中等密度脂蛋白)在血脂代谢中起过渡作用，虽然与心血管疾病有关，但并非糖尿病降脂治疗的首要目标。

150. 【答案】B

【解析】

A. 甲状腺危象：这是一种严重的并发症，但它不是术后最严重的并发症。甲状腺危象通常由于过度的甲状腺激素释放引起，表现为高热、心动过速、恶心、呕吐、精神异常等症状。

B. 呼吸困难和窒息：这是甲亢术后最严重的并发症，主要原因是止血不确切而引起动脉性出血、量大，或者手术插管创伤引起的喉头水肿、长期肿大甲状腺压迫使器官塌陷等等。如果不及时发现和处理，会危及患者生命。

C. 喉上神经损伤：喉上神经损伤也可以引起严重并发症，如呼吸困难，但与其损伤部位、是否双侧同时损伤有关，发生率较低约 0.5%，更多表现为声音嘶哑、音调改变等。

D. 喉返神经损伤：喉返神经损伤也可以引起严重并发症，如呼吸困难，但与其损伤部位、是否双侧同时损伤有关，发生率较低约 0.5%，更多表现为声音嘶哑、音调改变等。

E. 待补充：这个选项没有具体的内容，所以无法进行评价。

第三单元

1. 【答案】C

【解析】

A. 巨幼细胞贫血：这种贫血症通常由于叶酸或维生素 B₁₂ 摄入不足、吸收不良、代谢异常或需要增加等原因引起。在本题中，患者没有显示出这些相关症状，故排除。

B. 再生障碍性贫血：再生障碍性贫血患者多存在三系减少表现，即贫血、感染及出血，血常规也可见白细胞及血小板改变。本题中患者没有相关症状，故排除。

C. 缺铁性贫血：缺铁性贫血是最常见的贫血类型，其主要原因是铁摄入不足或者铁丢失过多。本题中，患者素食，铁补充可能不足，同时月经量过多，铁丢失过多，故该选项为正确答案。

D. 维生素 B₁₂ 缺乏性贫血：这种贫血症主要由于维生素 B₁₂ 摄入不足、吸收不良或利用障碍引起。本题中，患者没有显示出这些相关症状，故排除。

E. 生理性贫血：生理性贫血主要发生在妊娠期和新生儿期，一般程度较轻，不会引起机体的不良反应，并能够自愈。本题中，患者并未处于这些特殊生理状况下，故排除。

2. 【答案】B

【解析】

A. 红细胞主要负责输送氧气和二氧化碳，不是引起过敏反应的主要血液成分。

B. 血浆的主要成分是蛋白质，其中包括免疫球蛋白，这些蛋白质可以作为抗原引发过敏反应。因此，多次输注血浆制品可能导致体内产生免疫球蛋白抗体，从而引发以 IgA 为主的过敏反应。

C. 淋巴细胞主要参与免疫反应，但它们本身并不直接引发过敏反应。

D. 血小板主要参与凝血过程，虽然它们能引发血小板抗体或 HLA 抗体的抗原抗体反应，但这种反应通常不会导致过敏。

E. 纤维蛋白原由肝脏合成，主要参与凝血过程。输注纤维蛋白原产生的不良反应较少见，因此它们并不是引起过敏反应的主要血液成分。

3. 【答案】D

【解析】

A. 结缔组织病：结缔组织病主要表现为关节肌肉症状、皮肤黏膜损害、雷诺现象等，不常见脾大，因此不选 A。

B. 急性白血病：急性白血病患者的肝脾通常轻度到中度增大，很少出现巨脾，因此不选 B。

C. 慢性溶血性贫血：慢性溶血性贫血患者通常有轻度到中度的脾大，但巨脾较少见，因此不选 C。

D. 慢性粒细胞白血病：慢性粒细胞白血病患者常以脾大为最显著体征，脾可达脐或脐以下，质地坚实，平滑，无压痛，因此答案是 D。

E. 急性失血：急性失血患者通常不会出现脾大，因此不选 E。

4. 【答案】E

【解析】

选项 A：急性硬脑膜下积液，通常与外伤引起的蛛网膜撕裂有关，形成活瓣，使脑脊液进入硬膜下腔不能回流。但患者表现并不符合这一症状，故排除。

选项 B：脊髓横断，主要表现为受损脊髓平面以下各种感觉缺失，上运动神经元性瘫痪和括约肌障碍等。患者的症状并不符合，故排除。

选项 C：脑水肿，是一种非特异性的脑组织病理性肿胀，可在任何类型的神经损伤后发展成局灶性或弥漫性模式，常有明显的颅内压增高和脑神经功能缺失症状。但患者症状并不符合，故排除。

选项 D: 脑挫伤, 是头部遭受暴力造成的原发性脑器质性损伤, 多表现为伤后立即发生的意识障碍, 局灶症状和体征以及较明显的头痛、恶心、呕吐等。但患者症状并不符合, 故排除。

选项 E: 急性硬脑膜外血肿, 位于颅骨内板与硬脑膜之间的血肿, 临床特征有一定规律及共性, 即昏迷—清醒—再昏迷。患者的症状与此相符, 故此为正确答案。

5. 【答案】B

【解析】

选项 A: 复发, 指的是在治疗后体温完全恢复正常后 1~3 周再度出现临床症状, 与病灶内的细菌未被完全清除重新入血有关。这与题干中患者的情况不符, 因此 A 选项错误。

选项 B: 再燃, 指的是部分伤寒患者经治疗处于缓解期, 体温还没有下降到正常时, 又重新升高, 持续 5~7 天后退热, 称为再燃。此时血培养可再次出现阳性, 可能与伤寒杆菌菌血症尚未得到完全控制有关。这与题干中患者的情况相符, 因此 B 选项正确。

选项 C: 重复感染, 是指个体受某种感染后, 在此基础上, 再次被同种病原体感染。这与题干中患者的情况不符, 因此 C 选项错误。

选项 D: 混合感染, 指人体同时被两种或以上的病原体感染。这与题干中患者的情况不符, 因此 D 选项错误。

选项 E: 继发感染, 指在重叠感染中, 发生于原发感染后的其他病原体感染。这与题干中患者的情况不符, 因此 E 选项错误。

6. 【答案】E

【解析】

A. 疱疹病毒: 疱疹病毒侵入机体的途径多样, 包括口腔、呼吸道、生殖道粘膜和破损皮肤。其主要表现为粘膜或皮肤局部集聚的疱疹, 伴有刺痛感或灼热感, 不会出现外生殖器赘生物及醋酸白阳性。

B. 沙眼衣原体: 沙眼衣原体主要引发男性尿道炎、女性黏液性宫颈炎, 不会引起赘生物。

C. 人免疫缺陷病病毒: 人免疫缺陷病病毒感染主要引起艾滋病, 可能继发引起尖锐湿疣, 但该患者不符合艾滋病的发热、CD4+T 细胞减少表现。

D. 苍白密螺旋体: 苍白密螺旋体主要引起梅毒, 一期梅毒的主要表现为硬下疳, 二期梅毒主要表现为梅毒疹, 三期梅毒表现为皮肤粘膜损害, 神经梅毒, 心血管梅毒等。不表现为外生殖器赘生物。

E. 人乳头瘤病毒: 尖锐湿疣由 HPV 感染引起, 常在肛门和外生殖器皮肤粘膜形成赘生物, 且醋酸白试验阳性, 根据该患者的临床表现, 因此确定为尖锐湿疣。

7. 【答案】D

【解析】

A. 由间皮细胞构成: 正确。腹膜表面由排列规则的扁平间皮细胞组成, 这些间皮细胞可以分泌液体, 使得腹腔内的器官能够顺利移动。

B. 是双向性半透膜: 正确。腹膜是一种半透膜, 可以允许水、电解质、尿素以及一些小分子物质通过。

C. 可分泌淋巴细胞及巨噬细胞: 正确。腹膜能够向腹腔内渗出少量液体, 这些液体中含有淋巴细胞、巨噬细胞以及脱落的上皮细胞。

D. 受交感神经和迷走神经支配: 错误。腹膜分为脏层和壁层, 脏层腹膜主要受自主神经 (来自交感神经和迷走神经末梢) 支配, 而壁层腹膜主要受体神经 (肋间神经和腰神经的分支) 支配。

E. 腹膜腔是人体最大的体腔: 正确。腹膜腔是壁腹膜和脏腹膜之间的潜在腔隙, 是人体最大的体腔, 在病变时可以容纳数升液体或气体。

8. 【答案】D

【解析】

A 选项：右肾结核。根据题干信息，右肾不显影，符合结核性病变的表现，但仅有右肾结核不能解释左肾积水和膀胱收缩，因此 A 选项不全面。

B 选项：左肾结核。题干信息中，左肾虽然有积水，但并未出现不显影，故不符合左肾结核的特点。

C 选项：双肾结核。双肾结核较少见，且该患者左肾并无结核表现，故 C 选项错误。

D 选项：右肾、膀胱结核。右肾不显影，符合结核性病变的表现；左肾积水可能是由于膀胱结核引起尿液回流所致；膀胱如乒乓球大小，提示膀胱收缩，也符合膀胱结核的表现。因此，D 选项正确。

E 选项：右肾多发结石+左输尿管结石。虽然排泄性尿路造影显示了右肾区高密度阴影，但右肾不显影，左肾积水，膀胱容量小等表现并不符合此选项。

9. 【答案】C

【解析】

A. 肾实质裂伤：此选项并非所有情况都需要手术治疗。肾实质裂伤包括肾部分裂伤和肾全层裂伤。严重肾部分裂伤、肾全层裂伤及肾蒂血管外伤需尽早进行手术。但多数肾部分裂伤可行保守治疗或者介入栓塞治疗，仅少数需手术治疗。

B. 保守治疗观察过程中出现血尿：血尿可能为肾损伤时的陈旧性出血，此时不需要手术治疗。血尿是肾损伤的常见症状，但并非所有血尿都需要手术治疗。

C. 血尿加重伴血压下降：这种情况可能表明持续性活动性出血，是手术治疗的指征。血尿加重可能导致血压下降，严重的话可能引起休克，需要紧急手术治疗。

D. 血尿仍存在，但血压在上升：血尿仍存在，但血压在上升，考虑为陈旧性出血，且病情处于恢复期，此时不需要手术治疗。

E. 伤后出现腰部或腹部包块：肾损伤时，血液、尿液进入肾周围组织可使局部肿胀，形成肿块。若肿块未出现明显增大，可继续保守治疗。

10. 【答案】B

【解析】

A. 深Ⅱ度烧伤：此类烧伤伤及表皮生发层和真皮乳头层以及网状层，创面微湿，痛觉感较为迟钝。题干中描述的症状与此不符。

B. 浅Ⅱ度烧伤：此类烧伤伤及表皮生发层和真皮乳头层，局部红肿明显，有大小不一的水泡形成，内含淡黄色澄清液体，疼痛明显。这完全符合题干中描述的症状。

C. I 度烧伤：此类烧伤仅伤及表皮浅层，表面呈红斑状，一般无水疱。题干中描述的症状与此不符。

D. III 度烧伤：此类烧伤为全层皮肤烧伤，已无水疱，痛觉消失。题干中描述的症状与此不符。

E. 浅III 度烧伤：此类烧伤为全层皮肤烧伤，创面湿润，一般无水疱，痛觉消失。题干中描述的症状与此不符。

11. 【答案】A

【解析】

选项 A (5450ml)：根据公式计算结果，是正确答案。

选项 B (5750ml)、C (3750ml)、D (3450ml)、E (6750ml)：均非公式计算结果，故为错误选项。

这道题考察了烧伤患者的液体补充问题，需要掌握烧伤患者的液体补充公式：第一个 24 小时的补液量=体重(kg)*烧伤面积(%)*系数(1.5)+日需量(2000ml)。

12. 【答案】E

【解析】

选项 A (乳腺癌)：乳腺癌的发病率与雌酮及雌二醇的发病有直接关系，而乳腺增生及复旧不全是乳腺囊性增生病的直接病因，故为错误选项。

选项 B (乳管内乳头状瘤): 乳管内乳头状瘤多发生在大乳管附近的壶腹部, 与乳腺实质增生过度 and 复旧不全关系不大, 故为错误选项。

选项 C (乳房肉瘤): 乳房肉瘤主要来自中胚叶结缔组织, 也与乳腺实质增生过度 and 复旧不全关系不大, 故为错误选项。

选项 D (乳房纤维腺瘤): 乳房纤维腺瘤可能与纤维细胞所含雌激素受体的量或质的异常有关, 一般肿块较为稳定, 不是由乳腺增生及复旧不全导致的, 故为错误选项。

选项 E (乳腺囊性增生病): 乳腺囊性增生病的基本病因系雌激素、孕激素比例失调, 使乳腺实质增生过度 and 复旧不全, 故为正确答案。

13. 【答案】D

【解析】

选项 A (乳腺癌): 乳腺癌的症状包括乳房肿块、皮肤改变、乳头溢液等, 一般与月经周期无关, 因此排除。

选项 B (乳腺炎): 乳腺炎主要发生在哺乳期妇女, 表现为乳房红肿、疼痛和体温升高, 与患者症状不符, 排除。

选项 C (乳腺纤维瘤): 乳腺纤维瘤通常为单发, 质地较硬, 与月经周期无明显关联, 因此排除。

选项 D (乳腺囊性增生病): 乳腺囊性增生病以青年女性为主, 临床上以乳房周期性胀痛和肿块为主要症状, 符合患者的症状描述, 因此选择此项。

选项 E (乳管内乳头状瘤): 乳管内乳头状瘤多见于 40-50 岁的女性, 症状主要为乳头溢液, 与患者症状不符, 排除。

14. 【答案】B

【解析】

A 选项: 地塞米松是一种糖皮质激素类药物, 可以帮助减轻脑水肿, 但其对于预防迟发性脑病的效果尚不明确, 因此不是最佳选择。

B 选项: 高压舱氧疗是治疗一氧化碳中毒的有效方法。在超大气压的条件下使用 100% 氧气, 可以使血液中的一氧化碳半衰期缩短, 增加血液中物理溶解氧, 提高总体氧含量, 促进氧释放和加速一氧化碳排出, 以便快速纠正组织缺氧, 缩短昏迷时间和病程, 有效预防一氧化碳中毒引发的迟发性脑病。

C 选项: 甘露醇是一种脱水剂, 能有效降低脑水肿及脑内压, 但不能预防迟发性脑病。

D 选项: 呋塞米是一种快速利尿剂, 可以帮助缓解脑水肿, 但不能有效预防迟发性脑病。

E 选项: 护脑药物虽然可以辅助保护脑细胞, 但不能从根本上迅速纠正组织缺氧, 因此也不能从根本上预防迟发性脑病。

15. 【答案】A

【解析】

A. 流行性乙型脑炎: 根据题目中的症状、体征和流行病学背景, 符合流行性乙型脑炎的诊断标准, 故 A 选项正确。

B. 流行性脑脊髓膜炎: 这种疾病多发生在冬春季节, 且患者会有皮肤瘀点、瘀斑等表现, 与题目描述不符, 故 B 选项错误。

C. 钩端螺旋体病: 其临床表现有发热、头痛、全身乏力、眼结膜充血, 腓肠肌压痛和表浅淋巴结肿大等, 与题目描述不符, 故 C 选项错误。

D. 结核性脑膜炎: 无季节性, 起病较缓, 病程较长, 脑膜刺激征明显, 意识障碍轻, 出现较迟。有结核病史或接触史。其脑脊液检查结果与题目描述不符, 故 D 选项错误。

E. 肾综合征出血热: 主要病理变化是全身小血管和毛细血管的广泛性损害, 临床表现以发热、低血压休克、

充血出血和肾损害为主要表现。与题目描述不符，故 E 选项错误。

16. 【答案】D

【解析】

选项 A：补体结合试验主要用于检测 IgG 抗体，因此，它不能用于早期诊断，而是主要用于回顾性诊断或流行病学调查。在本例中，由于患者症状刚出现，补体结合试验不是首选的诊断方法。

选项 B：冷凝集试验主要用于由肺炎支原体引起的原发性非典型性肺炎的辅助诊断，与流行性乙型脑炎的诊断无关。

选项 C：中和试验是通过测定血清中和抗体的存在来确定是否有特定病原微生物的感染。但是，对于流行性乙型脑炎，该试验并不是首选的诊断方法。

选项 D：特异性 IgM 抗体检测是流行性乙型脑炎的首选诊断方法。发病 4-7 天就可进行血清学检查，特异性 IgM 抗体阳性可助确诊。

选项 E：脑脊液检查对于中枢神经系统疾病的诊断有重要意义，但在流行性乙型脑炎的早期，脑脊液检查可能出现正常，因此，它不是首选的诊断方法。

17. 【答案】E

【解析】

A. 手术治疗：手术是乳腺癌的主要治疗方式之一，但并非所有乳腺癌患者都适合手术。对于雌激素受体阳性的乳腺癌患者，首选内分泌治疗。

B. 化疗：化疗是乳腺癌的常用治疗方式，但其副作用大，且对雌激素受体阳性的乳腺癌患者，内分泌治疗更为有效。

C. 放疗：放疗通常用于术后辅助治疗，用来杀死可能残留的癌细胞，对于雌激素受体阳性的乳腺癌患者，首选内分泌治疗。

D. 靶向治疗：靶向治疗是针对癌细胞特定基因或蛋白质进行治疗，对于 HER2 阳性的乳腺癌患者更为有效，对于雌激素受体阳性的乳腺癌患者，首选内分泌治疗。

E. 内分泌治疗：对于雌激素受体阳性的乳腺癌患者，内分泌治疗是首选治疗方式。内分泌治疗主要通过抑制雌激素的合成或阻断雌激素与其受体的结合，从而抑制肿瘤细胞的生长。

18. 【答案】B

【解析】

A. 化脓性骨髓炎：通常发生在长管状骨的骺端，最常见于少年，多有外伤史，并伴有全身发热等系统症状。此患者的症状并不支持此诊断。

B. 化脓性指头炎：这是由微小刺伤、挫伤、逆剥或剪指甲过深引起的感染。患者的右手拇指被针刺伤后出现局部红肿和发热，最有可能是化脓性指头炎。

C. 丹毒：这是由乙型溶血性链球菌侵袭皮肤淋巴管所致的急性非化脓性炎症，最常发生在下肢和面部，手部较少见。

D. 化脓性腱鞘炎：其典型特征是腱鞘区域有明显的压痛，被动伸指运动疼痛加剧。题干中并未描述此类症状。

E. 急性静脉炎：其典型表现是静脉分布区域的条状疼痛，一般也不出现在手部。

19. 【答案】C

【解析】

选项 A：“继续观察”：这个选项是错误的。患者的症状（红肿、剧痛、波动感，伴发热）已经明显，表明感染已经发生并且形成了脓肿，此时不能再选择观察，需要立即进行治疗。

选项 B：“应用抗生素”：这个选项也是错误的。虽然抗生素可以用于治疗感染，但是对于已经形成脓肿的情况

况，仅仅使用抗生素是无法将脓液排出体外的，需要手术切开引流。

选项 C：“脓肿切开引流”：这个选项是正确的。对于已经形成脓肿的感染，应该选择手术切开引流，以便将脓液排出，减少感染的扩散。

选项 D 和 E：“热盐水浸泡患指”和“理疗”：这两个选项都是错误的。这些都是保守治疗措施，对于已经形成脓肿的情况，这些方法无法有效地处理问题。

20. 【答案】C

【解析】

选项 A：出现寒战时。寒战是感染性疾病的一个常见症状，但并不是血培养的最佳采集时间，因为此时病原菌在血液中的浓度可能还未达到最高。

选项 B：预计发生寒战及发热前。这个时间点并不能保证病原菌在血液中的浓度最高，所以不是最佳的采集时间。

选项 C：寒战后体温升至最高时。这是正确答案。在感染性疾病中，体温升高通常意味着病原菌在体内活跃，这时候进行血培养，可以获得较高浓度的病原菌，提高检测的准确性。

选项 D：体温正常后 1 小时。此时病原菌在血液中的浓度可能已经开始下降，不是最佳的采集时间。

选项 E：体温正常的任何时段。这个选项过于笼统，不能确保在此时进行血培养可以获得最高浓度的病原菌。

21. 【答案】E

【解析】

选项 A：急性淋巴管炎的典型表现为沿淋巴管分布的红线，患者会有触痛感，而非题干描述的边界不清晰。因此，A 选项是错误的。

选项 B：浅静脉炎的特点是以静脉分布区域的红肿和疼痛，存在以静脉分布为特点的边界。而题干描述为边界不清晰，因此，B 选项是错误的。

选项 C：气性坏疽是由产气荚膜梭菌感染所致，病情较重，一般伴随有剧烈的痛感和感染部位恶臭性气味，与题干不符，因此，C 选项是错误的。

选项 D：丹毒是由于乙型溶血性链球菌侵袭皮肤淋巴管所致，表现为边界清晰的皮肤红疹，而题干描述为不清晰，因此，D 选项是错误的。

选项 E：题干描述患者下肢存在红肿热痛表现，应考虑感染所致的炎性表现，同时患者压痛明显，边界不清晰，此为蜂窝织炎的临床特点，因此此患者最有可能的诊断应为急性蜂窝织炎。所以，E 选项是正确的。

22. 【答案】C

【解析】

选项 A：对于糖尿病患者，术前需要在一定程度上控制血糖水平，口服降糖药的服用应持续至手术前一天晚上。因此，选项 A 是正确的。

选项 B：对于高血压患者，虽然术前血压 160mmHg 以下不需要特殊降压准备，但仍需要维持原有的降压药物治疗以避免戒断综合征。因此，选项 B 是正确的。

选项 C：对于长期吸烟的患者，术前应至少提前 2 周戒烟，以减少术后并发症的风险。因此，选项 C 是错误的，是本题的答案。

选项 D：阿司匹林是抗血小板聚集药物，术前需要停用以减少出血风险，一般建议术前一周停用。因此，选项 D 是正确的。

选项 E：对于使用胰岛素的糖尿病患者，术前需要调整治疗方案，通常在手术当天早上停用胰岛素，以避免术中血糖过低。因此，选项 E 是正确的。

23. 【答案】A

【解析】

A. 白蛋白：白蛋白是一种血浆蛋白，其主要作用是维持血浆的胶体渗透压，对于肠外营养而言，我们更关注的是提供氨基酸以合成蛋白质，而非直接提供蛋白质，因此白蛋白不属于肠外营养成分。

B. 葡萄糖：葡萄糖是肠外营养的重要组成部分，它可以提供能量，同时也是机体的重要能量源。

C. 水：水是肠外营养的必要组成部分，它在肠外营养中的主要作用是维持机体的水电解质平衡。

D. 维生素：维生素也是肠外营养的重要组成部分，它们是机体正常代谢不可或缺的微量元素。

E. 脂肪乳：脂肪乳是肠外营养的重要组成部分，它可以提供能量，同时也是机体的重要能量源。

24. 【答案】C**【解析】**

A 选项：胃黏膜肠上皮化生是胃癌的一种早期表现，而不是炎症活动的直接证据，所以 A 选项错误。

B 选项：胃黏膜出血更多的是急性胃炎的表现，而题干中的病例是患有萎缩性胃炎的患者，所以 B 选项错误。

C 选项：胃黏膜内中性粒细胞增多是炎症活动的一个重要标志，因此 C 选项正确。

D 选项：胃黏膜中淋巴细胞的增多更多的是慢性炎症的表现，所以 D 选项错误。

E 选项：胃黏膜纤维组织增生通常是长期炎症后的修复反应，而不是炎症活动的直接证据，所以 E 选项错误。

25. 【答案】E**【解析】**

A 选项：壁细胞抗体阴性。这个选项不正确，因为在 A 型胃炎中，壁细胞抗体通常是阳性，这是由于自身免疫反应导致的。

B 选项：胃酸升高。这个选项也不正确，A 型胃炎会导致壁细胞数量减少，胃酸分泌降低，而不是升高。

C 选项：不出现厌食、体重下降。这个选项不正确，A 型胃炎的患者可能会出现消化道症状，包括厌食和体重下降。

D 选项：不出现恶性贫血。这个选项不正确，A 型胃炎由于胃酸分泌减少，导致维生素 B12 吸收不良，可能出现巨幼细胞贫血，也称为恶性贫血。

E 选项：主要位于胃体部。这个选项是正确的，A 型胃炎主要影响胃体部，这是其病理特征之一。

26. 【答案】B**【解析】**

选项 A：肿瘤。胆道肿瘤多无症状，常在超声检查时发现。与患者的症状，如反复发作的上腹部疼痛、近期短时间内出现腹痛、发热、寒战和黄疸不符，因此排除。

选项 B：结石。患者为老年男性，反复发作上腹部疼痛 4 年（慢性病程），近期短时间内出现腹痛、发热、寒战和黄疸（查科三联症），初步诊断为急性梗阻性化脓性胆管炎。最常见的病因是肝内外胆管结石。因此，选项 B 正确。

选项 C：蛔虫。胆道蛔虫病的临床特点是剧烈的腹痛与较轻的腹部体征不相称，所谓“症征不符”。常突发剑突下钻顶样剧烈绞痛，阵发性加剧。与患者的症状不符，因此排除。

选项 D：炎性狭窄。炎症狭窄的临床表现为反复发作的胆管炎，超声检查可见胆管狭窄。与患者的症状不符，因此排除。

选项 E：炎症。急性发作主要是上腹部疼痛。开始时仅有上腹胀痛不适，逐渐发展至呈阵发性绞痛；夜间发作常见，饱餐、进食肥腻食物常诱发发作。疼痛放射到右肩、肩胛和背部。伴恶心、呕吐、厌食、便秘等消化道症状。与患者的症状不符，因此排除。

27. 【答案】D**【解析】**

A. 纠正水、电解质和酸碱平衡紊乱：此项是术前准备的一部分，也是治疗过程中的一项措施，但不是最有效的治疗手段。

B. 给予有效足量抗生素：此项也是治疗过程中的一项措施，也是术前准备的一部分，但不是最有效的治疗手段。

C. 应用肾上腺皮质激素：此项也是治疗过程中的一项措施，也是术前准备的一部分，但不是最有效的治疗手段。

D. 紧急手术解除胆道梗阻并减压：这是最有效的治疗手段，因为急性梗阻性化脓性胆管炎的主要问题是胆道梗阻，手术解除梗阻可以直接解决问题。

E. 继续观察：在此情况下，患者已经出现感染性休克，需要紧急手术，不能继续观察。

28. 【答案】B

【解析】

选项 A：肛瘘的主要症状是肛门外口持续或间断流出少量脓性、血性、黏液性分泌物。这与题目中描述的长期便秘和大便干燥、带血的症状不符，因此 A 选项错误。

选项 B：肛裂的典型临床表现包括疼痛、便秘和出血，这完全符合题目中的描述，因此 B 选项正确。

选项 C：内痔的主要临床表现为出血和脱出。这与题目中描述的症状不符，因此 C 选项错误。

选项 D：直肠癌的症状包括便意频繁，排便习惯改变；便前肛门有下坠感、里急后重、排便不尽感，晚期有下腹痛。这与题目中描述的症状不符，因此 D 选项错误。

选项 E：直肠息肉的临床表现不一，早期可无任何症状，一般临床表现可有腹痛、腹泻、便血、大便中可含有粘液，或伴有里急后重感。这与题目中描述的症状不符，因此 E 选项错误。

29. 【答案】A

【解析】

选项 A：肛瘘。在临床上，肛瘘的患者会有条索状肿物的存在，这是因为肛瘘形成的管道可以被扪及，因此，这是正确的答案。

选项 B：肛裂。肛裂的主要症状是疼痛和出血，而不是条索状肿物，所以这个选项是错误的。

选项 C：内痔。内痔的主要症状是出血和脱出，肛门指检一般不会触及到条索状肿物，所以这个选项是错误的。

选项 D：直肠癌。直肠癌的早期症状可能包括改变的排便习惯和排便困难，晚期可能会触及到肿块，但不会是条索状，所以这个选项是错误的。

选项 E：直肠息肉。直肠息肉在直肠指检时一般会触及到质软的肿块，而非条索状肿物，所以这个选项是错误的。

30. 【答案】D

【解析】

选项 A：肛瘘。肛瘘的典型表现是沿瘘外口向肛门方向延伸，双指合诊常可扪及条索状物或瘘内口处小硬结。这与题干中描述的直肠指诊摸到不平质硬肿物，指套上有脓血与黏液的情况不符，所以不选择 A。

选项 B：肛裂。肛裂在肛门检查时，常会引起剧烈疼痛，没有明显的肿物，与题干中的表现不符，所以不选择 B。

选项 C：内痔。内痔多较柔软不易扪及，如有血栓形成，可扪及硬结，有时有触痛、出血。但是没有脓血和黏液的表现，与题干不符，所以不选择 C。

选项 D：直肠癌。直肠癌的典型表现就是在肛管或示指可及的直肠内可扪及高低不平的硬结、溃疡、菜花状肿物，肠腔可有狭窄，指套上常有脓血和黏液。这与题干完全符合，所以选择 D。

选项 E：直肠息肉。直肠息肉的表现是质软可推动的圆形肿块，多发息肉则可扪及大小不等的质软肿块，移动

度大的息肉多可扪及蒂部。这与题干中描述的情况不符，所以不选择 E。

31. 【答案】E

【解析】

A 选项：肛瘘的典型表现是沿瘘外口向肛门方向延伸，双指合诊常可扪及条索状物或瘘内口处小硬结。这与题目中描述的“直肠指检触及表面光滑且圆软的可推动肿物”不符。因此，A 选项错误。

B 选项：肛裂的典型表现是肛门检查时，常会引起剧烈疼痛。这与题目中描述的无疼痛的肿物不符。因此，B 选项错误。

C 选项：内痔的典型表现是多较柔软不易扪及，如有血栓形成，可扪及硬结，有时有触痛、出血。这与题目中描述的无疼痛、可推动的肿物不符。因此，C 选项错误。

D 选项：直肠癌的典型表现是在肛管或示指可及的直肠内可扪及高低不平的硬结、溃疡、菜花状肿物，肠腔可有狭窄，指套上常有脓血和黏液。这与题目中描述的表面光滑、圆软的可推动肿物不符。因此，D 选项错误。

E 选项：直肠息肉的典型表现是可扪及质软可推动的圆形肿块，多发息肉则可扪及大小不等的质软肿块，移动度大的息肉多可扪及蒂部。这与题目中描述的表面光滑、圆软的可推动肿物相符。因此，E 选项正确。

32. 【答案】B

【解析】

A. 消化性溃疡：通常表现为上腹痛，性质可有钝痛、灼痛、胀痛、剧痛、饥饿样不适。题干中的患者并无这些症状，故不选 A。

B. 胃食管反流病：患者为中年男性，存在反酸、烧心等症状，且站立时症状减轻，卧位、弯腰时加重，这与胃食管反流病的典型症状相符，故选择 B。

C. 食管癌：临床上以进行性吞咽困难为进展期典型症状，题干中的患者并无此症状，故不选 C。

D. 食管贲门失弛缓症：临床表现为间歇性咽下困难、食物反流和胸骨后不适或疼痛，病程较长，题干患者无吞咽困难，故不选 D。

E. 食管裂孔疝：典型症状可以出现胃食管反流症状，以及压迫和消化道梗阻症状如呼吸困难，吞咽困难，恶心、呕吐，胸痛等，题干患者无吞咽呼吸困难，依据不足，故不选 E。

33. 【答案】D

【解析】

A. 食管酸廓清能力下降：这是胃食管反流病的一个重要发病机制，因为食管对胃酸的清除能力降低会导致胃酸反流进入食管，引起症状。

B. 下食管括约肌压力降低：下食管括约肌是防止胃酸反流的重要结构，其压力降低会使得胃酸更容易反流进入食管。

C. 胃排空异常：胃排空异常会导致胃内的食物和胃酸停留时间过长，增加了胃酸反流的可能性。

D. 夜间胃酸分泌过多：虽然夜间胃酸分泌过多可能会加剧胃食管反流病的症状，但它并不是胃食管反流病的发病机制。

E. 异常的下食管括约肌一过性松弛：这也是胃食管反流病的一个重要发病机制，下食管括约肌的一过性松弛会使得胃酸有机会反流进入食管。

34. 【答案】C

【解析】

本题考察的是对消化系统疾病的诊断及辅助检查方法的理解和选择。

选项 A：B 超是一种无创、方便、快捷的检查方法，适用于探查消化系统实质性脏器、胆道及腹腔内的病变。但对被气体或骨骼遮盖的组织或器官探查受限，受操作者的技能或经验影响较大，因此不是本题最优选择。

选项 B: 腹部 CT 对于穿透性溃疡或穿孔有很大的价值, 可以发现穿孔周围组织炎症、包块、积液, 对于游离气体的显示甚至优于立位胸片。但在此患者情况下, 没有明显的穿孔症状, 故此选项不是最佳选择。

选项 C: 纤维胃镜检查能直视病变部位, 也是鉴别胃癌及胃溃疡的首选方法和金标准, 如怀疑胃癌可能, 可于胃镜下行黏膜活检, 因此是本题最优选择。

选项 D: 腹部 X 线平片一般用于鉴别消化道穿孔、肠梗阻、泌尿系结石检查, 本题的病人情况并未提示这些问题, 因此此选项不是最佳选择。

选项 E: MRI 适用于微小病变的观察以及病变定性诊断, 特别是对鉴别肝内肝门部病变组织学来源和诊断胆道、胰腺病变具有很大价值, 但在本题的病人情况下, MRI 并不是最佳的辅助检查方法。

35. 【答案】A

【解析】

选项 A: 低钾代谢性碱中毒。这是正确答案。幽门梗阻导致呕吐, 使胃液丢失, 出现大量钾、HCl 丢失, 而肠液中的 HCO_3^- 因未被胃酸中和而吸收过多, 造成碱血症, 此为低钾代谢性碱中毒。

选项 B: 高钾血症、代谢性酸中毒。这在慢性肾衰竭中较常见, 但在本题的情境下, 由于患者呕吐多, 主要为低钾, 而非高钾。

选项 C: 高钾血症、代谢性碱中毒。这在肾小管中毒中较常见, 但在本题的情境下, 由于患者呕吐多, 主要为低钾, 而非高钾。

选项 D: 低钾血症、代谢性酸中毒。这在慢性肾衰竭中较常见, 由于钾摄入不足、胃肠道丢失过多、应用排钾利尿剂等因素, 出现低钾血症。由于患者呕吐, 胃酸也一起排出, 较少见酸中毒。

选项 E: 低氯血症、代谢性酸中毒。这在碱性物质丢失过多、酸性物质产生过多的情况下较常见, 但在本题的情境下, 由于患者呕吐, 胃酸也一起排出, 较少见酸中毒。

36. 【答案】C

【解析】

选项 A: 20%甘露醇 250ml 静脉快速静注用于降低颅内压, 主要用于治疗脑水肿或颅内高压, 而非硫酸镁中毒。

选项 B: 冬眠合剂半量是一种镇静药物, 可以抑制神经系统, 有助于解痉降压, 控制子痫抽搐, 但不适用于硫酸镁中毒。

选项 C: 硫酸镁中毒的处理首选方法就是立即停用硫酸镁, 并给予 10%葡萄糖酸钙缓慢静注。葡萄糖酸钙可以与血清中的游离镁离子结合, 降低血镁浓度, 缓解中毒症状。

选项 D: 低分子右旋糖酐用于治疗各种休克及血栓性疾病, 并不适用于硫酸镁中毒的处理。

选项 E: 呋塞米是一种利尿剂, 主要用于全身性水肿、肺水肿、脑水肿、肾功能不全、急性心力衰竭等情况, 而非硫酸镁中毒。

37. 【答案】D

【解析】

A. 立即行负压吸宫术终止妊娠。这个选项是错误的, 因为在心力衰竭的情况下进行手术有很大的风险, 应先控制心力衰竭。

B. 控制心力衰竭后继续妊娠。这个选项也是错误的, 因为对于已经出现心力衰竭的风湿性心脏病妊娠患者, 继续妊娠会加重病情。

C. 边控制心力衰竭边终止妊娠。这个选项也是错误的, 因为在严重的心力衰竭下, 应先控制心力衰竭再进行其他处理。

D. 控制心力衰竭后行负压吸宫术。这个选项是正确的, 应先控制心力衰竭, 然后再进行负压吸宫术来终止妊娠。

E. 控制心力衰竭后行钳刮术。这个选项是错误的，因为在妊娠早期，应选择负压吸宫术，而非钳刮术。

38. 【答案】D

【解析】

选项 A: FVC 降低。FVC 是用力肺活量，主要见于限制性通气障碍、呼吸肌力减弱和重度慢性阻塞性肺气肿(COPD)。但在特发性肺纤维化中，FVC 不一定降低，因此这个选项是错误的。

选项 B: FEV1 降低。FEV1 是一秒量，其正常值可以排除明显的限制性和阻塞性通气功能障碍。在特发性肺纤维化中，FEV1/FVC 通常是正常或轻度增加，因此 FEV1 降低并不是特发性肺纤维化的特征表现，所以这个选项也是错误的。

选项 C: MVV 降低。MVV 是最大通气量，预计值为 0.60 是异常，主要见于胸廓、气道及肺组织的病变。但在特发性肺纤维化中，MVV 不一定降低，因此这个选项也是错误的。

选项 D: VC 减少。VC 是肺活量，特发性肺纤维化的肺功能表现为限制性通气功能障碍，限制性通气障碍则以肺活量(如 VC)减少为主，因此 VC 减少是特发性肺纤维化患者肺功能检查最具特征性的表现，这个选项是正确的。

选项 E: RV 降低。RV 是残气量，主要见于肺气肿和小气道过早闭合等情况。在特发性肺纤维化中，RV 并不一定降低，因此这个选项是错误的。

39. 【答案】A

【解析】

选项 A: 环磷酰胺是系统性红斑狼疮(SLE)病情活动时的首选免疫抑制剂，用于诱导缓解期治疗。因此，选项 A 是正确答案。

选项 B: 甲氨蝶呤也是 SLE 的常用免疫抑制剂，但并非首选药物，因此，选项 B 是错误的。

选项 C: 长春新碱主要用于抗肿瘤治疗，不是 SLE 的常用免疫抑制剂，因此，选项 C 是错误的。

选项 D: 依木兰即硫唑嘌呤，虽然是 SLE 常用免疫抑制剂的一种，但并非首选药物，因此，选项 D 是错误的。

选项 E: 地塞米松为糖皮质激素，而非免疫抑制剂，因此，选项 E 是错误的。

40. 【答案】B

【解析】

选项 A: 肺间质纤维化是类风湿关节炎中较常见的肺部病变，约有 30% 的病人会出现，但并非关节外最常见的表现。

选项 B: 类风湿结节是类风湿关节炎最常见的关节外表现，大约 30%~40% 的病人会出现。它们通常出现在压力点，如手肘、指关节、足跟等处。

选项 C: 心包炎在类风湿关节炎病人中并不常见，只有不足 10% 的病人会出现临床症状，因此这不是最常见的关节外表现。

选项 D: 脾肿大在类风湿关节炎病人中也不常见，只有在出现 Felty 综合征时才可能出现，因此也不是最常见的关节外表现。

选项 E: 类风湿血管炎通常见于病程长、血清类风湿因子阳性且病情活动的类风湿关节炎病人，整体发病率不足 1.0%，因此并非最常见的关节外表现。

41. 【答案】D

【解析】

A. 抗休克: 虽然此选项在一般情况下是重要的急救措施，但在这种情况下，首先应进行的是止血，以防止由于大量失血引发休克。

B. 有伤下肢临时固定: 固定患肢是骨折急救的重要措施，但应在基础生命体征平稳的状态后、伤口包扎稳定后进行，不能违背急救原则。

C. 清创缝合：清创缝合是进一步的治疗措施，不属于现场急救措施，应在患肢固定后转运至有条件的医疗机构进行。

D. 加压包扎止血：正确选项。对于开放性骨折并大出血的情况，首先应进行的是加压包扎止血，防止因大量失血引发休克。

E. 给予输血：输血是创伤后的进一步救治措施，不属于现场急救措施，需要在具备输血条件的医疗机构内进行。

42. 【答案】D

【解析】

A. 彻底清创后，缝合伤口。这个选项是错误的，因为火器伤的特点是组织损伤重、范围大、易感染。清创后一期缝合可能会导致感染的发生。

B. 不做彻底清创，切开深筋膜减压。这个选项也是错误的，火器伤必须进行彻底清创，充分暴露伤道，清除坏死和失活的组织，以降低感染风险。

C. 清洗伤口，消毒、包扎。这个选项同样错误，仅仅清洗伤口并不能彻底清除坏死和失活的组织，增加了感染的风险。

D. 彻底清创后，开放伤口引流。这个选项是正确的。火器伤需要彻底清创后，开放伤口引流，以便及时发现和处理可能的感染。

E. 彻底清创后，放置引流管、缝合伤口。这个选项是错误的，因为清创后一期缝合可能会导致感染，而且放置引流管也不能有效预防感染。

43. 【答案】B

【解析】

A. 急性胃肠炎：主要表现为恶心、呕吐、腹痛、腹泻等，腹痛多见于上、中腹部，排便常为黄色稀便、水样或黏液便。与患者的症状不符。

B. 急性细菌性痢疾：典型表现为发热、乏力、食欲减退，左下腹痛、解稀烂便，后出现黏液脓血便，伴有里急后重感，这与患者的症状完全符合。

C. 肠伤寒：主要表现为发热、全身疲倦、乏力、头痛、恶心、呕吐胃内容、腹痛、轻度腹泻或便秘，右下腹可轻压痛。与患者的症状不符。

D. 食物中毒：应有进食同一食物集体发病病史，主要表现为急性胃肠炎症状，起病急，有恶心、呕吐、腹痛、腹泻等，腹痛多见于上、中腹部，呕吐物为进食之食物，排便常为黄色稀便、水样或黏液便。患者无集体发病史，且与患者的症状不符。

E. 肠阿米巴痢疾：通常不发热，少有毒血症状，腹痛轻微，无痢疾后者，多为右下腹痛，排便常为暗红色果酱样便。与患者的症状不符。

44. 【答案】D

【解析】

选项 A：大叶性肺炎的症状包括寒战、高烧、胸痛、咳嗽、咳铁锈色痰和呼吸困难，体征为肺实变，如肺泡呼吸音减弱或消失，出现支气管呼吸音，语音震颤增强，叩诊呈浊音。这与题目描述的症状和体征不符。

选项 B：胸腔积液通常起病缓慢，大量胸腔积液时可有胸闷和呼吸困难，体征为患侧胸廓饱满，触诊语颤减弱，局部叩诊呈浊音，呼吸音减低或者消失，可伴有气管、纵隔向健侧移位。这与题目描述的症状和体征不符。

选项 C：干性胸膜炎的症状包括发热、乏力、食欲减退、体重减轻等，最重要的体征是胸膜摩擦音，这与题目描述的症状和体征不符。

选项 D：张力性气胸的症状包括突发胸痛、气促，体征为气管偏向健侧，叩诊呈空瓮音，呼吸音消失，这完全

符合题目描述的症状和体征。

选项 E: 肺癌常发生于老年, 起病缓慢, 早期症状为咳嗽、痰血、低热、胸痛、气闷等, 有时表现为反复同一部位的阻塞性肺炎, 经抗生素治疗未能完全消退, 这与题目描述的症状和体征不符。

45. 【答案】C

【解析】

选项 A: 出血性大肠埃希菌肠炎, 一般表现为大便次数增多, 开始为黄色水样便, 后转为血水便, 有特殊臭味。但在此题中, 病人的大便为暗绿色水样便, 与此种症状不符。

选项 B: 真菌性肠炎多由白念珠菌引起, 常见于 2 岁以下婴儿, 表现为大便次数增多, 黄色稀便, 泡沫较多, 带黏液, 有时可见豆腐渣样细块。然而, 本题中的症状并未提及这些特征。

选项 C (正确答案): 金黄色葡萄球菌肠炎通常会在大剂量应用抗生素后发生, 大便为暗绿色水样便, 镜检发现大量红细胞。这与题干描述的症状一致。

选项 D: 侵袭性大肠杆菌肠炎通常表现为急性起病, 高热甚至可以发热惊厥, 腹泻频繁, 大便呈黏液状, 带脓血, 有腥臭味。这与题干中的症状不符。

选项 E: 空肠弯曲菌肠炎表现为脓血便、腹痛剧烈, 亦可并发严重的小肠结肠炎、败血症、肺炎、脑膜炎、心内膜炎、心包炎等。但在本题中, 并未描述出这些症状。

46. 【答案】D

【解析】

选项 A: 出血性大肠埃希菌肠炎, 主要表现为大便次数增多, 开始为黄色水样便, 后转为血水便, 有特殊臭味。但题干中的症状并不完全符合, 所以排除。

选项 B: 真菌性肠炎, 多由白念珠菌引起, 2 岁以下婴儿多见, 表现为大便次数增多, 黄色稀便, 泡沫较多, 带黏液, 有时可见豆腐渣样细块。但题干中的症状并不符合, 所以排除。

选项 C: 金黄色葡萄球菌肠炎, 多继发于大量使用抗生素后, 表现为发热、呕吐、腹泻、不同程度的中毒症状、脱水和电解质紊乱, 甚至发生休克。典型的大便为暗绿色, 量多带黏液, 少数为血便。而题干中的症状并不完全符合, 所以排除。

选项 D: 侵袭性大肠杆菌肠炎, 通常表现为急性起病, 高热甚至可以发热惊厥, 腹泻频繁, 大便呈黏液状, 带脓血, 有腥臭味。这与题干中的症状完全一致, 所以是正确答案。

选项 E: 空肠弯曲菌肠炎, 主要表现为脓血便、腹痛剧烈, 亦可并发严重的小肠结肠炎、败血症、肺炎、脑膜炎、心内膜炎、心包炎等。但题干中的症状并不完全符合, 所以排除。

47. 【答案】C

【解析】

选项 A: 拆线时间为术后 2 周。这一时间段通常适用于减张缝线的拆除, 但在本题的情境中, 患者接受的是胃大部切除术, 因此这个答案是错误的。

选项 B: 拆线时间为术后 10~12 天。这一时间段通常适用于四肢手术的拆线, 尤其是在关节处的手术, 可能需要适当延长拆线时间。然而在本题的情境中, 患者接受的是胃大部切除术, 因此这个答案是错误的。

选项 C: 拆线时间为术后 7~9 天。这是正确答案。在胃大部切除术后, 一般在术后 7~9 天进行拆线。这一时间段可以确保伤口愈合, 同时也可以避免线头在体内过长时间, 导致可能的感染或其他并发症。

选项 D: 拆线时间为术后 5~6 天。这一时间段通常适用于下腹部、会阴部的手术拆线。然而在本题的情境中, 患者接受的是胃大部切除术, 因此这个答案是错误的。

选项 E: 拆线时间为术后 3~4 天。这一时间段通常适用于头、面、颈部的手术拆线。然而在本题的情境中, 患者接受的是胃大部切除术, 因此这个答案是错误的。

48. 【答案】C

【解析】

选项 A: 低钙血症通常会导致手足搐搦症、神经肌肉兴奋性增高等症状, 但在这个案例中, 患者补充葡萄糖酸钙后症状未见改善, 因此不太可能是低钙血症。

选项 B: 低镁血症也会导致神经肌肉兴奋性增高, 临床上可能出现手足搐搦、Chvostek 征阳性等症状。但是, 患者的病史中有严格低盐饮食, 这与低镁血症的病因不符。

选项 C: 低钠血症可能导致多种神经肌肉症状, 包括嘴角抽搐。患者的病史中有长期胃肠减压和严格低盐饮食, 这些都可能导致低钠血症。因此, 这是最可能的答案。

选项 D: 低钾血症的主要症状通常是肌无力, 而不是嘴角抽搐。因此, 这不太可能是正确答案。

选项 E: 高钙血症的症状包括疲乏无力、精神不集中、失眠、抑郁、腱反射迟钝、肌力下降等, 严重者可出现神志不清甚至昏迷。这些症状与患者的症状不符, 因此, 这不太可能是正确答案。

49. 【答案】C

【解析】

A 选项: 代偿期酸中毒时 pH 值仍在正常范围, 而题干中患者的 pH 值为 7.25, 低于正常范围, 所以排除。

B 选项: 代偿期碱中毒时, 血液 pH 值可能基本正常, 但 HCO_3^- 和 BE 会有一定程度的增高。题干数据中 pH 值偏低, BE 为 +1.5, 并未明显增高, 不符合此选项特点, 排除。

C 选项: 失代偿期呼吸性酸中毒时, pH 值降低, PaO_2 降低, PaCO_2 增高。题干数据中 pH 值为 7.25, 低于正常范围, 氧分压小于 60mmHg, 二氧化碳分压大于 50mmHg, 符合失代偿期呼吸性酸中毒的特征, 因此正确。

D 选项: 失代偿期碱中毒时, 血液 pH 和 HCO_3^- 明显增高。题干数据中 pH 值为 7.25, 低于正常范围, 不符合此选项特点, 排除。

E 选项: 呼吸合并代酸时, pH 降低, BE 负值增大。题干数据中 pH 值为 7.25, 低于正常范围, 但 BE 为 +1.5, 并未出现负值增大的情况, 不符合此选项特点, 排除。

50. 【答案】C

【解析】

A. 腹膜转移癌: 主要表现为腹水、腹胀、腹痛、贫血和体重减轻, 本患无移动性浊音, 提示无大量腹水, 故此选项不符。

B. 粘连性肠梗阻: 典型症状为腹胀、腹痛、恶心呕吐、排便障碍等。腹部立位 X 片可以见到有胀气的肠袢以及气液平面, 与本患不符, 故此选项不符。

C. 胰腺假性囊肿: 患者中青年男性, 上腹疼痛 7 小时。伴发热, 频繁呕吐。查体发现上腹部肌紧张, 压痛 (腹膜炎表现)。血白细胞 $15 \times 10^9/\text{L}$ (正常值 $4 \times 10^9/\text{L} - 10 \times 10^9/\text{L}$)。X 线检查: 膈下未见游离气体 (排除胃肠穿孔)。治疗期间出现上腹部包块, 考虑急性胰腺炎并发胰腺假性囊肿, 故此选项符合。

D. 胰腺癌: 最多见的是上腹部饱胀不适、疼痛。胰腺深在, 于后腹部难摸到, 腹部包块位于病变所在处, 如已摸到肿块, 多属进行期或晚期, 故此选项不符。

E. 结肠癌: 早期可以没有任何症状, 中晚期可表现为腹胀、消化不良, 而后出现排便习惯改变, 腹痛, 黏液便或黏血便。与本患不符, 故此选项不符。

51. 【答案】B

【解析】

选项 A: “急诊手术”一般用于急性腹膜炎、胆道感染、肠穿孔、大出血或胰腺假性囊肿等情况。患者的症状和体征并未满足这些条件, 因此排除选项 A。

选项 B: “禁食和胃肠减压”是急性胰腺炎的主要治疗方法。患者的症状 (上腹疼痛、发热、频繁呕吐) 以及

体征（上腹部肌紧张、压痛、高白细胞计数）均符合急性胰腺炎的临床表现。因此，选择选项 B。

选项 C：“腹腔穿刺引流”通常用于存在移动性浊音的情况，本例中患者无此体征，因此排除选项 C。

选项 D：“腹腔镜切除胆囊”是针对胆源性急性胰腺炎的治疗方法。患者的症状和体征并未符合胆源性胰腺炎的诊断，因此排除选项 D。

选项 E：“应用大量广谱抗生素”在急性胰腺炎的治疗中，抗生素的使用应当在有感染证据时进行，而且应选择能透过血胰屏障的针对革兰阴性菌和厌氧菌的抗生素，而不是大量广谱抗生素。因此排除选项 E。

52. 【答案】C

【解析】

选项 A：十二指肠溃疡大出血的典型症状是慢性周期性节律性上腹痛，性质可以是钝痛、灼痛、胀痛、剧痛、饥饿样不适。十二指肠溃疡多在饥饿或夜间痛，进餐后缓解。这与患者的病情不符，所以排除。

选项 B：急性胆道大出血的典型临床表现为三联征：胃肠道出血（呕血、便血）、胆绞痛和黄疸。这与患者的病情不符，所以排除。

选项 C：患者有乙肝病史，晚餐后突发呕血，查体发现肝掌和脾肋下 2cm（肝硬化表现），这些都指向了乙肝后肝硬化、食管胃底静脉曲张破裂出血的诊断，所以此为正确答案。

选项 D：胃溃疡大出血的典型症状是餐后痛，与患者的病情不符，所以排除。

选项 E：急性糜烂性胃炎的常见症状包括上腹痛、胀满、恶心、呕吐和食欲不振等。患者有乙肝病史和肝掌，应该优先考虑肝硬化并发门静脉高压症，引起食管胃底静脉曲张破裂出血，所以排除。

53. 【答案】A

【解析】

选项 A：肠易激综合征（IBS）的主要表现为反复出现的腹痛或腹部不适，与排便相关，并且伴有排便习惯改变。本题中，患者的症状如反复便秘、腹痛，以及工作紧张时症状加重等，都符合 IBS 的诊断标准，因此 A 是正确答案。

选项 B：克罗恩病的主要表现为腹痛、腹泻、体重下降，常有发热、疲乏等全身表现，肛周脓肿或瘘管等局部表现，以及关节、皮肤、眼、口腔黏膜等肠外损害。但本题患者并未出现这些症状，所以 B 选项不符。

选项 C：肠结核的主要表现为腹痛，大便习惯改变，腹部肿块，同时有长期不规则低热，盗汗，乏力等全身症状。然而，本题患者没有出现这些症状，因此 C 选项不符。

选项 D：结肠癌的主要表现为排便习惯与粪便形状改变，伴贫血、低热、消瘦。但本题患者并未出现这些症状，所以 D 选项不符。

选项 E：溃疡性结肠炎表现为反复发作的腹泻、黏液脓血便及腹痛。然而，本题患者没有出现这些症状，因此 E 选项不符。

54. 【答案】D

【解析】

选项 A：经颈静脉肝内门体分流术适用于肝功能差的门静脉高压症引起出血的病人。这种手术方式是通过在颈部将门静脉和体静脉连接，以减轻门静脉压力，达到止血的目的。但由于该患者肝功能良好，所以此选项不适用。

选项 B 和 C：非选择性门体分流术、选择性门体分流术主要适用于有食管胃静脉曲张破裂出血（史）伴随有明显门静脉高压性胃病出血及断流术后再次出血者。这两种手术方式都是通过改变血液流向，减轻门静脉压力，从而达到止血的目的。但由于该患者没有明显的门静脉高压性胃病出血史，所以这两个选项都不适用。

选项 D：贲门周围血管离断术适用于肝功能良好的门静脉高压症引起的食管或胃底静脉曲张破裂。这种手术方式是通过完全离断食管下段和胃底曲张静脉的反常血流，以达到确切止血的目的。考虑到该患者的病情，此选项最为适合。

选项 E：脾切除术适用于脾功能亢进的门静脉高压症引起出血的患者。这种手术方式主要是通过切除脾脏，减轻门静脉压力，达到止血的目的。但由于该患者没有脾功能亢进的表现，所以此选项不适用。

55. 【答案】C

【解析】

A. 内镜下摘除息肉：此选项不正确。虽然内镜下摘除息肉是一种常见的治疗方式，但它主要适用于增生性息肉，且直径多小于 5mm。在这个案例中，患者的息肉为结肠多发腺瘤样息肉，恶变可能性大，因此需要进行更彻底的治疗。

B. 经肛切除直肠息肉：此选项不正确。经肛切除直肠息肉主要用于直肠息肉的手术治疗，而这个患者的息肉位于结肠，因此这种方法不适合。

C. 行根治性结肠切除术：此选项正确。家族性肠息肉病的患者几乎所有人都将发展为结直肠癌，因此，最适宜的治疗是行根治性结肠切除术。

D. 放射治疗：此选项不正确。放射治疗主要用于中低位的直肠癌，结肠癌中晚期术后可选择化疗作为辅助治疗，而这个患者的病情并未发展到这一步。

E. 抗生素治疗：此选项不正确。抗生素治疗主要用于感染性疾病，而这个患者的病情是结肠多发腺瘤样息肉，无感染征象，因此不适合使用抗生素。

56. 【答案】E

【解析】

A. 抗生素应用：这是正确的处理方式。在急性阑尾炎的治疗中，抗生素是常规使用的药物，可以帮助控制感染，防止术后并发症。

B. 可食流质饮食：这也是正确的处理方式。术后为了避免对肠道的刺激，通常建议患者食用流质饮食。

C. 中药辅助治疗：这是正确的处理方式。在中国，中药被广泛用于辅助治疗各种疾病，包括急性阑尾炎。中药可以帮助改善患者的整体状况，促进脓肿的吸收和消退。

D. 行阑尾切除术：这是正确的处理方式。对于急性阑尾炎，一旦确诊，通常推荐尽早进行阑尾切除术，以防止炎症的进一步扩散。

E. 针灸或理疗：这是错误的处理方式。急性阑尾炎是一种需要手术治疗的紧急状况，针灸或理疗无法解决问题，可能会延误治疗，导致病情恶化。

57. 【答案】B

【解析】

A. 嵌顿疝：嵌顿疝是指疝内容物不能复位，且疝门紧窄，使疝囊内的血液循环受阻。此情况下，应进行紧急手术，除去坏死组织并修补疝门，而不仅仅是疝囊高位结扎。

B. 绞窄疝：绞窄疝是指疝囊颈部过紧，使疝囊内的器官（通常是肠）血液供应受阻，可能导致器官坏死。在这种情况下，应对疝囊进行高位结扎，切除坏死的疝囊和肠段，并避免进行复杂的修补手术，以降低感染风险。这是本题的正确答案。

C. 易复性疝：易复性疝是指疝病经过手术治疗后，疝病再次出现。此时，应进行疝囊高位结扎并修补疝门，以预防疝的再次复发。

D. 难复性疝：难复性疝是指疝内容物难以复位的疝。对于难复性疝，除非存在并发症如肠梗阻或坏死，否则应进行疝囊高位结扎并修补疝门。

E. 滑动性疝：滑动性疝是指部分或全部疝囊内容物是腹膜后的器官，如肠、膀胱等。这种情况下，除非有并发症，否则应进行疝囊高位结扎并修补疝门。

58. 【答案】E

【解析】

A. 氢化可的松保留灌肠：氢化可的松是一种糖皮质激素，主要用于对中度及重度溃疡性结肠炎(UC)病人的首选治疗，当5-ASA疗效不佳时。但它只适用于UC活动期的诱导缓解，症状控制后应逐渐减量至停药，不宜长期使用。

B. 口服强的松：强的松也是一种糖皮质激素，同样适用于中度及重度UC病人的首选治疗，当5-ASA疗效不佳时。同样，只适用于UC活动期的诱导缓解，症状控制后应逐渐减量至停药，不宜长期使用。

C. 口服氟哌酸：氟哌酸是一种抗生素，对UC一般病例并无指征。只有在重症有继发感染者，应积极抗菌治疗，选择广谱抗生素。

D. 口服甲硝唑：甲硝唑也是一种抗生素，对UC一般病例并无指征。只有在重症有继发感染者，应积极抗菌治疗，选择广谱抗生素。

E. 口服SASP：SASP即柳氮磺吡啶，是一种氨基水杨酸制剂，是UC的首选治疗药物。其治疗目标是诱导并维持症状缓解及黏膜愈合，防治并发症，改善生存质量。

59. 【答案】B

【解析】

A. PPI（质子泵抑制剂）：PPI可以抑制胃酸的分泌，帮助溃疡愈合，但是对于伴有血管外露的溃疡出血，单独使用PPI可能无法有效止血，因此不是最佳选择。

B. PPI+内镜下治疗：对于伴有血管外露的溃疡出血，除了使用PPI外，还需要进行内镜下的止血治疗，如电凝、止血夹等，因此是最合适的治疗方案。

C. 血管断离术：这是一种用于处理肝硬化门脉高压引起的上消化道大出血的手术方法，对于本题的患者情况并不适用。

D. 补液、输血：这是消化道大出血时的对症支持治疗，可以维持组织灌注，但并不能解决出血的问题，因此不是首选治疗。

E. 应用氨甲环酸：氨甲环酸可以抑制纤维蛋白溶解，有止血作用。但在使用前需要评估是否存在凝血功能异常、纤溶亢进的情况，否则可能会加重出血，因此不适合作为首选治疗。

60. 【答案】C

【解析】

选项A：直肠肛管周围脓肿，主要是指直肠肛管周围软组织或其周围间隙发生的急性化脓性感染，并形成脓肿。但是，此类脓肿通常会有肛周明显红肿的体征，而患者查体时并未发现肛周有明显红肿，因此排除。

选项B：坐骨肛管间隙脓肿，也称坐骨肛管窝脓肿，病侧会有持续性胀痛，逐渐加重，继而为持续性跳痛，排便或行走时疼痛加重，可有排尿困难和里急后重。早期局部体征不明显，以后出现肛门病侧红肿，双臀不对称，局部触诊或直肠指诊时病侧有深压痛，甚至波动感。但是，患者的体检结果并未发现肛门病侧红肿，双臀不对称等体征，因此排除。

选项C：骨盆直肠间隙脓肿，也称骨盆直肠窝脓肿，引起的全身症状较重而局部症状不明显。早期有发热、寒战、全身疲倦不适等，局部可见直肠坠胀感、便意不尽，伴排尿困难。会阴部检查多无异常，直肠指诊可在直肠壁上触及肿胀隆起，有压痛和波动感。这与患者的情况非常相符，因此选C。

选项D：肛周脓肿，是直肠肛管周围脓肿最常见的，全身感染性症状不明显，主要症状为肛周持续性跳动感疼痛。病变处明显红肿，有硬结和压痛，脓肿形成可有波动感。然而，患者并未出现肛周明显红肿的症状，因此排除。

选项E：直肠壁内脓肿，局部症状大多不明显，主要表现为会阴、直肠部坠胀感，排便时疼痛加重，直肠指诊可触及痛性肿块。但是，患者的症状并不完全符合这种情况，因此排除。

61. 【答案】B

【解析】

选项 A: 十二指肠损伤在腹部闭合损伤时很少受累, 早期症状体征多不明显。如果损伤发生在腹腔内部分, 胆汁和胰液经破口流入腹腔, 早期可有腹膜炎症状, 但不会出现右侧膈肌上升。

选项 B: 患者青年男性, 右上腹部钝性损伤 (外伤史), 面色苍白, 脉快, 血压 70/45mmHg (失血性休克表现, 考虑腹腔内大出血), 腹膜刺激征明显 (肝外伤时可有胆汁溢出)。X 线检查发现右侧膈肌上升 (肝所在位置), 因此诊断首先考虑肝破裂。

选项 C: 脾破裂者应为左侧膈肌上升, 而非右侧。

选项 D: 胰腺损伤约占腹部损伤的 1%-2%, 表现为上腹明显压痛和肌紧张、肩部疼痛。不会出现右侧膈肌上升。

选项 E: 小肠损伤可在早期出现明显的腹膜炎, 不会出现右侧膈肌上升。

62. 【答案】C

【解析】

选项 A: 血沉增快可作为估计结核病活动程度的指标之一, 但在炎症时血沉也可能升高, 因此这并不具有特异性, 不能确诊为肠结核。

选项 B: 血常规检查的结果非特异性, 无法准确确定患者是否患有肠结核。

选项 C: 结肠镜检查可以直接观察到肠道内部的情况, 如果在结肠镜下发现病灶处有肉芽肿、干酪坏死或抗酸杆菌, 就可以确诊为肠结核。因此, 对于本题中的患者来说, 结肠镜检查是最具诊断意义的检查方式。

选项 D: X 线钡剂透视可以观察到肠道的形态变化, 如肠粘膜呈结节状改变, 肠腔变窄、肠段缩短变形等, 这些都是肠结核的可能表现, 但仍不能确诊。

选项 E: 诊断性腹腔穿刺主要用于有腹腔积液的患者, 而本题中的患者没有腹腔积液, 因此这种检查方式对诊断没有帮助。

63. 【答案】C

【解析】

A. 克罗恩病: 主要症状为腹痛、腹泻、体重下降, 肠镜下可见肠粘膜呈非连续性病变、纵行溃疡和卵石样外观。但是在本题中, 患者并没有显示腹泻和体重下降的症状, 所以不选择 A。

B. 溃疡性结肠炎: 主要症状为反复发作的腹泻、黏液脓血便及腹痛。肠镜可见病变处弥漫性糜烂和多发性浅溃疡等表现。在本题中, 患者并未有腹泻和黏液脓血便的症状, 所以不选择 B。

C. 肠易激综合征: 主要临床表现为腹痛、排便习惯改变和粪便性状的变化, 精神、饮食等因素常诱使症状反复或加重。这与题目中描述的症状及状况相符, 所以选择 C。

D. 吸收不良综合征: 以腹胀、腹泻、贫血或骨痛为主要表现。胃肠 X 线检查可见空肠中段及远端肠管扩张, 钡剂通过不吝, 黏膜皱裂粗大, 肠壁平滑呈“蜡管”征, 钡剂分段或结块 (印痕征)。在本题中, 患者并未有腹泻和贫血的症状, 所以不选择 D。

E. 炎症性肠病: 是一种病因未明的慢性非特异性肠道炎症性疾病, 包括溃疡性结肠炎和克罗恩病。但是在本题中, 患者的检查结果均为阴性, 所以不选择 E。

64. 【答案】B

【解析】

A. 腹股沟直疝: 此类疝常见于老年人, 主要表现为直立位时可见腹股沟内侧端、耻骨结节上外方出现一半球形肿块, 并不伴有疼痛或其他症状。与本题病例不符。

B. 腹股沟斜疝: 此类疝的特点是疝囊经过腹壁下动脉外侧的腹股沟管深环 (内环) 突出, 向内、向下、向前斜行经过腹股沟管, 再穿过腹股沟管浅环 (皮下环), 并可进入阴囊。本题病例符合这些特点, 所以此选项正确。

C. 精索鞘膜积液：这种情况下肿块较小，在腹股沟管内，牵拉同侧睾丸可见肿块移动。与本题病例不符。

D. 股疝：股疝的疝块往往不大，平卧回纳内容物后，疝块有时不能完全消失。与本题病例不符。

E. 交通性鞘膜积液：其表现为每日起床后或站立位时肿块缓慢地出现并增大，平卧或睡觉后肿块逐渐缩小，挤压肿块时也缩小，透光试验阳性。与本题病例不符。

65. 【答案】E

【解析】

A. 腹部B超只能用于诊断是否有腹腔积液，但不能确定积液的病因，因此此选项不正确。B. 胃肠道钡剂检查可以发现肠粘连、肠结核、肠瘘、肠腔外肿块等征象，但对结核性腹膜炎无确诊价值，因此此选项不正确。C. 血沉增高可见于多种疾病，如急性炎症、白血病、结缔组织病及结核病的活动期，不具有特异性，因此此选项不正确。D. 结核性腹膜炎的腹水普通细菌培养结果为阴性，结核分枝杆菌培养的阳性率很低，因此此选项不正确。E. 腹腔镜检查结合病理活检可以明确诊断结核性腹膜炎，因此此选项正确。

66. 【答案】D

【解析】

A. 结肠癌：结肠癌早期可能无症状，中晚期可能出现腹胀、消化不良，排便习惯改变，腹痛，黏液便或黏血便。本患者虽有腹痛，但无上述其他症状，且年龄偏小，因此不考虑结肠癌。

B. 溃疡性结肠炎：其最初表现多种多样，血性腹泻是最常见的早期症状。其他症状有腹痛、便血、体重减轻、里急后重、呕吐等。偶尔主要表现为关节炎、虹膜睫状体炎、肝功能障碍和皮肤病变。本患者的临床表现与溃疡性结肠炎不完全符合。

C. 细菌性痢疾：由志贺菌引起的肠道传染病，主要表现为发热，腹泻，粘液脓血便。本患者无此类症状，因此不考虑细菌性痢疾。

D. 克罗恩病：本患者的临床表现与克罗恩病相符，故选择此项。

E. 阑尾炎：急性阑尾炎典型表现为转移性右下腹痛。慢性阑尾炎经常有右下腹疼痛，或仅有隐痛不适，剧烈活动或饮食不节可诱发急性发作。无口腔溃疡、便秘表现。本患者的临床表现与阑尾炎不符。

67. 【答案】A

【解析】

选项A：内脏小神经由穿过第九、十（或第十、十一）胸神经节的节前纤维组成的神经。它是阑尾的神经支配，因此选项A是正确答案。

选项B：第10胸神经为脊神经，司肌肉运动和皮肤感觉，分布于脐水平。这与阑尾的神经支配无关，所以选项B是错误的。

选项C：第12胸神经为脊神经，司肌肉运动和皮肤感觉，分布于腹股沟水平。这与阑尾的神经支配无关，所以选项C是错误的。

选项D：内脏大神经由穿过第五（或第六）至第九（或第十）胸神经节的节前纤维组成的神经。主要分布于内脏、心血管系统和腺体。这与阑尾的神经支配无关，所以选项D是错误的。

选项E：坐骨神经是脊神经中骶丛的主要神经，由腰神经和骶神经组成。这与阑尾的神经支配无关，所以选项E是错误的。

68. 【答案】C

【解析】

A. 广泛切除瘘管周围瘢痕组织：这一步骤在手术中是有必要的，但并不是关键步骤。广泛切除瘘管周围瘢痕组织能帮助清除病变，促进伤口愈合，但关键还是要找到并处理好瘘管的内口。

B. 切除瘘管后应一期缝合：这一步骤存在误导。实际上，肛瘘切除术后，创面可以选择不缝合，或者部分

缝合部分敞开，以利于排脓和愈合。

C. 确定外口和内口的位置：这是肛瘘手术的关键步骤。只有明确了瘘管的行程和内口位置，才能尽可能减少对肛门括约肌的损伤，防止肛门失禁，避免复发。

D. 必须用探针穿入肛管造成内口再切开：这个选项存在误解。实际上，内口是原本就存在的，而不是手术中用探针造成的。手术中可以用亚甲蓝溶液来确定内口位置，在探针引导下，切开探针上的表层组织，直到内口。

E. 麻醉选择：麻醉是手术的一部分，但并非关键步骤。肛瘘手术常常选择骶管麻醉或局部麻醉。

69. 【答案】A

【解析】

A. 结肠呈铅管样：这是溃疡性结肠炎的特征性 X 线钡餐表现，因为结肠壁的炎症和水肿导致黏膜皱襞消失，使得结肠呈现铅管样改变。故选 A。

B. 回肠末端呈线样征：这是肠结核的 X 线表现，肠结核通常会在回肠末端形成线样狭窄，所以选项 B 错误。

C. 回肠部呈跳跃征：这也是肠结核的 X 线表现，跳跃征是指肠道的病变部位跳跃式分布，与溃疡性结肠炎无关，故 C 选项错误。

D. 盲肠充盈缺损，肠腔狭窄：这是盲肠肿瘤的 X 线表现，肿瘤生长会导致肠腔狭窄和盲肠充盈缺损，与溃疡性结肠炎无关，故 D 选项错误。

E. 盲肠运动加速，结肠袋加深，张力增强：这与溃疡性结肠炎的 X 线钡餐表现不符，溃疡性结肠炎会导致肠壁炎症和水肿，结肠袋通常会消失，故 E 选项错误。

70. 【答案】D

【解析】

选项 A：克罗恩病。这是一种慢性炎症性肠道疾病，主要影响消化道的任何部位，从口腔到肛门。其 X 线造影特征包括肠黏膜皱襞粗乱、纵行性溃疡或鹅卵石征等，但不呈现“鸟嘴征”。

选项 B：肠套叠。这是指肠管的一部分滑入相邻的肠管段内，形成肠道阻塞。其 X 线造影特征为遇阻处钡餐呈“杯口状”，乃至呈“弹簧”状黑影，而非“鸟嘴征”。

选项 C：小肠扭转。小肠扭转是指小肠因各种原因在肠系膜根部绕轴线扭转，导致肠壁血液循环障碍。其 X 线造影可见空肠和回肠换位，或排列成多种形态的小跨度蜷曲肠袢等特有的征象，但不呈现“鸟嘴征”。

选项 D：乙状结肠扭转。这是指乙状结肠在其系膜根部绕轴线旋转，导致肠壁血液循环障碍。它主要发生在乙状结肠冗长、有便秘的老年人中。其 X 线造影特征为扭转部位钡剂受阻，可见“鸟嘴征”。因此，本题的正确答案是 D。

选项 E：肠结核。肠结核是由结核杆菌引起的消化系统结核病的一种，其 X 线造影下钡剂于病变肠段呈现激惹征象，排空很快，充盈不佳，而在病变的上、下肠段则钡剂充盈良好，称为 X 线钡影跳跃征象，但不呈现“鸟嘴征”。

71. 【答案】C

【解析】

选项 A：肝脏在车祸伤后，主要表现为失血性休克、胆汁性腹膜炎和继发性感染，但淀粉酶通常正常，因此不选 A。

选项 B：脾脏是腹腔内最容易受损的器官之一，其主要危险表现为失血性休克，但淀粉酶通常正常，因此不选 B。

选项 C：胰腺损伤在腹部损伤中占比为 1%-2%，血淀粉酶和腹腔穿刺液的淀粉酶升高，对诊断胰腺损伤有重要参考价值，因此选 C。

选项 D：肾脏损伤时，通常以血肌酐、尿素升高为主要表现，淀粉酶通常正常，因此不选 D。

选项 E: 胃在腹部闭合性损伤中很少受累, 只在饱腹时偶尔发生, 血淀粉酶通常正常, 如果发生消化道穿孔, 淀粉酶可能轻度升高, 但不会达到 1000U/L, 因此不选 E。

72. 【答案】B

【解析】

选项 A: Miles 手术, 也被称为经腹会阴联合直肠癌根治术, 主要用于治疗低位直肠癌, 特别是癌肿下缘距离肛门口 7cm 以内的肿瘤。因此, 对于本题中距离肛门 10cm 的肿瘤, Miles 手术并不适用。

选项 B: Dixon 手术, 即低位前切除术, 常用于治疗中、低位直肠癌。由于本题中的肿瘤下缘距离肛门 10cm, 因此 Dixon 手术是最佳选择。

选项 C: 拉下式直肠癌切除术, 主要适用于肿瘤距离肛缘 7-10cm 的情况。虽然这个范围包括了本题的肿瘤, 但是该方法术后控制排便效果不满意, 手术彻底性差, 因此不是最佳选择。

选项 D: 局部切除术, 主要适用于病灶距离肛缘 4-5cm 的情况。明显不符合本题的肿瘤情况。

选项 E: Duhamel 手术, 是一种治疗先天性巨结肠的手术方式, 与本题无关。

73. 【答案】E

【解析】

选项 A: 低位肠梗阻多位于回肠末段。这是因为回肠末段的管腔较窄, 容易发生梗阻。此选项正确。

选项 B: 低位肠梗阻的腹胀和腹痛显著, 遍及全腹。这是因为梗阻部位在肠道的下游, 积蓄的气体和液体量大, 压力高, 因此腹胀和腹痛较为明显。此选项正确。

选项 C: 低位肠梗阻的呕吐出现较晚, 初为胃内容物, 后期为积蓄在肠内并经发酵、腐败呈粪样的肠内容物。这是因为梗阻位置较低, 肠内的内容物需要一定的时间才能反流至胃部并被呕吐出来。此选项正确。

选项 D: 低位性肠梗阻时回肠扩张的肠袢多, X 线检查可见阶梯状的液平面。这是因为梗阻部位以下的肠段充满气体和液体, 造成肠腔扩张, 形成阶梯状气液平面。此选项正确。

选项 E: 低位肠梗阻的呕吐症状出现早。这是错误的, 因为低位肠梗阻的呕吐症状通常出现较晚, 而高位肠梗阻的呕吐症状出现较早。此选项错误。

74. 【答案】C

【解析】

选项 A: Ferguson 法主要用于腹股沟疝的手术治疗, 它是加强或修补腹股沟管前壁最常用的方法, 适用于腹横筋膜无显著缺损、腹股沟管后壁尚健全的病例。但对于股疝, 特别是女性股疝, Ferguson 法并非首选。

选项 B: Basini 法同样主要用于腹股沟疝的手术治疗, 能够加强或修补腹股沟管后壁。然而, 对于股疝, 该方法也不是首选。

选项 C: McVay 法是股疝修补的最常用手术, 尤其适合 40 岁以上的妇女。此方法能够加强腹股沟管后壁及堵住股环, 因此是女性股疝的首选手术方式。

选项 D: Halsted 法和 Basini 法类似, 主要用于腹股沟疝的手术治疗, 能够加强或修补腹股沟管后壁。对于股疝, 该方法并不是首选。

选项 E: 疝囊高位结扎术是指显露疝囊颈, 予以高位结扎、贯穿缝扎或荷包缝合, 然后切去疝囊的手术方法, 主要适用于腹股沟疝, 并非女性股疝的首选手术方式。

75. 【答案】E

【解析】

选项 A (5ml): 每日消化道出血量达到 5ml 时, 粪便潜血试验可能呈阳性。然而, 这个量级的出血不足以使粪便呈现黑色。因此, A 选项是错误的。

选项 B (20ml)、C (30ml)、D (40ml): 虽然这些出血量可能导致粪便潜血试验呈阳性, 但仍然不足以使粪便

呈现黑色，即“黑粪”。“黑粪”是由于上消化道大量出血，血液经过消化道长时间的消化吸收，血红蛋白被转化为硫化铁，使粪便呈现黑色。因此，B、C、D选项都是错误的。

选项E（50ml）：当每日消化道出血量超过50ml时，可能出现“黑粪”。这是因为大量的血液在消化道内经过消化吸收，血红蛋白被转化为硫化铁，使粪便呈现黑色。因此，E选项是正确的。

76. 【答案】D

【解析】

A选项：PET，即正电子发射断层扫描，是一种核医学影像检查技术。其能够显示身体内部生物化学过程的信息，对于一些疾病如癌症等有很好的诊断效果。但对于肾结核的诊断，其效果并不是最明显，因此不是最有意义的诊断方式。

B选项：尿路平片，是一种通过X线拍摄尿路系统的影像学检查，可以看到病肾局灶或斑点状钙化影或全肾广泛钙化等情况，但对于肾结核的诊断，其意义也不是最大。

C选项：B超，即超声波检查，是一种无创伤、无痛苦、无放射性损害的检查方式。对于中晚期肾结核病例可以初步确定病变部位，但对于早期肾结核可能无法准确诊断，因此也不是最有意义的诊断方式。

D选项：静脉尿路造影，是在静脉注射造影剂后，在X光下看尿路是否有病变的检查，是肾结核影像学诊断手段之一，对于肾结核的诊断具有重要意义，因此是最有意义的诊断方式。

E选项：膀胱镜检查，通过观察膀胱黏膜充血、水肿、浅黄色结核结节、结核性溃疡、肉芽肿及瘢痕等病变，可以初步诊断肾结核，但并不是最有意义的诊断方式。

77. 【答案】A

【解析】

A. 苍白螺旋体：苍白螺旋体是梅毒的病原体，青霉素是治疗梅毒的首选药物，对孕妇和胎儿安全。因此，A选项正确。

B. 人乳头瘤病毒：人乳头瘤病毒引起尖锐湿疣，其治疗主要为局部涂药，物理治疗或手术切除，不需要使用青霉素，所以B选项错误。

C. 沙眼衣原体：沙眼衣原体感染后，首选的治疗药物是阿奇霉素或阿莫西林，而非青霉素，所以C选项错误。

D. 解脲支原体：对于有症状的解脲支原体感染患者，首选的治疗药物是阿奇霉素，而非青霉素，所以D选项错误。

E. 人免疫缺陷病毒：人免疫缺陷病毒感染后，首选的治疗是抗病毒治疗，而非青霉素，所以E选项错误。

78. 【答案】C

【解析】

A选项：苍白螺旋体是梅毒的病原体，其首选的治疗药物是青霉素，而非阿奇霉素，所以A选项错误。

B选项：人乳头瘤病毒引发的尖锐湿疣，主要的治疗方法是三氯醋酸涂擦局部、物理治疗或者手术切除，而非用阿奇霉素，所以B选项错误。

C选项：沙眼衣原体感染在妊娠期是首选阿奇霉素治疗的，所以C选项正确。

D选项：解脲支原体感染在有症状的情况下首选阿奇霉素治疗，但是对于无症状的孕妇并不需要进行干预和治疗，所以D选项错误。

E选项：人免疫缺陷病毒感染首选的是抗病毒治疗，而非阿奇霉素，所以E选项错误。

79. 【答案】D

【解析】

A. 畸胎瘤：多位于前纵隔，接近心底部的心脏大血管前方，位置与题干中的后纵隔脊柱旁肋脊区内不符，所以A选项错误。

B. 心包囊肿：是先天发育异常所引起，是心包发育过程中慢慢变成的囊性东西，附着在心脏上。心包囊肿跟心包腔不相通，多发生在右侧心膈角或左侧心尖，位置与题干中的后纵隔脊柱旁肋脊区内不符，所以 B 选项错误。

C. 胸腺瘤：多位于前上纵隔，位置与题干中的后纵隔脊柱旁肋脊区内不符，所以 C 选项错误。

D. 神经源性肿瘤：多起源于交感神经，少数起源于外围神经。这类肿瘤多位于后纵隔脊柱旁肋脊区内，以单侧多见，符合题干描述，所以 D 选项正确。

E. 胸内甲状腺：胸内甲状腺肿的发生主要是由于患者颈部甲状腺肿不断延长至胸骨后方而引起，多位于胸骨后或纵隔内前方，位置与题干中的后纵隔脊柱旁肋脊区内不符，所以 E 选项错误。

80. 【答案】D

【解析】

A. 咯血颜色鲜红：这通常是急性呼吸道疾病如肺栓塞等咯血的表现，与左心衰竭肺水肿无关，所以选项 A 错误。

B. 铁锈色血痰：这是大叶性肺炎的特点，患者咳出的痰带有血丝并呈铁锈色，与左心衰竭肺水肿无关，所以选项 B 错误。

C. 砖红色胶冻样黏痰：这是肺炎克雷伯的特点，患者咳出的痰呈砖红色且质地类似胶冻，与左心衰竭肺水肿无关，所以选项 C 错误。

D. 粉红色泡沫样痰：这是左心衰竭肺水肿的典型症状特点，因为肺泡内充满了液体，导致咳出的痰带有大量的泡沫且呈粉红色，所以选项 D 正确。

E. 呕血：呕血多是由于上消化道急性出血所引起的一种症状，主要原因有胃炎、胃溃疡、食管静脉曲张、肝硬化等多种疾病，与左心衰竭肺水肿无关，所以选项 E 错误。

81. 【答案】C

【解析】

选项 A：下肢深静脉血栓形成，主要表现为一侧肢体的突然肿胀，局部感疼痛，行走时加剧。而本题中的患者主要症状是左下肢静脉曲张和长时间站立有酸胀感，并无明显的肿胀和疼痛，因此排除。

选项 B：原发性深静脉瓣膜功能不全，虽然也可导致下肢静脉曲张，但其曲张程度较轻，且早期就可能出现营养性变化，溃疡形成，与题干描述的患者症状不符，因此排除。

选项 C：原发性下肢静脉曲张，主要表现为静脉伸长、迂曲而呈曲张状态。患者的症状和查体结果（左下肢静脉呈串珠样曲张，Trendelenburg 试验(+)）与这个诊断相符，因此选择 C。

选项 D：下肢血栓性浅静脉炎，是急性非化脓性炎症，常伴有血栓形成，表现为病变静脉区呈红肿索条状，明显疼痛和压痛，局部皮温升高。而患者并无这些症状，因此排除。

选项 E：动静脉瘘，患肢局部可触及震颤，闻及连续性血管杂音，皮肤温度升高，浅静脉压力高。题干患者查体未触及震颤，未闻及连续性血管杂音，因此排除。

82. 【答案】C

【解析】

选项 A：动脉硬化性闭塞病常见于 50 岁以上的高血压、糖尿病或者高血脂患者，病因主要是血管硬化斑块导致的。这与题干中 28 岁的年轻男性不符，因此排除。

选项 B：下肢静脉曲张多见于长期站立工作或体力劳动人员，表现为下肢大隐静脉扩张，伸长，迂曲，产生患肢酸胀，乏力，沉重等症状。题干中的患者没有相关体力劳动史，查体也未见曲张静脉，因此排除。

选项 C：血栓闭塞性脉管炎是一种血管的炎性、阶段性和反复发作的慢性闭塞性疾病，多侵袭四肢中、小动脉，以下肢多见。患者有抽烟史和反复静脉炎病史，这些都是血栓闭塞性脉管炎的危险因素，查体发现左脚背动脉搏动减弱，因此这是最可能的诊断。

选项 D: 血栓性浅静脉炎是一种急性非化脓性炎症, 常伴有血栓形成, 病变主要累及四肢浅静脉。题干中的患者没有相关病史, 因此排除。

选项 E: 深静脉血栓形成指血液在深静脉腔内异常凝结, 阻塞静脉管腔, 导致静脉回流障碍, 引起远端静脉高压、肢体肿胀、疼痛及浅静脉扩张等临床症状, 多见于下肢。题干中的患者没有上述表现, 因此排除。

83. 【答案】B

【解析】

选项 A: 皮肤干燥, 毛发干燥易脱落, 这是缺铁性贫血的典型表现, 因为铁元素对于皮肤和毛发的健康有重要作用。

选项 B: 步态不稳, 深感觉减退, 这是中枢神经系统损伤的表现, 与贫血无直接关系, 因此这是正确答案。

选项 C: 口腔炎, 舌乳头萎缩, 这是巨幼细胞贫血的表现, 可能由胃大部切除术后内因子缺乏引发的维生素 B12 缺乏引起。

选项 D: 指甲变脆, 变平或匙状甲, 这也是缺铁性贫血的典型表现, 因为铁元素对于指甲的健康有重要作用。

选项 E: 心尖部收缩期吹风样杂音, 这是贫血患者可能出现的表现, 因为贫血可以引起左心室增大, 导致二尖瓣相对性关闭不全。

84. 【答案】A

【解析】

A. 胃大部切除术: 这是最佳的手术方式, 因为它可以一次性解决穿孔和溃疡两个问题。因此, 选项 A 正确。

B. 全胃切除: 这是胃癌根治性手术, 不适用于本例, 因此, 选项 B 错误。

C. 迷走神经切断加胃窦切除术: 这种手术现已很少应用, 且胃溃疡有癌变可能, 外科处理相对积极, 因此, 选项 C 错误。

D. 高选择性迷走神经切断术: 同样, 这种手术现已很少应用, 且胃溃疡有癌变可能, 外科处理相对积极, 因此, 选项 D 错误。

E. 缝合穿孔后行迷走神经切断加胃空肠吻合术: 这种手术方式也不适用于本例, 因为它不能一次性解决穿孔和溃疡两个问题, 因此, 选项 E 错误。

85. 【答案】B

【解析】

选项 A: 10%葡萄糖酸钙 20ml 缓慢静脉注射。这是因为葡萄糖酸钙能拮抗钾离子对心肌的毒性作用, 同时促进钾离子转入细胞内, 降低血钾水平。患者存在高钾血症, 所以这个措施是正确的。

选项 B: 口服螺内酯。螺内酯是一种排钠保钾利尿药, 但是患者已经有高钾血症, 所以不能单独使用, 这个措施是错误的。

选项 C: 输白蛋白。输白蛋白可以提高血浆胶体渗透压, 配合利尿剂改善腹腔积液的情况。因此, 这个措施是正确的。

选项 D: 控制液体入量。患者肝硬化合并腹腔积液, 应该限制钠、水渗入, 氯化钠摄入应该小于 2.0g/d, 入水量应该小于 1000ml/d。因此, 这个措施是正确的。

选项 E: 葡萄糖加胰岛素静点。这是因为胰岛素与受体结合后, 可以激活并促进钠钾 ATP 酶由胞内囊泡转运到细胞膜, 将更多的钾离子从细胞外摄入到细胞内, 并把钠离子由细胞内排出到细胞外, 从而降低血钾。因此, 这个措施是正确的。

86. 【答案】D

【解析】

A 选项: 右心功能不全会引起体静脉淤血, 包括消化道症状和颈静脉怒张等体征, 但本例中患者无消化道症状

且无颈静脉怒张等右心衰体征，故此选项不正确。

B 选项：淋巴瘤可以导致无痛性淋巴结肿大，但如果出现肝大，通常是由于肿瘤转移到肝脏。然而，这与本例患者的表现不符，故此选项不正确。

C 选项：胆道感染通常会引起右上腹或中上腹疼痛、发热、寒战和黄疸，而不会引起肝大和双下肢水肿，这与本例患者的表现不符，故此选项不正确。

D 选项：肝硬化是乙肝的常见并发症，可以引起肝大。本例中患者有乙肝病史，出现了右上腹剧痛、发热、肝大和双下肢凹陷性水肿等症状，故此选项正确。

E 选项：胃癌的主要症状是疼痛和体重减轻。如果出现肝大，通常是由于肿瘤转移到肝脏。然而，这与本例患者的表现不符，故此选项不正确。

87. 【答案】D

【解析】

选项 A（病毒感染）：肝硬化病人易发生感染，多为细菌性感染。病毒感染一般表现为白细胞降低，其余一般正常，所以不是全血细胞减少的最主要原因。

选项 B（消化道出血）：消化道出血表现为红细胞、血红蛋白下降，白细胞不会减少，所以它也不是全血细胞减少的最主要原因。

选项 C（肝功能减退）：肝功能减退表现为出血和贫血，肝合成凝血因子减少、脾功能亢进和毛细血管脆性增加，但它不是全血细胞减少的最主要原因。

选项 D（脾功能亢进）：肝硬化失代偿期患者，门静脉高压导致的脾静脉回流阻力增加及门静脉压力逆传到脾，脾功能亢进，使血小板及白细胞减少，增生性贫血，易并发感染及出血。所以这是全血细胞减少的最主要原因。

选项 E（肝功能亢进）：肝功能亢进无此种说法，所以它不可能是全血细胞减少的最主要原因。

88. 【答案】A

【解析】

选项 A：腹腔镜下胆囊切除术。这是对于有症状的胆囊结石的首选治疗方式，特点是损伤小、恢复快、疼痛轻、瘢痕不易被发现。本题中患者的病情符合这种治疗方式，所以此选项正确。

选项 B：体外震波碎石。这种方法主要是用于泌尿系结石的治疗，并不适用于胆囊结石，所以此选项错误。

选项 C：胆总管切开。这种手术适用于胆总管梗阻或术中证实胆总管有病变、胆囊结石小且有可能通过胆总管进入胆总管、胆总管扩张直径超过 1cm，胆囊壁明显增厚，发现胰腺炎或胰头肿物的情况。本题中患者的病情并不符合这种治疗方式，所以此选项错误。

选项 D：T 管引流术。这种手术是胆道探查术后放置 T 管，目的是胆道减压引流，预防术后胆漏，作为支撑预防胆管狭窄以及术后经 T 管拔除后窦道处理胆结残余结石，方便治疗和检查胆道疾病。本题中患者的病情并不需要这种治疗方式，所以此选项错误。

选项 E：胆囊切开取石术。这种手术适用于病情复杂或没有腹腔镜设备的医院。本题中患者的病情并不符合这种治疗方式，所以此选项错误。

89. 【答案】C

【解析】

选项 A：X 线钡餐检查。这种检查对于诊断胃食管反流病（GERD）的敏感性不高，对于不愿意或不能耐受胃镜检查者，有助于排除食管癌等其他食管疾病。但在这个案例中，胃镜检查已经进行过且未发现异常，因此不需要再进行 X 线钡餐检查。

选项 B：胃液酸碱度测定。虽然胃液酸碱度测定可以提供一些信息，但是对于 GERD 的诊断价值并不高。胃炎、消化性溃疡都可能导致胃液酸碱度升高，因此这并不能作为 GERD 的确诊依据。

选项 C: 24 小时食管 PH 监测。这是正确的答案。这种监测可以准确地显示食管存在过度酸、碱反流, 从而帮助诊断非糜烂性反流病 (NERD), 这是 GERD 的一种类型。在该患者的情况下, 既往有溃疡病史, 现有刺激性咳嗽, 胃镜检查未见异常, 这些都符合 NERD 的诊断标准。

选项 D: 胸部 CT。胸部 CT 对于 GERD 的诊断并不敏感。虽然它可以发现一些可能导致咳嗽的肺部疾病, 但在这个案例中, 由于患者有溃疡病史和刺激性咳嗽, 更应考虑 GERD。

选项 E: 腹部 B 超。腹部 B 超对于胃肠道疾病的检查并不敏感, 因此在这个案例中, 它并不能提供有用的信息。

90. 【答案】A

【解析】

A. 胃肠造瘘: 胃肠造瘘是一种姑息性手术, 用于改善食管癌患者的生活质量。对于无法进行手术治疗的患者, 如高龄或有基础疾病的患者, 胃肠造瘘可以提供一个新的食物通道, 从而改善患者的营养状况和生活质量。

B. 放疗: 对于局部晚期食管癌但无全身远处转移的患者, 可以进行新辅助同步或序贯放疗, 然后重新评估疗效以决定是否外科手术或继续根治性放疗。但放疗本身并不能直接改善患者的生活质量。

C. 手术: 手术治疗是可切除食管癌的首选治疗方法, 但对于高龄或有基础疾病的患者, 手术风险较高, 不适合进行。

D. 气管切开: 食管癌的典型症状为进行性吞咽困难, 气管切开并不能改善这一症状, 因此不能改善患者的生活质量。

E. 注射营养液: 注射营养液可以提供营养支持, 但如果患者吞咽困难, 注射营养液并不能解决根本问题, 因此不能改善患者的生活质量。

91. 【答案】B

【解析】

A 选项: 这类病变可逆。这个选项是正确的。轻度的不典型增生是可以逆转的, 一些药物治疗, 比如根除幽门螺杆菌, 可能帮助其逆转。

B 选项: 这类病变最终一般均会发展为胃癌。这个选项是错误的。虽然胃黏膜肠化和不典型增生是胃癌的前期病变, 但并不是所有的这类病变都会发展为胃癌, 因此这个选项是错误的。

C 选项: 一些药物可能帮助其逆转。这个选项是正确的。根除幽门螺杆菌的治疗可能帮助异型增生逆转。

D 选项: 对患者要耐心解释, 消除其恐癌心理。这个选项是正确的。医生在面对这类患者时, 需要耐心解释病情, 消除患者的恐癌心理。

E 选项: 必要时定期复查胃镜。这个选项是正确的。对于胃黏膜肠化和不典型增生的患者, 需要定期复查胃镜, 以便及时发现可能的病变。

92. 【答案】D

【解析】

A. 肝癌: 黄疸一般出现在肝癌晚期, 临床表现可见肝区疼痛、肝大, 胆囊多正常。但是肝癌一般无胆囊肿大, 与题意不符。

B. 慢性胆囊炎、胆囊积水: 这些疾病的表现为腹胀、右上腹不适、钝痛、食欲缺乏、厌油腻食物等; 胆囊肿大, Murphy 征阳性。有胆囊触痛, 与题意不符。

C. 胆囊颈部结石嵌顿: 此疾病表现为剧烈胆绞痛, 墨菲氏征阳性。

D. 中下段胆管癌: 黄疸提示胆道梗阻, 胆管癌早期常无特殊临床表现, 随着病情进展, 可出现腹部不适、腹痛、乏力、恶心、上腹肿块、黄疸、发热等。若病变在中下段, 可触及肿大而无触痛的胆囊; 若在上段胆管癌胆囊不肿大, 甚至缩小。

E. 胆总管下段结石: 此疾病可见发热、寒战、黄疸、腹痛。若是引起胆囊肿大, 一般是嵌顿在胆总管, 与题

意不符。

93. 【答案】A

【解析】

选项 A (正确答案): 腹部增强 CT 是胰腺癌首选的影像学检查, 它可以清晰显示胰腺的形态、大小以及是否存在肿瘤, 为胰腺肿瘤的定性、定位诊断提供重要依据。

选项 B: 超声检查虽然可以用于胰腺的筛查, 但其对胰腺的显示通常不清晰, 且在发现胰腺癌时往往已经是晚期, 因此并不是首选的影像学检查方法。

选项 C: MRI 虽然也可以用于胰腺癌的诊断, 但其对于胰腺癌的定位、定性诊断的价值不如增强 CT, 因此也不作为首选。

选项 D: 动脉造影主要用于观察动脉疾病, 如动脉狭窄程度, 动脉瘤, 动脉夹层以及动脉先天畸形等, 对于胰腺癌的诊断价值较低。

选项 E: ERCP 即内镜逆行胰胆管造影, 它可以显示胆管和胰管, 帮助了解有无解剖变异、病变, 但其并不作为胰腺癌首选的影像学检查方法。

94. 【答案】D

【解析】

选项 A: 肝性脑病是肝硬化晚期常见的并发症, 它反映了肝细胞的合成功能和排毒功能严重受损, 因此, 它对判断肝硬化的病情有重要的参考价值。

选项 B: 腹水是肝硬化常见的并发症之一, 其出现通常表明肝硬化病情较重, 门静脉高压和低蛋白血症是其主要原因, 因此, 腹水的存在对于肝硬化的病情评估具有重要意义。

选项 C: 白蛋白是肝脏合成的一种重要的血浆蛋白, 其水平下降通常反映肝脏合成功能的减退, 因此, 血清白蛋白水平对于肝硬化的病情评估具有重要意义。

选项 D: 血清电解质主要用于评估体液和酸碱平衡状态, 它的改变并不能直接反映肝硬化的病情, 因此, 血清电解质对于肝硬化的病情评估帮助不大。

选项 E: 凝血酶原时间反映了肝脏合成凝血因子的能力, 其延长通常表明肝脏合成功能的减退, 因此, 凝血酶原时间对于肝硬化的病情评估具有重要意义。

95. 【答案】E

【解析】

选项 A: CT 能够提供肝脏的详细图像, 用于诊断肝癌及确定治疗策略。但由于需要使用造影剂, 具有一定的创伤性, 且成本较高, 所以不是肝癌筛查的首选方法。

选项 B: MRI 提供的图像解析度非常高, 对于肝癌的诊断非常有帮助。然而, 其价格昂贵, 不适合作为肝癌筛查的首选方法。

选项 C: 血管造影可以清楚地显示肝脏的血管结构, 对于诊断肝癌有一定的帮助。但是, 这种检查方式具有一定的创伤性, 且不如超声方便, 因此不是肝癌筛查的首选方法。

选项 D: 放射性核素肝扫描可以提高诊断和评价疾病进展的准确性。但是, 由于价格昂贵, 且并非诊断肝癌的依据之一, 所以也不是肝癌筛查的首选方法。

选项 E: 腹部超声是肝癌筛查的首选方法, 它能够检出直径大于 1cm 的占位性病变, 具有方便易行、价格低廉、无创等优点。

96. 【答案】A

【解析】

选项 A: 幽门螺杆菌感染是慢性胃炎最常见的病因, 长期的感染可以引起胃黏膜的炎症反应和损伤, 进而发展

成胃炎、胃溃疡甚至胃癌。然而，它并不是急性糜烂出血性胃炎的常见病因。

选项 B：脑外伤可以导致全身应激反应，胃黏膜血流减少，容易发生急性糜烂出血性胃炎，这是 Cushing 溃疡的发病机制。

选项 C：乙醇（酒精）直接刺激和损伤胃黏膜，是急性糜烂出血性胃炎的重要原因。

选项 D：非甾体抗炎药（NSAIDs）通过抑制前列腺素的合成，削弱了胃黏膜的防御机制，是急性糜烂出血性胃炎的常见病因。

选项 E：严重烧伤后全身应激反应强烈，胃黏膜血流减少，容易发生急性糜烂出血性胃炎，这是 Curling 溃疡的发病机制。

97. 【答案】D

【解析】

选项 A：胸部 X 线片可以用来检查肺部、心脏等结构的异常，如肺炎、肺癌、心包积液等。但对于急性心梗这种基于血管的疾病，其诊断价值有限。

选项 B：心肌核磁显影是一种高级别的检查方法，能够详细地观察到心肌的形态和功能，但其操作复杂、耗时长，不适合作为急性胸痛的首选检查。

选项 C：冠状动脉 CT 造影能够清晰地展示冠状动脉的狭窄情况，是确诊冠心病的重要手段，但操作过程中需要注射造影剂，存在一定风险，且设备昂贵，不适合作为首选检查。

选项 D：心电图是检查心脏电活动的主要手段，操作简单、快速，能够及时发现心肌缺血的迹象，是急性胸痛的首选检查。

选项 E：超声心动图可以观察到心脏的形态、功能以及瓣膜的状态，但对于急性心梗的诊断价值有限。

98. 【答案】A

【解析】

A. CT 肺动脉造影（CTPA）这是正确选项。CTPA 是诊断肺血栓栓塞的首选方法，能够直接显示肺动脉内的栓子，故对于本题中的患者，其临床表现和胸部 X 线片结果都高度提示有肺血栓栓塞的可能，CTPA 检查能提供最直接的证据。

B. 胸部高分辨 CT 此项通常用于诊断各种肺部疾病，如肺纤维化、肺结节等，但在本题中，由于患者的临床表现和胸部 X 线片结果高度提示肺血栓栓塞，而高分辨 CT 并不能直接显示肺动脉内的栓子，因此不是最佳选项。

C. 心电图心电图是评估心脏功能和诊断各种心脏疾病的重要工具，但对于肺血栓栓塞的诊断，其价值有限。

D. 血 D-二聚体血 D-二聚体是血液凝固状态的一种标志，该项指标在肺血栓栓塞中可能升高，但并不特异，不能作为确诊的依据。

E. 超声心动图超声心动图主要用于检查心脏结构和功能，对于肺血栓栓塞的诊断帮助有限。

99. 【答案】B

【解析】

选项 A：咯血颜色鲜红，常见于肺结核、支气管扩张、肺脓肿、支气管结核、出血性疾病、肺癌等。

选项 B：铁锈色痰是肺炎链球菌肺炎的典型特征，常在受凉后突发寒战高热，咳嗽咳痰。

选项 C：砖红色胶冻样黏痰，是克雷伯杆菌肺炎的特征。

选项 D：粉红色乳样痰，常见于金黄色葡萄球菌肺炎。

选项 E：粉红色浆液性泡沫样痰，通常见于各种原因引起的左心功能衰竭、急性肺水肿等。

100. 【答案】A

【解析】

A. 急性呼吸窘迫综合征：患者的年龄、胆结石手术后的感染可能性、病症的起病时间、体征以及常规吸氧疗

法不能改善的情况，都符合急性呼吸窘迫综合征的特点。因此，选项 A 是正确答案。

B. 继发肺部感染：虽然患者有胆结石手术后的感染可能性，但其主要症状并非突发呼吸困难，而是发热、咳嗽、咳痰等，与题干描述不符。

C. 急性左心衰竭：急性左心衰竭的典型症状包括咯大量白色或血性泡沫状痰液，但题干中并未描述此情况，因此排除。

D. 自发性气胸：COPD 患者自发性气胸的表现为突然加重的呼吸困难，伴有明显的发绀，但听诊时呼吸音减弱或消失，与题干描述不符。

E. 右心衰竭：COPD 患者并发慢性肺源性心脏病最终可导致右心衰竭，其症状多为胃肠道反应（如恶心、呕吐）、肝区疼痛等，与题干描述不符。

101. 【答案】B

【解析】

选项 A：喉炎通常表现为咽喉不适、声音嘶哑，但不会出现锁骨上窝的淋巴结肿大，因此排除。

选项 B：肺癌的典型症状包括咳嗽、声音嘶哑以及锁骨上窝的淋巴结肿大。这个患者的症状与肺癌的表现完全一致，所以这是正确答案。

选项 C：胃癌的淋巴结转移通常见于左锁骨上窝（Virchow 淋巴结），而非右侧，因此排除。

选项 D：肺炎的主要症状是发热、咳嗽、畏寒、呼吸急促等感染症状，一般无淋巴结转移，因此排除。

选项 E：肺不张的症状包括胸闷、气急、呼吸困难、干咳等，当合并感染时，可能出现患侧胸痛、突发呼吸困难和发绀、咳嗽、喘鸣、咯血、脓痰、畏寒和发热等，但一般不会出现淋巴结肿大，因此排除。

102. 【答案】A

【解析】

选项 A：动脉血气分析是评估呼吸功能的重要手段，尤其对于有慢性阻塞性肺疾病病史的患者，能够准确判断患者呼吸衰竭的程度，为后续治疗提供依据。因此，这是首选的检查方法。

选项 B：胸部 X 线片可以帮助诊断呼吸系统疾病，但在该患者情况下，无法提供呼吸衰竭的程度，因此不是首选检查。

选项 C：心脏超声可了解心脏的功能状态，但对于呼吸衰竭的程度评估并不直接，因此不是首选检查。

选项 D：动态心电图主要用于了解心脏的电生理变化，对于呼吸衰竭的诊断帮助有限，因此不是首选检查。

选项 E：肺功能测试可以评价患者的肺功能状态，但对于急性呼吸衰竭的患者来说，进行肺功能测试操作困难，且不能及时反映患者当前的呼吸状态，因此不是首选检查。

103. 【答案】B

【解析】

选项 A：清音是正常肺部的叩诊音，提示肺组织的弹性、含气量、致密度正常。患者右上肺出现支气管呼吸音，说明存在病变，清音不可能出现。

选项 B：浊音是病理性叩诊音，当肺部实质性病变如肺炎时，会出现浊音。这与患者的临床表现相符，所以是正确答案。

选项 C：实音是一种音调较浊音更高，音响更弱，振动持续时间更短的一种非乐性音，如叩击心和肝等实质脏器所产生的音响。在病理状态下可见于大量胸腔积液或肺实变等，但在本题中不适用。

选项 D：鼓音如同击鼓声，是一种和谐的乐音，音响比清音更强，振动持续时间也较长，在叩击含有大量气体的空腔脏器时出现。正常情况下可见于胃泡区和腹部，病理情况下可见于肺内空洞、气胸、气腹等。在本题中，患者并无相关症状，所以不适用。

选项 E：过清音介于鼓音与清音之间，是属于鼓音范畴的一种变音，音调较清音低，音响较清音强，为一种类

乐性音，正常成人是不会出现的一种病态叩击音。临床上常见于肺组织含气量增多、弹性减弱时，如肺气肿。在本题中，患者并无相关症状，所以不适用。

104. 【答案】A

【解析】

A. 脾脏肿大：这是正确答案。慢性肺源性心脏病和心功能失代偿期一般不会出现脾肿大。脾肿大通常与肝硬化、慢性淋巴细胞性白血病、慢性溶血性黄疸和淋巴瘤等疾病有关。

B. 肝颈静脉回流征(+)：这是错误选项。慢性肺源性心脏病和心功能失代偿期可能出现肝颈静脉回流征阳性，这是右心衰竭的体征之一。

C. 三尖瓣区收缩期杂音：这是错误选项。慢性肺源性心脏病和心功能失代偿期可能出现三尖瓣区收缩期杂音，这是心脏疾病的典型症状。

D. 腹部移动性浊音(+)：这是错误选项。慢性肺源性心脏病和心功能失代偿期可能出现腹部移动性浊音，这是全身水肿或腹水的体征。

E. 颈静脉怒张：这是错误选项。慢性肺源性心脏病和心功能失代偿期可能出现颈静脉怒张，这是右心衰竭的典型体征。

105. 【答案】E

【解析】

A. 抗结核治疗：虽然患者有肺结核病史，但在紧急情况下，首要任务是处理大量咯血，因此抗结核治疗不作为首选。

B. 输液：输液可以补充体液，但不能有效止血，故不作为首选。

C. 氧气吸入：氧气吸入可以提供呼吸支持，但不能止血，故不作为首选。

D. 镇咳剂：虽然可以暂时减轻咳嗽症状，但无法止血，故不作为首选。

E. 垂体后叶素：垂体后叶素可以收缩血管，起到止血效果，是处理大量咯血的首选药物。

106. 【答案】A

【解析】

A 选项：患者老年男性，长期反复咳嗽、咳痰、喘息，并有急性加重症状，体征有双肺语颤减弱，心界缩小，肺部干湿啰音，这些符合慢性阻塞性肺疾病（COPD）急性发作的诊断。

B 选项：支气管哮喘多见于儿童或青少年，且常伴有过敏史、鼻炎或湿疹等，患者病史和体征并不符合。

C 选项：支气管扩张的典型症状为慢性咳嗽伴大量脓痰和反复咯血，而患者并无这些症状。

D 选项：肺结核常发生于青壮年，全身症状有发热、乏力、消瘦、盗汗等，呼吸系统症状包括咳嗽、咳痰、咯血、胸痛、呼吸困难，患者病史和体征并不符合。

E 选项：肺癌常见于老年，早期症状非特异性，晚期可有压迫症状及消耗性表现，患者的病史和体征并不符合。

107. 【答案】B

【解析】

选项 A：过敏性肺炎，通常在接触抗原数小时后出现症状，双肺听诊有湿啰音，无哮鸣音，胸部 X 线片显示弥漫性间质性浸润，呈粟粒或小结节状阴影，与题干描述不符。

选项 B：支气管哮喘，患者中老年男性，有接触油烟等刺激物病史，反复发作咳嗽咳痰 10 年，发作时可自行好转，抗生素无效，双肺可闻及散在哮鸣音，这些都符合支气管哮喘的临床表现。

选项 C：支气管扩张，典型症状为慢性咳嗽伴大量脓痰和反复咯血，胸部 X 线可见囊状支气管扩张的气道表现，与题干描述不符。

选项 D：慢性阻塞性肺病，临床出现有连续两年以上，每年持续三个月以上的咳嗽、咳痰或气喘等症状，一般

不会自行缓解，与题干描述不符。

选项 E：肺曲菌病，一般发生在特应性体质基础上，呈反复发作性喘息、发热、咳嗽、咳出棕色痰栓、咯血，胸部 X 线示中央性支气管扩张和一过性肺浸润，与题干描述不符。

108. 【答案】C

【解析】

选项 A：化脓性胸膜炎通常会有明显的感染症状，胸腔积液一般为脓液，白细胞计数增高，葡萄糖与 pH 降低，涂片或细菌培养可呈阳性。这与题目中的患者情况不符，所以 A 选项是错误的。

选项 B：结核性胸膜炎多见于青壮年，常伴有结核中毒症状，胸腔积液外观多为草黄色或深黄色，腺苷脱氨酶 ADA>45U/L 作为支持结核性胸膜炎的依据，水平越高，结核性胸膜炎可能性越大。虽然患者 PPD (+)，只能说明可能感染过结核分枝杆菌或接种卡介苗，不足以支持结核性胸膜炎诊断。所以 B 选项是错误的。

选项 C：患者中老年女性，胸闷、气急半月，大量胸腔积液，性质为淡黄色，肿瘤标志物 CEA 明显增高（正常 5~15 μg/L）且乳酸脱氢酶 LDH900U/L（LDH>500U/L 即提示恶性肿瘤或并发细菌感染），考虑为漏出液，且恶性胸腔积液可能性大。所以 C 选项是正确的。

选项 D：乳糜胸患者表现为呼吸困难，X 线胸片显示大量胸腔积液。胸腔积液呈乳状浑浊，苏丹Ⅲ染色呈红色，生化分析显示积液三酰甘油水平超过 1.24mmol/L，脂蛋白电泳可显示乳糜微粒，多见于胸导管破裂。这与题目中的患者情况不符，所以 D 选项是错误的。

选项 E：结缔组织病（类风湿性关节炎、红斑狼疮）患者胸液中补体 C3、C4 成分减少，且免疫复合物含量增高。抗核抗体及类风湿因子滴度增高。这与题目中给出的信息不符，所以 E 选项是错误的。

109. 【答案】A

【解析】

选项 A：靶向治疗。根据题目中的 EGFR(+) 信息，我们可以知道这位患者的肺腺癌存在 EGFR 突变，这是非小细胞肺癌（NSCLC）的常见原因。对于这种情况，靶向治疗是首选治疗，能够显著改善局部晚期和转移的 NSCLC 患者的治疗效果，并可延长生存期。所以选项 A 是正确答案。

选项 B：放疗。放疗对小细胞肺癌疗效最佳，鳞状细胞癌次之，腺癌最差。对于本例患者来说，放疗并非首选治疗。

选项 C：化疗。虽然化疗是肺癌的主要治疗方法，也是治疗非小细胞肺癌的主要手段，但是因为该患者有明显的靶向治疗指征，所以化疗不是首选。

选项 D：内分泌治疗。目前肺癌的治疗包括手术、化疗、放疗、靶向治疗、介入治疗及中医药治疗等，不涉及内分泌治疗。所以选项 D 不正确。

选项 E：手术治疗。肺癌的外科治疗主要适合于早中期（I~II 期）肺癌、IIIa 期肺癌和肿瘤局限在一侧胸腔的部分选择性的 IIIb 期肺癌。本例患者已经有胸膜转移，所以手术治疗并非首选。

110. 【答案】B

【解析】

选项 A：大叶性（肺泡性）肺炎的病原体先在肺泡引起炎症，经肺泡间孔（Cohn 孔）向其他肺泡扩散，致使部分肺段或整个肺段、肺叶发生炎症。但是，克雷伯杆菌肺炎的 X 线表现并非由此引起。

选项 B：克雷伯杆菌肺炎的特征之一就是病灶中的炎性渗出液黏稠而重，这就是造成 X 线上叶间隙下坠的主要原因。

选项 C：虽然细菌在细胞内的生长繁殖会引起组织坏死、液化形成，但是这并不是克雷伯杆菌肺炎 X 线叶间隙下坠的主要原因。

选项 D 和 E：肺炎链球菌肺炎的主要病理变化为肺泡中存在大量渗出的纤维素物质，但这并不是克雷伯杆菌肺

炎 X 线叶间隙下坠的原因。

111. 【答案】B

【解析】

A 选项：胸腔积液介于漏出液和渗出液之间。这是错误的，因为胸腔积液主要分为漏出液和渗出液两种，不存在介于两者之间的类型。

B 选项：胸膜间皮瘤所致胸腔积液是渗出液。这是正确的，胸膜间皮瘤是一种胸膜恶性肿瘤，可以增加胸膜的通透性，导致胸腔积液，这种积液就是渗出液。

C 选项：胸膜间皮瘤所致胸腔积液是漏出液。这是错误的，正如 B 选项解释的，胸膜间皮瘤所致胸腔积液是渗出液。

D 选项：胸膜间皮瘤所致胸腔积液的 LDH 小于 200U。这是错误的，渗出液的 LDH 含量通常会增高，大于 200U/L。

E 选项：胸膜间皮瘤所致胸腔积液的比重小于 1.018。这是错误的，渗出液的比重通常会大于 1.018。

112. 【答案】A

【解析】

A 选项：肺顺应性降低。这是急性呼吸窘迫综合征（ARDS）的一个重要特征，表明肺部的弹性降低，扩张困难。肺顺应性的降低反映了肺组织和/或胸腔壁的刚性增加，是 ARDS 严重性的重要指标，故此选项正确。

B 选项：无效腔通气比例增加。虽然在 ARDS 中，由于肺泡损伤和炎症反应，可能导致无效腔（包括解剖无效腔和肺泡无效腔）增加，但这并不是评价 ARDS 严重性和疗效的主要指标，故此选项错误。

C 选项：无呼气流速受阻。在 ARDS 中，由于疾病主要影响肺泡和肺间质，而非气道，因此呼气流速通常不受限制。然而，这并不是评价 ARDS 严重性和疗效的主要指标，故此选项错误。

D 选项：VD/VT。这是生理无效腔（解剖无效腔+肺泡无效腔）的比例。虽然在 ARDS 中，由于肺泡损伤和炎症反应，可能导致无效腔增加，但这并不是评价 ARDS 严重性和疗效的主要指标，故此选项错误。

E 选项：以上都不是。由于 A 选项是正确的，因此此选项错误。

113. 【答案】C

【解析】

A. 肺小动脉内膜增厚：这是慢性阻塞性肺疾病（COPD）长期反复发作或由支气管周围炎累及临近肺小动脉引起的一种情况，会导致血管管壁增厚和管腔狭窄，但不是引起 COPD 肺动脉高压最重要的原因。

B. 肺小动脉原位血栓形成：这是多发性肺微小动脉原位血栓形成，也会增加肺血管阻力，但同样不是引起 COPD 肺动脉高压最重要的原因。

C. 肺小动脉痉挛：在缺氧的情况下，肺血管会收缩，这在低氧性肺动脉高压的发生中起着关键作用，所以这是引起 COPD 肺动脉高压最重要的原因。

D. 肺小动脉壁纤维化：这是慢阻肺或支气管周围炎累及临近肺小动脉引起的一种情况，可以导致血管管壁纤维化，但不是引起 COPD 肺动脉高压最重要的原因。

E. 肺静脉血栓：肺静脉血栓并不是肺动脉高压形成的机制，所以这个选项是错误的。

114. 【答案】D

【解析】

选项 A：头孢他啶是一种抗生素，用于治疗各种感染，但不是支气管哮喘的首选治疗药物。

选项 B：地塞米松是一种口服糖皮质激素，对于无法控制的严重哮喘可能有帮助，但由于长期使用可能引发副作用，因此不是长期控制哮喘的首选药物。

选项 C：利多卡因是一种局部麻醉药，虽然它可以扩张气道平滑肌并抑制炎性介质的释放，但它不是支气管哮喘长期控制的常用药物。

选项 D: 吸入型糖皮质激素是支气管哮喘长期控制的首选药物, 因为它们在局部产生强大的抗炎效果, 全身不良反应少。

选项 E: 阿托品是一种抗胆碱药, 可以舒张支气管和减少粘液分泌, 但不是支气管哮喘的常用治疗方法。

【答案】E

【解析】

选项 A: 支原体肺炎的 X 线表现多样, 早期局部肺纹理增粗及斑片状阴影, 密度较淡, 有的常呈扇形自肺门部发出。2-3 周后肺部炎症实变开始吸收消散, 炎症浸润影消失。这种情况下不易形成空洞。

选项 B: 肺炎球菌肺炎的 X 线表现为充血期、实变期和消散期。其中实变期时, 炎症累及肺段或肺叶, 可呈片状或三角形致密影, 但不易形成空洞。

选项 C: 军团菌肺炎的胸部 X 线检查与一般细菌性肺炎相似, 以渗出、实变为主, 可呈斑片、结节样改变。早期多为单侧弥漫性片状浸润影, 可发展为致密的大片病变也可累及多叶, 但无明显特异性, 不易形成空洞。

选项 D: 衣原体肺炎的胸片表现为单侧下叶的阶段肺炎表现, 大规模实变非常罕见, 20~25% 的患者可能出现胸腔积液。这种情况下也不易形成空洞。

选项 E: 金黄色葡萄球菌肺炎胸片显示肺段或肺叶实变, 可形成空洞, 或呈小叶状浸润, 其中有单个或多发的液气囊腔。另一特征是 X 线阴影的易变性, 表现为一处炎性浸润消失而在另一处出现新的病灶, 或很小的单一病灶发展为大片阴影。这种情况下更易形成空洞。

116. 【答案】E

【解析】

A. 肺活量下降: 肺活量是指在最大吸气后尽力呼气的气量。虽然慢阻肺患者的肺活量会发生变化, 但不能作为检测小气道阻塞的首要指标。

B. 残气容积增加: 残气容积是肺容量参数中一项重要指标, 其测定结果的准确与否对临床上判断患者是否存在过度充气或肺气肿有重要意义。但它不能作为检测小气道阻塞的首要指标。

C. 闭合容量减小: 闭合容积 (CV) 也称闭合气量, 是平静呼气至残气位时, 肺下垂部小气道开始闭合时所能继续呼出的气体量。闭合容积增大, 说明小气道较早发生闭陷, 但它并不是慢性支气管炎有小气道阻塞时, 最早出现的肺功能改变。

D. 肺最大通气量降低: 最大通气量是指肺功能测定时, 单位时间内所能呼吸的最大气量。虽然它可以用来衡量胸廓肺组织弹性、气道阻力、呼吸肌力量, 但也并非是慢性支气管炎有小气道阻塞时, 最早出现的肺功能改变。

E. 流量-容积曲线降低: 这是正确答案。流量-容积曲线是在最大用力呼气过程中, 呼出肺容量与相应的气流速度的相关曲线图。这个指标能够直接反映小气道的阻塞情况。

117. 【答案】B

【解析】

选项 A: I 度烧伤仅涉及表皮浅层, 通常表现为局部红斑、烧灼感, 没有水疱。而该患者的烧伤面积为 46%, 且有水疱, 因此不符合 I 度烧伤的特征。

选项 B: 该患者烧伤面积包括双下肢、臀部、双小腿和双足, 总计 46%。烧伤创面有水疱, 水疱液透明, 创面红润, 这些都是浅 II 度烧伤的特征, 因此选项 B 正确。

选项 C 和 D: 深 II 度烧伤也存在水疱, 但其分布不一, 创面红白相间。该患者烧伤处布满水疱, 创面红润, 不符合深 II 度烧伤的特征。

选项 E: III 度烧伤为焦痂型烧伤, 创面蜡白焦黄, 没有水疱。该患者的烧伤有水疱, 因此不符合 III 度烧伤的特征。

118. 【答案】C

【解析】

A. 800ml-不正确。按照帕克兰公式计算，结果明显低于正确答案。

B. 1200ml-不正确。按照帕克兰公式计算，结果仍然低于正确答案。

C. 1600ml-正确。按照帕克兰公式计算，胶体液的补给量应为 $70\text{kg} \times 46\% \times 4\text{ml} \times 1/3 \approx 1610\text{ml}$ ，选项 C 最接近这个值。

D. 2000ml-不正确。按照帕克兰公式计算，结果高于正确答案。

E. 2400ml-不正确。按照帕克兰公式计算，结果远高于正确答案。

119. 【答案】B

【解析】

选项 A (9-10 天)：这个时间段对于乳胶引流片的拔除来说过长，可能会导致病人不必要的痛苦和并发症风险增加，因此不是正确答案。

选项 B (1-2 天)：在腹腔手术后，乳胶引流片通常在术后的 1-2 天内拔除，所以这是正确答案。

选项 C (7-8 天)：与选项 A 相同，这个时间段对于乳胶引流片的拔除来说也过长，因此不是正确答案。

选项 D (3-4 天)：这个时间段适用于烟卷引流的拔除，而不是乳胶引流片，所以不是正确答案。

选项 E (5-6 天)：这个时间段对于乳胶引流片的拔除来说过长，因此不是正确答案。

120. 【答案】D

【解析】

选项 A (5-6 天)：对于上腹部手术，这个时间段拆线过早，可能会导致切口愈合不良，因此不是正确答案。

选项 B (10-12 天)：这个时间段适用于四肢手术的拆线，而非上腹部手术，所以不是正确答案。

选项 C (12 天以上)：对于上腹部手术，这个时间段拆线过晚，可能会导致患者不必要的痛苦和并发症风险增加，因此不是正确答案。

选项 D (7-9 天)：胸部、上腹部、背部、臀部手术通常在术后 7-9 天拆线，所以这是正确答案。

选项 E (3-4 天)：对于上腹部手术，这个时间段拆线过早，可能会导致切口愈合不良，因此不是正确答案。

121. 【答案】A

【解析】

A. 急性前列腺炎：患者出现尿频、尿急、尿痛等尿路刺激征，且前列腺肿大、触痛，尿常规检查显示白细胞和细菌阳性，亚硝酸盐阳性，提示泌尿生殖道的细菌感染，符合急性前列腺炎的诊断。

B. 急性尿道炎：虽然也可出现尿路刺激征，但是前列腺查体一般阴性，所以此选项不正确。

C. 急性膀胱炎：同样，尽管可以出现尿路刺激征，但前列腺查体通常阴性，因此此选项错误。

D. 急性肾盂肾炎：除了尿频尿急尿痛外，发热畏寒明显、且肾区叩痛阳性，而该患者肾区体征阴性，不支持此选项。

E. 急性附睾炎：主要表现为阴囊明显肿胀，阴囊皮肤发红、发热、疼痛，该病例未提及这些，所以此选项错误。

122. 【答案】C

【解析】

选项 A：低分子肝素是一种抗凝剂，主要用于预防和治疗静脉血栓，但在这个病例中，患者的主要问题是急性心包压塞，需要立即解除心包内的压力，因此这不是首选治疗。

选项 B：西地兰主要用于急性和慢性心力衰竭、心房颤动和阵发性室上性心动过速，但对于急性心包压塞，这并不是首选治疗。

选项 C：这是正确的答案。在冠脉介入治疗过程中，如果出现低血压、颈静脉怒张、心音低钝等压塞三联征，

应考虑急性血性心包压塞。此时，紧急处理是心包穿刺抽液以解除心包内的压力。

选项 D：呼吸机辅助呼吸对于由心脏压塞引起的呼吸困难并非首选治疗。首要任务是解除心包内的压力。

选项 E：去甲肾上腺素主要用于嗜铬细胞瘤切除等引起的低血压治疗，与本病例的治疗无直接关联。

123. 【答案】A

【解析】

选项 A：左心房的混合血栓。房颤时心房失去节律收缩，心房内血液出现血液瘀滞、湍流，以左心耳最好发、形成球型混合血栓，当出现脱落时随血液进入体循环而发生栓塞。因此，这是正确答案。

选项 B：左心室的附壁血栓。房颤时心室收缩可能正常或稍快，但是节律是规整的，血液流动湍流较少，流速快，不具备血栓形成的条件，一般不出现附壁血栓，不是房颤血栓的主要来源。

选项 C：微血管透明血栓一般见于 DIC，是为微循环内的纤维素性血栓、体积很小，不会引起大面积脑栓塞发生。

选项 D：基底节混合血栓。基底节区是脑出血好发部位，心源性脑栓塞一般 20% 发生基底节区，其不是血栓的来源部位、而是常见的病变部位。

选项 E：二尖瓣赘生物常见于风湿性心脏病的患病，该病例未提及相关病史，可能性较小。

124. 【答案】C

【解析】

A 选项：解毒剂过量使用，如大量应用胆碱酯酶复活药，主要表现为癫痫样发作、口周四肢麻木感。但该患者并未出现这些症状，故 A 选项错误。

B 选项：阿托品过量会导致神志模糊、抽搐、尿潴留等症状。而该患者的症状并不符合阿托品过量的临床表现，故 B 选项错误。

C 选项：中间型反应是有机磷农药中毒后 24~96 小时出现的一种临床表现，主要症状包括颈屈肌无力、上睑下垂、呼吸肌无力等。该患者的症状和中间型反应相符，且全血胆碱酯酶明显降低，故 C 选项正确。

D 选项：迟发性多发性神经病发病在中毒症状消失 2~3 周后，主要表现为下肢瘫痪、四肢肌肉萎缩等。该患者的病程时间及症状并不符合，故 D 选项错误。

E 选项：胆酶分离指的是严重肝炎时肝细胞大量坏死，转氨酶降低、胆红素持续升高。该患者并无相关表现，故 E 选项错误。

125. 【答案】C

【解析】

A. 心动过缓-心动过速综合征：这种情况下，患者会出现心动过缓与房性快速型心律失常交替发作，如室上速等。但是，QRS 波形一般正常，不会出现畸形变宽。因此，这个选项不符合题干中的症状描述。

B. 室上速：室上速一般指的是心脏搏动速度快于正常范围的心律失常。然而，这种情况下，QRS 波形一般是正常的，不会出现畸形变宽。因此，这个选项也不符合题干中的症状描述。

C. 室速：室性心动过速是一种严重的心律失常，表现为连续出现 3 个以上增宽畸形的 QRS 期前收缩波，偶有特征性心室夺获出现正常 QRS 波。这完全符合题干中的症状描述，因此，这是正确答案。

D. 窦性心律不齐：窦性心律不齐一般不会引起心率明显增加，且表现为正常的 QRS 波，但各 RR 间期不等。因此，这个选项不符合题干中的症状描述。

E. 房颤：房颤是一种常见的心律失常，可见特征性的 f 波，心室率不规则但 QRS 波形态正常。因此，这个选项也不符合题干中的症状描述。

126. 【答案】C

【解析】

A. 利多卡因静滴：利多卡因是一种抗心律失常药物，用于无血流动力学障碍的室速患者，但该患者已经出现血流动力学障碍，首要措施不应为药物。

B. 植入心脏起搏器：对于反复发作的病例，可以考虑稳定期植入起搏器进行预防控制，该患者为急性发病期，不适合进行手术。

C. 同步直流电复律：对于并发了低血压、休克的病人，需要迅速终止室速发作、恢复正常节律，应立即进行同步直流电复律抢救。因此，这是正确答案。

D. 刺激迷走神经：刺激迷走神经是室上速的治疗措施，主要减慢房室结区传导，室速病灶一般位于房室结以下，故该措施效果有限。

E. 口服美托洛尔：美托洛尔是 β 受体阻滞剂，对于无血流动力学障碍的室速患者适用，但该患者已经出现血流动力学障碍，首要措施不应为药物。

127. 【答案】C

【解析】

选项 A：胸片。胸片主要用于检查肺部和心脏的病变，对于腹部损伤的判断并不直接。因此，这不是首选的诊断方法。

选项 B：血常规。血常规可以反映身体的一般状况，如感染、贫血、出血等，但不能明确指出器官损伤的位置和程度，所以这也不是首选的诊断方法。

选项 C：诊断性腹腔穿刺。该患者有车祸史，腹痛明显，且有低血压等内出血的表现，可疑腹腔内有器官损伤出血。诊断性腹腔穿刺能直接证实是否有腹腔内出血，是最直接、最准确的诊断方法，因此是首选。

选项 D：血细胞比容。血细胞比容是反映全身血液量的一个指标，虽然可以反映出患者是否有出血，但不能明确出血位置，所以也不是首选的诊断方法。

选项 E：腹部 B 超。腹部 B 超主要用于观察腹部各器官的形态和结构，对于判断急性腹腔内出血并不准确，因此也不是首选的诊断方法。

128. 【答案】B

【解析】

A. 胃：胃主要位于左上腹，故此处不选。

B. 肝：肝位于右上腹，且是一个容易受到外伤损伤的器官，所以此处选择 B。

C. 胰腺：胰腺主要位于上腹部，而且损伤的可能性相对较小，所以此处不选。

D. 结肠：结肠主要位于左下腹，故此处不选。

E. 十二指肠：十二指肠位于中上腹，故此处不选。

129. 【答案】B

【解析】

A. 急性肾衰竭：此选项不符合，因为在急性肾衰竭中，患者的肌酐水平会显著升高，而这名患儿的肌酐水平正常。

B. 单纯肾病综合征：此选项符合，因为患儿有大量蛋白尿、低蛋白血症、水肿和高脂血症，且无明显血尿和高血压，这些都是单纯肾病综合征的典型表现。

C. 肾炎性肾病综合征：此选项不符合，因为肾炎性肾病综合征的诊断标准包括尿检查红细胞 ≥ 10 个/HP、反复或持续高血压、肾功能不全、持续低补体血症，而这名患儿的表现并未达到这些标准。

D. 急进性肾炎：此选项不符合，因为在急进性肾炎中，患者的肌酐水平会显著升高，而这名患儿的肌酐水平正常。

E. 急性肾炎：此选项不符合，因为急性肾炎通常有前驱感染病史，且会表现为血尿、蛋白尿、水肿、高血压、

肾功能不全，而这名患儿并未出现这些表现。

130. 【答案】C

【解析】

A. 泼尼松+环磷酰胺：环磷酰胺是一种免疫抑制剂，通常用于糖皮质激素依赖、耐药或出现严重副作用者，不适用于本病例。

B. 呋塞米：呋塞米主要用于治疗水肿，但并不能解决肾病综合征的根本问题，所以不是首选治疗药物。

C. 泼尼松：泼尼松是一种糖皮质激素，具有抗炎和免疫抑制作用，是肾病综合征的首选治疗药物，故此选项正确。

D. 环磷酰胺：同 A 选项，环磷酰胺不适用于本病例。

E. 待补充：无具体选项，故不选。

131. 【答案】B

【解析】

选项 A：CA125 主要用于卵巢癌的治疗效果观察和复发判断，与此题的直肠癌无关，所以不选 A。

选项 B：CEA（癌胚抗原）是一种肿瘤标记物，其水平与肿瘤分期呈正相关，主要用于评估肿瘤负荷和监测术后复发。在直肠癌中，CEA 的检测具有重要的临床意义，因此选 B。

选项 C：AFP 主要用于诊断原发性肝癌和生殖腺胚胎肿瘤，与此题的直肠癌无关，所以不选 C。

选项 D：ALP 主要用于骨骼、肝胆系统疾病的诊断和鉴别诊断，与此题的直肠癌无关，所以不选 D。

选项 E：PSA 主要用于诊断前列腺癌，与此题的直肠癌无关，所以不选 E。

132. 【答案】A

【解析】

选项 A：腹水呈血性。这是最符合肝癌结节破裂的表现，因为肝癌结节破裂时，会引起内出血，出血液体可能会积聚在腹腔内，形成血性腹水。因此，答案是 A。

选项 B：腹水呈乳糜性。乳糜性腹水通常与淋巴系统的疾病有关，如淋巴管阻塞或破裂，不符合肝癌结节破裂的表现。

选项 C：腹水呈脓性。脓性腹水主要与腹腔内的感染有关，如阑尾炎、胆囊炎等，不符合肝癌结节破裂的表现。

选项 D 和 E：描述的是腹水的一些生化指标。这两个选项中的腹水比重、蛋白量和细胞总数，都不符合肝癌结节破裂后腹水的特点。

133. 【答案】E

【解析】

A. 肝细胞水肿：虽然肝硬化可以导致肝细胞水肿，但这不是其最具特征性的表现。

B. 肝细胞坏死：肝硬化过程中可以有肝细胞坏死，但这也不是其最具特征性的表现。

C. 肝细胞再生：肝硬化过程中肝细胞会尝试再生，但再生的肝细胞结构和功能常常异常，这也不是其最具特征性的表现。

D. 纤维组织增生：肝硬化时，由于肝细胞损伤和坏死，会引发纤维组织的增生，但这也不是其最具特征性的表现。

E. 假小叶形成：肝硬化的特征性病理变化是假小叶形成，这是因为肝细胞的再生和纤维组织的增生导致正常的肝脏结构被破坏，形成所谓的“假小叶”。

134. 【答案】A

【解析】

A. 进展性吞咽困难：这是进展期食管癌的典型症状，随着病情的发展，患者会逐渐出现先是难咽固体食物，

然后连半流质食物和液体也难以咽下。这是由于肿瘤的增长导致食管腔被阻塞，食物无法顺利通过。

B. 间歇性吞咽困难：这是早期食管癌的症状，此时食管尚未完全被肿瘤阻塞，所以吞咽困难会呈现出间歇性。

C. 胸骨后疼痛：胸骨后疼痛在早期食管癌和进展期食管癌都可能出现，但并非其特征性症状，因此不能作为诊断进展期食管癌的依据。

D. 腹痛呕吐：食管癌一般不会出现腹痛和呕吐的症状，如果有则需要考虑其他疾病或并发症。

E. 反酸烧心：反酸烧心多见于胃食管反流病，而非食管癌。

135. 【答案】A

【解析】

选项 A：铃蟾素是迷走神经末梢释放的神经递质，能作用于胃窦部 G 细胞，使其分泌促胃液素，因此这是正确答案。

选项 B：多巴胺主要在下丘脑和脑垂体腺中起到神经递质的作用，与情绪相关，不涉及胃液分泌，因此这是错误选项。

选项 C：乙酰胆碱是迷走神经传出纤维直接到达胃黏膜泌酸腺中的壁细胞所释放的，引起胃酸分泌，但它不直接影响 G 细胞分泌促胃液素，因此这是错误选项。

选项 D：组胺由胃泌酸区黏膜内的肠嗜铬样（ECL）细胞分泌，作用于邻旁壁细胞，引起壁细胞分泌胃酸，但它并不直接作用于 G 细胞，因此这是错误选项。

选项 E：5-羟色胺主要分布于松果体和下丘脑，可能参与痛觉、睡眠和体温等生理功能的调节，与胃液分泌无关，因此这是错误选项。

136. 【答案】C

【解析】

正确选项（C）：患者为老年男性，有高血压和冠心病病史，且出现左下肢间歇性跛行、皮肤苍白、皮温低、动脉搏动减弱等慢性肢体缺血的表现，最可能的诊断为动脉硬化性闭塞症。动脉硬化性闭塞症主要是由于动脉壁硬化、狭窄或闭塞，导致血液供应不足。

错误选项（A）：急性动脉栓塞通常起病急骤，表现为“五无”症状，即无色、无热、无痛、无感觉、无动，本例中患者病程较长，不符合急性发病的特点。

错误选项（B）：深静脉血栓形成常表现为肢体突然肿胀，伴有胀痛、浅静脉扩张，本例中患者没有这些表现。

错误选项（D）：血栓性浅静脉炎的典型表现为病变部位静脉区呈红肿、索条状，沿静脉走行，伴有明显疼痛和压痛，本例中患者没有这些表现。

错误选项（E）：血栓闭塞性脉管炎多见于青壮年，一般没有高血压、冠心病等病史，本例中患者为老年人，有高血压和冠心病病史，不符合血栓闭塞性脉管炎的常见人群特点。

137. 【答案】C

【解析】

选项 A：暂停补液。这个选项是错误的，因为患者仍处于休克状态，需要补液以纠正循环衰竭，所以不能直接停止补液。

选项 B：加快补液速度。这个选项也是错误的。虽然患者需要补液，但由于存在心功能不全，过快的补液会增加心脏的前负荷，加重心衰病情。

选项 C：控制补液速度，加用强心剂。这是正确的选项。患者的中心静脉压高，提示液体负荷大，可能是心功能不全导致的血容量多。此时需要控制补液速度，并且使用强心剂，以提升心脏功能，改善患者病情。

选项 D：减慢补液速度。这个选项虽然可以减轻心脏的前负荷，但没有应用强心药物，不能有效对症治疗，所以不是最优选择。

选项 E: 加用血管活性药物。这个选项也是错误的。虽然血管活性药物如肾上腺素可以收缩血管,但同时会增加心脏的前后负荷,加重病情,所以不宜选用。

138. 【答案】E

【解析】

A. 收缩压: 收缩压主要反映左心室射血量和左心功能。虽然收缩压的降低可能暗示了有效循环血量的减少,但它并不能直接反映器官血流灌注情况。

B. 舒张压: 舒张压主要反映外周血管阻力。同样,舒张压的改变不能直接反映器官血流灌注情况。

C. 脉压: 脉压为收缩压减去舒张压,升高提示甲亢、主动脉关闭不全或动脉硬化,减小提示主动脉狭窄、心包积液等,也不能有效反应血流灌注。

D. 脉率: 脉率改变可以由多种疾病引起,也不能有效反应血流灌注情况。

E. 尿量: 在休克早期,由于血流量的重新分布,肝、脾、肾等脏器血流减少,保证心、脑等重要脏器的血流灌注,此时尿量变化较为明显。休克中晚期,有效循环血量减少,尿量进一步减少。当尿量维持在 30 毫升每小时以上时,提示器官血流灌注已恢复。

139. 【答案】C

【解析】

选项 A (急性心包炎): 急性心包炎主要表现为心前区疼痛,疼痛会随着体位变换、深呼吸、吞咽时加剧,查体可见心包摩擦音。而患者并未出现这些典型症状,因此不选 A。

选项 B (扩张型心肌病): 扩张型心肌病主要表现为活动时呼吸困难,活动耐量下降,查体见心界扩大。患者的症状并不符合这一描述,因此不选 B。

选项 C (病毒性心肌炎): 病毒性心肌炎在呼吸系统感染后可能发生,表现为胸闷、心悸等心脏不适,心电图上可能出现低电压和 T 波低平。患者的症状及心电图改变与此相符,因此选择 C。

选项 D (风湿性心肌炎): 风湿性心肌炎主要表现为胸闷、心悸、乏力,可见与体温不相称的心动过速。患者的症状并未完全符合这一描述,因此不选 D。

选项 E (风湿性心脏病): 风湿性心脏病主要表现为二尖瓣关闭不全、主动脉瓣狭窄等症状。患者并未出现这些症状,因此不选 E。

140. 【答案】D

【解析】

选项 A: II、III、aVF 导联对应心肌下壁,而非右壁心梗,所以不选 A。

选项 B: I、aVL 导联 ST 段抬高提示高侧壁心肌梗死,与右壁心梗无关,所以不选 B。

选项 C: V1~V3 在后壁心肌梗死时表现为 ST 段压低,而 ST 段抬高提示前间隔的梗死,与右壁心梗无关,所以不选 C。

选项 D: 正确答案。右室梗 V3R-V5R 导联 ST 段抬高。这是右壁心梗的典型心电图表现,所以选 D。

选项 E: V1、V2 导联 R/S>1,可见于后壁心肌梗死、右心室肥厚等情况,但并不是右壁心梗的特征性表现,所以不选 E。

141. 【答案】E

【解析】

选项 A: II、III、aVF 导联对应心肌下壁,与后壁心肌梗死无直接关联,故不选 A。

选项 B: I、aVL 导联 ST 段抬高提示高侧壁心肌梗死,与后壁心肌梗死不符,故不选 B。

选项 C: V1~V3 在后壁心肌梗死时表现为 ST 段压低,而 ST 段抬高提示前间隔的梗死,故不选 C。

选项 D: V3R~V5R 是右侧心肌梗死的导联监测区域,与后壁心肌梗死无关,故不选 D。

选项 E: 后壁心肌梗死在心前导联 (V1、2、3) 出现镜像改变, 即 V1~3 导联 R 波增高、s 波变浅, R/S>1, 以及 ST 段压低、T 波高耸。这是后壁心肌梗死的典型表现, 故选 E。

142. 【答案】E

【解析】

A. 肌钙蛋白 I (cTnI) 或 T (cTnT) 起病 3-4 小时后升高, 是诊断心肌梗死的敏感指标。但在此题中, 患者胸痛 2.5 小时, 此时还未到肌钙蛋白 I 升高的时间。

B. 天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 特异性及敏感性远不如其他标志物, 已不再用于诊断急性心肌梗死。

C. 乳酸脱氢酶 (LDH) 同样特异性及敏感性不如其他标志物, 已不再用于诊断急性心肌梗死。

D. 肌酸激酶同工酶 (CK-MB) 在起病后 4 小时内增高, 其增高的程度能较准确地反映梗死的范围, 其高峰出现时间是否提前有助于判断溶栓治疗是否成功。但在此题中, 患者胸痛 2.5 小时, 此时还未到肌酸激酶同工酶升高的时间。

E. 肌红蛋白是最早出现的指标, 2 小时内升高。在此题中, 患者胸痛 2.5 小时, 此时肌红蛋白最可能升高。

143. 【答案】D

【解析】

选项 A 和 B: 将美托洛尔调整为 25mgqd 或 12.5mgbid。这两个选项都是减少美托洛尔的剂量, 但是对于已经出现明显不良反应的患者, 仅仅减少剂量可能无法有效解决问题, 所以这两个选项都不正确。

选项 C: 植入永久起搏器。这是针对严重的心脏传导阻滞的治疗方案, 但是在这个病例中, 患者的症状可能只是由于美托洛尔引起的, 停止使用美托洛尔后, 症状可能就会消失, 所以无需进行这样的治疗, 所以这个选项也不正确。

选项 D: 停用美托洛尔。根据患者的症状和心电图表现, 以及美托洛尔的药物作用机制, 我们可以推断患者的症状可能是由于美托洛尔引起的, 因此停止使用美托洛尔是最恰当的处理方法, 所以这个选项是正确的。

选项 E: 将美托洛尔更换为地尔硫卓 30mg tid。地尔硫卓也是一种钙通道阻滞剂, 但是对于已经出现明显不良反应的患者, 更换相同类别的药物可能无法有效解决问题, 所以这个选项也不正确。

144. 【答案】E

【解析】

选项 A: 地尔硫卓是一种钙通道阻滞剂, 主要用于治疗高血压和心绞痛。它通过抑制钙离子进入心肌细胞和血管平滑肌细胞, 从而达到降低血压和减轻心肌缺血的效果。对哮喘患者并无禁忌。

选项 B: 贝那普利是一种 ACEI 药物, 可以通过抑制血管紧张素转化酶, 降低血管紧张素 II 的生成, 从而扩张血管, 降低血压。对哮喘患者并无禁忌。

选项 C: 硝苯地平是一种钙通道阻滞剂, 可阻止钙离子进入细胞, 使血管平滑肌松弛, 从而降低血压。对哮喘患者并无禁忌。

选项 D: 氢氯噻嗪是一种利尿剂, 通过抑制肾小管对钠、氯的重吸收, 增加尿液排泄, 从而降低血压。对哮喘患者并无禁忌。

选项 E: 美托洛尔是一种 β 受体阻滞剂, 可以通过抑制心肌 β_1 受体减慢心率、降低心肌收缩力而发挥降压作用。但是在呼吸系统, 会阻滞气道平滑肌的 β_2 受体, 表现为平滑肌收缩, 加大气道阻力, 尤其在哮喘病人气道高反应性基础上, 会明显诱发气道痉挛、加重呼吸障碍, 是为禁忌情况。

145. 【答案】B

【解析】

A. 地尔硫卓: 为利尿剂, 通过增加尿液排泄降低血容量从而降压, 对肾小球滤过影响较小, 不会加重双肾动脉狭窄患者的病情。

B. 贝那普利：为 ACEI 类药物，可扩张肾血管，但在双侧肾动脉均狭窄的情况下，可能导致有效滤过压明显降低、甚至诱发肾衰，因此不宜选用。

C. 硝苯地平：为钙通道阻滞剂，主要通过抑制钙离子流入心肌和血管平滑肌细胞，使血管扩张，降低血压，对肾小球滤过影响较小，不会加重双肾动脉狭窄患者的病情。

D. 氢氯噻嗪：为噻嗪类利尿剂，通过抑制肾小管对尿液的重吸收，增加尿液排泄，降低血压，对肾小球滤过影响较小，不会加重双肾动脉狭窄患者的病情。

E. 美托洛尔：为 β 受体阻滞剂，通过降低心率、心肌收缩力降压，对肾小球滤过影响较小，不会加重双肾动脉狭窄患者的病情。

146. 【答案】B

【解析】

选项 A：氢氯噻嗪和呋塞米都是利尿剂。在降压治疗中，一般不推荐使用两种利尿剂联合，因此这个选项是错误的。

选项 B：氨氯地平是一种钙通道阻滞剂，可以引起反射性心跳加快，提升患者心率。缬沙坦是一种血管紧张素 II 受体阻滞剂 (ARB)，在糖尿病肾病合并高血压的情况下，首选 ACEI/ARB 类药物。这些药物可以改善胰岛素抵抗，有利于控制血糖，减轻蛋白尿，预防肾功能恶化。因此，这个选项是正确的。

选项 C 和 D：美托洛尔、普萘洛尔都是 β 受体阻滞剂，对于心率较慢的患者不宜使用。此外， β 受体阻滞剂可能增加胰岛素抵抗，还可能掩盖和延长低血糖反应，因此这两个选项是错误的。

选项 E：螺内酯是一种保钾利尿药，可能会提高血钾水平。在使用 ACEI 类药物的同时使用螺内酯可能会增加高血钾的风险，因此这个选项是错误的。

147. 【答案】A

【解析】

选项 A：静息心率 <110 次 / 分。这是正确答案。对于无症状的心房颤动，且左心室收缩功能正常的患者，控制静息心室率 <110 次 / 分是适当的。

选项 B：静息心率 <100 次 / 分。这个选项不正确。对于无器质性心脏病的患者，无需将心率控制在如此低的水平。

选项 C：静息心率 <90 次 / 分。这个选项也不正确。同样，对于无器质性心脏病的患者，无需将心率控制在这样的范围内。

选项 D：轻微活动后心率 <110 次 / 分。这个选项不正确。这个控制目标通常适用于有器质性心脏病的患者。

选项 E：轻微活动后心率 <100 次 / 分。这个选项也不正确。同样，这个控制目标通常适用于有器质性心脏病的患者。

148. 【答案】B

【解析】

选项 A：西地兰是一种强心药，可以增强心肌收缩力，对于非急性心梗诱发的患者是可以使用的，因此选项 A 不正确。

选项 B：卡维地洛是 α_1 、 β_1 、 β_2 受体阻断药，急性期不宜使用 β 受体阻滞剂（尤其心功能 IV 级是卡维地洛的用药禁忌），因为可能会减弱心肌收缩力而加重心肌泵血功能障碍，所以选项 B 是正确答案。

选项 C：硝普钠是血管扩张剂，一般用于高血压危象、心力衰竭并肺水肿等，可以扩张血管降低心脏前后负荷，但是降压效力较大需要控制剂量，因此选项 C 不正确。

选项 D：硝酸甘油也为血管扩张剂，主要扩张小静脉、降低心脏前负荷，可以用于急性心衰发作的治疗，因此选项 D 不正确。

选项 E：呋塞米是急性心衰发作的首选药物，可以通过利尿作用减轻体内水潴留，降低心脏负荷，因此选项 E 不正确。

149. 【答案】D

【解析】

A 选项：窦性心动过缓，其病情轻重不一，可呈间歇性发作，临床多表现为器官供血不足，很少引起心力衰竭。因此，这个选项是错误的。

B 选项：一度房室传导阻滞，多无明显临床症状，因此，这个选项也是错误的。

C 选项：偶发室性期前收缩，一般不需治疗，很少引起心衰。因此，这个选项也是错误的。

D 选项：快速心房颤动，当心房颤动时，心室率可大于 150 次/分，心脏收缩时间明显缩短，泵功能衰竭，且心房有效收缩消失，心排血量比窦性心律时减少达 25%或更多，故最易引起心衰。因此，这个选项是正确的。

E 选项：偶发房性期前收缩，患者偶感心悸，也可无临床症状。因此，这个选项也是错误的。

150. 【答案】A

【解析】

A. 二尖瓣关闭不全：二尖瓣是位于左心房和左心室之间，主要防止血液从心室逆流回心房。当二尖瓣关闭不全，部分血液会回流至左心房，导致有效的心排血量减少，从而可能引起低输出量性心力衰竭。

B. 维生素 B₁ 缺乏：维生素 B₁ 对心脏有重要作用，其缺乏可引发伯利-伯利病，表现为心肌代谢障碍，但通常引起的是高输出量性心力衰竭。

C. 动静脉瘘：动静脉瘘可以增加静脉回流，导致心脏负荷增加，但它引起的是高输出量性心力衰竭。

D. 严重贫血：严重贫血会导致氧供应不足，心脏需要加大工作量以满足身体对氧的需求，但这通常引起的是高输出量性心力衰竭。

E. 甲状腺功能亢进：甲状腺激素可以增加心脏收缩力和心率，导致心脏工作负荷增加，但它引起的也是高输出量性心力衰竭。

第四单元

1. 【答案】D

【解析】

选项 A: 神经衰弱的主要症状包括疲乏、失眠、头晕、头痛、耳鸣和记忆力减退等。在这个病例中, 患者并没有出现这些症状, 因此 A 选项不正确。

选项 B: 分离性障碍的主要特征是部分或全部丧失对过去的记忆或身份, 或出现具有发泄特点的情感暴发。患者可以有遗忘、漫游、人格改变等表现, 症状可具有发作性。在这个病例中, 患者并没有出现这些症状, 因此 B 选项不正确。

选项 C: 梦魇是发生在快眼动睡眠阶段, 症状与夜惊相仿, 区别就是事后可以回忆。在这个病例中, 患者不能回忆发作的情况, 因此 C 选项不正确。

选项 D: 夜惊是患者在深度睡眠阶段突然惊醒, 表现为恐惧、焦虑, 对周围环境反应迟钝, 对于发作的情况无法回忆。这个病例中的患者的症状与夜惊的定义相符, 因此 D 选项是正确的。

选项 E: 睡行症是一种在睡眠过程中尚未清醒时起床在室内或户外行走, 或做一些简单活动的睡眠和清醒状态的混合状态。在这个病例中, 患者并没有出现这些症状, 因此 E 选项不正确。

2. 【答案】D

【解析】

选项 A: 甲状腺功能不全的症状包括疲劳、体重增加、寒冷感、皮肤干燥等。然而, 患者的主要症状是严重的体重减轻和食欲失调, 这与甲状腺功能不全的症状不符。

选项 B: 癌症可能会导致体重减轻, 但通常伴随其他症状, 如持续的疼痛、无法解释的疲劳、皮肤变色等。患者没有这些症状, 因此不太可能是癌症。

选项 C: 结核症的典型症状包括咳嗽、疲劳、体重减轻、发热和夜间出汗。患者没有出现这些症状, 所以结核症的可能性不大。

选项 D: 神经性厌食症的主要症状是对体重和体形的过度关注, 严格限制食物摄入, 导致体重严重下降。患者的症状与神经性厌食症的定义一致。

选项 E: 神经性贪食症的患者会有反复发作的暴食行为, 之后会因担心体重增加而采取各种减轻体重的方法。虽然患者有暴食和自我诱发呕吐的行为, 但其严重的体重下降更符合神经性厌食症的诊断。

3. 【答案】C

【解析】

选项 A: 精神分裂症的主要症状包括感知、思维、情感、行为等多方面的障碍和精神活动的不协调, 但患者在此案例中的表现并不符合这些特征。

选项 B: 分离性障碍主要表现为部分或全部丧失对自我身份的识别和对过去记忆部分或全部的丧失, 此案例中的患者并未出现这些症状。

选项 C: 急性应激障碍主要出现在遭受严重精神刺激后, 如此案例中的患者所经历的家中房子因洪水倒塌的事件, 其后的行为反应符合急性应激障碍的症状。

选项 D: 躁狂发作的患者会有情感高涨、思维奔逸、活动增多的症状, 本例中的患者虽然表现出了兴奋, 但是这种兴奋是不协调的, 与躁狂发作的特征不符。

选项 E: 癫痫所致精神障碍通常会有癫痫病史, 此案例中的患者没有提及有这样的病史, 因此这个选项也被排除。

4. 【答案】A

【解析】

A 选项：分离（转换）性障碍，正确。该疾病的特点是患者在强烈的情绪冲突或应激情况下，出现与脑器质性疾病相似但无器质性病变的临床症状。

B 选项：急性应激障碍，错误。这个疾病的特征是在遭受极度恐怖的事件之后，患者会立即出现强烈的恐惧，行为具有盲目性，或者精神运动性抑制，甚至木僵，但没有分离（转换）性障碍的症状。

C 选项：脑器质性精神障碍，错误。这类疾病是由于脑部的器质性病变引起的精神障碍，如脑血管疾病、颅内感染等，与患者的临床表现不符。

D 选项：精神分裂症，错误。这是一种病因未明的精神病，常有感知、思维、情感、行为等多方面的障碍和精神活动的不协调，但没有意识障碍和智能障碍，病程多迁延，自知力不全或缺乏，与患者的病史不符。

E 选项：妄想性障碍，错误。妄想性障碍的特点是妄想结构严密系统，病前常有性格缺陷，而妄想有一定的事实基础，是对事实的片面评价和推断的基础上发展起来，思维有条理和逻辑，行为与情感反应与妄想观念相一致，无智能和人格衰退，一般没有幻觉，与患者病历不符。

5. **【答案】E****【解析】**

A. 思维云集：这是指患者莫名其妙地体验到强制性地脑内涌现出大量无现实意义、异己的联想，此处患者并未表现出这种症状，因此不选 A。

B. 音联意联：在躁狂患者中出现思维奔逸时，说话的主题极易随环境而改变（随境转移），也可有音韵联想（音联），或字意联想（意联）。但在本例中，患者并未表现出这种症状，因此不选 B。

C. 强直性思维：这指的是思维过程缓慢，思维内容贫乏，缺乏新的想法，此处患者并未表现出这种症状，因此不选 C。

D. 思维插入：这是指患者感到有某种思想不是属于自己的，不受他的意志所支配，是别人强行塞入其脑中。此处患者并未表现出这种症状，因此不选 D。

E. 思维破裂：这是指患者的语句完整，但含义互不关联，此处患者的症状符合这一描述，因此答案选 E。

6. **【答案】C****【解析】**

A. 颈椎病：颈椎病在累及交感神经时可有头痛，但多伴有心动过速、耳鸣等症状。本例中，患者没有这些症状，因此不是颈椎病。

B. 血管性头痛：血管性头痛通常表现为搏动性头痛，而该患者的头痛为紧箍样疼痛，并非搏动性，所以不符合血管性头痛的诊断。

D. 无先兆偏头痛：无先兆偏头痛多表现为反复发作的双侧颞部及眶周疼痛，可为搏动性。本例中，患者的症状并不符合这一描述。

E. 颞颌关节紊乱：颞颌关节紊乱有张口颞颌关节弹响的特点，而该患者的检查结果未显示这一症状，因此不是颞颌关节紊乱。

7. **【答案】C****【解析】**

选项 A：多发性肌炎通常表现为肌痛和肌萎缩，而非急性四肢无力，因此这不是正确答案。

选项 B：重症肌无力的主要特征是疲劳，特别是在一天结束时症状更重，眼肌最先受累，而非四肢无力，因此这不是正确答案。

选项 C：吉兰巴雷综合征是一种急性起病的疾病，常有前驱感染病史，主要表现为四肢迟缓性瘫痪，腱反射减弱，感觉缺失相对轻。本例中，患者的症状与这种疾病相符，因此这是正确答案。

选项 D: 急性脊髓炎通常胸髓最常受累, 以病损水平以下肢体瘫痪、传导束性感觉障碍和尿便障碍为临床特征, 而非四肢无力, 因此这不是正确答案。

选项 E: 周期性瘫痪是一种主要表现为反复发作性的骨骼肌弛缓性瘫痪的疾病, 发作时常伴有血清钾的异常改变, 而非急性四肢无力, 因此这不是正确答案。

8. 【答案】C

【解析】

A. 重症肌无力: 主要表现为病态疲劳, 晨轻暮重, 眼肌最先受累, 此患者的症状并不符合。

B. 周期性麻痹: 是反复发作性的骨骼肌弛缓性瘫痪为主要表现的一组肌病, 发作时大多伴有血清钾的异常改变, 但此患者没有相关描述。

C. 吉兰-巴雷综合征: 患者急性起病, 四肢无力, 呈迟缓性瘫痪, 腓肠肌压痛, 符合吉兰-巴雷综合征的临床表现。

D. 多发性肌炎: 主要表现为肌痛和肌萎缩, 此患者的症状并不符合。

E. 急性脊髓炎: 通常胸髓最常受累, 以病损水平以下肢体瘫痪、传导束性感觉障碍和尿便障碍为临床特征, 此患者的症状并不符合。

9. 【答案】A

【解析】

A 选项 (正确答案): 广泛性焦虑障碍的主要表现为持续的、过度的焦虑和担忧, 患者往往无法控制这种担忧, 而且担忧内容常常涉及日常生活的多个方面。题中所描述的患者, 存在长期的入睡困难, 对社交有恐惧感, 担心自己的免疫力降低, 这些都符合广泛性焦虑障碍的症状。

B 选项: 恐怖性焦虑障碍主要表现为对特定对象或情境的极度恐惧, 这种恐惧通常是不合理的, 远超过实际威胁。C 选项: 失眠障碍主要表现为长期的睡眠质量或数量减少, 导致显著的社会功能损害。虽然题目中的患者存在睡眠问题, 但更主要的问题是广泛的焦虑和担忧, 因此不能诊断为失眠障碍。

D 选项: 抑郁症的主要症状包括持续的低落情绪, 对日常活动的兴趣或乐趣减少, 以及能量的显著减少。E 选项: 躁狂症的主要症状包括持续的高涨情绪, 对日常活动的兴趣或乐趣增加, 以及能量的显著增加。

10. 【答案】A

【解析】

A. 认知疗法: 这是一种心理治疗, 主要通过改变患者的思维方式, 帮助他们理解和管理不良情绪。对于广泛性焦虑障碍, 认知疗法是首选治疗方法, 因此选 A。

B. 催眠: 虽然催眠可以帮助人们放松, 但它并不被视为治疗广泛性焦虑障碍的有效方法, 因此不选 B。

C. 生物反馈: 生物反馈是一种通过了解身体信号来改善健康的技术, 但对于广泛性焦虑障碍的治疗效果尚无定论, 因此不选 C。

D. 口服地西泮: 地西泮属于苯二氮䓬类药物, 对于焦虑症有效。但由于其具有依赖性, 一般不建议长期服用, 因此不选 D。

E. 暗示疗法: 暗示疗法主要是利用语言或其他刺激引导患者进入一种特殊的心理状态, 以达到改变其异常行为或情绪的目的。但对于广泛性焦虑障碍的治疗效果尚无定论, 因此不选 E。

11. 【答案】B

【解析】

选项 A: 刚塞综合征, 又称心因性假性痴呆, 主要表现为对简单问题进行近似而错误的回答。这与题干中的患者表现不符, 因此排除。

选项 B: 童样痴呆, 特征是行为幼稚, 模仿幼儿的言行。如题干中的患者, 她虽然是 23 岁的成年人, 但在语

言和行为上表现得像个 3 岁的孩子，这符合童样痴呆的症状，因此选择 B。

选项 C：错构，是指在遗忘的基础上，患者对过去发生的事情，在发生的地点、情节、特别是时间上出现错误的回忆，并坚信不移。这与题干中的患者表现不符，因此排除。

选项 D：谵妄状态，是指在意识清晰度下降的基础上出现恐怖性的幻视和错觉。这与题干中的患者表现不符，因此排除。

选项 E：虚构，是以想象的、未曾经历的事件来填补记忆的缺陷。这与题干中的患者表现不符，因此排除。

12. 【答案】C

【解析】

A. 幻觉妄想状态：此状态下，患者会有错误的感知或对现实的扭曲理解，但不会出现定向力障碍。因此，这个选项是错误的。

B. 抑郁状态：抑郁症患者主要表现为情绪低落，丧失兴趣或愉悦感，而不会出现定向力障碍和幻觉。因此，这个选项是错误的。

C. 朦胧状态：朦胧状态是一种精神病性症状，主要特征是意识模糊，记忆障碍，人物定向力障碍和幻觉，与题目描述的症状相符。所以，这个选项是正确的。

D. 谵妄状态：谵妄状态的主要特征是意识清晰度的改变，注意力集中困难，昼夜颠倒等，患者的幻视多为恐怖性，常由感染、中毒、躯体疾病导致，与题目描述的病情不符。因此，这个选项是错误的。

E. 强迫状态：强迫状态患者会有无法控制的思想或冲动，但不会出现定向力障碍和幻觉。因此，这个选项是错误的。

13. 【答案】A

【解析】

选项 A：“谈话”，在心理治疗中，谈话是一种常见的手段，但不是急性应激障碍治疗干预的基本原则。因此，这是正确答案。

选项 B：“及时”，对于急性应激障碍，及时的干预是非常重要的，可以帮助患者尽快恢复，防止症状恶化。

选项 C：“就近”，这是指尽可能在发生应激事件的地方进行干预，这样可以更直接、更有效地处理问题。

选项 D：“简洁”，在干预过程中，应尽量保持简洁明了，让患者能够清楚理解治疗的目标和方法。

选项 E：“紧扣重点”，在处理急性应激障碍时，需要紧扣患者的主要问题，集中精力进行治疗。

14. 【答案】B

【解析】

A. 血清铁减少：贮存铁减少到不足以补偿功能状态后，血清铁和转铁蛋白饱和度才会减低。并非缺铁性贫血早期改变。

B. 血清铁蛋白降低：当机体对铁的需求与供给失衡，导致体内贮存铁耗尽时，铁代谢指标发生异常。故缺铁性贫血早期以贮铁指标（铁蛋白、含铁血黄素）减低为主要表现。此选项正确。

C. 血清总铁结合力增高：贮存铁减少到不足以补偿功能状态后，总铁结合力和未结合铁的转铁蛋白才会升高。并非缺铁性贫血早期改变。

D. 运铁蛋白饱和度降低：重金属中毒时，运铁蛋白饱和度会降低。这与缺铁性贫血无关。

E. 红细胞内原卟啉增高：红细胞内原卟啉增高常见于卟啉病，并非缺铁性贫血的特征。

15. 【答案】A

【解析】

A. 颅骨外生性肿瘤：这类肿瘤是发生在颅骨之外，其生长并不会占据颅腔内的空间，因此不会引起颅内压增高。这是本题的正确答案。

B. 脑血管流量升高：当脑血管流量升高时，会导致颅内血液容积增加，从而可能引起颅内压力升高。因此，这个选项是错误的。

C. 颅内感染：颅内感染如脑脓肿，可挤占颅内空间，引起颅内压增高。因此，这个选项是错误的。

D. 颅腔狭小：颅腔狭小使颅腔的容积变小，可引起颅内压增高。因此，这个选项是错误的。

E. 颅内实质体积增大：颅内实质体积增大，如由于肿瘤或脑水肿等原因，可占据更多的颅腔空间，引起颅内压力升高。因此，这个选项是错误的。

16. 【答案】B

【解析】

选项 A：左旋多巴有效。这是帕金森病的支持标准，但不是诊断的核心必备条件。左旋多巴是治疗帕金森病的主要药物，对大多数患者有效，但并非所有帕金森病患者都对其有反应。

选项 B：运动迟缓。这是帕金森病的核心诊断标准之一。运动迟缓（或称刚性）是帕金森病的主要症状之一，表现为动作变慢和困难。

选项 C：静止性震颤。静止性震颤是帕金森病的典型症状，但不是诊断的核心必备条件。它通常在病程早期就会出现，但并非所有帕金森病患者都有此症状。

选项 D：肌强直。肌强直也是帕金森病的典型症状，但不是诊断的核心必备条件。肌强直表现为肌肉僵硬，导致动作不灵活。

选项 E：姿势步态异常。这是帕金森病的一个常见症状，但不是诊断的核心必备条件。姿势步态异常表现为行走时身体前倾，步子变小，容易跌倒。

17. 【答案】A

【解析】

选项 A：酒精毒性幻想症，患者有长期饮酒史，出现意识不清、话多零乱、看见鬼怪入院（幻觉），这些都是酒精毒性幻想症的典型表现，因此这是正确答案。

选项 B：酒精中毒性痴呆，主要表现为持续性智力减退，如短期、长期记忆障碍，抽象思维及理解判断障碍，人格改变等，但患者主要表现为幻觉，所以排除此选项。

选项 C：酒精中毒性情感障碍，虽然长期饮酒患者会出现人格改变及情感障碍，但患者主要表现为幻觉，所以排除此选项。

选项 D：精神分裂症，多起病于青壮年，常有感知、思维、情感、行为等多方面的障碍和精神活动的不协调，一般无意识障碍和明显的智能障碍，与本题患者表现不符，所以排除此选项。

18. 【答案】B

【解析】

A 选项：单纯性肾病。这种病通常表现为大量蛋白尿，但不会伴随血尿或高血压。所以，患儿的症状（包括血尿和高血压）与单纯性肾病的症状不符。

B 选项：肾炎性肾病。这是一种由于免疫反应导致的肾脏疾病，症状包括蛋白尿、血尿、水肿和高血压。患儿的症状与肾炎性肾病的症状完全吻合，因此，这是最可能的诊断。

C 选项：泌尿系感染。这种病通常会引起发热、呕吐、腹泻等症状，而题干中并未提及这些症状，所以这不是正确的答案。

D 选项：急性肾小球肾炎。这种病的症状包括血尿、蛋白尿、水肿、高血压，或肾功能不全。虽然患儿的症状与急性肾小球肾炎的症状相似，但是急性肾小球肾炎通常有明显的前驱感染，而题干中并未提及这一点。

E 选项：肾结石。肾结石的症状包括血尿、疼痛、肾水肿等，与题干描述的症状不符。

19. 【答案】B

【解析】

A. 房间隔缺损：房间隔缺损通常会有第一心音亢进，肺动脉第二心音增强；第二心音呈固定分裂；左第2肋间近胸骨旁可闻及2~3级喷射性收缩期杂音。肺动脉段突出，肺野充血明显，主动脉影缩小。但是题干中并未提到这些特点。

B. 室间隔缺损：室间隔缺损的特征符合题干描述，即胸骨左缘3~4肋间可闻及IV级收缩期粗糙杂音，广泛传导，可触及收缩期震颤，P₂亢进，胸部X线显示主动脉结(弓)影缩小。故此选项正确。

C. 动脉导管未闭：动脉导管未闭通常会有胸骨左缘上方闻及连续性“机器”样杂音，占整个收缩期与舒张期，常伴有震颤，杂音向左锁骨下、颈部和背部传导，当肺血管阻力增高时，杂音的舒张期成分可能减弱或消失。主动脉结正常或突出。这与题干描述不符。

D. 法洛四联症：法洛四联症通常会有胸骨左缘第2肋间可闻及2级粗糙喷射性收缩期杂音，一般无收缩期震颤。肺动脉第二心音减弱。这与题干描述不符。

E. 肺动脉狭窄：肺动脉狭窄通常会有胸骨左缘第2、3肋间可闻及4-5级以上喷射性收缩期杂音，向左上胸、心前区、颈部、腋下及背面传导。狭窄后的肺动脉扩张为本病特征性的改变。典型者前后位心影呈“靴状”，即心尖圆钝上翘，肺动脉段凹陷，上纵隔较宽，肺门血管影缩小，两侧肺纹理减少，透亮度增加。这与题干描述不符。

20. 【答案】E

【解析】

选项A：生理性黄疸通常在新生儿出生后2-3天内出现，患儿一般情况良好。题干中的男婴在出生后10小时就出现了黄疸，并且有加重趋势，因此排除生理性黄疸。

选项B：新生儿肝炎通常由病毒引起，例如乙型肝炎病毒、巨细胞病毒等，题干中并未提及这些，因此不选此项。

选项C：母乳性黄疸通常在新生儿生后1-3个月内出现，表现为非溶血性高未结合胆红素血症，题干中的男婴黄疸出现的时间和特征并不符合，因此排除此项。

选项D：ABO溶血病通常在新生儿出生后第2-3天出现，题干中的男婴黄疸出现的时间并不符合，因此排除此项。

选项E：Rh溶血病可能在出生后24小时内出现黄疸并迅速加重，符合题干中的男婴症状，因此选此项。

21. 【答案】B

【解析】

A. 川崎病：该病通常表现为持续发热5天以上，伴有四肢变化、多形性皮疹、眼结合膜充血、唇充血皲裂、口腔黏膜弥漫充血、舌乳头突起、充血呈草莓舌、颈部淋巴结肿大等症状。根据题干中给出的信息，该病不符合孩子的症状。

B. 传染性单核细胞增多症：该病的典型症状包括发热、咽痛、颈部淋巴结肿大和异型淋巴细胞可检出。这完全符合题干中描述的孩子的症状，因此这是正确答案。

C. 猩红热：该病的典型症状包括发热、咽痛、头痛、呕吐、杨梅舌、环口苍白圈、颈部淋巴结肿大、皮肤弥漫充血、上有密集针尖大小丘疹、全身皮肤均可受累、疹退后伴脱皮。根据题干中给出的信息，该病不符合孩子的症状。

D. 风疹：该病的典型症状包括全身症状轻、耳后、枕部淋巴结肿大并触痛、疹间有正常皮肤、退疹后无色素沉着及脱屑。根据题干中给出的信息，该病不符合孩子的症状。

E. 麻疹：该病的典型症状包括发热、咳嗽、畏光、鼻卡他、结膜炎，Koplik斑。根据题干中给出的信息，该病不符合孩子的症状。

22. 【答案】D

【解析】

A. 食欲增加：错误。先天性甲状腺功能减退症患者的新陈代谢减慢，食欲一般减退，不会出现食欲增加的情况。

B. 心率快：错误。由于甲状腺激素缺乏，导致新陈代谢下降，心肌收缩力下降，心率减慢，不会出现心率快的情况。

C. 肌张力亢进：错误。先天性甲状腺功能减退症患者的肌肉无力，肌张力降低，不会出现肌张力亢进的情况。

D. 肌力下降：正确。由于甲状腺激素对神经肌肉系统有重要影响，先天性甲状腺功能减退症会导致肌力下降。

E. 反射亢进：错误。先天性甲状腺功能减退症患者的神经反射减弱，不会出现反射亢进的情况。

23. 【答案】C

【解析】

选项 A：臀部。皮下脂肪的消耗顺序中，臀部并不是最后消失的部位，所以选项 A 错误。

选项 B：四肢。在皮下脂肪的消耗顺序中，四肢也并不是最后消失的部位，所以选项 B 错误。

选项 C：面颊。面颊是皮下脂肪消耗的最后部位，所以选项 C 是正确答案。

选项 D：躯干。在皮下脂肪的消耗顺序中，躯干并不是最后消失的部位，所以选项 D 错误。

选项 E：腹部。在皮下脂肪的消耗顺序中，腹部是首先开始消失的部位，所以选项 E 错误。

24. 【答案】E

【解析】

A 选项：日光照射不足及维生素 D 摄入不足的病史。这是维生素 D 缺乏性佝偻病的病因，但并非诊断指标。

B 选项：烦躁不安、夜惊、多汗等神经精神症状。这些是维生素 D 缺乏性佝偻病的临床早期症状，但并非特异性，仅作为临床早期诊断的参考依据。

C 选项：血钙、磷、碱性磷酸酶水平异常。这些都是维生素 D 缺乏可能导致的生化改变，但并非最可靠的诊断指标。

D 选项：长骨 X 线检查异常及骨骼畸形。这是维生素 D 缺乏性佝偻病晚期的表现，早期常无骨骼病变。

E 选项：血 25-(OH)D₃ 与 1, 25-(OH)₂D₃ 水平下降。这是最可靠的早期诊断指标，因为血清 25-(OH)D₃ 是体内维生素 D 储存的主要形式，其水平能反映体内维生素 D 的储存情况。

25. 【答案】C

【解析】

A. 原发性房间隔缺损：原发性房间隔缺损通常会导致血液从左心房流向右心房，因此右心房和右心室的血量会增多，而不是左心房和左心室。

B. 继发性房间隔缺损：同样，继发性房间隔缺损也会使得血液从左心房流向右心房，导致右心血流量增加，舒张期负荷加重，故右心房、右心室增大，而不是左心房和左心室。

C. 动脉导管未闭：动脉导管未闭会使主动脉在收缩期和舒张期的压力均超过肺动脉，通过未闭的动脉导管左向右分流的血液连续不断，使肺循环及左心房、左心室、升主动脉的血流量明显增加。这是唯一符合题目描述的选项。

D. 室间隔缺损：室间隔缺损的影响取决于缺损大小及肺血管阻力，只有大量左向右分流量使肺循环血流量增加，左右心室增大，但并未明确指出左心房和左心室的血量会增多。

E. 法洛四联症：法洛四联症存在四种畸形：肺动脉狭窄、室间隔缺损、主动脉骑跨和右心室肥厚，可能出现肺循环血量减少，右心室血量增加，不符合题目描述。

26. 【答案】D

【解析】

A. 细菌性心内膜炎：这是右向左分流型（青紫型）如法洛四联症、大动脉换位和三尖瓣闭锁等先天性心脏病的常见并发症，而非左向右分流型心脏病，所以此选项错误。

B. 脑血栓：这也是右向左分流型心脏病的常见并发症，与左向右分流型心脏病无关，所以此选项错误。

C. 脑脓肿：同样，这是右向左分流型心脏病的常见并发症，不是左向右分流型心脏病的常见并发症，所以此选项错误。

D. 肺炎：左向右分流型心脏病由于缺损较大时左向右分流量多，患儿多生长迟缓，体重不增，有消瘦、喂养困难，活动后乏力、气短、多汗，易患反复呼吸道感染导致肺炎，所以此选项正确。

E. 心力衰竭：虽然严重的左向右分流型心脏病可以导致心力衰竭，但是最常见的并发症仍是肺炎，所以此选项错误。

27. 【答案】D

【解析】

选项 A：新生儿期、学龄期。新生儿期确实是一个生长迅速的时期，但并不算是生长的高峰期。学龄期生长速度相对较慢，并没有明显的生长高峰。

选项 B：婴儿期、学龄期。婴儿期是生长的第一个高峰期，但学龄期并未出现明显的生长高峰。

选项 C：幼儿期、学龄期。幼儿期和学龄期的生长速度都相对较慢，并没有明显的生长高峰。

选项 D：婴儿期、青春期。这是正确答案。婴儿期是生长的第一个高峰期，青春期则是第二个生长高峰期。

选项 E：学龄前期、青春期。学龄前期的生长速度较慢，并未出现明显的生长高峰，而青春期则是生长的第二个高峰期。

28. 【答案】B

【解析】

A. 青霉素：这是一种抗生素，主要用于治疗由细菌引起的感染，无法促使动脉导管闭合。

B. 吲哚美辛：这是一种非甾体抗炎药，常用于早产儿的动脉导管未闭治疗，可以通过抑制前列腺素 E2 的合成，降低前列腺素 E2 的浓度，从而促使动脉导管闭合。

C. 卡托普利：这是一种血管紧张素转化酶抑制剂，主要用于治疗高血压和心力衰竭，不能促使动脉导管闭合。

D. 普萘洛尔：这是一种 β 受体阻滞剂，主要用于治疗心律失常、高血压等，不能促使动脉导管闭合。

E. 硝酸甘油：这是一种血管扩张药，主要用于治疗冠心病，不能促使动脉导管闭合。

29. 【答案】A

【解析】

A. 2:1 等张含钠液：对于重度低渗性脱水的腹泻患儿，应首先选用等张含钠液进行扩容。这是因为等张含钠液能有效补充体内丢失的水分和电解质，有助于改善循环不良和休克的症状。因此，选择 A 是正确的。

B. 4:3:2(2/3 张)混合液：这种液体可用于低渗性脱水的维持补液，但在重度低渗性脱水扩容时并非首选，所以 B 选项不正确。

C. 2:3:1(1/2 张)混合液：这种液体用于等渗性脱水的治疗，但不适用于重度低渗性脱水的扩容，所以 C 选项不正确。

D. 1:4(1/5 张)混合液：这种液体用于高渗性脱水的治疗，但不适用于重度低渗性脱水的扩容，所以 D 选项不正确。

E. 1:2(1/3 张)混合液：这种液体用于高渗性脱水的治疗，但不适用于重度低渗性脱水的扩容，所以 E 选项不正确。

30. 【答案】C

【解析】

A. 输尿管结石：输尿管结石虽然也可以引起肾积水，但是在儿童中并不常见，因此此选项不正确。

B. 肿瘤：肿瘤可能导致尿流受阻，从而引起肾积水，但是在儿童中，先天性肾盂连接部狭窄更为常见，因此此选项不正确。

C. 先天性肾盂连接部狭窄：这是儿童先天性肾积水的主要原因。由于狭窄阻碍了尿液从肾盂到输尿管的流动，导致肾盂和肾盏扩张，久而久之，会引发肾实质损害和肾功能障碍。因此此选项正确。

D. 精索静脉曲张：精索静脉曲张并不会影响尿液的排泄，因此不会引起肾积水，此选项不正确。

E. 尿道狭窄：尿道狭窄虽然会影响尿液的排泄，但是它通常会引起膀胱积水，而不是肾积水，因此此选项不正确。

31. 【答案】D

【解析】

A. 加油加盐：这个选项是错误的。在辅食过渡期，应该注意少油少盐，以免对儿童的肾脏功能造成过度负担。

B. 少量多餐：这个选项也是错误的。虽然在一些情况下，如儿童消化功能较弱时，可以采取少量多餐的方式，但这并非辅食过渡期的标准做法。正常情况下，应保持规律的三餐。

C. 循序渐进：这个选项虽然在某种程度上符合辅食添加的原则，但不全面。辅食添加应从单一到多元化，而不仅仅是循序渐进。

D. 单一到多元化：这是正确的选项。辅食添加的原则就是从单一到多元化，即从一种食物开始，逐渐增加食物种类，以满足儿童营养需求的多样性。

E. 吃奶后辅食：这个选项是错误的。在辅食过渡期，辅食和奶应该分开给，以便更好地掌握儿童的食欲和摄入量。

32. 【答案】D

【解析】

选项 A：发出 mama 的声音。一般来说，婴儿在 7 个月左右就能发出“mama”的声音，所以 8 个月的婴儿应该可以做到这一点。因此，选项 A 是错误的。

选项 B：会换手。大约在 7 个月，婴儿开始学习使用双手，并能够自由地从一只手传递物体到另一只手。因此，8 个月的婴儿应该可以做到这一点。所以，选项 B 是错误的。

选项 C：会拍手。一般来说，婴儿在 6-9 个月之间就会学会拍手。因此，8 个月会爬的婴儿应该可以做到这一点。所以，选项 C 是错误的。

选项 D：指认身体的部位。一般来说，婴儿在 18 个月左右才能认识和指出身体的各个部位。因此，8 个月的婴儿最不可能做到这一点。所以，选项 D 是正确的。

选项 E：会扶站。一般来说，婴儿在 8-10 个月左右就会开始尝试扶站。因此，8 个月的婴儿应该可以做到这一点。所以，选项 E 是错误的。

33. 【答案】C

【解析】

A. 乙肝疫苗第三针：一般在小儿出生后 24 小时内接种第一针，第二针在出生后 1 个月，第三针在 6 个月时接种。所以 4 个月的小儿下一次接种的疫苗不是乙肝疫苗第三针。

B. 麻腮风疫苗第一针：一般在小儿 8 个月时接种，所以此选项不正确。

C. 百白破疫苗第三针：百白破疫苗是小儿 3、4、5 月接种，在 5 月接种第三针。所以 4 个月的小儿下一次接种的疫苗是百白破疫苗第三针，此选项正确。

D. 脊髓灰质炎疫苗第二针：一般在小儿 2、3、4 个月接种，4 岁复种。所以此选项不正确。

E. 乙脑减毒活疫苗第一针：一般在小儿 8 个月接种。所以此选项不正确。

34. 【答案】A

【解析】

选项 A：每年增重 2kg。这个选项是不正确的。在婴儿第一年生长过程中，体重的增加是非常显著的。前 3 个月体重的增加值约等于后 9 个月内体重的增加值。因此，1 岁时，婴儿的体重约为出生时的三倍，一般来说，这个数字应该在 6-7kg 左右，而不是 2kg。

选项 B：体重为出生时的 4 倍。这个选项是可能的。一般来说，1 岁时，婴儿的体重约为出生时的三倍。但是，这个数据有一定的波动性，有的婴儿可能会达到出生时的四倍。

选项 C：3 个月为体重的 2 倍。这个选项是可能的。一般来说，婴儿在出生后的 3 个月，体重会增加到出生时的两倍。

选项 D：头围为 46cm。这个选项是正确的。婴儿在出生后的一年，头围的增长与体重、身长的增长相似，都是很快的。一般来说，1 岁时，婴儿的头围约为 46cm。

选项 E：乳牙 6 颗。这个选项是正确的。一般来说，婴儿在出生后的一年，乳牙会长出 6-8 颗。

35. 【答案】C

【解析】

A. 继续吸入沙丁胺醇：沙丁胺醇是一种吸入型速效 β_2 受体激动剂，可以快速缓解哮喘患者的急性发作症状，因此，这是正确的治疗方案。

B. 规律吸入糖皮质激素：糖皮质激素可以有效缓解哮喘的炎症反应，对于哮喘急性发作期，规律吸入糖皮质激素也是正确的治疗方法。

C. 静脉注射氨茶碱：氨茶碱是一种治疗哮喘的药物，但通常用于哮喘的慢性持续期，而不是急性发作期。因此，对于急性发作的哮喘患儿，静脉注射氨茶碱并不是正确的治疗方案。

D. 避免过敏原：避免接触可能引起哮喘发作的过敏原，是预防和控制哮喘的重要措施。因此，这也是正确的治疗方案。

E. 适量运动：适量的运动可以增强患者的身体素质，对于哮喘的控制和预防有一定的帮助，因此，这也是正确的治疗方案。

36. 【答案】D

【解析】

A. 肺炎链球菌肺炎的典型临床表现包括急骤起病、高热、胸痛等，且胸部 X 线检查可见大片阴影，与题干描述不符。

B. 金黄色葡萄球菌肺炎的特点是起病急、病情严重、进展快，全身中毒症状明显。胸部 X 线检查可见小片状影，病变发展迅速，与题干描述不符。

C. 支原体肺炎的临床表现持续高热、干咳、肺部体征不明显，胸部 X 线检查特点为支气管肺炎、间质性肺炎等，与题干描述不符。

D. 腺病毒肺炎的典型表现包括持续高热、频咳，喘憋加重伴精神萎靡，病程中有抽搐 1 次，白细胞数不高，X 线显示大小不等的片状病灶或融合性病灶，以两肺下野及右上肺多见，与题干描述相符。

E. 急性咽喉炎的临床表现为急性起病的犬吠样咳嗽、声嘶、喉鸣、吸气性呼吸困难等，与题干描述不符。

37. 【答案】E

【解析】

A. 先天性肠闭锁：此类疾病通常在新生儿期就会出现症状，如低位肠梗阻等，而且直肠指检仅见少量灰白色胶冻样便，用盐水灌肠亦不能排便，与题干描述不符。

B. 功能性便秘：这是一种原因不明的慢性便秘，主要表现为排便次数少、排便费力、粪质较硬或呈球状、排便不尽感，需要排除器质性疾病，与题干描述不符。

C. 中毒性巨结肠：主要由感染中毒引起，题干中没有提及患儿有感染中毒的症状，所以不选。

D. 肠套叠：主要表现为婴幼儿突然发生阵发性腹痛或阵发性规律性哭闹、呕吐、便血和腹部扪及腊肠样肿块，与题干描述不符。

E. 先天性巨结肠：根据患儿的症状，1岁男孩，生后48小时内无胎便，之后即有顽固性便秘和腹胀，最可能的诊断是先天性巨结肠。

38. 患儿，3岁，因出现面色苍白、食欲下降来诊，其父母诉有喂食蚕豆病史，考虑诊断蚕豆病。该患儿最可能缺乏

A. 磷酸果糖激酶-1

B. 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶

C. 丙酮酸羧化酶

D. 过氧化物酶

E. ATP合成酶

38. 【答案】B

【解析】

选项A：磷酸果糖激酶-1是糖酵解作用里一种重要的酶，但这与蚕豆病无直接关系，所以排除此选项。

选项B：蚕豆病是由于葡萄糖-6-磷酸脱氢酶的缺乏导致的，使得红细胞对氧化应激的抵抗力下降，容易发生溶血。因此，这是正确答案。

选项C：丙酮酸羧化酶存在于线粒体中，是三羧酸循环中的一种酶，但与蚕豆病无关，所以排除此选项。

选项D：过氧化物酶是一类氧化还原酶，它们能催化很多反应，主要是以过氧化氢为电子受体催化底物氧化的酶，但与蚕豆病无关，所以排除此选项。

选项E：ATP合成酶参与氧化磷酸化和光合磷酸化，在跨膜质子动力势的推动下合成ATP，但与蚕豆病无关，所以排除此选项。

39. 【答案】D

【解析】

A. II度轻型：宫颈脱出阴道口，宫体仍在阴道内。这与题干描述的病例不符，因为题干中明确提到部分宫体脱出阴道口外。

B. I度重型：宫颈已达处女膜缘，阴道口可见子宫颈。这同样与题干描述的病例不符，因为题干中部分宫体已经脱出阴道口外。

C. I度轻型：宫颈外口距处女膜缘 $<4\text{cm}$ ，未达处女膜缘。这与题干描述的病例不符，因为题干中部分宫体已经脱出阴道口外。

D. II度重型：部分宫体脱出阴道口外。这与题干描述的病例相符，所以是正确答案。

E. III度：宫颈与宫体全部脱出阴道口外。这与题干描述的病例不符，因为题干中只有部分宫体脱出阴道口外。

40. 【答案】C

【解析】

A选项：胎膜早破的主要症状为突然感到较多液体自阴道流出，与题干的症状不符，所以排除。

B选项：子宫破裂的典型症状是产妇突然感到下腹撕裂样剧痛，子宫收缩骤然停止，可以通过腹壁清楚扪及胎体，胎心胎动消失。根据题干描述，产妇的症状并未达到这种程度，所以排除。

D选项：前置胎盘的典型症状为妊娠晚期或临产后发生无诱因、无痛性反复阴道流血，与题干的症状不符，所

以排除。

E 选项：胎盘早剥的典型临床表现是阴道流血、腹痛，可能伴有子宫张力增高和子宫压痛，但不会出现病理性缩复环，所以排除。

41. 【答案】D

【解析】

选项 A（手足口病）：这种疾病的主要症状是发热，口腔咽颊处有疱疹，手、足、臀都会有斑丘疹或者是疱疹为主。这与题目中描述的情况不符，所以不选择 A。

选项 B（麻疹）：麻疹是由麻疹病毒引起的传染性呼吸道疾病，表现为呼吸道卡他炎症，发热第 2~3 天口腔麻疹黏膜斑；皮疹特点为红色斑丘疹，退疹后有色素沉着及细小脱屑；发热 3~4 天后出疹，出疹期为发热高峰。这与题目描述的情况也不符，所以不选择 B。

选项 C（幼儿急疹）：幼儿急疹在发热 3~5 天后，热度突然下降，在 24 小时内体温将至正常，热退同时或稍后出疹。这与题目描述的情况不符，所以不选择 C。

选项 D（风疹）：风疹的典型症状是患儿退热后耳后、枕部淋巴结肿大并触痛，这与题目描述的情况完全吻合，所以选择 D。

选项 E（水痘）：水痘在发病 24 小时内出现皮疹，皮疹先发于头皮、躯干受压部分，呈向心性分布猩红热。这与题目描述的情况不符，所以不选择 E。

42. 【答案】A

【解析】

选项 A：手足口病是由肠道病毒引起的一种常见传染病，主要症状包括手足口臀部出现皮疹和口腔黏膜有溃疡。这与题目描述的症状完全符合，因此，选项 A 是正确答案。

选项 B：麻疹是一种由麻疹病毒引起的传染性疾病，主要症状包括高热、咳嗽、鼻涕、眼结膜炎以及特征性的皮疹。但这与题目描述的症状不符，所以选项 B 是错误的。

选项 C：幼儿急疹主要表现为突发高热，热退后出现皮疹。这与题目描述的症状不符，所以选项 C 是错误的。

选项 D：风疹是由风疹病毒引起的一种急性传染病，主要症状为轻微的全身不适和面颈部→躯干→四肢的皮疹。这与题目描述的症状不符，所以选项 D 是错误的。

选项 E：水痘是由水痘-带状疱疹病毒引起的一种急性传染病，主要症状为全身皮疹和瘙痒。这与题目描述的症状不符，所以选项 E 是错误的。

43. 【答案】C

【解析】

A 选项：手足口病主要症状是发热，口腔咽颊处有疱疹，手、足、臀都会有斑丘疹或者是疱疹为主。这与题干描述的“热退一天后出疹”不符，因此排除。

B 选项：麻疹是由麻疹病毒引起的传染性呼吸道疾病，表现为呼吸道卡他炎症，发热第 2~3 天口腔麻疹黏膜斑，皮疹特点为红色斑丘疹，退疹后有色素沉着及细小脱屑，发热 3~4 天后出疹，出疹期为发热高峰。这与题干描述的“热退一天后出疹”不符，因此排除。

C 选项：幼儿急疹，又称突发性皮疹，常见于 6 个月到 3 岁的小儿，多在发热后 1-2 天出现皮疹，与题干描述的“热退一天后出疹”相符，因此是正确答案。

D 选项：风疹全身症状轻，症状出现后 1~2 天出疹。皮疹特点：面颈部→躯干→四肢，斑丘疹，疹间有正常皮肤，退疹后无色素沉着及脱屑。这与题干描述的“热退一天后出疹”不符，因此排除。

E 选项：水痘在发病 24 小时内出现皮疹，皮疹先发于头皮、躯干受压部分，呈向心性分布猩红热。这与题干描述的“热退一天后出疹”不符，因此排除。

44. 【答案】A

【解析】

A 选项：生理性黄疸通常在出生后 2-3 天开始出现，5-7 天达到高峰，然后逐渐消退。血清胆红素值通常不超过 $221 \mu\text{mol/L}$ （足月儿）。本例中，患儿的表现符合生理性黄疸的特征，因此，A 选项正确。

B 选项：溶血性黄疸通常在出生 24 小时后出现，血清胆红素值迅速上升，并可能伴有其他症状如贫血、肝脾肿大等。本例中，患儿无这些症状，故 B 选项错误。

C 选项：母乳性黄疸通常在生后 1-3 个月内出现，表现为非溶血性高未结合胆红素血症。本例中，患儿年龄小于 1 个月，故 C 选项错误。

D 选项：新生儿胆道闭锁表现为持续的黄疸，大便颜色淡黄或陶土色。本例中，题干并未提及患儿大便颜色异常，故 D 选项错误。

E 选项：新生儿肝炎起病较缓，常在生后数天至数周内出现黄疸，可伴有食欲下降、恶心、呕吐等症状。本例中，患儿一般情况好，吃奶好，无上述症状，故 E 选项错误。

45. 【答案】D

【解析】

选项 A：功能测定是用来诊断，而不是治疗。所以这个选项是错误的。

选项 B：光照疗法是对于血清胆红素值达到一定水平的新生儿黄疸进行治疗，但在这个案例中，患儿的血清胆红素值并未达到光疗指征，所以此选项也是错误的。

选项 C：抗生素疗法通常用于感染引起的黄疸，但这个案例中并无感染征象，所以此选项错误。

选项 D：观察，监测胆红素值。根据题意，诊断考虑为生理性黄疸，血清总胆红素值尚未超过小时胆红素曲线的第 95 百分位数，或未达到相应日龄、胎龄及相应危险因素下的光疗干预标准。无需特殊治疗，观察，监测胆红素值即可。所以此选项是正确的。

选项 E：换血疗法是对于血清胆红素值极高的新生儿黄疸进行治疗，但在这个案例中，患儿的血清胆红素值并未达到换血指征，所以此选项也是错误的。

46. 【答案】B

【解析】

选项 A：湿肺又称新生儿暂时性呼吸增快，多见于足月儿或剖宫产儿，由于肺内液体吸收及清除延迟所致，为自限性疾病。此病状通常不会出现进行性呼吸困难缺氧的症状。

选项 B：新生儿呼吸窘迫综合征又称新生儿肺透明膜病，多见于早产儿，生后久（一般 6 小时内）出现呼吸窘迫，并呈进行性加重。这符合题目中的病状描述，因此是正确答案。

选项 C：胎粪吸入综合征或称胎粪吸入性肺炎，是由于胎儿在宫内或产时吸入混有胎粪的羊水而导致，以呼吸道机械性阻塞及肺组织化学性炎症为病理特征，生后即出现呼吸窘迫，易并发肺动脉高压及肺气漏，多见于足月儿及过期产儿，无进行性加重，因此不符合题目描述。

选项 D：急性呼吸窘迫综合征，其临床特征呼吸频速和窘迫，进行性低氧血症，X 线呈现弥漫性肺泡浸润。本症与婴儿呼吸窘迫综合征颇为相似，但其病因和发病机制不尽相同，因此不能作为正确答案。

选项 E：肺部感染指包括终末气道、肺泡腔及肺间质在内的肺实质炎症，病因以感染最为常见，可有发热、咳嗽等表现。这种病状通常不会出现进行性呼吸困难缺氧的症状。

47. 【答案】C

【解析】

选项 A（保温）：对于新生儿来说，保温是非常重要的，但对于本题的新生儿出现呼吸困难缺氧的情况，保温并不能直接解决问题，故不选。

选项 B（表面活性物质替代治疗）：这是新生儿肺透明膜病的一种治疗方法，但并不是首要措施，故不选。

选项 C（无创通气）：对于新生儿肺透明膜病的早期，应用持续气道正压通气，可以减少肺表面活性物质应用及气管插管，因此是首要的治疗措施。

选项 D（液体疗法）：液体疗法对于新生儿肺透明膜病并不是首选的治疗方法，故不选。

选项 E（ECMO 治疗）：ECMO 治疗是一种复杂且有风险的治疗方式，只在其他治疗无效时才会考虑，故不选。

48. 【答案】E

【解析】

选项 A：先天性肠闭锁，通常在新生儿出生后立即出现呕吐和腹胀等症状。由于本题中的患儿在出生后 48 小时内无胎便，之后才出现腹胀和大便难解，因此不符合先天性肠闭锁的临床表现。

选项 B：功能性便秘，一般不会在新生儿期出现，且其主要表现为便次减少、排便费力、粪质较硬或呈球状，与题干描述的症状不符。

选项 C：肠套叠，其典型症状为腹痛、血便和腹部肿块，而非题干中的无胎便和腹胀。

选项 D：先天性肥厚性幽门狭窄，其主要表现为频繁的呕吐，尤其是喂奶后立即呕吐出射性，且常伴有右上腹的橄榄形肿块，与题干描述的症状不符。

选项 E：先天性巨结肠，其典型症状为新生儿出生后 24-48 小时内无胎便或少量胎便，之后出现低位肠梗阻症状，如腹胀逐步加重、顽固性便秘等，与题干描述的症状相符。

49. 【答案】C

【解析】

A. 脓毒症：此选项不符合题意，因为脓毒症通常会有全身感染的症状，如寒战、高热、皮疹等，而题目中并未描述这些症状。

B. 肠穿孔：虽然肠穿孔是先天性巨结肠的并发症之一，但是通常会伴随剧烈腹痛、腹膜炎征象等症状，C. 小肠结肠炎：正确选项。因为患儿在灌肠后症状缓解，但几天后突发高热，腹胀再次加重，这是小肠结肠炎的典型表现。

D. 肠梗阻：虽然先天性巨结肠可能会引起肠梗阻，但是在灌肠后，患儿的症状有所缓解，因此不太可能是肠梗阻。

E. 败血症：败血症是全身性感染，通常会出现寒战、高热、皮疹、关节痛及肝脾肿大等症状，而题目中并未描述这些症状，因此不选。

50. 【答案】C

【解析】

选项 A：呼吸道合胞病毒肺炎的临床表现通常为发热、呼吸困难，且肺部听诊多有中、细湿啰音，与题干描述的患儿症状不符。

选项 B：金黄色葡萄球菌肺炎起病急，病情重，进展快，且常有消化道症状，如呕吐、腹泻等，与题干描述的患儿症状不符。

选项 C：腺病毒肺炎多见于 6 个月至 2 岁的儿童，且症状包括稽留热、咳嗽、咳痰，这与题干描述的患儿症状相符，因此是正确答案。

选项 D：支原体肺炎起病不甚急，病程较长，且肺部体征常不明显，与题干描述的患儿症状不符。

选项 E：肺炎衣原体肺炎多见于年长儿，起病较缓，且常伴有上感症状，如咽痛、声音嘶哑等，与题干描述的患儿症状不符。

51. 【答案】A

【解析】

A. 呼吸道合胞病毒：该病毒是儿童常见的下呼吸道感染病原体，特点为全身中毒症状重，伴发作性喘憋，血白细胞正常，X线片可以看到点片状阴影和肺气肿。这与题目描述的临床表现一致，所以A选项是正确答案。

B. 金黄色葡萄球菌：该病原体引起的肺炎起病急，病情重，进展快，且X线检查特点为临底症状与胸片所见不一致。这与题目描述的临床表现不符，故B选项错误。

C. 腺病毒：腺病毒肺炎好发于冬春季节，疾病急骤、持续高热不退、中毒症状重，X线表现早于肺部啰音出现，容易出现大片状影及融合病灶。这与题目描述的临床表现及X线特点不同，故C选项错误。

D. 支原体：支原体肺炎起病不甚急，有发热、热型不定，咳嗽为突出表现，临床常表现两个不一致，即咳嗽重而肺部体征轻微，体征轻微但胸片阴影显著。这与题目描述的临床表现及X线特点不同，故D选项错误。

E. 衣原体：衣原体肺炎多见于年长儿，起病较缓，初起有上感症状，并常伴咽痛、声音嘶哑、发热。肺部体征常不明显。这与题目描述的临床表现不同，故E选项错误。

52. 【答案】C

【解析】

选项A：病毒性肠炎的特点主要是起病急，常伴有呕吐和腹泻，大便为水样或蛋花汤样，少量黏液，无腥臭。但在此题中，病人的大便为粘液和脓血状，中毒症状明显，伴里急后重，这与病毒性肠炎的临床特征不符。

选项B：真菌性肠炎多发于体弱、营养不良的小儿，大便次数增多，色稀黄或发绿，泡沫较多，带黏液有时可见豆腐渣样细块。这与题目中的情况不符，因此不选。

选项C：侵袭性大肠埃希菌性肠炎的临床表现与题目中的病人情况相符，包括急性起病，高热，大便呈粘液和脓血状，中毒症状明显，伴里急后重。

选项D：出血性大肠埃希杆菌肠炎，大便为血水便，有特殊臭味，伴腹痛。但题目中的病人并无这些表现，因此不选。

选项E：金黄色葡萄球菌肠炎多继发于应用大量广谱抗生素后或继发于慢性疾病基础上。起病急，中毒症状重。病初大便为黄绿色，3~4天后多转变为腥臭，海水样便，黏液多。这与题目中的情况不符，因此不选。

53. 【答案】E

【解析】

选项A：病毒性肠炎的主要表现为发热和上呼吸道感染症状，大便常为水样或蛋花汤样，无腥臭。而题目中描述的症状与此不符。

选项B：真菌性肠炎多发生于体弱、营养不良小儿，长期滥用广谱抗生素或肾上腺皮质激素者。大便带有豆腐渣样细块（菌落），与题干描述不符。

选项C：侵袭性大肠埃希菌性肠炎表现为急性起病，高热甚至可以发生热惊厥。大便呈黏液状，带脓血，有腥臭味。这与题目中描述的症状不符。

选项D：出血性大肠埃希杆菌肠炎，大便开始为黄色水样便，后转为血水便，有特殊臭味，大便镜检有大量红细胞，常无白细胞。伴腹痛。可伴发溶血尿毒综合征和血小板减少性紫癜。这与题目中描述的症状不符。

选项E：金黄色葡萄球菌性肠炎。使用多种抗生素后，呕吐、腹泻，呈暗绿色水样便，镜检发现大量脓细胞，考虑诊断为金黄色葡萄球菌性肠炎。这与题目中描述的症状相符。

54. 【答案】D

【解析】

选项A：肺动脉狭窄会出现右心室抬举搏动和喷射性收缩期杂音，但不会出现第二心音固定分裂，所以排除。

选项B：主动脉导管未闭会出现连续性“机器”样杂音，而非单纯的收缩期杂音，同时也不会出现第二心音固定分裂，所以排除。

选项C：室间隔缺损会出现全收缩期杂音，但不会出现第二心音固定分裂，所以排除。

选项 D: 房间隔缺损可以出现收缩期杂音, 且第二心音固定分裂, 符合题干描述, 所以选择此项。

选项 E: 法洛四联症的主要表现为活动耐力差和青紫加重, 体格检查会出现喷射性收缩期杂音, 但不会出现第二心音固定分裂, 所以排除。

55. 【答案】C

【解析】

选项 A: X 连锁显性遗传的疾病有抗维生素 D 佝偻病等, 苯丙酮尿症并不属于此类, 所以 A 选项错误。

选项 B: 常染色体数目异常包括 21 三体综合征等, 这与苯丙酮尿症无关, 所以 B 选项错误。

选项 C: 苯丙酮尿症是一种常染色体隐性遗传疾病, 是先天性氨基酸代谢障碍中较为常见的一种, 所以 C 选项正确。

选项 D: X 连锁隐性遗传的疾病有血友病、进行性肌营养不良等, 这些病和苯丙酮尿症无关, 所以 D 选项错误。

选项 E: 常染色体显性遗传的疾病有结节性硬化症、神经纤维瘤、遗传性舞蹈病等, 这些病和苯丙酮尿症无关, 所以 E 选项错误。

56. 【答案】E

【解析】

A. 支原体肺炎: 起病不甚急, 有发热、热型不定, 刺激性咳嗽为突出表现, 胸 X 线片改变分为 4 种, 与题中症状及 X 线特征不符, 所以排除。

B. 金黄色葡萄球菌肺炎: 起病急, 病情重, 进展快, 中毒症状明显, X 线检查特点与题中症状及 X 线特征不符, 所以排除。

C. 衣原体肺炎: 多见于年长儿, 起病较缓, 初起有上感症状, 并常伴咽痛、声音嘶哑、发热, 与题中症状不符, 所以排除。

D. 腺病毒肺炎: 好发于冬春季节, 6~24 月龄婴幼儿多见, 疾病急骤、持续高热不退、中毒症状重, X 线表现与题中症状及 X 线特征不符, 所以排除。

E. 呼吸道合胞病毒肺炎: 好发于冬春季节, 患儿以阵发性喘憋为主要症状, 血白细胞总数正常, 胸片可见小片状阴影, 有不同程度肺气肿, 符合题目描述, 所以选择 E。

57. 【答案】C

【解析】

A 选项: 婴儿期, 这个阶段的儿童已经开始逐渐适应外界环境, 虽然其免疫力仍然较低, 但相比新生儿期, 其死亡率已经有所下降。

B 选项: 学龄前期, 这个阶段的儿童智力发展非常快, 身体机能也在逐渐完善, 因此其死亡率相对较低。

C 选项: 新生儿期, 这是正确答案。新生儿出生后体外环境改变, 且新生儿免疫力最低, 故该期小儿的发病率和死亡率极高。

D 选项: 学龄期, 这个阶段的儿童已经有一定的自我保护能力, 身体机能也在逐步完善, 因此其死亡率较低。

E 选项: 幼儿期, 这个阶段的儿童是最容易发生意外的时期, 但是相比新生儿期, 其死亡率还是要低的。

58. 【答案】C

【解析】

选项 A: 丙种球蛋白+糖皮质激素。糖皮质激素可以促进血栓形成, 增加发生冠状动脉病变及冠状动脉瘤的风险, 影响冠脉病变的修复, 因此不作为首选用药。

选项 B: 对症治疗, 观察。川崎病虽为自限性疾病, 但该患儿已经引起严重临床表现, 不能只采取对症治疗及观察。

选项 C: 丙种球蛋白+阿司匹林。这是正确答案。丙种球蛋白是治疗川崎病的首选, 联合应用阿司匹林可预防

冠脉病变的发生。

选项 D: 阿司匹林+糖皮质激素。同选项 A, 糖皮质激素不作为首选用药。

选项 E: 青霉素。青霉素对川崎病治疗无效。

59. 【答案】A

【解析】

A. 丙种球蛋白+阿司匹林: 这是正确答案。丙种球蛋白是川崎病急性期的首选治疗, 可以降低冠状动脉异常的风险。阿司匹林则有抗炎和抗血小板聚集的作用, 对于预防冠状动脉病变也有积极作用。

B. 糖皮质激素+阿司匹林: 虽然糖皮质激素有抗炎作用, 但在川崎病中并不是首选, 因为它可能增加血栓形成和冠状动脉病变的风险。

C. 丙种球蛋白+环磷酰胺: 环磷酰胺是一种免疫抑制剂, 不适合作为川崎病的首选治疗。

D. 糖皮质激素+环磷酰胺: 同 B 和 C, 这个组合也不是川崎病的首选治疗。

E. 阿司匹林+环磷酰胺: 虽然阿司匹林在川崎病治疗中有作用, 但环磷酰胺并不适用。

60. 【答案】C

【解析】

选项 A: Asherman 综合征是子宫性闭经的常见原因, 多由于人工流产刮宫过度或产后、流产后出血刮宫损伤子宫内膜, 导致宫腔粘连而闭经。不会出现高雄激素的临床表现, 所以此选项是错误的。

选项 B: 闭经泌乳综合征患者中约 2/3 存在高催乳素血症, 其中 1/3 为垂体微腺瘤, 临床表现为月经紊乱及不育, 溢乳。该患者无溢乳, 所以此选项是错误的。

选项 C: 多囊卵巢综合征的患者会有月经稀发 (35~60 天行经一次), 伴高雄激素的临床表现 (毛发浓密, 面部痤疮明显), 符合题干描述, 所以此选项是正确的。

选项 D: 对抗性卵巢综合征或称卵巢不敏感综合征, 特点是: 卵巢内多数为始基卵泡及初级卵泡; 内源性促性腺激素, 特别是 FSH 升高; 卵巢对外源性促性腺激素不敏感; 临床表现为原发闭经, 女性第二性征存在。不会出现高雄激素的临床表现, 所以此选项是错误的。

选项 E: 特纳综合征属于先天性发育不全。性染色体异常, 表现为原发性闭经, 卵巢不发育, 身材矮小, 第二性征发育不良, 所以此选项是错误的。

61. 【答案】E

【解析】

选项 A: 不孕。子宫腺肌病会影响卵子和精子的结合, 也可能影响胚胎的着床, 因此可能导致不孕。

选项 B: 性交疼痛。子宫后倾屈和增大可能导致盆腔压迫, 从而导致性交疼痛。

选项 C: 经量过多。子宫腺肌病会影响内膜的正常脱落, 可能导致经量过多。

选项 D: 经期延长。同样, 子宫腺肌病会影响内膜的正常脱落, 可能导致经期延长。

选项 E: 月经稀发。子宫腺肌病通常不会影响卵巢的正常排卵, 因此不会导致月经稀发。这是正确答案。

62. 【答案】A

【解析】

A. 随访观察: 这是正确答案。不规则阴道流血是放置宫内节育器的常见副作用, 一般在 3-6 个月后逐渐恢复, 因此无需特殊处理, 只需随访观察。

B. 取出节育环: 这不是必要的。除非节育环引起的出血量大或持续时间长, 影响生活质量, 否则一般不需要取出。

C. 使用止血药物: 止血药物并不能解决根本问题, 因为出血是节育环的正常反应, 使用止血药物可能会掩盖其他潜在的严重问题。

D. 抗感染治疗：除非有明确的感染迹象，否则无需进行抗感染治疗。

E. 卧床休息：卧床休息并不能解决问题，因为出血是节育环的正常反应，不是由过度劳累引起的。

63. 【答案】D

【解析】

选项 A：下丘脑性闭经，通常是由于压力、营养不良或过度运动等因素导致的。这些因素会影响下丘脑释放促性腺激素释放激素，从而影响卵巢功能。然而，根据题干，患者在接受雌孕激素试验后没有出现撤退性出血，这不符合下丘脑性闭经的表现，因此排除。

选项 B：垂体性闭经，通常由于垂体疾病或炎症导致。然而，同样地，患者在接受雌孕激素试验后没有出现撤退性出血，这不符合垂体性闭经的表现，因此排除。

选项 C：卵巢性闭经，通常由于卵巢早衰或卵巢功能不足导致。然而，患者在接受雌孕激素试验后没有出现撤退性出血，这不符合卵巢性闭经的表现，因此排除。

选项 D：Asherman 综合征，也被称为子宫粘连，通常由于子宫内膜受损（如人工流产后）导致。患者在接受雌孕激素试验后没有出现撤退性出血，这符合 Asherman 综合征的表现，因此是正确答案。

选项 E：难以确定，由于题干中给出的信息足够确定闭经的原因，因此排除。

64. 【答案】A

【解析】

A. 经子宫输卵管造影：这是一种检查输卵管通畅性的重要方法，既可以评估宫腔病变，也可以了解输卵管通畅度。根据题干信息，患者月经规则，所以排卵障碍的可能性较小，而盆腔因素是我国女性不孕症最主要的原因，因此，选择经子宫输卵管造影作为下一步检查是合理的。

B. 宫腔镜检查：适用于体格检查、超声检查或输卵管检查提示存在宫腔异常的患者，但不是必须的检查项目，故此选项不正确。

C. 腹腔镜检查：同样适用于体格检查、超声检查或输卵管检查提示存在盆腔异常的患者，但不是必须的检查项目，故此选项不正确。

D. B 超检测卵泡发育：虽然是不孕症相关辅助检查之一，但因为该患者月经规则，考虑卵泡发育及黄体功能异常的可能性小，故此选项不正确。

E. 女性激素测定：适用于排卵障碍和年龄 ≥ 35 岁女性，而该患者月经规则，排卵障碍的可能性小，故此选项不正确。

65. 【答案】A

【解析】

选项 A：多囊卵巢综合征，是一种常见的内分泌疾病，主要表现为月经不规则、多毛、痤疮和超声波检查发现的卵巢多囊改变。选项 B：生殖器结核，虽然也可能导致月经稀少或闭经，但是不会出现高雄激素的临床表现，也不会有卵巢多囊的超声波表现，所以排除 B。

选项 C：无排卵性功能失调性子宫出血，虽然可能出现在多囊卵巢综合征的患者中，但不能全面反应该患者的综合情况，所以排除 C。

选项 D：卵巢早衰，虽然可能出现月经稀少，但超声表现为双侧卵巢体积较正常明显缩小，窦卵泡数减少，不会表现为卵巢多囊，所以排除 D。

选项 E：子宫内膜异位症，虽然可能导致不孕，并可能出现月经改变，但多表现为经量增多、经期延长或月经淋漓不尽或经期前出血，超声可见异位囊肿，不会提示卵巢多囊，所以排除 E。

66. 【答案】A

【解析】

选项 A: 绝经综合征。患者年龄、停经病史、FSH 和 E2 的检查结果都符合绝经综合征的诊断标准, 因此此选项是正确的。绝经综合征常见于中老年妇女, 主要表现为血管舒缩症状如潮热, 自主神经失调症状如心悸、眩晕、头痛等。

选项 B: 经前期综合征。经前期综合征常见于 25-45 岁的妇女, 主要表现为情感、行为和躯体障碍, 与 FSH 水平无关。因此, 根据患者的年龄和症状, 此选项不正确。

选项 C: 甲亢。甲亢会导致月经异常, 甚至闭经, 但通常会伴有 TSH 异常。考虑到患者的症状和 FSH、E2 的检查结果, 此选项不正确。

选项 D: 早期卵巢功能不全。早期卵巢功能不全常见于 40 岁以下的女性, 患者的年龄明显超过这一范围, 因此此选项不正确。

选项 E: 神经衰弱。虽然绝经期妇女可能出现神经衰弱的症状, 但这是由于性激素波动或减少导致的。因此, 患者的症状应归因于绝经综合征, 而非神经衰弱, 所以此选项不正确。

67. 【答案】A

【解析】

A. 子宫脱垂 II 度重型: 这是正确选项。在这种情况下, 部分宫体脱出阴道口, 符合题目描述的情况。

B. 子宫脱垂 III 度: 这个选项描述的是宫颈与宫体全部脱出阴道口外的情况, 与题目描述不符。

C. 子宫脱垂 II 度轻型: 这个选项描述的是宫颈脱出阴道口, 宫体仍在阴道内的情况, 与题目描述不符。

D. 子宫脱垂 I 度重型: 这个选项描述的是宫颈已达处女膜缘, 阴道口可见子宫颈的情况, 与题目描述不符。

E. 子宫脱垂 II 度中型: 这个选项不存在, 因为子宫脱垂没有 II 度中型的分期。

68. 【答案】B

【解析】

A. 子宫肌层。子宫内膜异位症虽然可能出现在子宫肌层, 但这并不是最常见的部位。子宫内膜异位症最常见的部位是卵巢, 因此选项 A 不正确。

B. 卵巢。子宫内膜异位症最常见的部位是卵巢。这是因为每个月的排卵期间, 子宫内膜组织会通过输卵管进入卵巢, 有可能导致内膜异位。因此, 选项 B 是正确答案。

C. 宫颈。虽然子宫内膜异位症可能出现在宫颈, 但宫颈不是最常见的部位。因此, 选项 C 不正确。

D. 直肠子宫陷凹。直肠子宫陷凹是子宫内膜异位症可能出现的部位之一, 但并不是最常见的部位。因此, 选项 D 不正确。

E. 宫骶韧带。宫骶韧带是子宫内膜异位症可能出现的部位之一, 但并不是最常见的部位。因此, 选项 E 不正确。

69. 【答案】E

【解析】

选项 A: 抑制排卵。这是甾体避孕药的作用机制, 与宫内节育器无关。避孕药中的雌、孕激素通过负反馈抑制下丘脑释放 GnRH, 从而抑制垂体分泌 FSH 和 LH, 同时直接影响垂体对 GnRH 的反应, 不出现排卵前的 LH 峰, 排卵受到抑制。

选项 B: 阻碍受精。孕激素可以使宫颈黏液量减少, 粘稠度增加, 拉丝度降低, 不利于精子穿透, 从而阻碍精子与卵子相遇。但宫内节育器并不能阻碍受精。

选项 C: 抗孕激素。米非司酮是一种抗孕激素制剂, 具有抗孕激素及抗糖皮质激素作用, 主要用于药物流产, 并非宫内节育器的作用机制。

选项 D: 抗雌激素。宫内节育器并无抗雌激素作用。抗雌激素药物多用于治疗乳腺癌, 或在辅助生殖中用于促排卵。

选项 E: 干扰着床。这是宫内节育器的主要抗生育原理。宫内节育器引发的局部组织对异物的反应会影响受精卵着床。

70. 【答案】C

【解析】

A 选项: 储存式自体输血主要适用于预计术中出血量较大的择期手术。这种方式需要在术前多次采血储备, 对于输卵管妊娠破裂这种急性出血情况, 时间上无法满足, 因此不适用。

B 选项: 稀释性自体输血是在麻醉前从病人一侧静脉采血, 同时从另一侧静脉输入为采血量 3-4 倍的电解质溶液, 或适量血浆代用品等以补充血容量。但在输卵管妊娠破裂的情况下, 由于失血量大, 血红蛋白一般低于 10g/L, 采血会加重失血, 因此不适用。

C 选项 (正确答案): 回收式自体输血是将收集到的创伤后体腔内积血或手术过程中的失血, 经抗凝、过滤后再回输给病人。这种方式适用于外伤性脾破裂、异位妊娠破裂等造成的腹腔内出血, 因此是最佳选择。

D 选项: 回收式和稀释式自体输血的组合在这种情况下并不适用, 因为如之前分析, 稀释性自体输血会加重失血。

E 选项: 储存式和回收式自体输血的组合在这种情况下也不适用, 因为储存式自体输血需要提前采集, 无法满足急性出血的处理。

71. 【答案】A

【解析】

A 选项: 溴隐亭药物治疗。溴隐亭是一种多巴胺受体激动剂, 可以抑制催乳素的分泌, 是催乳素腺瘤的一线治疗药物。因此, 该选项是正确的。

B 选项: 经鼻-蝶窦垂体腺瘤切除术。这是一种手术方法, 通常用于药物治疗无效或者垂体肿瘤引起的严重并发症。在本题中, 患者并未出现这些情况, 因此该选项不正确。

C 选项: 环磷酰胺化疗。环磷酰胺是一种抗肿瘤药物, 用于治疗多种癌症, 但并不适用于催乳素腺瘤的治疗, 因此该选项不正确。

D 选项: 放射治疗。放射治疗主要用于不能坚持或耐受药物治疗者; 不愿手术者; 不能耐受手术者。但由于其可能引起垂体功能低下、视神经损伤、诱发肿瘤等并发症, 不主张单纯放疗, 因此该选项不正确。

E 选项: 黄体酮药物治疗。黄体酮主要用于治疗闭经, 不适用于催乳素腺瘤的治疗, 因此该选项不正确。

72. 【答案】B

【解析】

选项 A: 先兆流产, 出现少量阴道出血, 常为暗红色或血性白带, 无妊娠物排出, 出血量较少, 不会引起失血性休克。

选项 B: 不全流产, 部分妊娠物排出宫腔, 还有部分残留于宫腔内或嵌顿于宫颈口处, 或胎儿排出后胎盘滞留宫腔或嵌顿于宫颈口, 影响子宫收缩, 导致出血, 可能发生失血性休克。这是本题的正确答案。

选项 C: 稽留流产, 胚胎或胎儿已死亡滞留宫腔内未能及时自然排出者。出血量较少, 不会引起失血性休克。

选项 D: 难免流产, 流产不可避免, 在先兆流产的基础上, 阴道流血量增多, 阵发性下腹痛加剧, 或出现阴道流液。难免流产可能发展为完全流产, 也可能发展为不全流产, 一旦确诊应尽早使胚胎及胎盘组织完全排出。若难免流产发展为不全流产, 可能引起失血性休克。

选项 E: 复发流产, 指与同一伴侣连续发生 3 次及 3 次以上的自然流产。定义中强调的是自然流产的次数, 而每一次自然流产的过程中可能发生难免流产、不全流产、完全流产或稽留流产等不同的情况, 但并不能直接导致失血性休克。

73. 【答案】E

【解析】

选项 A: 卵巢囊肿切除术。错误。题干中的卵巢囊性肿物可能是由于 HCG 刺激卵泡内膜细胞发生黄素化造成的卵巢黄素化囊肿, 不需要手术切除。

选项 B: 放射治疗。错误。放射治疗在侵蚀性葡萄胎的治疗中应用较少, 主要用于肝、脑转移和肺部耐药病灶的治疗。

选项 C: 子宫病灶切除术。错误。虽然手术可以作为化疗的辅助治疗, 对控制大出血等并发症、切除耐药病灶、减少肿瘤负荷和缩短化疗疗程等方面有作用, 但它不是首选治疗方法。

选项 D: 清宫术。错误。对于葡萄胎, 确诊后应及时进行清宫术, 但对于侵蚀性葡萄胎, 清宫术并不包括在治疗手段中。

选项 E: 化学治疗。正确。侵蚀性葡萄胎的治疗原则是以化疗为主, 手术和放疗为辅的综合治疗。

74. **【答案】C****【解析】**

选项 A: 红细胞沉降率升高。这是一种非特异性的炎症反应, 可以在许多疾病中出现, 包括感染、肿瘤、自身免疫疾病等。因此, 它不能作为盆腔炎性疾病的最低诊断标准。

选项 B: 血 C 反应蛋白升高。同样, 这也是一种非特异性的炎症反应标志物, 可以在各种炎症性疾病中出现, 所以也不能作为盆腔炎性疾病的最低诊断标准。

选项 C: 宫颈举痛或子宫压痛或附件区压痛。这是盆腔炎性疾病的典型临床表现, 且在没有其他原因的情况下, 可以作为盆腔炎性疾病的最低诊断标准。

选项 D: 宫颈脓性分泌物。虽然在盆腔炎性疾病中可能出现, 但并不是所有的盆腔炎性疾病都会有宫颈脓性分泌物, 所以不能作为最低诊断标准。

选项 E: 体温超过 38.3℃。这是一种全身性反应, 可以在各种感染性疾病中出现, 因此不能作为盆腔炎性疾病的最低诊断标准。

75. **【答案】C****【解析】**

选项 A: 美尼尔综合征是一种特发性膜迷路积水的内耳病, 表现为反复发作的选择性眩晕, 波动性感音神经性听力损失, 耳鸣和 (或) 耳胀满感。与卵巢纤维瘤无关, 故不选。

选项 B: 唐氏综合征即 21-三体综合征, 是由 21 号染色体异常导致的染色体病。与卵巢纤维瘤无关, 故不选。

选项 C: 梅格斯综合征是卵巢纤维瘤伴有腹腔积液和 (或) 胸腔积液者的表现, 这是卵巢纤维瘤常伴随的症状, 故此选项正确。

选项 D: 库欣综合征为各种病因造成肾上腺分泌过多糖皮质激素 (主要是皮质醇) 所致病症的总称, 其中最多见者为垂体促肾上腺皮质激素 (ACTH) 分泌亢进所引起的临床类型, 称为库欣病。与卵巢纤维瘤无关, 故不选。

选项 E: 类癌为功能性神经内分泌肿瘤, 常见小肠、少见肺、胸腺、胰腺、胃, 细胞来源为肠嗜铬细胞, 释放 5-羟色胺、前列腺素等, 类癌综合征临床表现为腹泻、皮肤潮红、喘鸣、心脏瓣膜纤维化。与卵巢纤维瘤无关, 故不选。

76. **【答案】E****【解析】**

选项 A: 腺癌伴鳞状上皮化生, 这是子宫内膜样癌的一种亚型, 不是子宫内膜癌最常见的类型。

选项 B: 浆液性腺癌, 这是 II 型子宫内膜癌, 是非雌激素依赖型, 占有子宫内膜癌的 1%-9%, 并非最常见。

选项 C: 透明细胞癌, 也是 II 型子宫内膜癌, 非雌激素依赖型, 占有子宫内膜癌的不足 5%, 并非最常见。

选项 D: 移行细胞癌, 常见于肾盂、输尿管、膀胱等, 属于移行细胞癌, 与子宫内膜癌的类型无关。

选项 E: 内膜样腺癌, 这是 I 型子宫内膜癌, 是雌激素依赖型, 占有子宫内膜癌的 89%-90%, 是最常见的类型。

77. 【答案】B

【解析】

选项 A: 制霉菌素是一种抗真菌药物, 主要用于治疗由真菌(尤其是假丝酵母菌)引起的感染, 如外阴阴道假丝酵母菌病。因此, 对于细菌性阴道病, 它并不是首选治疗药物。

选项 B: 甲硝唑是一种抗厌氧菌药物, 对大多数厌氧菌和部分需氧菌具有较强的抑制或杀灭作用。细菌性阴道病的主要病原体为厌氧菌, 因此甲硝唑是其首选治疗药物。

选项 C: 头孢菌素是一种广谱抗生素, 主要用于治疗由革兰氏阳性菌引起的感染, 对于细菌性阴道病并不是首选治疗药物。

选项 D: 青霉素也是一种广谱抗生素, 主要用于治疗由革兰氏阳性菌引起的感染, 对于细菌性阴道病并不是首选治疗药物。

选项 E: 阿奇霉素是一种大环内酯类抗生素, 主要用于治疗由革兰氏阳性菌引起的感染, 对于细菌性阴道病并不是首选治疗药物。

78. 【答案】B

【解析】

选项 A: 孕妇黄体功能不足是早期流产的一个可能原因, 但并非最常见。黄体功能不足会导致孕酮分泌减少, 影响胚胎着床和发育, 但在所有早期流产中所占比例较小。

选项 B: 胚胎染色体异常是早期流产最常见的原因。大约 50% 以上的自然流产胚胎存在染色体异常, 这些异常通常是随机发生的, 与父母的染色体无关。

选项 C: 孕妇生殖器官异常也可能导致早期流产, 如宫腔形态异常、子宫肌瘤等, 但这些情况通常不会导致早期流产, 而是更常见于晚期流产。

选项 D: 孕妇宫颈内口松弛通常导致晚期流产, 而非早期流产。宫颈功能不全会导致在胚胎发育过程中, 宫颈不能保持关闭, 从而引发流产。

选项 E: 孕妇免疫功能异常可能会导致早期流产, 但并非最常见。免疫系统在怀孕过程中有重要作用, 如果母体的免疫系统不能正确识别和保护胚胎, 可能会导致流产。

79. 【答案】B

【解析】

选项 A: “抑制宫缩, 使其维持至妊娠 40 周”是不正确的。因为该患者已经孕足月, 且处于正常的产程中, 没有必要抑制宫缩延长妊娠期。

选项 B: “等待自然分娩”是正确的。根据题干信息, 该患者处于正常的分娩过程中, 没有出现任何异常情况, 所以应该等待自然分娩。

选项 C: “人工破膜加速产程进展”是不正确的。虽然人工破膜可以加速产程, 但是在没有必要的情况下, 不应随意进行人工破膜。

选项 D: “静脉滴注缩宫素”也是不正确的。缩宫素主要用于治疗宫缩不良, 而该患者的宫缩是正常的, 没有使用缩宫素的必要。

选项 E: “行剖宫产术”是不正确的。剖宫产主要适用于有分娩难产或者胎儿和母体有危险的情况, 而该患者并未出现这些情况。

80. 【答案】C

【解析】

选项 A: 细菌性阴道炎的临床特点为带有鱼腥臭味的稀薄阴道分泌物增多, 与题干描述的患者症状不符, 故排除。

选项 B: 滴虫性阴道炎的分泌物典型特点为稀薄脓性、泡沫状、有异味, 与题干描述的患者症状不符, 故排除。

选项 C: 外阴阴道念珠菌病的典型症状为外阴瘙痒伴灼热感, 阴道黏膜表面有白色片状薄膜或凝乳状物, 与题干描述的患者症状相符, 故为正确答案。

选项 D: 淋病性阴道炎主要感染子宫颈管柱状上皮, 不会感染阴道非角化复层鳞状上皮, 其分泌物呈黏液脓性, 与题干描述的患者症状不符, 故排除。

选项 E: 萎缩性阴道炎常见于自然绝经或人工绝经后的妇女, 主要症状为外阴灼热不适、瘙痒, 阴道分泌物稀薄, 呈淡黄色, 与题干描述的患者症状不符, 故排除。

81. 【答案】A

【解析】

选项 A: 胎头受压。这是正确答案。早期减速的特点是胎心率 (FHR) 减速与宫缩同时开始, FHR 曲线最低点与宫缩的高峰相一致, 下降幅度小于 50bpm, 持续时间短 (少于 15 秒), 恢复快 (少于 15 秒)。这种情况一般认为是在第一产程后期, 宫缩时胎头受压引起的。

选项 B: 胎儿宫内缺氧。这是错误答案。晚期减速通常是胎儿宫内缺氧或胎盘功能不良的表现, FHR 减速多在宫缩高峰后出现, 波谷落后于波峰, 时间差多在 30-60 秒, 下降缓慢, 下降幅度小于 50bpm, 持续时间长, 恢复慢。

选项 C: 脐带受压。这是错误答案。变异减速一般认为是宫缩时脐带受压兴奋迷走神经引起。特点是 FHR 变异形态不规则, 减速与宫缩无恒定关系, 持续时间长短不一, 下降幅度大于 70bpm, 恢复迅速。

选项 D: 脐带脱垂。这是错误答案。脐带脱垂通常发生在胎先露部尚未衔接、胎膜未破时, 因宫缩时胎先露部下降, 一过性压迫脐带导致胎心率异常。如果胎先露部已衔接、胎膜已破, 脐带会受压于胎先露部与骨盆之间, 引起胎儿缺氧, 甚至胎心完全消失。

选项 E: 胎盘功能不良。这是错误答案。胎盘功能不良通常会导致晚期减速, 其特点与选项 B 中描述的相同。

82. 【答案】C

【解析】

A 选项: 子宫肌炎常与子宫内膜炎两者伴发, 为产褥感染一种。子宫肌炎可出现腹痛、恶露增多呈脓性、子宫压痛明显, 但本题患者为宫旁压痛明显, 故排除。

B 选项: 急性宫颈炎也可出现阴道脓性分泌物, 但宫颈局部感染不会出现宫旁压痛等盆腔炎症的表现, 故排除。

C 选项: 病原体沿宫旁淋巴和血行达宫旁组织, 出现急性炎症反应而形成炎症包块, 同时波及输卵管, 形成急性输卵管炎。患者查体宫旁组织增厚、压痛, 考虑诊断为急性输卵管炎。

D 选项: 患者乳房胀痛, 考虑存在急性乳腺炎的可能。但对产后发热者, 首先考虑为产褥感染, 再排除引起产褥病的其他疾病。该患者临床表现支持产褥感染, 故排除。

E 选项: 感染血栓脱落进入血液循环可引起菌血症, 继续发展可并发脓毒血症。严重的脓毒血症表现为持续高热、寒战、全身明显中毒症状等, 本题中患者尚未出现此种情况, 故排除。

83. 【答案】D

【解析】

选项 A: 子宫全切术, 是指切除整个子宫, 但不包括双附件。对于子宫内膜癌 I 期的患者, 仅仅进行子宫全切术可能无法彻底清除病灶, 因此这个答案是错误的。

选项 B: 腔内放射治疗, 是一种放疗方法, 通常用于有手术禁忌证的患者或无法手术切除的晚期患者。根据题干, 患者为子宫内膜癌 I 期, 而且没有提到有手术禁忌, 因此这个答案也是错误的。

选项 C: 盆腔外照射治疗, 同样是一种放疗方法, 适用于有手术禁忌证的患者或无法手术切除的晚期患者。根

据题干，这个答案也是错误的。

选项 D：扩大子宫全切术及+双附件切除术，是对子宫和两侧附件（卵巢和输卵管）的全面切除，能够更彻底地清除可能的病灶，因此对于子宫内膜癌 I 期的患者是首选的治疗方法。

选项 E：子宫广泛切除术+盆腔淋巴结清扫术，这种手术方式通常用于病变可能已经侵犯到盆腔淋巴结的情况。题干中并未提及病变是否已经侵犯到盆腔淋巴结，因此这个答案也是错误的。

84. 【答案】B

【解析】

选项 A：子宫颈浸润癌是指子宫颈鳞状上皮内病变（SIL）形成后，继续发展突破上皮基底膜，浸润间质。本题患者的病理活检结果并未显示有突破基底膜的迹象，因此排除。

选项 B：根据题干中的病理活检结果，可以看出患者的鳞状上皮基底及副基底样细胞增生，细胞核极性紊乱，核分裂像增多，异型细胞扩展至全层。这些都是高级别子宫颈鳞状上皮内病变（HSIL）的典型病理表现。

选项 C：宫颈息肉是由于宫颈黏膜上皮、腺体和间质结缔组织增生形成的，常见于慢性宫颈炎。然而，本题中的病理活检结果并未显示出息肉的特征，因此排除。

选项 D：子宫内膜炎的临床表现并不包括阴道接触性出血，结合患者的病史，可以排除这个选项。

选项 E：宫颈糜烂通常是由于子宫颈管黏膜柱状上皮外移，因为柱状上皮较薄，血管显露而呈红色，这是正常的生理现象。本题中的病理活检结果显示出了细胞的异型性，因此排除。

85. 【答案】B

【解析】

选项 A：随访 NT。此选项错误，因为根据题干，NT 值已经异常（正常 $<2.5\text{mm}$ ），应立即进行相关的染色体检查，而不是简单地进行随访。

选项 B：羊膜腔穿刺染色体检查。此选项正确。NT 增厚的胎儿有染色体异常的可能，应进行相关染色体检查。超声介导下的羊膜腔穿刺术是目前应用最广泛、相对安全的介入性产前诊断技术，可抽取羊水，获得胎儿细胞或胎儿 DNA 进行遗传学检查。

选项 C：母亲血液中提取 DNA。此选项错误，这是无创产前筛查的方法，采集母体外周血，对其中游离的 DNA 片段（包括胎儿游离 DNA）进行测序。虽然这是一种产前筛查的方法，但不能取代传统的产前诊断的方法。

选项 D：血清学检查。此选项错误，血清学检查是检测母体血清中多种生化筛查的指标，结合孕妇的年龄、孕周等预测胎儿患 21-三体、13-三体、18-三体综合征、神经管畸形的风险。这也是一种产前筛查方法，但不能取代传统的产前诊断的方法。

选项 E：基因检测。此选项错误，虽然基因检测可以作为遗传疾病的产前诊断的一部分，但是仅靠基因检测并不能全面地进行诊断，因此此选项被排除。

86. 【答案】C

【解析】

选项 A：“等待自然分娩”，这个选项不正确。因为患者既往有风心病史，现在心功能为 III 级，不能耐受阴道分娩的体力消耗，同时为了保护母婴健康，不能采取等待自然分娩的方式。

选项 B：“静滴催产素，加强宫缩”，这个选项也不正确。虽然催产素可以加强宫缩，但是对于心功能不全的产妇来说，可能会增加心脏的负担，加重心功能不全的症状，所以不适合使用。

选项 C：“剖宫产结束分娩”，这是正确答案。对于心功能 III-IV 级的产妇，一般推荐剖宫产，以减少心脏的负荷，保护母婴健康。

选项 D：“产钳助产”，这个选项不正确。产钳助产适用于第二产程，但是此产妇尚未进入第二产程，同时心功能为 III 级，无法耐受阴道分娩的负担。

选项 E: “指导产妇屏气用力”, 这个选项不正确。屏气用力会增加心脏负荷, 对于心功能不全的产妇来说, 可能会导致病情加重。

87. 【答案】C

【解析】

选项 A: “增加母婴感情”, 这是正确的。母乳喂养的过程中, 母亲与婴儿的身体接触可以增强他们之间的感情。

选项 B: “促进子宫复旧”, 这也是正确的。母乳喂养时, 催乳激素泌乳素会刺激子宫收缩, 有助于子宫恢复到孕前的状态。

选项 C: “避孕”, 这是错误的。虽然母乳喂养可推迟排卵和月经复潮, 但不能完全防止排卵, 因此不能作为避孕方法。

选项 D: “提高婴儿免疫力”, 这是正确的。母乳中含有大量的抗体, 能够帮助新生儿对抗疾病, 增强免疫力。

选项 E: “预防产后出血”, 这是正确的。如前所述, 母乳喂养可以刺激子宫收缩, 有助于预防产后出血。

88. 【答案】E

【解析】

A. 2 月 26 日: 此选项不正确。按照末次月经推算预产期的方法, 应该是月份减 3 或加 9, 日数加 7, 所以不能得到 2 月 26 日。

B. 2 月 27 日: 此选项不正确。同样按照末次月经推算预产期的方法, 不能得到 2 月 27 日。

C. 2 月 28 日: 此选项不正确。按照末次月经推算预产期的方法, 不能得到 2 月 28 日。

D. 2 月 23 日: 此选项不正确。按照末次月经推算预产期的方法, 不能得到 2 月 23 日。

E. 2 月 24 日: 此选项正确。按照末次月经推算预产期的方法, 末次月经为 2000 年 5 月 17 日, 月份加 9, 日数加 7, 可以得到 2021 年 2 月 24 日。

89. 【答案】C

【解析】

A. 盆底肌肉及筋膜的支托作用: 此选项不正确。虽然盆底肌肉和筋膜对子宫位置有一定的支持作用, 但是它们并非唯一的支持力量, 还需要子宫韧带的配合。

B. 膀胱和直肠的支托: 此选项不正确。膀胱和直肠是子宫的临近器官, 但它们本身不具备支撑子宫的功能。

C. 子宫韧带和盆底肌肉筋膜的支托: 此选项正确。子宫的正常位置依赖于子宫韧带和盆底肌肉筋膜的共同支托。

D. 子宫四对韧带的作用: 此选项不正确。子宫的四对韧带虽然对子宫位置有一定的影响, 但仅靠它们不能保证子宫的正常位置。

E. 腹腔压力作用: 此选项不正确。腹腔压力并非维持子宫在正常位置的支托, 反而腹压增加可能会导致盆腔脏器脱垂。

90. 【答案】A

【解析】

选项 A: 动脉注射缩宫素可以诱发宫缩。这一选项是错误的, 因为在 OCT (缩宫素激惹试验) 中, 缩宫素是通过静脉滴注的方式使用的, 而不是动脉注射。

选项 B: 乳头刺激法可以诱发宫缩。这一选项是正确的, 乳头刺激法可以诱发分泌内源性缩宫素, 引起宫缩。

选项 C: 需要用到胎儿监护仪。这一选项是正确的, OCT 的原理为用缩宫素诱导宫缩并用电子胎心监护仪记录胎心率的变化。

选项 D: 正弦波形提示在观察时胎儿存在酸碱失衡。这一选项是正确的, 正弦波形 (III 类电子胎心监护) 提示在观察时胎儿存在酸碱失调即胎儿缺氧。

选项 E：必要时应紧急终止妊娠。这一选项是正确的，如果采取的各种措施均无法纠正胎儿缺氧，应紧急终止妊娠。

91. 【答案】C

【解析】

A. 卵巢内胚窦瘤：这是一种罕见的卵巢肿瘤，通常发生在儿童和青少年女性中。它与纤维瘤无直接关联。

B. 无性细胞瘤：这是一种卵巢肿瘤，主要由卵巢的生殖细胞组成。它与纤维瘤无直接关联。

C. 梅格斯综合征：这是一个罕见的病理综合征，其特征是卵巢纤维瘤、腹水和胸腔积液的存在。这是纤维瘤最常见的伴发疾病。

D. 库肯勃瘤：这是一种卵巢转移性肿瘤，通常来自胃癌。它与纤维瘤无直接关联。

E. 畸胎瘤：这是一种由多种细胞类型（包括皮肤、毛发和骨骼）组成的卵巢肿瘤。它与纤维瘤无直接关联。

92. 【答案】D

【解析】

选项 A：子宫颈异常黏液脓性分泌物或脆性增加是盆腔炎性疾病诊断的附加标准，而不是最低标准，所以这个选项是错误的。

选项 B：导致下腹压痛及反跳痛原因很多，可能是阑尾炎、肠道穿孔、卵巢囊肿蒂扭转、异位妊娠破裂等。盆腔炎性疾病的最低标准是子宫压痛或附件区压痛，不是下腹压痛及反跳痛，所以这个选项是错误的。

选项 C：阴道超声见输卵管增粗是诊断盆腔炎性疾病的特异标准，而不是最低标准，所以这个选项是错误的。

选项 D：盆腔炎性疾病诊断的最低标准是子宫颈举痛或子宫压痛或附件区压痛，所以这个选项是正确的。

选项 E：体温超过 38.3℃ 是盆腔炎性疾病诊断的附加标准，而不是最低标准，所以这个选项是错误的。

93. 【答案】D

【解析】

选项 A：“刺激并维持女性第二性征”是雌激素的生理作用，而非孕激素。雌激素主要在卵巢发育期间产生，对乳房、子宫以及阴道等产生影响，形成女性特有的身体特征。

选项 B：“宫颈黏液变稀薄”也是雌激素的生理作用，雌激素可以使宫颈黏液稀薄，有利于精子进入宫腔。

选项 C：“促进乳腺腺管发育”是雌激素的生理作用，而孕激素则主要促进乳腺腺泡的发育，准备进行哺乳。

选项 D：“使体温升高 0.3~0.5℃”是孕激素的生理作用，孕激素能兴奋下丘脑体温调节中枢，使基础体温在排卵后升高。

选项 E：“促进水钠潴留”是雌激素的生理作用，雌激素可以促进水钠潴留，而孕激素则对此没有明显效果。

94. 【答案】B

【解析】

A. 双绒毛膜双羊膜囊双胎：这种类型的双胎每个胎儿都有自己的胎盘和羊膜囊，因此不存在血液分流问题，不会出现双胎输血综合征。

B. 单绒毛膜双羊膜囊双胎：这是双胎输血综合征的主要发生对象。这种类型的双胎共享一个胎盘，胎盘之间存在血管吻合，可能导致血液从一个胎儿分流到另一个胎儿，造成一方贫血，另一方血容量过多。

C. 双绒毛膜单羊膜囊双胎：这种类型的双胎虽然共享一个羊膜囊，但每个胎儿都有自己的胎盘，因此不会出现双胎输血综合征。

D. 单绒毛膜单羊膜囊双胎：这种类型的双胎共享胎盘和羊膜囊，理论上也可能出现双胎输血综合征，但实际上极少见。

E. 联体双胎：联体双胎的情况复杂，可能存在多种血管吻合，但并不一定会出现双胎输血综合征。

95. 【答案】A

【解析】

A. 停经：早期妊娠最具有特异性的症状是停经。对于有性生活史，月经周期规则的生育期妇女，一旦出现停经或月经异常，应首先考虑到可能的妊娠。

B. 早孕反应：在妊娠早期，很多妇女会出现早孕反应，如厌恶油腻、恶心、晨起呕吐等，但这并不是最具特异性的妊娠症状，因为这些症状也可能出现在胃肠道疾病等其他情况中。

C. 乳房增大：乳房增大是早期妊娠的体征之一，但并非主要症状，其变化可能受到多种因素影响，如月经周期、荷尔蒙的改变等。

D. 子宫增大：子宫增大是早期妊娠的体征之一，但仅凭子宫增大不能确定妊娠，因为也可能由于子宫肌瘤、卵巢囊肿等引起。

E. 黑加征：妊娠 6-8 周时，双合诊检查子宫峡部极软，感觉宫颈与宫体之间似不相连，称为黑加征，是早期妊娠的体征之一，但并非最具特异性的妊娠症状。

96. 【答案】C

【解析】

选项 A 分析：20%甘露醇 250ml 静脉快速静注主要用于降低颅内压，对于硫酸镁中毒并无直接效果，因此不选 A。

选项 B 分析：冬眠合剂半量是一种镇静药物，能广泛抑制神经系统，有助于解痉降压，控制子痫抽搐，但对于硫酸镁中毒没有直接治疗效果，因此不选 B。

选项 C 分析：硫酸镁中毒的主要治疗方法是停用硫酸镁，并给予 10%葡萄糖酸钙缓慢静注，可以起到解毒作用，因此选 C。

选项 D 分析：低分子右旋糖酐主要用于治疗各种休克及血栓性疾病，并不能直接治疗硫酸镁中毒，因此不选 D。

选项 E 分析：呋塞米(速尿)是一种利尿剂，主要用于治疗全身性水肿、肺水肿、脑水肿、肾功能不全、急性心力衰竭等疾病，对于硫酸镁中毒没有直接治疗效果，因此不选 E。

97. 【答案】D

【解析】

选项 A：立即行负压吸宫术终止妊娠。错误。因为患者现在已经出现了心力衰竭，做手术的风险很大，需要先控制心力衰竭。

选项 B：控制心力衰竭后继续妊娠。错误。因为该患者在妊娠早期就出现了心力衰竭，说明她的身体状况不适合妊娠，应该终止妊娠。

选项 C：边控制心力衰竭边终止妊娠。错误。虽然在严重的心力衰竭情况下，可以一边控制心力衰竭一边紧急剖宫产，但对于这个患者来说，应该先内科控制心力衰竭后再终止妊娠。

选项 D：控制心力衰竭后行负压吸宫术。正确。首先要控制心力衰竭，然后再进行负压吸宫术，以降低手术风险。

选项 E：控制心力衰竭后行钳刮术。错误。钳刮术适用于妊娠 10 周以上的患者，而该患者妊娠 45 天，应选择负压吸宫术。

98. 【答案】D

【解析】

选项 A：吸宫不全虽然也会导致术后阴道出血和尿妊娠试验阳性，但是并不会导致肺部转移。此外，该患者病程已经有半年，且肺部已经出现转移灶，因此，更可能的是恶性疾病，所以排除选项 A。

选项 B：葡萄胎一般不会对正常妊娠后发生，而且会导致子宫异常增大。题干中的患者人流术后半年，一直避孕，尿妊娠阳性，考虑此次病变继发于上次妊娠，因此，排除选项 B。

选项 C: 侵蚀性葡萄胎都是继发于葡萄胎的, 而题干中的患者上次妊娠为正常宫内妊娠, 因此, 排除选项 C。

选项 D: 根据患者的病史和肺部转移的情况, 最可能的诊断是绒毛膜癌。绒毛膜癌可以在葡萄胎或非葡萄胎妊娠后发生, 且常见的转移部位为肺, 因此选项 D 为正确答案。

选项 E: 胎盘部位滋养细胞肿瘤起源于胎盘种植部位, 多数不发生转移。考虑到该患者行人工流产术, 为早期妊娠, 此时胎盘尚未形成, 且患者已发生肺部转移, 故排除选项 E。

99. 【答案】B

【解析】

选项 A: 葡萄胎。葡萄胎的病理特征是可以看到绒毛结构, 但题干中病理检查结果显示无绒毛结构, 所以排除了葡萄胎的可能性。

选项 B: 绒毛膜癌。这是正确答案。患者在人工流产后 3 个月出现持续的不规则阴道流血, 刮宫病理检查提示无绒毛结构, 这是典型的绒癌病理结果, 因此最可能的诊断是绒毛膜癌。

选项 C: 侵蚀性葡萄胎。侵蚀性葡萄胎通常是葡萄胎的后续发展, 但患者没有葡萄胎的病史, 而且病理检查也没有显示侵入肌层的水泡状组织和绒毛结构, 所以排除了侵蚀性葡萄胎的可能性。

选项 D: 子宫内膜癌。虽然子宫内膜癌也可能导致阴道异常出血, 但结合患者的病史和病理结果, 更倾向于妊娠滋养细胞疾病, 所以不首选子宫内膜癌。

选项 E: 转移性癌。考虑到患者的病史和病理结果, 转移性癌不是首选诊断。

100. 【答案】A

【解析】

选项 A: 乳腺囊性增生病, 其病因为雌、孕激素比例失调, 使乳腺实质增生过度 and 复旧不全。因此, 这是正确答案。

选项 B: 乳腺癌的病因尚不清楚, 但已知乳腺是多种内分泌激素的靶器官, 其中雌酮及雌二醇与乳腺癌的发病有直接关系。然而, 无法直接确定雌孕激素分泌失调会导致乳腺癌。

选项 C: 乳腺纤维腺瘤产生的原因是小叶内纤维细胞对雌激素的敏感性异常增高, 可能与纤维细胞所含雌激素受体的量或质的异常有关。这与题干中的雌孕激素分泌失调不完全一致。

选项 D: 乳管内乳头状瘤的具体病因不明, 因此不能确定其与雌孕激素分泌失调有直接关系。

选项 E: 乳腺炎的病因为乳汁淤积或乳头破损或皲裂时细菌沿淋巴管入侵感染, 这与雌孕激素分泌失调无直接关系。

101. 【答案】C

【解析】

选项 A: 乳腺囊性增生病的病因为雌、孕激素比例失调, 使乳腺实质增生过度 and 复旧不全。这与题目中的小叶纤维细胞对雌激素敏感性异常增高并不直接相关, 所以不选 A。

选项 B: 乳腺癌的病因尚不清楚, 但是乳腺是多种内分泌激素的靶器官, 其中雌酮及雌二醇与乳腺癌的发病有直接关系。然而, 这并不能直接联系到小叶纤维细胞对雌激素敏感性异常增高, 所以不选 B。

选项 C: 乳腺纤维腺瘤产生的原因是小叶内纤维细胞对雌激素的敏感性异常增高, 可能与纤维细胞所含雌激素受体的量或质的异常有关。这与题目描述相符, 所以选 C。

选项 D: 乳管内乳头状瘤的具体病因不明, 与题目描述的小叶纤维细胞对雌激素敏感性异常增高没有直接关系, 所以不选 D。

选项 E: 乳腺炎的病因为乳汁淤积或乳头破损或皲裂时细菌沿淋巴管入侵感染。这与题目描述无关, 所以不选 E。

102. 【答案】D

【解析】

选项 A: 硬膜下血肿通常会出现持续昏迷或昏迷状态逐渐加重, 而不会出现中间清醒期, 因此可以排除。

选项 B: 脑震荡的典型表现为伤后立即发生的短暂意识障碍和近事遗忘, 神经系统检查多无明显阳性体征, 因此也可以排除。

选项 C: 颅底骨折的诊断主要依靠临床表现, 如耳、鼻出血或脑脊液漏、脑神经损伤、皮下或粘膜下淤血斑, 而题目中并没有明确提到这些症状, 因此也可以排除。

选项 D: 硬膜外血肿的主要表现为伤后昏迷一段时间后, 有一个清醒期, 然后再次陷入昏迷, 这与题目中描述的病人症状完全吻合, 因此这是正确答案。

选项 E: 脑干损伤通常表现为伤后立刻发生的持续性昏迷状态, 早期各种反射消失, 病情稳定后可出现偏瘫、肌张力增高、腱反射亢进等表现, 很少出现中间清醒或中间好转期, 因此可以排除。

103. **【答案】B****【解析】**

选项 A: 胸段脊髓损伤通常会导致双下肢截瘫和感觉消失, 严重时可能导致肋间肌麻痹和呼吸困难。但在这个案例中, 患者的四肢肌力和肌张力正常, 感觉运动也正常, 所以选项 A 不正确。

选项 B: 脊髓圆锥部位拥有膀胱中枢 (S2-4) 和肛门直肠中枢 (S3), 因此, 当脊髓圆锥受损时, 可能会出现膀胱过度膨胀、麻痹性失禁、大小便失禁、性功能障碍和会阴部感觉障碍等症状。在这个案例中, 患者出现了小便障碍, 与脊髓圆锥损伤的症状相符, 所以选项 B 是正确答案。

选项 C: 颈段脊髓损伤通常会导致四肢瘫痪、上肢呈节段性感觉和运动障碍、呼吸困难等症状。但在这个案例中, 患者的四肢肌力和肌张力正常, 感觉运动也正常, 所以选项 C 不正确。

选项 D: 如果脊髓传入神经元或前角受损, 会导致反射弧破坏, 出现双侧膝踝反射消失的情况。但在这个案例中, 患者的感觉运动正常, 所以选项 D 不正确。

选项 E: 脊髓前角细胞损伤会导致该脊髓支配节段的运动障碍, 时间长了还会出现肌肉萎缩。但在这个案例中, 患者的四肢肌力和肌张力正常, 所以选项 E 不正确。

104. **【答案】A****【解析】**

选项 A: 颈内 TIA。这是正确答案。在这个病例中, 老年男性患者有高血压和脑梗的病史, 突然出现右眼一过性黑朦, 数分钟后恢复, 这些都是颈内 TIA 的典型症状。颈内动脉系统短暂性脑缺血 (TIA) 的症状表现为颈内动脉系统支配区的缺血相关症状, 可以出现单眼一过性黑朦、失明和 (或) 对侧瘫痪及感觉障碍等表现。

选项 B: 椎基底 TIA。这个选项是错误的。椎-基底动脉供应大脑后半球后 1/3 及部分间脑、脑干和小脑。最常见表现是眩晕、平衡障碍、眼球运动异常和复视, 与病例描述的症状不符。

选项 C: 脑出血。这个选项是错误的。脑出血一般会有头痛、恶心、呕吐等表现, 查体可有脑实质损害的体征, 如偏瘫、偏身感觉障碍及偏盲等, 而病例描述的症状并没有这些。

选项 D: 脑血栓形成。这个选项是错误的。脑血栓形成多见于中老年人, 多在睡眠或安静状态下起病, 与病例描述的症状不符。

选项 E: 脑栓塞。这个选项是错误的。脑栓塞是指各种栓子随血流进入颅内动脉使血管腔急性闭塞或严重狭窄, 引起相应供血区脑组织发生缺血坏死及功能障碍的一组临床综合征, 多有脑实质损害症状, 不能自行缓解, 与病例描述的症状不符。

105. **【答案】A****【解析】**

正确选项 (A): 急性严重的锥体束损害, 会引发断联休克。这是一种中枢神经系统局部急性严重病变, 导致

与受损部位密切联系的远隔部位神经功能短暂缺失。在早期阶段，患者会出现弛缓性瘫痪，肌张力降低，腱反射消失，这就是所谓的脑休克。

错误选项 (B)：痉挛性瘫痪通常表现为肌张力增高，腱反射活跃亢进，病理反射阳性，呈剪刀步态。这与急性严重的锥体束损害的早期表现不符。

错误选项 (C)：弛缓性瘫痪的特点是肌张力降低，腱反射减弱或消失，但不会出现腱反射亢进。

错误选项 (D)：在休克期过去后，受损组织的释放症状逐渐出现，此时可能转变为痉挛性瘫痪，腱反射亢进，肌张力增高，病理反射阳性，这是急性严重的锥体束损害后期的表现。

错误选项 (E)：完全性截瘫是一种导致 T1 或以下水平的运动和感觉永久丧失的疾病，与本题考察的内容不符。

106. 【答案】D

【解析】

选项 A：急性脊髓炎，此病症主要引起的是急性横贯性脊髓病变，这种情况下脊髓的损害是广泛的，不仅限于一侧，因此不常见脊髓半横断综合征。

选项 B：Guilam-Bare 综合征（格兰-巴雷综合征），主要损害部位在脊神经根和周围神经，无脊髓损害。因此，这种病症不会导致脊髓半横断综合征。

选项 C：急性硬脊膜外脓肿，由于病变部位在硬膜外，脊髓受到硬脊膜的阻挡，脊髓受压较轻，脊髓半切综合征不常见。

选项 D：脊髓外肿瘤，这种病症可以引起脊髓外压迫，从而导致脊髓半横断综合征，因此是正确答案。

选项 E：外伤，虽然外伤可以引起脊髓压迫症，但是不一定会导致脊髓半横断综合征，因为外伤可能影响的区域广泛，不仅限于脊髓的一侧。

107. 【答案】C

【解析】

选项 A：脊髓胶质瘤是一种髓内病变，主要表现为脊髓压迫症状，不会引发脊髓休克。

选项 B：脊髓蛛网膜粘连可导致脊髓蛛网膜炎，但由于病损来源于蛛网膜，一般不会引起脊髓横贯性损伤，因此也不会出现脊髓休克。

选项 C：急性横贯性脊髓炎的早期，可能会出现脊髓休克，特征为病损平面以下肢体瘫痪、传导束性感觉障碍和尿便障碍。

选项 D：脊髓空洞症是由于多种原因导致脊髓形成管状空腔，临床表现为受累的脊髓节段神经损害症状，以痛、温觉减退与消失、而深感觉保存的分离性感觉障碍为特点，不会出现脊髓休克。

选项 E：脊髓后动脉血栓形成会出现脊髓后动脉综合征，表现为急性根痛，病变水平以下深感觉缺失和感觉性共济失调，痛温觉和肌力保存，括约肌功能常不受累，不会出现脊髓休克。

108. 【答案】D

【解析】

A 选项：错觉，对于真实感觉的错误解释。在急性脑病综合征中，患者可能会出现对周围环境的错误感知，这是因为他们的认知功能受到了严重的影响。因此，这个选项是正确的。

B 选项：幻觉，是指在没有相应的外界刺激的情况下产生的感觉体验。在急性脑病综合征中，由于大脑功能的混乱，患者可能会出现幻觉。因此，这个选项也是正确的。

C 选项：被害妄想，是一种偏离现实的坚定信念，患者认为自己正在或将要受到伤害。在急性脑病综合征中，患者可能会出现这种情况。因此，这个选项是正确的。

D 选项：关系妄想，是指患者错误地认为无关的事件或行为与自己有某种特殊的关系。这种症状常见于精神分裂症，而不是急性脑病综合征。因此，这个选项是错误的。

E 选项：逻辑障碍，是指患者的思维过程出现问题，不能正常地进行逻辑推理。在急性脑病综合征中，由于大脑功能的混乱，患者可能会出现这种情况。因此，这个选项是正确的。

109. 【答案】A

【解析】

选项 A：动脉硬化是脑梗死的最主要病因。动脉硬化会导致血管壁变硬，形成斑块，进而引发血栓，阻塞脑部供血，最终导致脑梗死。

选项 B：高血压虽然可以引起脑血管疾病，但它更多地与脑出血有关，并不是脑梗死的主要病因。

选项 C：动脉壁炎症可以引发血栓形成，从而导致脑梗死，但其发生率相对较低，并不是脑梗死的最主要病因。

选项 D：真性红细胞增多症可能会增加血液粘稠度，形成血栓，但也并非脑梗死的最主要病因。

选项 E：血高凝状态会增加血栓形成的风险，可能导致脑梗死，但同样并非最主要病因。

110. 【答案】B

【解析】

选项 A：出血性大肠埃希菌肠炎，表现为大便次数增多，开始为黄色水样便，后转为血水便，有特殊臭味。这与题目中的情况不符，所以排除。

选项 B：真菌性肠炎多为白念珠菌所致，2 岁以下婴儿多见，表现为大便次数增多，黄色稀便，泡沫较多，带黏液，有时可见豆腐渣样细块。这与题目中的情况也不符，所以排除。

选项 C：金黄色葡萄球菌肠炎，继发于大剂量应用抗生素后，大便为暗绿色水样便，镜检发现大量红细胞，这与题目中的情况完全符合，所以选择此选项。

选项 D：侵袭性大肠杆菌肠炎一般表现为急性起病，高热甚至可以发热惊厥，腹泻频繁，大便呈黏液状，带脓血，有腥臭味。这与题目中的情况不符，所以排除。

选项 E：空肠弯曲菌肠炎表现为脓血便、腹痛剧烈，亦可并发严重的小肠结肠炎、败血症、肺炎、脑膜炎、心内膜炎、心包炎等。这与题目中的情况不符，所以排除。

111. 【答案】D

【解析】

选项 A：出血性大肠埃希菌肠炎主要表现为大便次数增多，开始为黄色水样便，后转为血水便，有特殊臭味。这与题目中的病症描述不符，所以排除。

选项 B：真菌性肠炎多由白念珠菌引起，2 岁以下婴儿多见，表现为大便次数增多，黄色稀便，泡沫较多，带黏液，有时可见豆腐渣样细块。这与题目中的病症描述不符，所以排除。

选项 C：金黄色葡萄球菌肠炎，多继发于大量使用抗生素后，表现为发热、呕吐、腹泻、不同程度的中毒症状、脱水和电解质紊乱，甚至发生休克。典型的大便为暗绿色，量多带黏液，少数为血便。这与题目中的病症描述不符，所以排除。

选项 D：侵袭性大肠杆菌肠炎一般表现为急性起病，高热甚至可以发热惊厥，腹泻频繁，大便呈黏液状，带脓血，有腥臭味。这与题目中的病症描述完全符合，所以答案是 D。

选项 E：空肠弯曲菌肠炎表现为脓血便、腹痛剧烈，亦可并发严重的小肠结肠炎、败血症、肺炎、脑膜炎、心内膜炎、心包炎等。这与题目中的病症描述不符，所以排除。

112. 【答案】D

【解析】

选项 A：透明细胞癌是肾癌的一种病理类型，不是宫颈癌的常见病理类型。

选项 B：腺鳞癌是宫颈癌的一种少见类型，不是最常见的病理类型。

选项 C：内膜腺样癌是宫颈癌的一种少见类型，不是最常见的病理类型。

选项 D: 鳞状细胞癌是宫颈癌最常见的病理类型, 占宫颈癌的 75%-80%。

选项 E: 腺癌在宫颈癌中的发病率较低, 大约占 20%-25%, 因此也不是宫颈癌最常见的病理类型。

113. 【答案】C

【解析】

选项 A: 透明细胞癌是一种罕见的子宫内膜癌病理类型, 只占所有子宫内膜癌的不足 5%, 所以 A 选项不正确。

选项 B: 腺鳞癌主要是宫颈癌的一种病理类型, 而非子宫内膜癌的常见病理类型, 所以 B 选项不正确。

选项 C: 内膜腺样癌是子宫内膜癌最常见的病理类型, 占所有子宫内膜癌的 80%-90%, 所以 C 选项是正确答案。

选项 D: 鳞状细胞癌主要是宫颈癌的一种病理类型, 而非子宫内膜癌的常见病理类型, 所以 D 选项不正确。

选项 E: 腺癌是一种常见于宫颈的病理类型, 占所有宫颈癌的 20%-25%, 而非子宫内膜癌的常见病理类型, 所以 E 选项不正确。

114. 【答案】A

【解析】

选项 A: 骨盆漏斗韧带, 连接骨盆与卵巢之间的韧带, 在保留双附件的全子宫切除术中, 这是唯一不需要切断的韧带。因此, 选项 A 是正确答案。

选项 B: 卵巢固有韧带, 连接卵巢与子宫角之间的韧带, 在切除子宫时, 需要切断此韧带。

选项 C: 子宫主韧带, 横位于子宫颈两侧和骨盆侧壁之间的韧带, 是固定子宫颈位置, 防止子宫脱垂的主要结构。在切除子宫时, 需要切断此韧带。

选项 D: 子宫阔韧带, 从子宫侧缘向两侧延伸至盆壁, 能够限制子宫向两侧倾斜, 因此在切除子宫时, 需要切断此韧带。

选项 E: 子宫骶骨韧带, 连接子宫体和子宫颈交界处后面的上侧方与第 2、3 骶韧带前面的筋膜, 宫底韧带向后向上牵引子宫颈, 维持子宫前倾位置。在切除子宫时, 需要切断此韧带。

115. 【答案】C

【解析】

选项 A: 雌激素主要用于治疗萎缩性阴道炎等疾病, 对于子宫腺肌病的治疗效果并不明显, 所以选项 A 不正确。

选项 B: 孕激素主要用于抑制排卵等治疗, 对于子宫腺肌病并无明显疗效, 所以选项 B 不正确。

选项 C: GnRH- α 是治疗子宫腺肌病的有效药物, 可以缓解症状, 但需要注意其副作用, 且在停药后症状可能复发, 所以选项 C 是正确答案。

选项 D: 雌孕激素交替主要用于治疗月经不规则等疾病, 对于子宫腺肌病并无明显疗效, 所以选项 D 不正确。

选项 E: 镇痛药物主要用于缓解疼痛, 但该患者并无疼痛症状, 故选项 E 不正确。

116. 【答案】D

【解析】

选项 A: CIN I 级, 指宫颈上皮轻度不典型增生。病变局限于上皮层的下 1/3, 细胞略大, 核大深染, 核分裂象少; 排列虽不整齐, 但存在极性。与题干描述不符, 故不考虑。

选项 B: CINIV 级, 在 WHO 女性生殖器肿瘤分类标准中并不存在 CINIV 级, 故此选项错误。

选项 C: CINII 级, 指宫颈上皮中度不典型增生。病变局限于上皮层的下 2/3, 细胞核大, 异型明显, 染色质加深, 核分裂象多; 细胞排列紊乱。与题干描述不符, 故不考虑。

选项 D: CINIII 级, 指包括宫颈上皮重度不典型增生及原位癌。其中宫颈重度不典型增生病变累及 2/3 层以上或全部上皮层。细胞异型显著, 核大、深染、染色质分布不均, 有核分裂象; 上皮极性几乎均消失, 与题干描述一致, 所以选项 D 是正确答案。

选项 E: 浸润癌, 题干显示宫颈上皮不典型增生病变累及 2/3 层以上到全层, 但基底膜完整, 故不属于浸润癌,

不考虑。

117. 【答案】C

【解析】

A. 肌层绒毛：这是指绒毛侵入子宫肌层，多见于胎盘植入，并非葡萄胎所致，故不正确。

B. 输卵管绒毛：在输卵管妊娠时出现，非葡萄胎时可见，故不正确。

C. 子宫内绒毛：葡萄胎主要由子宫内绒毛过度增生形成，清宫术主要是刮除这些过度增生的绒毛组织，故是正确答案。

D. 蜕膜组织：子宫内膜间质受蜕膜化诱导因子刺激而增殖和再分化形成的一种特殊组织，对于妊娠的建立和维持至关重要，并非葡萄胎清宫组织，故不正确。

E. 宫外绒毛：多见于宫外孕时，非题干所述葡萄胎，故不正确。

118. 【答案】A

【解析】

选项 A（正确）：LOT 代表左枕横位。根据题目中的描述，胎头矢状缝与骨盆横径一致，小囟门在 3 点位，大囟门在 9 点位，这些都是左枕横位的特征。

选项 B：LOP 代表左枕后位，但题目中的描述不符合这个胎位，所以排除。

选项 C：LOA 代表左枕前位，但题目中的描述不符合这个胎位，所以排除。

选项 D：ROA 代表右枕前位，但题目中的描述不符合这个胎位，所以排除。

选项 E：ROT 代表右枕横位，但题目中的描述不符合这个胎位，所以排除。

119. 【答案】D

【解析】

选项 A：顺时针旋转 45° 。这种情况下，胎头会转到枕左后位，这并不利于分娩，因为这种位置在自然分娩中比较困难，所以选项 A 错误。

选项 B：顺时针旋转 90° 。这将使胎头转到枕后位，这个位置对于分娩来说非常不利，因此选项 B 错误。

选项 C：逆时针旋转 90° 。虽然这可以使胎头转到枕前位，但是在实际操作中，一次旋转 90° 的难度较大，可能会增加分娩的风险，所以选项 C 错误。

选项 D：逆时针旋转 45° 。这将使胎头转到枕左前位，这是一个利于分娩的位置，因此选项 D 是正确答案。

选项 E：不需要旋转。由于胎头当前的位置并不利于分娩，所以需要旋转，所以选项 E 错误。

120. 【答案】D

【解析】

选项 A：胎盘早剥。胎盘早剥一般在分娩前就会出现阴道流血，伴有腹痛和子宫压痛，且子宫张力增高。而题干中胎儿已经娩出，子宫轮廓清晰，所以不符合胎盘早剥的特征，因此 A 选项错误。

选项 B：子宫收缩乏力。这种情况下，通常是胎盘娩出后才会出现阴道流血较多，但题干中胎儿娩出后出现大量出血，子宫轮廓清晰，不符合子宫收缩乏力的特征，所以 B 选项错误。

选项 C：凝血功能障碍。凝血功能障碍会导致阴道持续流血，且血液不凝。但题干没有提供足够的信息来支持这一点，所以 C 选项错误。

选项 D：胎盘剥离不全。胎儿娩出后出现阴道出血，考虑胎盘因素，且子宫轮廓清晰，排除胎盘早剥，符合胎盘剥离不全的特征，所以 D 选项正确。

选项 E：软产道损伤。通常会在胎儿娩出后立即发生阴道流血，血色鲜红，并伴有阴道疼痛。题干中胎儿娩出后 10 分钟，阴道大量流血，不符合软产道损伤的特征，所以 E 选项错误。

121. 【答案】E

【解析】

选项 A: 胎盘早剥通常会在胎儿娩出前导致阴道流血, 且伴有腹痛、子宫张力增高和压痛等症状。本题中并未提及这些特征, 因此不选 A。

选项 B: 子宫收缩乏力通常表现为胎盘娩出后阴道大量出血。但本题中的患者是在胎儿娩出后立即出现阴道出血, 故排除子宫收缩乏力。

选项 C: 凝血功能障碍会导致胎儿或胎盘娩出后阴道持续流血, 且血液不凝。但本题中的患者并没有明确表示血液不凝固, 因此不选 C。

选项 D: 胎盘剥离不全通常会在胎儿娩出数分钟后才出现阴道出血。但本题中的患者是在胎儿娩出后立即出现阴道出血, 故不选 D。

选项 E: 软产道损伤会在胎儿娩出后立即出现阴道流血, 且血色鲜红, 符合本题的病历描述, 因此选择 E。

122. 【答案】B

【解析】

选项 A: 胎盘早剥通常表现为子宫轮廓不清, 但本题中未提及子宫轮廓情况, 因此不考虑胎盘早剥。

选项 B: 子宫收缩乏力通常会导致胎盘娩出后阴道流血较多。本题中, 第二胎人工破膜后随即出现出血, 符合子宫收缩乏力的特征, 故该选项是正确答案。

选项 C: 凝血功能障碍通常会导致胎儿或胎盘娩出后阴道持续流血, 且血液不凝。但本题中患者未出现血液不凝的情况, 因此不考虑凝血功能障碍。

选项 D: 胎盘剥离不全通常会在胎儿娩出数分钟后出现阴道出血, 但本题中患者是人工破膜后随即出血, 因此不考虑胎盘剥离不全。

选项 E: 软产道损伤通常会导致胎儿娩出后立即发生阴道流血, 色鲜红, 并伴有阴道疼痛。但本题中患者胎儿第二胎人工破膜后随即出血, 且未提及阴道疼痛, 因此不考虑软产道损伤。

123. 【答案】A

【解析】

A 选项: 稽留流产, 是指胎儿在宫内死亡, 但并未排出, 持续时间过长可能导致凝血功能障碍, 最容易出现弥散性血管内凝血, 造成严重出血。这也是本题的正确答案。

B 选项: 不全流产, 部分妊娠物排出宫腔, 还有部分残留于宫腔内, 或嵌顿于宫颈口处, 或胎儿排出后胎盘滞留宫腔或嵌顿于宫颈口, 影响子宫收缩导致出血, 甚至发生休克。但这种情况下更多考虑的是出血问题, 而非凝血功能障碍。

C 选项: 复发性流产, 是指与同一性伴侣连续发生 3 次及以上的自然流产。复发性流产大多数为早期流产, 少数为晚期流产。这种情况下, 凝血功能障碍并不常见。

D 选项: 完全流产, 妊娠物已全部排出, 阴道流血逐渐停止, 腹痛逐渐消失。这种情况下的症状较轻, 不容易出现凝血功能障碍。

E 选项: 先兆流产, 常出现少量阴道流血, 常为暗红色或血性白带, 临床症状较轻, 不容易导致凝血功能障碍。

124. 【答案】B

【解析】

A 选项: 稽留流产, 是指胎儿在子宫内死亡但不排出, 可能导致凝血功能障碍, 但对失血性休克的风险并不是最大。

B 选项 (正确答案): 不全流产, 是指部分妊娠物排出宫腔, 还有部分残留于宫腔内, 或嵌顿于宫颈口处, 或胎儿排出后胎盘滞留宫腔或嵌顿于宫颈口, 影响子宫收缩导致出血, 甚至发生休克。因此, 不全流产最容易出现失血性休克。

C 选项：复发性流产，是指与同一性伴侣连续发生 3 次及以上的自然流产，大多数为早期流产，少数为晚期流产，对失血性休克的风险并不是最大。

D 选项：完全流产，是指妊娠物已全部排出，阴道流血逐渐停止，腹痛逐渐消失，症状表现最轻，最不容易出现失血性休克。

E 选项：先兆流产，常出现少量阴道流血，临床症状较轻，不容易导致失血性休克。

125. 【答案】A

【解析】

选项 A（肩难产）：肩难产是指在头部已经娩出后，胎儿的肩部不能顺利通过产道。在这个情况下，如果不采取适当的医疗干预，可能会给母亲和婴儿带来严重的危害。选项 B（第二产程延长）：第二产程是从宫颈口全开到胎儿完全娩出的过程。虽然题目中提到了后产程延长，但没有明确指出是因为宫颈口未全开还是其他原因，所以不能确定是第二产程延长。

选项 C（小儿发育畸形）：选项 D（巨大儿）：巨大儿是指出生时体重超过 4000g 的新生儿。选项 E（滞产）：滞产是指产程过长，通常是超过 24 小时。

126. 【答案】A

【解析】

选项 A：臂丛神经损伤。肩难产时，由于胎儿的肩部受到压迫，可能会导致臂丛神经损伤。臂丛神经损伤会导致胎儿手部无法正常抬起。因此，这是正确答案。

选项 B：肌皮神经损伤。肌皮神经主要负责前臂的屈曲功能，而题目中胎儿表现为左手不能抬，故不符合肌皮神经损伤的表现。

选项 C：腋神经损伤。腋神经损伤会导致上肢外展困难、外旋无力，三角肌萎缩、麻痹，本题中表现为胎儿左手不能抬，故不考虑诊断为腋神经损伤。

选项 D：肱骨骨折。肱骨骨折会导致肿胀、疼痛，上臂的畸形和反常活动，而本题中无此表现，故不考虑诊断为肱骨骨折。

选项 E：肌肉拉伤。肌肉拉伤是肌肉在运动中急剧收缩或过度牵拉引起的损伤，而本题为助产过程中，故不考虑诊断为肌肉拉伤。

127. 【答案】A

【解析】

选项 A：苍白螺旋体是梅毒的病原体，对青霉素非常敏感，因此是孕妇感染后首选的治疗药物。

选项 B：人乳头瘤病毒通常会导致尖锐湿疣，其主要治疗方式为三氯醋酸涂擦局部，物理治疗或手术切除，而非青霉素。

选项 C：沙眼衣原体感染通常首选阿奇霉素或阿莫西林进行治疗，而非青霉素。

选项 D：解脲支原体感染的患者，常用的治疗药物是阿奇霉素，而非青霉素。

选项 E：人免疫缺陷病毒感染的首选治疗方法是抗病毒治疗，而非青霉素。

128. 【答案】C

【解析】

A. 苍白螺旋体：苍白螺旋体是梅毒的病原体，而治疗梅毒的首选药物是青霉素，因此 A 选项不正确。

B. 人乳头瘤病毒：人乳头瘤病毒是尖锐湿疣的病原体，治疗方式主要是局部涂擦三氯醋酸，物理治疗或手术切除，因此 B 选项不正确。

C. 沙眼衣原体：沙眼衣原体感染的孕妇首选用阿奇霉素进行治疗，因此 C 选项是正确的。

D. 解脲支原体：对于无症状的孕妇，即使下生殖道检出支原体也不需要进行治疗，只有在有症状的解

脉支原体感染患者中才会首选阿奇霉素治疗，因此 D 选项不正确。

E. 人免疫缺陷病毒：人免疫缺陷病毒是艾滋病的病原体，其治疗首选的是抗病毒治疗，因此 E 选项不正确。

129. 【答案】E

【解析】

A. 混合性酸中毒：此选项错误，因为患者没有呼吸衰竭等情况，不会出现呼吸性酸中毒的情况。

B. 代谢性碱中毒：此选项错误，因为患者的情况会导致酸中毒，而不是碱中毒。

C. AG 正常型代谢性酸中毒：此选项错误，因为患者的情况会导致 AG 增高，而不是 AG 正常。

D. 呼吸性酸中毒：此选项错误，因为患者没有呼吸衰竭等情况，不会出现呼吸性酸中毒的情况。

E. AG 升高型代谢性酸中毒：此选项正确，因为患者的情况会导致 AG 增高，形成 AG 增高型代谢性酸中毒。

130. 【答案】D

【解析】

A. B 超检查：B 超检查虽然可以观察到子宫内膜的厚度、形态等变化，但无法准确判断子宫内膜的周期性变化，因为它不能反映出子宫内膜细胞学和生物化学的具体改变。

B. 基础体温测定：基础体温测定主要用于判断排卵期，受到许多因素影响，如机体的一般情况、环境、饮食等，因此不能作为判断子宫内膜周期性变化的可靠依据。

C. 激素测定：激素测定可以反映出女性的激素水平变化，但这并不能全面反映出子宫内膜的周期性改变，因为子宫内膜的周期性变化包括组织学和生物化学的相应变化，而激素测定只能反映其中的一部分。

D. 诊断性刮宫：诊断性刮宫是最直接、最可靠的方法，可以获取子宫内膜样本，通过镜检可以观察到子宫内膜的组织学和生物化学的具体改变，因此是了解子宫内膜周期性变化最可靠的诊断依据。

E. 细胞学检查：细胞学检查虽然可以观察到细胞的形态变化，但不能全面反映子宫内膜的周期性改变，因为它不能反映出生物化学的具体改变。

131. 【答案】A

【解析】

A. 雌激素：在妊娠期由胎盘-胎儿单位共同合成，水平增高可通过增高子宫肌细胞膜电位活性，使子宫对缩宫素的敏感性增加，促进宫颈成熟，刺激分娩，因此是正确答案。B. 孕激素：可以促进一氧化氮的合成，抑制细胞间连接形成，下调缩宫素受体表达，所以并不能增加子宫对缩宫素的敏感性。C. 雄激素：主要由睾丸合成和分泌，肾上腺和卵巢可少量分泌，并非妊娠分娩时参与活动的激素，因此不符合题目要求。D. 促性腺激素：参与调节性腺发育，胎盘分泌的促性腺激素可促进妊娠黄体分泌孕酮，但并未与缩宫素反应，故不考虑。E. 生长激素：由位于垂体的生长激素细胞分泌，与生长相关，而非分娩，因此不符合题目要求。

132. 【答案】A

【解析】

A. 产毒性大肠埃希菌肠炎：病程短，大便次数多，呈黄绿色或蛋花样稀便伴较多黏液，有发霉臭味；镜检有少量白细胞。这与病例描述相符，所以 A 是正确答案。

B. 空肠弯曲菌肠炎：症状与细菌性痢疾相似，大便为黏液便或脓血便，有腥臭味，镜检有大量白细胞和少量红细胞。病例中并未提到腹痛和发热，且粪便中未见大量白细胞和红细胞，所以 B 不是正确答案。

C. 金黄色葡萄球菌肠炎：重症腹泻频繁，大便有腥臭味，呈黄或暗绿色，水样，黏液较多，少数为血便。病例中并未提到血便，所以 C 不是正确答案。

D. 轮状病毒肠炎：起病急，大便次数多，量多，水分多，黄色水样或蛋花汤样，可带少量黏液，无腥臭味。病例中的大便有腥臭味，所以 D 不是正确答案。

E. 白色念珠菌肠炎：大便次数增多，稀黄，泡沫较多，带黏液，有时可见豆腐渣样细块，偶见血便，镜检可

见真菌芽生细胞和假菌丝。病例中并未提到豆腐渣样细块和血便，所以 E 不是正确答案。

133. 【答案】A

【解析】

A. 重度等渗性脱水：根据题目中的症状描述和血钠 134mmol/L ，符合等渗性脱水（血清钠为 $130\sim 150\text{mmol/L}$ ）的定义。同时，患儿的临床表现（精神极度萎靡，表情淡漠，口唇黏膜极度干燥，眼窝和前囟明显凹陷等）也符合重度脱水的特征，因此选项 A 是正确答案。

B. 中度等渗性脱水：虽然患儿的血钠符合等渗性脱水的范围，但临床表现更接近重度脱水，因此选项 B 不正确。

C. 重度低渗性脱水：虽然患儿的临床表现符合重度脱水，但血钠 134mmol/L 并不符合低渗性脱水（血清钠 $< 130\text{mmol/L}$ ）的定义，因此选项 C 不正确。

D. 中度低渗性脱水：同样，虽然患儿的临床表现符合重度脱水，但血钠 134mmol/L 并不符合低渗性脱水的定义，因此选项 D 不正确。

E. 重度高渗性脱水：虽然临床表现符合重度脱水，但血钠 134mmol/L 并不符合高渗性脱水（血清钠 $> 150\text{mmol/L}$ ）的定义，因此选项 E 不正确。

134. 【答案】B

【解析】

A. $1/3$ 张含钠液：对于重度脱水的患者，这种比例的含钠液无法有效快速扩容，不能迅速改善周围循环障碍。

B. $2:1$ 等张含钠液：对于重度脱水有明显周围循环障碍者，应先快速扩容， 20ml/kg 等张含钠液， $30\sim 60$ 分钟内快速输入，迅速扩容。试题选项中只有 $2:1$ 等张含钠液是等张溶液，符合治疗原则。

C. $2/3$ 张含钠液：这种比例的含钠液可能无法达到快速扩容的效果。

D. $1/2$ 张含钠液：这种比例的含钠液可能无法达到快速扩容的效果。

E. $4/5$ 张含钠液：这种比例的含钠液可能无法达到快速扩容的效果。

135. 【答案】A

【解析】

A. 低钾血症：正确选项。患儿的症状与低钾血症一致。低钾血症可能导致胃肠道平滑肌兴奋性下降，蠕动减少而腹胀、肠鸣音弱，神经反射减弱甚至消失。

B. 低钙血症：错误选项。低钙血症通常会导致神经、肌肉兴奋性增加，肌肉痉挛抽搐等，但患儿的症状表现为神经肌肉兴奋性下降，与低钙血症的症状不符。

C. 低磷血症：错误选项。低磷血症一般无特异症状，轻症可能出现骨骼肌无力，但患儿主要表现为胃肠道平滑肌症状，不符合低磷血症的表现。

D. 低镁血症：错误选项。低镁血症也会导致神经、肌肉兴奋性增加，肌肉痉挛抽搐等，但患儿的症状表现为神经肌肉兴奋性下降，与低镁血症的症状不符。

E. 低钠血症：错误选项。低钠血症一般以乏力、精神失常等全身、中枢症状为主，与患儿的症状不符。

136. 【答案】D

【解析】

选项 A：生长过快。婴儿生长发育迅速，对膳食铁需要量增加，但生长过快本身并不是缺铁性贫血的直接原因，因此这个选项是错误的。

选项 B：铁吸收障碍。虽然铁吸收障碍会导致缺铁性贫血，但这主要见于慢性腹泻等疾病，不是 6 个月婴儿缺铁性贫血的常见原因，所以这个选项也是错误的。

选项 C：铁丢失过多。长期慢性失血确实会导致铁丢失过多，但这并不是婴儿缺铁性贫血的常见原因，因此这

个选项是错误的。

选项 D: 未及时添加辅食。6 个月大的婴儿, 母体提供的铁已经逐渐耗尽, 而婴儿主食人乳和牛乳的铁含量均低, 如果没有及时添加辅食, 就不能满足机体对铁的需要, 从而导致缺铁性贫血, 因此这个选项是正确的。

选项 E: 先天性储铁不足。先天性储铁不足确实会导致缺铁性贫血, 但这主要见于早产、双胎或多胎、胎儿失血等情况, 并不常见, 所以这个选项是错误的。

137. 【答案】D

【解析】

选项 A: 主动脉骑跨是指主动脉起源于右心室和左心室, 但这并不是法洛四联症预后影响最大的因素, 因此 A 选项错误。

选项 B: 右心室肥厚是肺动脉高压的继发性病变, 其本身并不能直接影响法洛四联症的预后, 因此 B 选项错误。

选项 C: 室间隔缺损是法洛四联症的一个组成部分, 但其对预后的影响并不如肺动脉狭窄大, 因此 C 选项错误。

选项 D: 肺动脉狭窄是决定法洛四联症患者生理病理、病情严重程度及预后的主要因素。肺动脉狭窄程度决定了分流的方向和分流量, 对患者的血氧饱和度和生活质量有直接影响。因此, D 选项是正确答案。

选项 E: 主动脉狭窄并不属于法洛四联症的病理变化, 因此 E 选项错误。

138. 【答案】C

【解析】

A 选项: 房间隔缺损, 其典型表现为右房、右室大, 但题干中未提及这些, 排除 A 选项。

B 选项: 室间隔缺损, 其典型表现为左右心室增大, 且以右室增大为主, 与题干描述不符, 排除 B 选项。

C 选项: 动脉导管未闭, 因为主动脉在收缩期和舒张期的压力均超过肺动脉, 所以通过未闭的动脉导管, 左向右分流的血液连续不断, 使肺循环及左心房、左心室血流量明显增加, 故 X 线表现为肺血增多、左心室增大、左心房增大。这与题干描述的症状相符, 因此 C 选项是正确答案。

D 选项: 法洛四联症, 其 X 线表现为靴状心影、肺动脉段凹陷、双侧肺纹理减少, 与题干描述不符, 排除 D 选项。

E 选项: 待补充, 没有具体的选项内容, 无法进行分析。

139. 【答案】E

【解析】

选项 A: 万古霉素是一种强力的抗生素, 主要用于治疗耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌感染, 对于肺炎支原体肺炎并非首选, 因此排除。

选项 B: 阿米卡星属于氨基糖苷类抗生素, 虽然其具有广谱的抗菌活性, 但由于其较严重的耳毒性和肾毒性, 儿科慎用, 因此排除。

选项 C: 阿莫西林+克拉维酸钾是一种常用的抗生素组合, 主要用于治疗流感嗜血杆菌等感染, 对于肺炎支原体肺炎并非首选, 因此排除。

选项 D: 头孢曲松是一种头孢菌素抗生素, 主要用于治疗肺炎链球菌等感染, 对于肺炎支原体肺炎并非首选, 因此排除。

选项 E: 阿奇霉素属于大环内酯类抗生素, 是治疗肺炎支原体肺炎的首选药物, 因此选择 E。

140. 【答案】C

【解析】

选项 A: 万古霉素主要用于处理耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌 (MRSA) 感染, 但不适用于流感嗜血杆菌, 因此不选。

选项 B: 阿米卡星属于氨基糖苷类抗生素, 由于其较严重的耳毒性, 儿科使用时需要慎重, 因此不作为首选,

所以不选。

选项 C: 阿莫西林+克拉维酸钾是治疗流感嗜血杆菌的首选药物, 因此这是正确答案。

选项 D: 头孢曲松主要用于处理肺炎链球菌感染, 对于青霉素敏感者首选青霉素或阿莫西林, 耐药者选择头孢类, 因此不选。

选项 E: 阿奇霉素主要用于处理肺炎支原体感染, 因此不选。

141. 【答案】A

【解析】

选项 A: 万古霉素。新生儿 MRSA (耐甲氧西林金黄色葡萄球菌) 感染首选万古霉素。这是因为万古霉素对多种革兰阳性菌, 包括耐药金黄色葡萄球菌具有良好的抗菌活性。

选项 B: 阿米卡星。氨基糖苷类抗生素因较严重的耳毒性和肾毒性, 儿科慎用。因此, 对于新生儿的治疗并不是最佳选择。

选项 C: 阿莫西林+克拉维酸钾。流感嗜血杆菌首选阿莫西林/克拉维酸、氨苄西林/舒巴坦。但对于 MRSA, 则不是首选。

选项 D: 头孢曲松。肺炎链球菌青霉素敏感者首选青霉素或阿莫西林, 耐药者选择头孢类。然而, 对于 MRSA, 头孢曲松并非首选。

选项 E: 阿奇霉素。肺炎支原体治疗首选大环内酯类抗生素, 如阿奇霉素、红霉素及罗红霉素。然而, 对于 MRSA, 阿奇霉素并非首选。

142. 【答案】E

【解析】

A. 2-6 岁: 此选项错误, 幼儿急疹主要发生在 1 岁以内的婴儿。

B. 7 岁以内: 此选项错误, 虽然 7 岁以内的儿童也有可能发生, 但最易发的年龄段是 1 岁以内。

C. 幼儿: 此选项错误, 幼儿通常指的是 1-3 岁的儿童, 而幼儿急疹主要发生在 1 岁以内的婴儿。

D. 新生儿期: 此选项错误, 新生儿期一般指出生后 28 天以内, 而幼儿急疹主要发生在 1 岁以内的婴儿。

E. 1 岁以内: 此选项正确, 幼儿急疹主要发生在 1 岁以内的婴儿。

143. 【答案】D

【解析】

A. 泼尼松: 川崎病的治疗不首选糖皮质激素, 因为它会促进血栓形成, 仅在丙种球蛋白治疗无效时考虑使用。

B. 环磷酰胺: 川崎病是一种自限性疾病, 不需要使用免疫抑制剂如环磷酰胺。

C. 泼尼松+丙种球蛋白: 这种组合在丙种球蛋白治疗无效时才可能使用, 不是首选治疗方法。

D. 阿司匹林+丙种球蛋白: 这是川崎病的标准治疗方案, 阿司匹林用于抗炎和抗血小板聚集, 丙种球蛋白用于降低冠状动脉病变的风险。

E. 观察: 由于川崎病如果不及时治疗可能导致冠状动脉病变等严重并发症, 所以不能只是观察。

144. 【答案】E

【解析】

选项 A: 基础代谢是指在安静、清醒、空腹、舒适环境下身体进行生命活动所需要的最低能量, 小儿的基础代谢能量需求量较成人高, 但随着年龄增长会逐渐减少, 所以这不是小儿特有的。

选项 B: 活动所需能量与身体大小、活动强度、活动持续时间、活动类型等因素有关, 这既适用于儿童也适用于成人, 所以这也不是小儿特有的。

选项 C: 食物的特殊动力作用是指在消化、吸收过程中出现的能量消耗额外增加的现象, 这是所有人都会经历的过程, 所以这也不是小儿特有的。

选项 D: 排泄损失能量是指未经消化吸收的食物损失约占能量的 10%, 这是所有人都会有的情况, 所以这也不是小儿特有的。

选项 E: 生长发育所需的能量是小儿特有的, 因为成人已完成生长发育, 不再需要额外的能量来支持生长, 而小儿在生长发育过程中需要额外的能量, 所以这是小儿特有的。

145. 【答案】B

【解析】

选项 A: 急性肾衰竭。患者的血肌酐 $56\mu\text{mol/L}$, 处于正常范围 (2~8 岁儿童血肌酐正常参考为 $40\sim 60\mu\text{mol/L}$), 说明患者的肾功能并未受到严重影响, 因此不符合急性肾衰竭的诊断。

选项 B: 单纯肾病综合征。患者出现大量蛋白尿、低蛋白血症、水肿和高脂血症, 这些都是肾病综合征的典型表现。由于患者无明显血尿和高血压, 因此更符合单纯肾病综合征的诊断。

选项 C: 肾炎性肾病综合征。该病的诊断标准包括尿检查红细胞 ≥ 10 个/HP、反复或持续高血压、肾功能不全、持续低补体血症等, 但在本例中, 患者的血压和尿检红细胞都未达到肾炎性肾病综合征的标准, 因此不符合此选项。

选项 D: 急进性肾炎。同选项 A, 由于患者肾功能并未受到严重影响, 因此不符合急进性肾炎的诊断。

选项 E: 急性肾炎。急性肾炎通常有前驱感染病史, 表现为血尿、蛋白尿、水肿、高血压、肾功能不全等, 但在本例中, 患者并未出现这些症状, 因此不符合急性肾炎的诊断。

146. 【答案】C

【答案】A 选项: 泼尼松+环磷酰胺, 环磷酰胺是免疫抑制剂, 用于糖皮质激素依赖、耐药或出现严重副作用者, 不适用于本题的病例。

B 选项: 呋塞米, 是利尿剂, 仅用于糖皮质激素耐药而需要缓解水肿症状者, 属于对症治疗, 不是针对病因治疗的首选药。

C 选项: 泼尼松, 是糖皮质激素, 可以有效抑制免疫反应, 减少尿蛋白的渗出, 是肾病综合征的首选治疗药物。

D 选项: 环磷酰胺, 同 A 选项, 是免疫抑制剂, 用于糖皮质激素依赖、耐药或出现严重副作用者, 不适用于本题的病例。

E 选项: 待补充, 没有具体药物, 无法进行评估。

147. 【答案】A

【解析】

选项 A: 活跃期停滞。正确。根据题干, 初产妇宫口开大至 6cm (已进入活跃期), 4 小时后宫口无任何扩张, 符合活跃期停滞的定义。活跃期通常是指宫颈口从 4~6cm 扩张到全开, 如果在这个阶段, 宫颈口在 4 小时内无扩张, 则被诊断为活跃期停滞。

选项 B: 第二产程延长。错误。第二产程是指从宫颈口完全扩张到胎儿娩出的过程。对于初产妇, 如果这个过程超过 3 小时, 则被认为是第二产程延长。但在题干中, 我们看到宫口仍然只有 6cm, 所以还未进入第二产程。

选项 C: 潜伏期延长。错误。潜伏期是指从临产规律宫缩开始到活跃期开始的时间。一般来说, 如果初产妇的潜伏期超过 20 小时, 就被认为是潜伏期延长。但在题干中, 我们看到宫口已经开大至 6cm, 说明已经进入了活跃期, 所以不是潜伏期延长。

选项 D: 正常产程。错误。正常产程通常是指从临产开始到胎儿和胎盘的娩出, 包括潜伏期、活跃期和第二产程。在这个过程中, 宫颈口应该持续扩张。但在题干中, 我们看到在 4 小时内宫口无任何扩张, 所以不能被认为是正常产程。

选项 E: 活跃期延长。错误。活跃期延长通常是指在活跃期, 宫颈口的扩张速度低于 0.5cm/h 。但在题干中, 我们看到在 4 小时内宫口无任何扩张, 所以更符合活跃期停滞的定义, 而不是活跃期延长。

148. 【答案】C

【解析】

选项 A: 维生素 PP (尼克酸), 在人体内主要参与能量的代谢, 对皮肤和神经系统的健康有重要影响, 但不能缓解妊娠恶心呕吐症状。

选项 B: 维生素 B2 (核黄素), 对皮肤、眼睛和神经系统的健康有重要作用, 缺乏会出现口角炎、唇炎等, 但对于妊娠恶心呕吐的缓解没有直接效果。

选项 C: 维生素 B6 (吡哆醇), 此选项为正确答案。维生素 B6 在人体内起到了多种作用, 包括氨基酸代谢、神经递质合成等。临床上, 维生素 B6 常被用于治疗妊娠期恶心呕吐。

选项 D: 维生素 B12 (钴胺), 在人体内主要参与红血球的生成和神经系统的维护, 用于治疗恶性贫血、周围神经病等, 但对妊娠恶心呕吐无缓解作用。

选项 E: 维生素 A (视黄醇), 在人体内主要参与视觉、免疫系统和皮肤健康的维护, 用于治疗夜盲症等, 但对妊娠恶心呕吐无缓解作用。

149. 【答案】D

【解析】

选项 A: 2021 年 3 月 31 日-4 月 1 日, 这个时间点已经超过了正常的受精卵着床时间, 所以选择 A 是错误的。

选项 B: 2021 年 3 月 14 日-3 月 15 日, 这个时间点是在排卵期, 受精卵还未形成, 无法着床, 所以选择 B 是错误的。

选项 C: 2021 年 4 月 8 日-4 月 9 日, 这个时间点也超出了正常的受精卵着床时间, 所以选择 C 是错误的。

选项 D: 2021 年 3 月 20 日-3 月 21 日, 这个时间点是在排卵后的约 6-7 天, 正好是受精卵着床的时间, 所以选择 D 是正确的。

选项 E: 2021 年 3 月 28 日-3 月 29 日, 这个时间点已经超过了正常的受精卵着床时间, 所以选择 E 是错误的。

150. 【答案】B

【解析】

A. 大脑: 大脑是排尿反射的高级中枢, 可以有意识地抑制或加强排尿反射过程, 但它并非排尿反射的低级中枢。因此, 选项 A 不正确。

B. 脊髓: 排尿反射是一种脊髓反射, 该反射在脊髓水平就能完成, 故排尿反射的低级中枢是脊髓。因此, 选项 B 正确。

C. 脑桥: 脑桥主要参与调控人体的生理活动, 如呼吸、心跳等, 并不直接涉及排尿反射。因此, 选项 C 不正确。

D. 中脑: 中脑主要负责视觉和听觉信息的传输, 以及眼球和头部的运动控制, 并不直接涉及排尿反射。因此, 选项 D 不正确。

E. 延髓: 延髓主要负责呼吸、心跳和血压等基本生命活动的调控, 并不直接涉及排尿反射。因此, 选项 E 不正确。