

## 临床执业医师 2022 年真题

### 第一单元

1. 急性肾损伤后，患者出现肾小管原尿回漏的原因是

- A. 肾小球滤过率降低
- B. 肾间质水肿，挤压肾小管
- C. 输尿管梗阻
- D. 肾小管上皮细胞坏死、脱落
- E. 肾小管的水钠重吸收减弱

2. 人的最低层次的需要是

- A. 生存的需要
- B. 安全的需要
- C. 归属与爱的需要
- D. 尊重的需要
- E. 自我实现的需要

3. 分级诊疗正确的是

- A. 非急症患者不可急诊就诊
- B. 自下向上进行转诊
- C. 鼓励非急症患者到基层医院首诊
- D. 各级医院报销比例相等
- E. 患者可根据自己意愿就诊

4. 医务人员之间相互协作的基础是

- A. 尊重
- B. 竞争
- C. 平等
- D. 信任
- E. 独立

5. 支撑呼吸道的软骨是

- A. 甲状软骨
- B. 杓状软骨
- C. 环状软骨

- D. 麦状软骨
- E. 会厌软骨
6. 不属于慢性肺源性心脏病的心室改变的为
- A. 右心室壁前壁肺动脉圆锥膨隆
- B. 右心室壁肥厚增生
- C. 心尖圆钝
- D. 右心室腔扩张
- E. 右心室乳头肌和肉柱萎缩
7. O 型血所含的抗原是
- A. A 抗原
- B. H 抗原
- C. O 抗原
- D. B 抗原
- E. MHC 抗原
8. 提出“六不治”理念的是谁
- A. 扁鹊
- B. 张仲景
- C. 孙思邈
- D. 陈实功
- E. 苏耽
9. 吸烟是肺癌的危险因素，下列吸烟的相关因素中与肺癌关系不密切的是
- A. 烟草燃烧所产生的一氧化碳量
- B. 吸烟量
- C. 烟草中尼古丁含量
- D. 烟草中焦油含量
- E. 吸烟年数
10. 输液时须遵循三查七对原则，以下不属于七对的是
- A. 姓名
- B. 性别
- C. 剂量
- D. 药物
- E. 床号
11. 在一定 pH 条件下，分子在 SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳中，决定其迁移速度的主要因素是

- A. 分子形状  
B. 分子电荷  
C. 分子极性  
D. 分子量大小  
E. 分子溶解度大小
12. 患者男，34 岁，身高 180cm，体重 72kg，根据我国 BMI，患者属于
- A. 正常  
B. 消瘦  
C. 超重  
D. 肥胖  
E. 轻度肥胖
13. 椎内静脉丛位于
- A. 硬膜下隙  
B. 椎体内  
C. 椎体旁  
D. 蛛网膜下隙  
E. 硬膜外隙
14. DNA 聚合链中最稳定的碱基对是
- A. A-G  
B. A-T  
C. G-C  
D. A-U  
E. C-U
15. 依据人们的实际健康状况与“理想健康状态”之间存在差距而提出的对预防、保健、医疗、康复等服务的客观要求是
- A. 卫生服务需要  
B. 卫生服务需求  
C. 卫生服务利用  
D. 卫生服务提供  
E. 卫生服务购买
16. 非处方药分为甲类、乙类的依据是
- A. 有效性  
B. 安全性

- C. 可及性
- D. 稳定性
- E. 经济性
17. 胃壁细胞分泌  $H^+$  的方式是
- A. 原发性转运
- B. 继发性转运
- C. 出胞作用
- D. 单纯扩散
- E. 易化扩散
18. 在生理性止血过程中，血小板起到的主要作用
- A. 血小板粘附于创面上，填补创面，止血栓形成
- B. 血小板释放 5-HT 等缩血管物质，引起血管收缩
- C. 释放 ADP 和  $TXA_2$ ，引起血小板聚集
- D. 纤溶蛋白原转换成不溶性的纤溶蛋白，加固止血栓形成
- E. 提供磷脂表面，止血栓形成
19. 属于胸腺非依赖性抗原的是
- A. 血清白蛋白
- B. 卡介苗
- C. 脂多糖
- D. 类毒素
- E. 抗病毒血清
20. 未列入临时急性用血的原则是
- A. 危及病人生命急需输血
- B. 所在地血站无法及时提供血液，且无法及时从其他机构调剂血液，而其他医疗措施不能替代输血治疗
- C. 各抢救科室具备处理输血反应的能力和条件
- D. 临床机构批准
- E. 符合采血标准
21. 患者因食用大量腌制腊肉及咸菜后出现恶心、呕吐等消化系统症状，查体：口唇青紫色，患者缺氧类型为：
- A. 血液型缺氧
- B. 组织型缺氧
- C. 循环型缺氧
- D. 乏氧型缺氧
- E. 低张型缺氧

22. 暗适应是在暗环境中
- A. 视觉感受性不断降低的过程
  - B. 视觉感受性不断提高的过程
  - C. 视觉感觉阈限不断提高的过程
  - D. 视觉的差别阈限不断提高的过程
  - E. 视觉对比度不断提高的过程
23. 医生于某医疗机构，参加抗菌药物合理使用培训并参加考核，合格后取得使用权，该医疗机构属于
- A. 一级医院
  - B. 乡镇卫生院
  - C. 社区卫生服务中心
  - D. 二级医院
  - E. 村卫生室
24. 根据《传染病防治法》要求，能增加或减少乙类传染病的机构是
- A. 当地政府部门
  - B. 全国人大常委会
  - C. 县级卫生部门
  - D. 国务院卫生行政部门
  - E. 疾病预防控制中心
25. 某地区发生群体性不明原因疾病时，应急管理措施不正确的是
- A. 分工合作，联防联控
  - B. 及时上报
  - C. 统一领导，统一响应
  - D. 信息共享，及时沟通
  - E. 控制与治疗并重
26. 肺通气/血流比值 $>0.8$  主要见于哪种疾病
- A. 肺血栓栓塞
  - B. 肺气肿
  - C. 哮喘
  - D. 慢性支气管炎
  - E. 肺水肿
27. 酶活性中心以外必需基团的功能是
- A. 结合多个底物分子
  - B. 调控其他的酶活性

- C. 维持酶活性中心的空间结构
- D. 加快催化反应
- E. 生成成肽键
28. 最容易引起淋巴结窦性组织细胞增生的疾病是
- A. 传染性单核细胞增多症
- B. 癌肿引流区的淋巴结
- C. 药物过敏反应
- D. 化脓性感染
- E. 病毒接种不良反应
29. 卵巢黏液性囊腺瘤的病理学特征是
- A. 单个囊腺泡，内上皮为单层扁平状上皮
- B. 内层为多层高柱状上皮
- C. 大小不一的囊腔，充满富含糖蛋白的粘稠液体
- D. 囊腔和间质可见多个砂粒体
- E. 可见明显异型性细胞
30. 下列属于正反馈调节的是
- A. 甲状腺素对促甲状腺素释放激素的调节
- B. 排卵前黄体生成素的释放
- C. 皮质醇对下丘脑的调控
- D. 肺牵张反射
- E. 降压反射
31. 下列哪项不直接影响细胞内氧化磷酸化的速率
- A. 呼吸链电子传递速度
- B. ATP 合酶活性
- C. ADP 水平
- D. 细胞内解耦联
- E. 蛋白激酶的作用
32. 医疗机构麻醉药品处方的最低保存年限是
- A. 1 年
- B. 2 年
- C. 3 年
- D. 4 年
- E. 5 年

33. 良性前列腺增生的病理特点

- A. 腺体、平滑肌、纤维均增生
- B. 基质增生
- C. 血管增生
- D. 上皮细胞增生
- E. 腺上皮化生

34. 伤寒的病理特征性表现

- A. 侵入淋巴细胞
- B. 感染性肉芽肿
- C. 干酪样坏死
- D. 淋巴细胞增多
- E. 假膜的形成

35. 心理测评的参考指标

- A. 作品
- B. 信度
- C. 效度
- D. 误差
- E. 常模

36. 属于髋关节囊内韧带的是

- A. 髂股韧带
- B. 股骨头韧带
- C. 坐股韧带
- D. 髌白横韧带
- E. 耻骨韧带

37. 肾上腺素与受体结合后，细胞内发生什么变化

- A. 核受体激活
- B. cAMP 升高
- C. cGMP 升高
- D. 细胞内受体结合
- E. IP<sub>3</sub> 降解

38. 肾上腺素是一种重要的激素和神经递质，它在身体的许多生理过程中都发挥着关键作用，包括心跳加速、血管收缩、呼吸加快等。同时，肾上腺素的作用也与许多疾病的发生和发展有关，如心血管疾病、哮喘、肾上腺瘤等。启动肌肉收缩过程的是

- A. 肌球蛋白
  - B. 原肌球蛋白
  - C. 钙调蛋白
  - D. 肌动蛋白
  - E. 肌钙蛋白
39. 公共卫生的核心功能是什么
- A. 预防疾病、宣传健康、职业病管理
  - B. 环境保护, 预防传染病, 保障卫生服务
  - C. 发布医疗卫生有关信息, 促进卫生经济调控
  - D. 对灾难作出应急反应, 保证卫生服务的有效性和及时性
  - E. 防治传染病, 职业病管理, 母婴保健
40. 医学科研的灵魂和科研人员的良心是什么
- A. 同情
  - B. 公正
  - C. 廉洁
  - D. 诚实
  - E. 勤奋
41. 基因工程中的“转”指的是
- A. 目的基因的选择
  - B. DNA 转录为 RNA
  - C. 逆转录 RNA 的合成
  - D. 目的 DNA 转入受体细胞
  - E. 目的基因导入质粒
42. 肾母细胞瘤的组织学特征是
- A. 角化
  - B. 胞质透明
  - C. 梭状
  - D. 形状, 大小不等
  - E. 包括间叶组织的细胞, 上皮细胞, 和幼稚细胞
43. 关于实施临床预防的原则, 下列哪项正确?
- A. 以治疗疾病为导向
  - B. 以收集临床资料为主
  - C. 以健康体检为主



- D. 以健康咨询和健康促进为主
- E. 以医生的决策为导向
44. 重大疾病医疗保险范围涵盖
- A. 城镇居民医疗保险与城乡居民新农合
- B. 城镇居民医疗保险与城镇职工医保
- C. 所有大病居民
- D. 城镇职工医疗保险与城乡新农合
- E. 所有参保公民
45. 传染病防控中，属于切断传播途径的是
- A. 隔离病人
- B. 医学隔离
- C. 治愈病人
- D. 注射疫苗
- E. 消毒
46. 临终关怀的范围
- A. 急诊患者
- B. 重症患者
- C. 晚期肿瘤患者
- D. 慢性病患者
- E. 危重症患者
47. 沙丁胺醇治疗支气管哮喘的机制：
- A. 激动  $\beta_1$ 受体
- B. 激动  $\beta_2$ 受体
- C. 激动  $\beta_1$ 、 $\beta_2$ 受体
- D. 激动  $\alpha$ 受体
- E. 激动  $\alpha$ 、 $\beta$ 受体
48. 高血压患者服用吲达帕胺和氨氯地平，应注意检测
- A. 血常规
- B. 血钾
- C. 血肌酐
- D. 血丙氨酸转移酶
- E. 血 PH
49. 男，21岁，呕吐寒战高热1周，隔日发作一次。8月15日入院。1周前由云南回来，次日出现寒战、发热、头

痛，体温时高时低，无定规律性，出汗多，近 2 天来发作过一次高热，伴头痛，持续 4 小时，热退后精神如常食欲正常，体温  $39^{\circ}\text{C}$ ，血象：WBC  $6.8 \times 10^9/\text{L}$ ，中性粒细胞 64%，淋巴细胞 36%，RBC  $3.2 \times 10^{12}/\text{L}$ ，Hb  $105\text{g/L}$ 。患者最可能的诊断是

- A. 疟疾
- B. 血吸虫
- C. 登革热
- D. 钩端螺旋体
- E. 艾滋病

50. 高胆固醇，低密度脂蛋白偏高，治疗选用

- A. 他汀类药物
- B. 贝特类
- C. 烟酸类
- D. 普罗布考
- E. 依折麦布

51. 判断代谢性酸中毒类型的指标是

- A. PH
- B. AB
- C. BE
- D. AG
- E.  $\text{PaCO}_2$

52. 下列符合卫生法的形式之一是

- A. 临床路径
- B. 临床实践指南
- C. 卫生法规
- D. 卫生标准
- E. 专家共识

53. 医学心理学包括的医学类型是

- A. 心理范围文化范围社会范围
- B. 心理范围文化范围病理范围
- C. 文化范围社会范围病理范围
- D. 心理范围社会范围医学范围
- E. 病理范围文化范围心理范围

54. 急性左心衰缓解肺水肿的措施

- A. 静脉注射吗啡
  - B. 氨茶碱
  - C. 硝酸甘油
  - D. 静脉注射呋塞米
  - E. 应用洋地黄制剂
55. 美托洛尔降低心肌收缩力的机制
- A.  $\alpha_1$  受体激动剂
  - B.  $\beta_2$  受体阻断剂
  - C. M 受体激动剂
  - D.  $\beta_1$  受体阻断剂
  - E.  $\alpha_2$  受体激动剂
56. 普萘洛尔不能用于以下哪种疾病
- A. 高血压伴支气管哮喘
  - B. 急性心肌梗死
  - C. 心力衰竭
  - D. 心绞痛
  - E. 心律失常
57. P2 大于 A2，可能见于那种疾病
- A. 肺栓塞
  - B. 肺炎
  - C. 肺结核
  - D. 主动脉夹层
  - E. 胸腔积液
58. 肢体浅感觉的 2 级神经元位于
- A. 脊神经节
  - B. 内侧丘系
  - C. 白质前联合
  - D. 脊髓后角
  - E. 薄束核
59. 不属于子宫内膜癌的病理
- A. 鳞癌
  - B. 粘液性癌
  - C. 透明细胞癌

D. 腺癌

E. 浆液性癌

60. 女, 45 岁, 大学教授, 因车祸导致颅脑损伤, 智力测验显示其智商为 85 分。同时有一位从未接受过正规教育的老人测得智商也是 85 分。心理治疗师认为前者的智力出现了问题, 而后者正常。这一判断的所遵循的原则是

A. 中立性原则

B. 保密性原则

C. 标准化原则

D. 客观性原则

E. 综合性原则

61. 为评估急性淋巴细胞白血病患者用药的预后情况, 哪项不能作为观察结局

A. 缓解

B. 复发

C. 车祸死亡

D. 失访

E. 自行出组

62. 女, 60 岁, 患丙肝多年, 今日出现扑翼样震颤、昏迷症状, 请问应该使用何种药物治疗

A. 支链氨基酸

B. 羟基化合物

C. 芳香氨基酸

D. 抗生素

E. 碱性肥皂水灌肠

63. 对儿童进行乙肝型肝炎疫苗接种的临床试验研究, 为评价其流行病学预防效果, 最好选用的指标是

A. 效果指数

B. 发病率

C. 感染率

D. 死亡率

E. 病死率

64. 破伤风抗毒素细胞来源

A. 单克隆 B 细胞

B. 单克隆 T 细胞

C. NK 细胞

D. 多克隆 B 细胞

E. 多克隆 T 细胞

65. 下列哪项不是反应运动的相对强度的指标？

- A. 体重指数
- B. 运动中的主观运动强度
- C. 运动的代谢当量
- D. 运动的持续时间
- E. 运动的绝对强度

66. 三羧酸循环的关键酶

- A. 异柠檬酸脱氢酶
- B. 丙酮酸激酶
- C. 6-磷酸葡萄糖激酶
- D. 琥珀酸脱氢酶
- E. 苹果酸脱氢酶

67. 衣原体的繁殖形式是

- A. 内基小体
- B. 中介体
- C. 二十面体
- D. 原体
- E. 始体

68. 男，61岁，胸闷乏力1月，血压150/83mmHg，颈动脉搏动，查体左室肥大，胸骨左缘第3肋间闻及递减型叹气样舒张期杂音，可触及水冲脉，股动脉枪击音和毛细血管搏动征。该患者主动脉瓣的病理变化最可能是

- A. 粘连
- B. 钙化
- C. 增厚
- D. 卷曲
- E. 变硬

69. 下列属于二级预防的是

- A. 体检
- B. 预防并发症
- C. 术后护理
- D. 术后康复锻炼
- E. 开展健康教育工作

70. 真核生物前体 mRNA 转录后的加工过程

- A. 乙酰化修饰

- B. 磷酸化修饰
- C. 高尔基体糖基化修饰
- D. 内含子剪切
- E. 在内质网折叠
71. 肉毒梭菌或肉毒毒素侵入人体的途径主要为
- A. 医源性感染
- B. 经被污染的空气吸入
- C. 经伤口入侵
- D. 节肢动物叮咬
- E. 污染的食物
72. 古希腊医师希波克拉底认为医学有两件东西可以治病，一是语言二是药物，希波克拉底说这句话时处于什么医学模式
- A. 生物医学模式
- B. 生物-心理-社会医学模式
- C. 自然哲学医学模式
- D. 神灵医学模式
- E. 机械医学模式
73. 男，60岁，发现口角歪向右侧伴流涎2小时，查体：神志清楚，言语不清，左侧鼻唇沟消失，闭眼而额纹存在。受累情况是
- A. 左侧面神经核受损
- B. 右侧面神经核受损
- C. 左侧面神经核上瘫
- D. 右侧面神经核上瘫
- E. 左侧面神经受损
74. 食物特殊动力最高的
- A. 脂肪
- B. 蛋白质
- C. 糖类
- D. 维生素
- E. 氨基酸
75. 心理治疗中，医生和患者的桥梁
- A. 互相信任
- B. 医疗技术

- C. 医生与患者的良好关系
- D. 医生的医疗水平
- E. 互相尊重
76. 若已知一份资料中, 18 名成年女子分两组用两种测量肺活量的仪器测最大呼吸率 (L/min), 比较两种方法检测结果有无差别, 可进行
- A. 配对设计的 Z 检验
- B. 成组设计的 t 检验
- C. 配对设计的 t 检验
- D. 成组设计的 Z 检验
- E. q 检验
77. 某大学实行戒烟活动, 开展戒烟班, 规定吸烟者不可领奖学金, 不得参与学生会, 问这种行为属于什么
- A. 健康促进活动
- B. 行为相关活动
- C. 健康引导活动
- D. 健康咨询活动
- E. 卫生指导行为
78. 男, 55 岁, 上腹部胀痛不适 1 月, 加重伴高热呕吐 4 天。六年糖尿病史。发热就诊, 体温 39.5℃, 心率 110 次每分。无黄疸, 腹水。白细胞  $20 \times 10^9/L$ , 中性粒细胞率 0.85。肝区叩击痛, 肝内  $4 \times 4.5 \times 6.5\text{cm}$  脓肿, 与胸膜腔相通。超声引导下穿刺, 培养革兰氏阴性杆菌, 吲哚试验和乳糖发酵试验阳性。考虑可能的感染是哪种
- A. 大肠埃希菌
- B. 痢疾杆菌
- C. 志贺氏菌
- D. 沙门菌属
- E. 脆弱拟杆菌
79. 男性 38 岁, 因骨折外伤入院, 血检 HIV 阳性, 主管医生查房时对其大声询问是否有冶游史, 患者感到愤怒, 在本案例中, 主管医生违背的医学伦理是
- A. 积极对传染病进行防治
- B. 尊重科学, 无私奉献
- C. 进行宣传教育
- D. 保密和隐私原则
- E. 对传染病进行上报和登记
80. 某心理咨询师开了一家心理咨询所, 聘请一位心理治疗师来进行兼职, 卫生部门得知后, 予以心理治疗师处罚, 请问处罚的理由是什么

- A. 未变更执业地点
- B. 擅自予以心理咨询
- C. 未征得原单位同意
- D. 未给予行政部门备案
- E. 注册地点之外的机构开展医疗活动

81. 患者，男性，54岁，慢性咳嗽、咳痰10年，2天前感冒后出现胸闷，呼吸困难，不能平卧，查体体温39°C，颈静脉怒张，心前区可闻及3/6级收缩期吹风样杂音。肝颈静脉回流征(+)，双下肢凹陷性水肿，P2亢进。造成水肿的机制不包括

- A. 抗利尿激素增多
- B. 醛固酮增多
- C. 肾小球滤过率下降
- D. 肾血流量减少
- E. 肾小球滤过分数减小

82. 男，28岁，间歇性上腹痛3年，饥饿时，夜间易发作，进餐后缓解。根据该病的发病机制，影响该症状的主要因素是

- A. 胃酸
- B. 胃蛋白酶原
- C. 组胺
- D. 粘液
- E. 促胃液素

83. 高三男生，18岁，因失恋、月考成绩下降情绪失落、伤心，与同伴去看心理咨询师，心理咨询师询问治疗病情后告诉了他的同伴患者病情，同伴告诉了他的同班同学，大家都知道了患者的病情议论纷纷，造成患者的痛苦。该医生违反了什么原则

- A. 伦理
- B. 患者利益至上原则
- C. 尊重原则
- D. 保密原则
- E. 综合性原则

84. 男，52岁，头部受伤，诊断为硬膜下血肿海脑沟回疝，建议手术，患者自认为病情较轻，拒绝手术并签字，离院后果自负，出院之后再次入院，抢救无效死亡，尸检报告显示颅内出血硬膜下血肿死亡，在此次诊治中，首诊医师的医学伦理原则冲突

- A. 尊重原则与公正原则
- B. 保护原则与有利原则



- C. 公正原则与有利原则
- D. 尊重原则与自保原则
- E. 有利原则与尊重原则

85. 女, 临床表现单侧乳腺肿块, 疑乳腺癌, 发生骨转移和肺转移, 需要做乳腺肿块活检, 行内分泌治疗, 哪项用以确定靶向治疗方案

- A. P25
- B. HER-2
- C. ER
- D. Ki-67
- E. PR

86. 某地新生儿出生身高 55.1cm, 标准差 2.2, 6 岁儿童身高 119.5cm, 标准差 4.3, 比较离散趋势应用

- A. 标准差
- B. 变异系数
- C. 四分位数间距
- D. 极差
- E. 离均差平方和

87. 为了验证黄热病通过蚊虫叮咬传播, 研究组让叮咬过黄热病患者的蚊子叮咬两名研究组成员, 其中一名成员因感染黄热病死亡, 研究组继续招募劳工进行实验, 本案例中, 研究组违反了人的生物医学伦理中的

- A. 伦理审查
- B. 依法赔偿
- C. 免费赔偿
- D. 控制风险
- E. 特殊保护

88. 男, 38 岁, 某钢铁厂煤炉车间平车工, 工作期间头痛, 头晕, 面色潮红, 大量出汗, 脉搏加速, 38℃, 首要救助措施

- A. 按压人中
- B. 灌注清凉饮料
- C. 酒精擦浴
- D. 静脉注射氯丙嗪
- E. 脱离工作环境

89. 某校内一女学生感到最近心情低落, 表情淡漠, 有厌食自杀想法, 主动去找心理医生, 该医生给予的评估下列哪种最合适

- A. WISC

B. EPQ

C. MMPI

D. 16-PF

E. SDS

90. 患儿，男，1岁，既往肩难产史。头颈部左偏，面向左侧，颈向右侧，导致该现象的肌肉是

A. 前斜角肌

B. 后斜角肌

C. 胸锁乳突肌

D. 颈阔肌

E. 斜方肌

91. 男童，进食蚕豆后出现恶心、乏力，酱油色尿，尿RBC(-)，既往有蚕豆病病史，发现葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏，该酶缺乏主要导致什么物质生成减少

A. NADPH

B. ATP

C. cAMP

D. NADP

E. FAD

92. 某孕妇，妊娠26周，患有高血压，今近日突发腹痛，阴道流血，查体：皮肤瘀斑，血小板 $60 \times 10^9/L$ ，无法凝血，请问机制不包括下列哪项

A. 单核巨噬细胞吞噬

B. 血小板大量损耗

C. 纤维蛋白溶解产物增加

D. 纤维蛋白原溶解增加

E. 凝血因子消耗

93. 来工地调查传染病发病率，该工地三组人，每组人数600人，肠道传染病20%，乙肝10%，呼吸道传染病2%，该工地传染病的患病率为

A. 0.2

B. 0.05

C. 0.1

D. 0.26

E. 0.9

94. 研究生，晚自习后，因失恋，同时课题研究受阻，精神崩溃，生活的困扰情绪低落，有自杀念头，告知了自己的好朋友，此时应立即采取的措施是

- A. 电话心理咨询
- B. 门诊心理咨询
- C. 社会心理咨询
- D. 团体咨询
- E. 面对面心理咨询

95. 张某在接种某疫苗后发生残疾，经查该疫苗质量合格，接种过程符合规范，张某依法获得赔偿，赔偿他的机构是

- A. 省级医疗管理部门
- B. 为其接种的工作人员
- C. 为其接种的机构
- D. 疫苗上市许可持有人
- E. 省级财政部门

96. 某乡 4 万人，约 1 万户，欲抽其 1/10 人口进行某病调查。随机抽取第 1 户，随后每隔 4 户抽取 1 户，抽到户的每个成员均进行调查。这种抽样方法称为

- A. 分层抽样
- B. 系统抽样
- C. 整群抽样
- D. 简单抽样
- E. 多级抽样

97. 女性患者，因腹痛，反酸来院就诊，胃镜检查提示：十二指肠前部溃疡，快速尿素酶实验阳性，关于该病的致病菌，下列说法正确的是

- A. 需联合药物治疗
- B. 革兰染色阳性
- C. 营养要求不高
- D. 厌氧菌
- E. 生化反应活跃

98. 完全随机的样本分析中，样本总数 30，分为 3 组，每组的组内变异自由度是多少

- A. 2
- B. 3
- C. 29
- D. 27
- E. 26

99. 男，35 岁，排尿烧灼样疼痛伴尿频 3 日，尿道口大量分泌物，晨起尿道口有脓痂。有不洁性生活史。查体尿道

外口有大量脓性分泌物，龟头和阴茎红肿。该病原菌是

- A. 阴道毛滴虫
- B. 淋病奈瑟氏菌
- C. 白假丝酵母
- D. 梅毒螺旋体
- E. 人类支原体

100. 一单位发生食物中毒，部分职工吃过一家快餐，症状为面色潮红，胸痛，胸闷，心慌，恶心，呕吐。经询问，快餐内有“青皮红肉鱼”。请问中毒的原因为

- A. 氰苷
- B. 龙葵素
- C. 组胺
- D. 亚硝酸盐
- E. 组氨酸

101. 男，51岁，父母双亡，未婚，发生车祸后送医就诊，经抢救无效脑死亡，其三个外甥与主治医生商量后决定捐献该患者心脏、肾脏等器官，下列说法正确的是

- A. 主治医生可自行摘取患者器官
- B. 脑死亡患者不能捐献器官
- C. 未婚患者不能捐献器官
- D. 外甥无权捐献该患者器官
- E. 器官捐献需经患者本人同意

102. 男性，43岁，在工地从高处坠落昏迷，工友送至附近医院抢救，接诊医生全力抢救，未及时书写病历，抢救结束后，接诊医生在规定时限之内据实补记病历，请问该时限为

- A. 2小时
- B. 4小时
- C. 6小时
- D. 8小时
- E. 12小时

103. 女婴，8个月，发热，烦躁1天，T38.7℃，P160次/分，R35次/分，BP80/62mmHg，神差，呼吸急促，左肺底可闻及湿啰音，心音低钝，腹膨隆，四肢皮温低，可见大理石纹。WBC $19 \times 10^9/L$ ，N0.85，X线左下肺片状影，请问休克类型是

- A. 心源性休克
- B. 感染性休克
- C. 神经源性休克

D. 低血容量性休克

E. 过敏性休克

104. 患者从卧位转为立位时，血压 80/60mmHg，心率 115 次/分，其机制为

A. 主动脉神经传入冲动减少，心交感传出增强

B. 主动脉神经传入冲动减少，心交感传出减少

C. 窦神经传入冲动减少，心交感传出增强

D. 窦神经传入冲动减少，心迷走传出增强

E. 窦神经传入冲动增强，心迷走传出增强

105. 冬季，某居民在家用煤气热水器洗澡时晕倒，皮肤黏膜呈樱桃红色，引起该症状最可能的气体是

A. CO

B. CO<sub>2</sub>

C. NH<sub>3</sub>

D. SO<sub>2</sub>

E. NO

106. 男童，初中，离异家庭，住寄宿学校，一上学就腹痛，就医过程中症状缓解，查体无器质性改变，该患者可能

A. 精神性疾病

B. 感染性疾病

C. 神经性疾病

D. 心身障碍

E. 自身免疫性疾病

107. 男，70 岁，体检发现肝脏占位 1 周。既往 HbsAg 阳性 40 年，B 超发现。肝脏左叶占位，直径 8cm，有腹水，血 AFP 明显增高，肝活检增生细胞成片状，血窦丰富，细胞体积大，胞浆丰富，核大，核仁明显，核分裂象易见，病理诊断

A. 肝细胞腺瘤

B. 肝细胞癌

C. 胆管细胞癌

D. 海绵状血管瘤

E. 肝硬化

108. 男，25 岁，外伤输血治疗 1 小时，出现寒战，高热，心悸，气短，酱油色尿，尿隐血（+++），尿红细胞（-），发生上述临床症状的主要免疫学基础是

A. 中性粒细胞吞噬导致红细胞破坏

B. 补体激活导致红细胞溶解

C. NK 细胞裂解红细胞

D. CTL 细胞杀伤红细胞

E. 巨噬细胞吞噬导致红细胞破坏

109. 男，30 岁，寒战，高热，咳铁锈色痰 3 天，加重 1 天，查体右下肺可闻及湿罗音，痰培养：肺炎链球菌（+），影像学提示右下肺野大片致密阴影。右肺病灶处肺泡腔内的主要成分是

A. 浆液和红细胞

B. 中性粒细胞和纤维素

C. 纤维素和红细胞

D. 浆液和巨噬细胞

E. 淋巴细胞和纤维素

110. “入芝兰之室，久而不闻其香”说明的是

A. 感觉适应

B. 感觉减退

C. 感觉相互作用

D. 感觉过敏

E. 疲劳

111. 男，20 岁，在某社区卫生服务中心住院治疗几日，因病情未好转，要求转入上级医疗机构继续治疗，在办理转院手续时，患者以未得到有效治疗为由，拒绝支付全部医疗费用，仅同意支付药费和护理费，下列对该案例的分析表述正确的是

A. 以疗效支付是患者的正当权利

B. 给付医疗费是患者应尽的义务

C. 社区医院应减少患者部分费用

D. 患者对服务不满意可拒绝支付

E. 医院应当按患者经济水平收费

112. 女，43 岁，甲状腺肿大 30 年，近 3 年自觉压迫气管，2-3 度肿大，行手术治疗，术后病理显示大小结节，细胞大小不一，上皮扁平，滤泡细胞内充满胶质，如何治疗？

A. 左甲状腺素长期服用

B. 糖皮质激素

C. 补充甲状腺激素

D. 氢化可的松静脉滴注

E. 头孢呋辛

113. 某志愿者在社区宣传戒烟活动，与陈某沟通，陈某 34 岁，吸烟 15 年，每天 20 支，他说认识戒烟的各种危害，但是不觉得吸烟会对自己造成伤害，根据“5R”法，我们应该进一步选择什么

- A. 相关性
- B. 益处
- C. 反复
- D. 障碍
- E. 风险

114. 某社区为早期发现血吸虫患者，对 600 名 5-65 岁的自然人群进行粪便收集，采用一种简便、快速的方法进行检测，对阳性人群再进行确诊检查，这种方法是

- A. 筛检
- B. 研究
- C. 抽查
- D. 调查
- E. 确诊

115. 女性，55 岁，一小时前服用农药“乐果”，半小时后出现腹痛，恶心，呕吐，昏迷，呼吸呕吐有大蒜味，还有的表现为

- A. 骨骼肌震颤
- B. 瞳孔扩大
- C. 出汗减少
- D. 气道分泌物减少
- E. 唾液分泌减少

116. 男，75 岁，咳嗽、咳痰 1 月，入院检查，发现右肺门靠上一  $5\text{cm} \times 4\text{cm}$  大小肿物，边界不清，该肿物最可能压迫的部位是

- A. 副半奇静脉
- B. 右头臂静脉
- C. 右锁骨下静脉
- D. 半奇静脉
- E. 奇静脉

117. 女性，33 岁，外阴瘙痒，刺痛伴灼热感 3 天，发热 1 天，停经 30 周 G1P0，妇科检查：外阴散在 10 余直径  $0.2 \sim 0.5\text{cm}$  疱疹，部分破溃呈脓疱，最可能感染病原体及潜伏部位

- A. HSV-1 骶神经节
- B. HSV-2 骶神经节
- C. VZV 脊髓后根神经节
- D. HSV-2 三叉神经节
- E. HSV-1 三叉神经节

118. 女, 30 岁, 发现怀孕后到县妇幼保健院做孕检, 接诊医生检查后发现该患者合并妊娠严重并发症, 现在首诊医生依法提供的医学行为是

- A. 基因治疗
- B. 终止妊娠
- C. 给出指导意见并完善相关检查
- D. 指导妊娠和胎儿保健
- E. 产前诊断

119. 某患者因职业伤害到医院进行职业病诊断, 经过诊疗后该患者所患疾病被认定为职业病, 该医疗机构为其出具了正规职业病诊断证明。请问谁有权在职业病诊断证明上签字?

- A. 医务科科长
- B. 该医院医务部负责人
- C. 科主任
- D. 该病人诊断医生且具有职业病诊断资格的人
- E. 该病人诊断医生及病人

120. 某研究员, 研究某地 500 名八岁儿童的体重跟身高的关系, 所用的统计图为

- A. 直方图
- B. 直条图
- C. 散点图
- D. 线图
- E. 圆图

121. 女, 48 岁, 在体检时发现 HBsAg 阳性, 平时无不适, 检查无异常, 穿刺活检, 肝细胞质不透明, 可见肝内颗粒状小体, 这种颗粒状小体被称为

- A. 毛玻璃样肝细胞
- B. 气球样变肝细胞
- C. 嗜酸性样肝细胞
- D. 嗜酸性小体
- E. 点状坏死肝细胞

122. 某男, 20 岁, 3 月 1 日, 与正在发热的母亲进餐, 3 月 3 日母亲被确诊为新冠肺炎患者, 对男子采取的措施是:

- A. 自我健康检测
- B. 给予口服预防药物
- C. 隔离治疗
- D. 隔离观察
- E. 注射丙种球蛋白



123. 男, 65 岁, 排尿延长、夜尿增多 2 年余, 加重 3 月, 排尿细碎、无力, 盆腔 B 超: 前列腺增大, 突入膀胱。

该病变的部位位于

- A. 前列腺周围带
- B. 前列腺移行区
- C. 射精管
- D. 尿道
- E. 纤维肌层

124. 男, 56 岁。突发患者右上腹痛 1 天, 曾有胆囊泥沙样结石, 现影像学肝内外胆管未见明显异常, 胆囊肿大明显, 最可能的梗阻部位是

- A. 肝左管
- B. 肝右管
- C. 胆囊管
- D. 胆总管
- E. 肝总管

125. 男, 28 岁, 因间质性肾炎。需要进行肾脏移植, 其兄自愿捐赠, 体检后肾脏符合移植标准, 但左肾功能较右肾功能稍差, 其主治医师评估后将其左肾移植给患者, 主治医师决策依据的原则是

- A. 自愿
- B. 患者健康至上
- C. 唯一性
- D. 保护供者
- E. 知情同意

126. 女, 26 岁, 妊娠 25 周, 1 型糖尿病, 孕检未检测血糖。现恶心呕吐昏迷, PH7.18, PaCO<sub>2</sub>20mmHg, 导致患者酸中毒的原因

- A. 尿酸增加
- B. 乳酸增加
- C. 丙酮酸增加
- D. 酮体增加
- E. 转氨酶增加

127. 儿童, 查体: 毛发银白色, 毛发稀疏, 皮肤白, 瞳孔色浅, 请问该患儿缺乏哪种酶

- A. 组氨酸脱羧酶
- B. 半胱氨酸蛋白酶
- C. 色氨酸羟化酶
- D. 酪氨酸酶

E. 苯丙氨酸羟化酶

128. 某化工厂因意外事故出现氮氧化合物泄漏，造成楼下居民咳嗽、胸闷、面色发红，治疗转运过程中，最应该预防居民出现的意外是

- A. 窒息
- B. 肺气肿
- C. 休克
- D. 急性中毒性肺水肿
- E. 硅肺

129. 婴儿，五月龄，足月顺产。近日来，夜间出汗，烦躁不安。体检发现枕秃。颅骨体检触及乒乓球触感，该婴儿最有可能缺乏的维生素是

- A. 维生素 A
- B. 铁
- C. 维生素 C
- D. 维生素 D
- E. 锌

130. 男性，36 岁，婚后 2 年无子，有性生活，未避孕。既往有睾丸外伤史，免疫学检查出精液抗精子抗体（+）。问抗精子抗体产生的机制是

- A. 抗原抗体交叉反应
- B. B 细胞克隆抗体
- C. 隐蔽性抗原释放
- D. 表位抗原扩展
- E. 自身抗原反应

131. 某医师欲开办诊所，在申请诊所程序的过程中租借李某医师诊所的《医疗机构职业许可证》，因雇佣的护士操作不当致使一名患者死亡，那么李某出借许可证的行为需要承担的法律责任。

- A. 罚款
- B. 警告
- C. 吊销执业证
- D. 训诫
- E. 暂扣许可证

132. 男，28 岁。潜水后四肢肌肉及关节疼痛三天。三天前潜水时发现呼吸器故障。立刻快速上升出水。随即出现眩晕定向力障碍，恶心呕吐等症状，休息及吸氧后症状缓解，但持续性四肢肌肉痉挛、抽搐疼痛及关节痛。该患者疼痛的最可能原因是

- A. 慢性炎症细胞浸润

- B. 应激性溃疡
- C. 局部组织凝固性坏死
- D. 血液中二氧化碳浓度升高
- E. 血管腔内气泡栓塞

133. 工地工人，从 3 楼跌下，由 120 转上级医院治疗一路上脑海中不断浮现坠落时的情形并情绪激动不断大声描述，这种记忆属于

- A. 机械识记
- B. 有意识记
- C. 无意识记
- D. 逻辑识记
- E. 创伤性应激

134. 男性，15 岁，发现多饮，多尿，多食 1 月余，血压 130/80mmHg，尿糖++++，患者多尿的原因是

- A. 肾小管内液体渗透压增高
- B. 肾滤过率降低
- C. 抗利尿激素减少
- D. 醛固酮增多
- E. 抗利尿激素增多

135. 食管癌发病危险因素的病例对照被研究时，为减少因研究对象回忆不准确而收集错误，应使用以下哪种信息

- A. 现患病例
- B. 死亡病例
- C. 现存病例
- D. 住院病例
- E. 新发病例

136. 女，42 岁，孕 39+2 周，患 1 型糖尿病 5 年，宫高腹围及 B 超估算胎儿体重 4500 克，巨大胎儿的原因为

- A. 高胰岛素促进蛋白和脂肪合成，抑制脂肪分解
- B. 高胰岛素促进蛋白合成，促脂肪分解
- C. 高胰岛素促进蛋白和脂肪合成，促进脂肪分解
- D. 高胰岛素促进蛋白和脂肪合成，促蛋白分解
- E. 高胰岛素促脂肪合成，蛋白质分解

137. 女，43 岁，甲状腺肿大 30 年，近 3 年自觉压迫气管，2-3 度肿大，行手术治疗，术后病理显示大小结节，细胞大小不一，上皮扁平，滤泡细胞内充满胶质，最可能的诊断为

- A. 甲状腺乳头状癌
- B. 甲状腺滤泡性腺瘤

- C. 单纯性甲状腺肿
- D. 桥本氏甲状腺炎
- E. 甲状腺髓样癌

138. 爱因斯坦说“在我的思维结构中，书面的或口头的文字似乎不起任何作用，作为思维元素的心理的东西是一些记号和有一定明晰程度的意向，由我随意的再生和组合”。这体现了思维种类是

- A. 发散思维
- B. 动作思维
- C. 形象思维
- D. 抽象思维
- E. 聚合思维

139. 患者男，30 岁，肾移植术后一年，服用泼尼松和他克莫司治疗，发热，查 WBC $6.5 \times 10^9/L$ ，N $5 \times 10^9/L$ ，L $0.8 \times 10^9/L$ ，巨细胞病毒 DNA 阳性。患者容易被感染是因为

- A. 补体功能缺陷
- B. B 细胞被抑制
- C. 中性粒细胞亢进
- D. T 细胞被抑制
- E. 巨噬细胞被抑制

140. 男，工地外伤，多根多处肋骨骨折，呼吸时可见胸廓反常呼吸运动，现场急救最佳处理措施

- A. 厚敷料加压包扎
- B. 胸腔穿刺术
- C. 胸腔闭式引流术
- D. 胸廓固定
- E. 镇痛，对症处理

141. 男，70 岁。乏力、腰痛半个月。既往体健。查体：轻度贫血貌，第 2~4 腰部压痛。实验室检查 Hb $50g/L$ ，WBC $5.6 \times 10^9/L$ ，Plt $156 \times 10^9/L$ 。血清总蛋白 $108g/L$ ，白蛋白 $30g/L$ ，血肌酐 $187\mu mol/L$ 。骨髓细胞学检查示骨髓中异常浆细胞占 0.45。腰椎 X 线片示第 2 腰椎压缩性骨折。为进一步明确诊断，下一步最需要做的检查是

- A. 血清  $\beta_2$  微球蛋白测定
- B. 尿本周蛋白测定
- C. 尿常规
- D. 血清钙测定
- E. 血清 M 蛋白及免疫球蛋白

142. 男，25 岁，过量饮酒后，被同桌酒友送到医院，在未支付医疗费的情况下，匆忙离开医院，医院无法联系到患者的家人。此时，患者血压下降，面色苍白，皮肤湿冷，瞳孔散大。经首诊医师初步判断，为急性酒精中毒，

经全力抢救后，患者已经转危为安了。需要遵循的急诊抢救原则是

- A. 分秒必争的抢救患者
- B. 满足心理需求
- C. 遵从社会公益
- D. 患者家属知情同意
- E. 团结协作

143. 男，25 岁，过量饮酒后，被同桌酒友送到医院，在未支付医疗费的情况下，匆忙离开医院，医院无法联系到患者的家人。此时，患者血压下降，面色苍白，皮肤湿冷，瞳孔散大。经首诊医师初步判断，为急性酒精中毒，经全力抢救后，患者已经转危为安了。此时的医疗模式是

- A. 共同参与型
- B. 主动-被动型
- C. 主动合作型
- D. 指导参与型
- E. 指导合作型

144. 男，25 岁，过量饮酒后，被同桌酒友送到医院，在未支付医疗费的情况下，匆忙离开医院，医院无法联系到患者的家人。此时，患者血压下降，面色苍白，皮肤湿冷，瞳孔散大。经首诊医师初步判断，为急性酒精中毒，经全力抢救后，患者转危为安。关于实施抢救说法，正确的是

- A. 再到当地公安局备案后
- B. 在经过主任医师同意后
- C. 在医院授权的负责人批准后
- D. 联系到患者家属后
- E. 找到酒友后

145. 一高中女生 18 岁，因乳房刺痛来医院就诊，诊室内除了一个女医生外还有一个男医学生，当询问病情时女生犹豫不回答，女医生在让男医学生回避后再次耐心询问，女医生让男医学生回避后才对患者进行问诊和查体是实现了伦理学中的哪项原则

- A. 不伤害原则
- B. 尊重原则
- C. 有利原则
- D. 公正原则
- E. 保密原则

146. 一高中女生 18 岁，因乳房刺痛来医院就诊，诊室内除了一个女医生外还有一个男医学生，当询问病情时女生犹豫不回答，女医生在让男医学生回避后再次耐心询问，女医生在诊疗过程中体现了

- A. 体贴关心，充分尊重

- B. 过程耐心
- C. 心正无私，正确引导
- D. 全面系统，认真仔细
- E. 态度热情

147. 一高中女生 18 岁，因乳房刺痛来医院就诊，诊室内除了一个女医生外还有一个男医学生，当询问病情时女生犹豫不回答，女医生在让男医学生回避后再次耐心询问，女医生让患者实现的权利是

- A. 个人隐私权
- B. 人身自由权
- C. 知情同意权
- D. 平等就医权
- E. 自主决定权

148. 为了解病毒性肝炎在某地区的分布情况，研究者于 2019 年 7 月进行抽样调查部分结果如下，共调查 10000，男 6000 人女 4000 人，发现患者 1000 人，女性 300 人（乙肝 200 例，丙肝 50 例，其他 50 例），调查还发现在 600 例乙肝患者中有 300 例是 2019 年新发。该研究方法为

- A. 分析性
- B. 理论性研究
- C. 描述性研究
- D. 实验性研究
- E. 生态学研究

149. 为了解病毒性肝炎在某地区的分布情况，研究者于 2019 年 7 月进行抽样调查部分结果如下，共调查 10000，男 6000 人女 4000 人，发现患者 1000 人，女性 300 人（乙肝 200 例，丙肝 50 例，其他 50 例），调查还发现在 600 例乙肝患者中有 300 例是 2019 年新发。该地区女性乙肝患病率为

- A. 200/10000
- B. 350/1000
- C. 300/1000
- D. 200/4000
- E. 无法计算

150. 为了解病毒性肝炎在某地区的分布情况，研究者于 2019 年 7 月进行抽样调查部分结果如下，共调查 10000，男 6000 人女 4000 人，发现患者 1000 人，女性 300 人（乙肝 200 例，丙肝 50 例，其他 50 例），调查还发现在 600 例乙肝患者中有 300 例是 2019 年新发。男性病毒性肝炎新发病率为

- A. 700/6000
- B. 650/6000
- C. 300/6000

D. 400/1000

E. 无法计算

## 第二单元

1. 需要“严格管理”的传染病疾病是
  - A. 鼠疫
  - B. 霍乱
  - C. 流行性腮腺炎
  - D. 艾滋病
  - E. 麻风
2. 蛋白质-能量营养不良症伴腹泻出现的临床表现中，不包括
  - A. 低钾血症
  - B. 低钙血症
  - C. 碱中毒
  - D. 低钠血症
  - E. 脱水
3. 缺血性脑梗塞和出血性脑梗塞最重要的鉴别是
  - A. 头疼
  - B. 意识障碍
  - C. 脑电图
  - D. 安静时突发
  - E. 颅脑 CT
4. 男，65 岁，3 月前有头部外伤史，现头痛，并逐渐出现左侧肢体无力，头颅 CT 示右顶枕新月形低密度影，最可能的诊断是
  - A. 硬膜下血肿
  - B. 硬膜外血肿
  - C. 脑出血
  - D. 脑水肿
  - E. 脑梗死
5. 与人争吵后突然倒地，首先判断
  - A. 意识
  - B. 呼吸
  - C. 桡动脉搏动
  - D. 血压
  - E. 股动脉搏动
6. 再生障碍性贫血确诊的细胞学检查是



- A. 骨髓活检
- B. 骨髓细胞学检查
- C. 血常规
- D. 外周血涂片
- E. 脑脊液
7. 男, 74 岁, 争吵中起病, 血压 80/60mmHg, 双肺湿啰音, 咳泡沫痰, 无双下肢水肿, 患者最可能的诊断是
- A. 急性左心衰
- B. 急性右心衰
- C. 全心衰
- D. 慢性心衰
- E. 支气管扩张
8. 女, 89 岁, 坠落伤, T12 压缩 1/3~3/4, 保守治疗一月未见好转, 下一步治疗
- A. 前位椎体置换
- B. 经皮胸背段支架固定
- C. 经皮穿刺椎体成形术
- D. 切开复位钢钉固定
- E. 继续卧床制动
9. 男性, 73 岁, 多年高血压, 糖尿病病史, 主动脉瓣第二听诊区可闻及舒张期吹风样递减型杂音, 瓣膜病应为
- A. 退行性
- B. 风湿性
- C. 先天性
- D. 感染性
- E. 自身免疫性
10. 患者因胸痛来院就诊, 既往有上感史, 心电图检查提示: 除 aVR 外, 多导联 ST 段弓背向下型抬高。听诊: 心前区摩擦音, 抓刮样粗糙音, 最可能的诊断为
- A. 感染性心内膜炎
- B. 急性心梗
- C. 急性心包炎
- D. 主动脉夹层
- E. 心肌梗死后综合征
11. 儿童受伤后右手掌着地, 右肘部肿胀, 肘后三角正常, 骨皮质不连续, 右手指皮肤苍白发凉, 损伤的部位是
- A. 正中神经损伤
- B. 缺血性肌挛缩

C. 肱动脉损伤

D. 骨筋膜室综合征

E. 桡神经损伤

12. 男性, 62 岁, 尿频尿急尿痛, 伴尿道内不适 1 年余, 近日晨起排尿终末可见尿道口滴白, 会阴部胀痛, 下腹按压痛、无反跳痛。患者最可能的诊断为

A. 慢性前列腺炎

B. 泌尿系结核

C. 膀胱炎

D. 肾癌

E. 膀胱结石

13. 男, 50 岁。出现冻结肩, 活动受限, 以下处理哪一个是对的

A. 理疗

B. 肩关节固定

C. 热敷

D. 消炎

E. 锻炼

14. 男, 41 岁, 高热一个月, 肝区疼痛半年。超声检查发现肝区多发小结节, 大小 1-2cm。血常规 WBC  $13.4 \times 10^9/L$ , NO.83, 肝穿刺见黄白相间条索状物, 可见脓细胞和脓球, 质软。该患者可能的诊断是

A. 慢性肝炎导致肝硬化

B. 肝脓肿

C. 亚急性重症肝炎

D. 肝细胞癌

E. 肝胆管细胞癌

15. 男, 56 岁, 突发胸闷心悸 3 小时, 血压 80/50mmHg, 心率 200 次/min, 查体: 心律齐, 四肢湿冷, 心电图示宽大 QRS 波, 心动过速, 需立即进行的处理是

A. 静脉注射胺碘酮

B. 静脉注射利多卡因

C. 静脉注射西地兰

D. 静脉注射维拉帕米

E. 同步直流电复律

16. 患者急性阑尾炎手术, 医生术后发现手上有伤口, 患者血化验示抗 HIV (+), 请问医生需要处理的是

A. 抗生素治疗

B. 免疫球蛋白治疗

C. 抗病毒药治疗

D. 输液

E. 观察

17. 男, 45 岁, 2 天前饮用啤酒后出现右足疼痛, 第一跖趾关节红、肿、热、痛, 功能受限, 触痛明显。既往痛风、高脂血症, 肾功能不全, 入院后见局部发红, 查尿酸  $624 \mu\text{mol/L}$ , 当前应予以的治疗是

A. 复方倍他米松注射液

B. 秋水仙碱

C. 甲氨蝶呤

D. 苯溴马隆

E. 非布司他

18. 男, 35 岁, 右下肢疼痛 1 年, 抬高右下肢  $75^\circ$ , 一分钟后下肢皮肤苍白, 再让其下肢垂于床沿, 大约 1 分钟后, 下肢皮肤颜色回复正常。该检查结果显示

A. Buerger 实验阳性

B. Trendelenburg 实验阳性

C. Lasegue 实验阳性

D. Perthes 实验阳性

E. Pratt 实验阳性

19. 中年男性, 口唇疱疹, 发热, 头痛, 神经系统症状, 脑脊液检查提示淋巴细胞升高, 蛋白轻度升高, 糖含量正。考虑诊断为

A. 结核性脑膜炎

B. 单纯疱疹病毒性脑炎

C. 化脓性脑膜炎

D. 中毒性脑膜炎

E. 乙型脑炎

20. 男性, 75 岁, 左侧腹股沟肿块 3 天, 绞痛 2 天, 查体左侧腹股沟可触及包块, 呈半球形, 按压可还纳, 后又复出, 诊断是

A. 腹股沟斜疝

B. 股疝

C. 腹股沟直疝

D. 切口疝

E. 脂肪瘤

21. Wernicke 脑病是由于缺乏哪种维生素所致

A. 维生素  $B_1$

- B. 维生素 B
- C. 维生素 B6
- D. 维生素 A
- E. 维生素 C
22. 男性, 31 岁, 一周前上呼吸道感染, 受凉后出现低热, 胸段脊椎痛, 胸段下瘫痪, 最可能的诊断是
- A. 急性脊髓炎
- B. 脊髓压迫症
- C. 周期性瘫痪
- D. 重症肌无力
- E. 放射性脊髓病
23. 高血压合并慢性阻塞性肺疾病, 血压需要控制在
- A. 140/90mmHg
- B. 150/90mmHg
- C. 130/80mmHg
- D. 140/80mmHg
- E. 130/90mmHg
24. 男, 40 岁, 突发心脏骤停, 经心肺复苏后, 呼吸逐渐恢复, 血压 85/60mmHg, 有休克, 心率 34 次/分, 首选治疗用药为
- A. 肾上腺素
- B. 去甲肾上腺素
- C. 异丙肾上腺素
- D. 多巴胺
- E. 阿托品
25. 减轻梗阻性肥厚型心肌病的左心室流出道梗阻可以使用的药物是
- A.  $\beta$  受体阻滞剂
- B. 硝酸甘油
- C. 地高辛
- D. 异丙肾上腺素
- E. 去甲肾上腺素
26. 踝关节稳定性差, 易于发生损伤的体位是
- A. 跖屈位
- B. 背屈位
- C. 内翻位

- D. 外翻位
- E. 中立位
27. 髋关节前脱位最典型的临床表现是
- A. 伸直，外展，外旋畸形
- B. 屈曲，外旋，外展畸形
- C. 屈曲，内收，内旋畸形
- D. 伸直，外展，内收畸形
- E. 屈曲，内收，外旋畸形
28. 不符合肾小球源性血尿的是
- A. 可有红细胞管型
- B. 无痛
- C. 合并大量蛋白尿
- D. 变形红细胞为主
- E. 红细胞呈均一性
29. 氨茶碱舒张支气管平滑肌的作用机制是
- A. 阻断 M 受体
- B. 激动  $\beta$  受体
- C. 激动腺苷受体
- D. 抑制磷酸二酯酶
- E. 激活鸟苷酸环化酶
30. 下列符合梗阻性肥厚型心肌病的重要诊断是
- A. 一过性晕厥和黑朦不适
- B. 心电图提示左室高电压与 T 波倒置，有病理性 Q 波
- C. 感胸闷不适
- D. 超声心动图示舒张期室间隔与左室后壁厚度之比 $>1.5$ ，二尖瓣前叶收缩期向前运动
- E. 可闻及胸骨左缘 2~4 肋间舒张期杂音
31. 钩端螺旋体病哪一型肾衰是最主要的死亡原因
- A. 肾衰竭型
- B. 黄疸出血型
- C. 肺出血型
- D. 单纯型
- E. 脑膜脑炎型
32. 下列属于不完全性骨折的是

- A. 横形骨折
  - B. 裂缝骨折
  - C. 压缩性骨折
  - D. 螺旋形骨折
  - E. 嵌插骨折
33. 我国提倡的献血制度是
- A. 光荣献血制度
  - B. 义务献血制度
  - C. 强制献血制度
  - D. 无偿献血制度
  - E. 自愿献血制度
34. 患囊尾蚴病的原因是进食了
- A. 裂头蚴
  - B. 猪带绦虫卵
  - C. 猪带绦虫幼虫
  - D. 牛带绦虫幼虫
  - E. 牛带绦虫卵
35. 下列选项中，不属于肿瘤靶向药物控制的是
- A. 甲氨蝶呤
  - B. 全反式维 A 酸
  - C. HER-2
  - D. 硼替佐米
  - E. 利妥昔单抗
36. 烧伤后铜绿假单胞菌感染，抗生素治疗首选
- A. 红霉素
  - B. 青霉素
  - C. 美西律
  - D. 甲氧苄啶（二氢还原酶抑制剂）
  - E. 头孢他啶
37. 下尿路梗阻最严重的并发症是
- A. 尿路结石
  - B. 尿路感染
  - C. 尿路积水

- D. 肾衰竭
- E. 尿外渗
38. 下列选项中，不具有内分泌功能的细胞是
- A. 肾上腺髓质细胞
- B. 甲状旁腺主细胞
- C. 胰腺导管细胞
- D. 甲状腺滤泡上皮细胞
- E. 睾丸间质细胞
39. 感染性心内膜炎合并心衰最常损伤的部位是
- A. 室间隔内侧壁
- B. 二尖瓣
- C. 三尖瓣
- D. 肺动脉瓣
- E. 主动脉瓣
40. 关于运动系统慢性损伤，不正确的是
- A. 生理性或结构性异常，应力均匀
- B. 操作技术不熟练
- C. 长期慢性损伤
- D. 超越人体局部代偿
- E. 急性损伤后未得到正确的康复
41. 对于甲状腺破坏所导致的甲状腺毒症，下列实验室检查正确的是
- A. 甲状腺肿大
- B. 血 T<sub>3</sub>、T<sub>4</sub> ↑，甲状腺摄<sup>131</sup>I（碘 131）率明显升高
- C. 血 T<sub>3</sub>、T<sub>4</sub> ↑，甲状腺摄<sup>131</sup>I（碘 131）率明显降低
- D. TSH 明显降低
- E. TgAb 与 TPOAb 明显升高
42. 哪种疾病外周血中性粒细胞碱性磷酸酶积分常呈阴性结果
- A. 骨髓纤维化
- B. 细菌性肺炎
- C. 慢性髓系白血病
- D. 急性淋巴细胞白血病
- E. 类白血病反应
43. 成人心肺复苏的顺序是

A. ABC

B. ACB

C. CAB

D. CBA

E. BAC

44. 诊断休克失代偿期必备的条件是

A. 脉率 $>90$ 次/分

B. 收缩压 $<90$ mmHg

C. 脉压 $<20$ mmHg

D. 谵妄

E. 四肢末梢皮肤湿冷

45. 以一级动力学消除的某药物，其半衰期为 8h，若按照恒定剂量每隔一个半衰期给药，达到稳态血药浓度所需的时间为

A. 10 小时

B. 20 小时

C. 30 小时

D. 40 小时

E. 50 小时

46. 下列属于稳定型（劳力性）心绞痛症状的是

A. 开始运动时心前区疼痛，行走 5 分钟后缓解

B. 搬重物感心前区针刺样疼痛，伴呼吸困难

C. 骑自行车上坡时感心前区疼痛，休息 5 分钟自行缓解

D. 夜间呼吸困难，坐位缓解

E. 休息时，突发心前区针扎样刺痛，持续半小时左右，服用硝酸甘油后缓解

47. 顽固性高血压最常见于

A. 高龄

B. 遗传

C. 病程长

D. 体位性

E. 未规律服药

48. 如何鉴别中枢性尿崩和肾性尿崩

A. 查血浆浓度和尿渗透压

B. 查尿渗透压和尿钠



- C. 禁饮水实验
- D. 加压素实验
- E. 测定尿渗透压和比重
49. 不稳定型心绞痛与急性非 ST 段抬高型心肌梗死的鉴别
- A. 超声心动图
- B. ST 段抬高
- C. 冠状动脉造影
- D. 持续时间
- E. 肌钙蛋白
50. 患者一氧化碳中毒，被人发现时处于昏迷状态，主要损伤的脏器为
- A. 胃肠
- B. 肝
- C. 肺
- D. 肾
- E. 脑
51. 男，35 岁，风湿性心脏病及感染性心内膜炎病史五年，无发热，无活动下胸闷、夜间阵发性呼吸困难、上下肢水肿。患者近期需要拔牙，应该进行的处置是
- A. 无需用药，择期手术
- B. 术前抗风湿治疗三个月
- C. 术前三个月行瓣膜置换手术
- D. 术前口服阿莫西林
- E. 术前加强强心、利尿、扩血管治疗
52. 患者男，45 岁，腰椎挫伤后出现排尿困难 10 年。加重伴排尿中断，间断血尿 1 年。中断症状在改变体位后可继续排尿，首选的治疗措施是
- A. 经尿道膀胱肿瘤内切术
- B. 经尿道前列腺切除术
- C. 经尿道膀胱结石碎石术
- D. 抗结核治疗
- E. 经尿道腺性膀胱炎电切术
53. 男，65 岁，发现高血压数年，最高血压 190/100mmHg，平日血压可控制在收缩压 150~160mmHg，舒张压 90~100mmHg，平时吸烟喝酒，血脂高，有糖尿病史 20 年，应为高血压几级
- A. 高血压 2 级，很高危
- B. 高血压 3 级，很高危

- C. 高血压 1 级，很高危
- D. 高血压 2 级
- E. 高血压
54. 男，20 岁，腹泻 1 天，呈水样便，无腹痛、无里急后重，心率 110 次/分，血压 85/45mmHg，其他检查正常，此时的处理为
- A. 口服补液
- B. 快速静脉补液
- C. 糖皮质激素治疗
- D. 缓慢静脉补液治疗
- E. 观察
55. 男孩 4 岁，1 小时摔倒后右肩部疼痛，查体头向右侧偏斜，右肩下沉，右侧上肢活动障碍，皮肤出现淤血，Dugas 征阴性。最可能诊断是
- A. 锁骨骨折
- B. 正中神经损伤
- C. 桡骨头半脱位
- D. 肘关节脱位
- E. 肩关节脱位
56. 八岁男孩，干骺端可见一个骨性突起，表面光滑，无骨膜反应。最可能的诊断为
- A. 骨肉瘤
- B. 骨巨细胞瘤
- C. 骨软骨瘤
- D. 骨囊肿
- E. 骨软骨肉瘤
57. 女，40 岁，反复膀胱刺激征伴低热 1 年，尿常规 PH5.5，蛋白微量，WBC20-30，RBC20-30，血沉增高，CT 示双肾斑片状钙化，最可能诊断。
- A. 肾肿瘤
- B. 肾结核
- C. 肾结石合并感染
- D. 输尿管结石
- E. 尿路感染
58. 男，47 岁，尿频尿急伴发热 1 年，再发 4 天，既往肾结石病史 4 年，查体体温 39.7℃，右肾区叩击痛，尿常规比重 1.008，WBC++，RBC 阴性，CT 示双肾颗粒固缩，下列治疗不恰当的是
- A. 多饮水，优质蛋白饮食>40g

- B. 根据肾小球滤过率调整抗生素
- C. 联合应用 3 种抗生素
- D. 抗生素应足量足疗程
- E. 抗生素延长使用 2 周~4 周

59. 男, 12 岁, 外出玩耍时摔伤膝盖, 当晚出现寒战、高热, 短暂谵妄, 查体: T38.7℃, 左膝局部肿胀、疼痛明显、浮髌试验阳性。实验室检查: 血 WBC $14.0 \times 10^9/L$ , N0.85, ESR80mm/h。X 线检查未见明显异常。该患者最可能的诊断为

- A. 急性化脓性关节炎
- B. 软骨肉瘤
- C. 膝关节结核
- D. 急性骨髓炎
- E. 类风湿关节炎

60. 男, 66 岁, 双手震颤, 行动迟缓一年, 查体, 面具脸, 静止时手有搓丸样震颤, 手臂齿轮样强直, 迈步前动作迟缓, 能改善其症状的药物作用机制是升高脑内

- A. 多巴胺水平
- B. 去甲肾上腺素水平
- C. GABA 水平
- D. 乙酰胆碱水平
- E. 5-HT 水平

61. 男性, 62 岁, 持续胸痛 4 小时。心电图: II、III、aVF 导联弓背向上抬高。查体: 心率 35 次/分, 血压 60-90mmHg, 心律齐。该患者出现心跳过缓的原因为

- A. 三度房室传导阻滞
- B. 右束支传导阻滞
- C. 二度一型传导阻滞
- D. 房颤
- E. 左束支传导阻滞

62. 男性 40 岁, 反复肾结石 4 年, 最近肾区疼痛, 全骨疼痛, 口渴, 夜尿增多, 体温 36.5°, 心率 80, 呼吸 18 次/分, 血压 120/80mmHg, 肺部听诊清, 最有意义的检查

- A. TSH
- B. PTH
- C. ACTH
- D. GH
- E. FSH

63. 女, 35 岁, 头晕 3 年, 夜尿增多 1 年, 查体, T36.5℃, P80 次/分, R18 次/分, BP170/100mmHg, BM122kg/m<sup>2</sup>。

体格检查正常, 血钾 2.8mmol/L, 最有助于诊断的实验室检查是

- A. 血浆肾素, 醛固酮
- B. 生长激素
- C. 甲状腺激素
- D. 血浆 ACTH, 皮质醇
- E. 血浆儿茶酚胺

64. 男, 25 岁, 1 小时前重物砸伤右前臂, 诊断为尺桡骨双骨折, 手法复位管型石膏固定术后 X 线复位满意, 此后疼痛不能缓解且持续加重, 查石膏牢固, 右手部皮肤感觉减退, 手指主动活动受限, 被动牵拉疼痛加重, 首先应给予处理措施

- A. 应用消肿止痛药
- B. 立即松绑石膏观察
- C. 抬高患肢促进血液回流
- D. 切开减张术
- E. 继续观察

65. 男性, 56 岁, 下肢水肿 1 年, 查体, PT11s, APTT56s, 体内缺乏的凝血因子为

- A. FV II
- B. FV
- C. FX
- D. FVIII
- E. F II

66. 男, 75 岁, 尿流变细排尿困难 2 年, 尿失禁半年, 超声前列腺增生, 膀胱余尿 500 毫升, 患者尿失禁的类型是

- A. 急迫性尿失禁
- B. 充溢性尿失禁
- C. 真性尿失禁
- D. 混合性尿失禁
- E. 压力性尿失禁

67. 男, 40 岁, 突发心脏骤停, 经心肺复苏后血压 85/55mmHg, 心率 34 次/分, 应首选什么药物

- A. 利多卡因
- B. 胺碘酮
- C. 阿托品
- D. 西地兰
- E. 多巴酚丁胺

68. 患者肾衰竭五期，定期行透析治疗，每周 3 次，末次透析时间为 2 天前，出现胸闷不适四肢乏力伴口周发麻 2 天，心率 43 次/分。近两日进食橘子约 1KG。出现上述症状原因是

- A. 高钾血症
- B. 代谢性酸中毒
- C. 高磷血症
- D. 低钙血症
- E. 高钙血症

69. 在临床实践中，医生需要根据患者的具体症状和体征，结合相关检查，如血液电解质检测，做出准确的诊断。患者肾衰竭五期，定期行透析治疗，每周 3 次，末次透析时间为 2 天前，出现胸闷不适四肢乏力伴口周发麻 2 天，心率 43 次/分。近两日进食橘子约 1KG。最有效的治疗方式为

- A. 血液透析
- B. 阳离子交换树脂
- C. 注射钙剂
- D. 大量激素
- E. 利尿剂

70. 男，72 岁，1 小时前睡眠时突发胸痛呼吸困难，伴出汗。救护车到后心电图检查 II、III、avf 导联 ST 段弓背向上抬高 0.3mv。查体体温 36.5℃，心率正常，血压 115/75mmHg，去医院途中症状缓解。复测心电图 II、III、avf 导联 ST 恢复到等电位线。入院后反复复查肌钙蛋白正常。考虑诊断为

- A. 变异型心绞痛
- B. 急性下壁心肌梗死
- C. 急性心包炎
- D. 劳力性心绞痛
- E. 不稳定型心绞痛

71. 男，26 岁，水肿少尿一周。一月前上呼吸道感染史。查体：BP150/90mmHg，尿蛋白（++），RBC100-150/HP，血 Hb：100g/L，血肌酐 456，B 超双肾体积增大，最可能的病理

- A. 膜性肾病
- B. 膜增生性肾小球肾炎
- C. 局灶节段性肾小球肾炎
- D. 系膜增生性肾小球肾炎
- E. 新月体性肾小球肾炎

72. 女，20 岁，眼睑水肿 3 个月，尿常规 RBC20-30/HP，尿蛋白（++），尿相差显微镜：可见棘球红细胞，血肌酐 60umol/L，考虑疾病为

- A. 肾小管疾病

- B. 肾小球疾病
- C. 肾静脉疾病
- D. 肾动脉疾病
- E. 肾间质疾病

73. 男, 45 岁, 血压 80/70mmHg, 突发胸痛, 心电图 V1-V3 导联 ST 段向上抬高 0.3-0.5mv, 该患者诊断为

- A. 急性前壁心肌梗塞
- B. 急性下壁心肌梗死
- C. 急性后壁心肌梗死
- D. 急性前间壁心肌梗塞
- E. 急性侧壁心肌梗塞

74. 女, 40 岁, 心悸, 多汗, 消瘦 2 年, 症状加重伴咽痛发热 1 周, 恶心、呕吐、腹泻 1 天。查体: T39.8°, 大汗淋漓, 甲状腺弥漫性 II 度肿大, 可闻及血管杂音。对于该患者, 以下治疗方法不正确的是

- A. 抗甲状腺药物
- B. 碘剂
- C. 阿司匹林降温
- D. 抗生素
- E. 糖皮质激素

75. 患儿, 男, 12 岁, 踢足球摔伤左膝盖, 左膝盖疼痛, 浮髌实验 (+), 抽屉实验 (-), Lachman 实验 (+), McMurray 实验 (-), 该患者损伤的韧带为

- A. 内侧副韧带损伤
- B. 外侧副韧带损伤
- C. 髌骨骨折
- D. 交叉韧带损伤
- E. 半月板损伤

76. 女性, 20 岁。发热乏力两周, 既往月经增多 2 年, 入院后查血常规: RBC $2.6 \times 10^{12}/L$ , WBC $1.8 \times 10^9/L$ , PLT $25 \times 10^9/L$ , Ret0.004, Hb80g/L, MCV70, 该患者不可能出现的症状是

- A. 皮肤干燥
- B. 共济失调和行动不稳
- C. 烦躁易怒
- D. 异食癖
- E. 口腔炎

77. 小孩无诱因出现右膝关节肿胀疼痛不能动, 主动被动运动均受限, 浮髌试验阳性, 关节腔内分层抽出浑浊液体送检培养, 最可能是哪种细菌

A. 结核杆菌

B. 乙型脑炎病毒

C. 金黄色葡萄球菌

D. 大肠杆菌

E. 溶血性链球菌

78. 老年人心梗冠脉支架术，当时造影满意，术后 1 月出现反复低热，胸痛、伴心前区摩擦音，抓刮样粗糙音，最可能的诊断

A. 心力衰竭

B. 胸膜炎

C. 心脏破裂

D. 心肌梗死后综合征

E. 结核性心包炎

79. 男，4 岁，右侧阴囊肿大，软，透光实验阳性，平卧后可消失。最可能的诊断是

A. 附睾囊肿

B. 附睾结核

C. 交通性鞘膜积液

D. 睾丸鞘膜积液

E. 睾丸肿瘤

80. 女，32 岁，恶心，头晕，呕吐，脑膜刺激征阳性，体温 38.9℃，HIV 抗体阳性，wbc $15 \times 10^9/L$ 。脑脊液细胞数  $200 \sim 300 \times 10^6$ ，墨汁染色 (+)。患者的治疗应为

A. 伊曲康唑

B. 氟康唑

C. 恩替卡韦

D. 卡泊芬净

E. 制霉菌素

81. 男，56，右侧颈部淋巴结肿大 3 月，发热 1 月。T38.8℃，双侧腹股沟淋巴结肿大，颈部淋巴结活检提示弥漫大 B 细胞淋巴瘤。该患者的临床分期为

A. II 期 B

B. III 期 B

C. III 期 A

D. II 期 A

E. IV 期 A

82. 最容易发生深静脉血栓的肾病类型是

- A. 系膜增生性肾病
- B. 膜性肾病
- C. 微小病变性肾病
- D. 膜增生性肾病
- E. 局灶节段性肾小球硬化

83. 男性, 75 岁, 腹胀、消瘦 2 个月。查体: 全身浅表淋巴结未触及, 脾肋缘下 5cm, 质硬, 实验室检查: Hb110g/L, WBC $55.7 \times 10^9/L$ , Plt $443 \times 10^9/L$ , 染色体 t(9; 22)(q34; q11), 最可能的诊断是

- A. 骨髓纤维化
- B. 急性髓性白血病
- C. 慢性髓性白血病
- D. 慢性淋巴细胞白血病
- E. 急性淋巴细胞白血病

84. 男, 70 岁。乏力、腰痛半个月。既往体健。查体: 轻度贫血貌, 第 2~4 腰部压痛。实验室检查: Hb50g/L, WBC $5.6 \times 10^9/L$ , Plt $156 \times 10^9/L$ 。血清总蛋白 108g/L, 白蛋白 30g/L, 肌酐 187 $\mu\text{mol/L}$ 。骨髓细胞学检查示骨髓中异常浆细胞占 0.45。腰椎 X 线片示第 2 腰椎压缩性骨折。为进一步明确诊断, 下一步最需要做的检查是

- A. 血清  $\beta_2$  微球蛋白测定
- B. 尿本周蛋白测定
- C. 尿常规
- D. 血清钙测定
- E. 血清 M 蛋白及免疫球蛋白

85. 男, 82 岁, 阵发心悸两年, 再发一小时, P108 次/分, 心率不齐, S1 强弱不等, 无明显杂音, 心电图无 P 波代之以 f 波, 心室率 150 次/分, R-R 不等, 应诊断为

- A. 房性心动过速
- B. 阵发性室上性心动过速
- C. 房颤
- D. 房扑
- E. 室速

86. 女性, 74 岁, 阵发性胸痛 2 天, 加重 7 小时, 既往高血压 10 年, 血清肌钙蛋白(+), 心电图 II、III、avF, V7~V9ST 段抬高 0.1~0.2mv, 改善左心室重构需用

- A. 阿司匹林
- B. 培哚普利
- C. 辛伐他汀
- D. 硝酸异山梨酯



E. 硝普钠

87. 男, 50 岁, 头晕、乏力 6 个月, 贫血貌, 查体: 肝脾无肿大, 血常规结果提示大细胞性贫血, Hb87g/L, 血小板  $89 \times 10^9/L$ , reT0.02, 幼稚粒细胞 0.02, 该患者下列哪项检查结果最不可能出现异常

A. 红细胞膜 CD55、CD59 表达低下

B. 叶酸、维生素 B<sub>12</sub> 可正常

C. 骨髓病理是大片网状纤维增生

D. 骨髓造血功能低下, 巨核细胞明显减少

E. 骨髓红系粒系巨核系病态造血

88. 女, 50 岁, 两小时前擦窗户从窗台坠落, 会阴部皮肤感觉缺失, 不能自主排便, 双下肢感觉及运动正常, MRI 示 T12 椎体爆裂骨折骨折, 将突入椎管压迫脊髓, 对其神经损伤诊断正确的是

A. 前脊髓综合征

B. 后脊髓综合征

C. 胸段脊髓震荡

D. 脊髓圆锥损伤

E. 马尾神经损伤

89. 男, 16 岁, 发热, 腹泻伴腹痛 1 周, T39℃, 腹泻 3-4 次/天。查体脾肋下 3cm, 移动性浊音(-), 血 WBC  $20 \times 10^9/L$ ,

EO.2, ALT98U/L, 粪便见虫卵, 根据流行病学表述, 下列不正确的是

A. 家畜是重要的传染源

B. 感染后获得持久性免疫

C. 多发生在湖泽区

D. 钉螺为唯一的中间宿主

E. 接触疫水可感染

90. 男, 24 岁, 一小时前工作中右小腿被机器割伤, 伤口无活动性出血, 右小腿及右足血运正常, 右侧足背前内侧感觉障碍, 最可能损伤的神经是

A. 股神经

B. 胫神经

C. 腓肠神经

D. 腓总神经

E. 隐神经

91. 男 19 岁, 头痛恶心呕吐, 双下肢痉挛半小时, 半小时前烈日下负重跑 5km, 查体 T38.6℃, P119/分, BP105/68mmHg, 神志清楚, 颈软, 全身皮肤潮湿, 四肢肌张力高, 最可能是

A. 热射病

B. 横纹肌溶解

C. 热痉挛

D. 蛛网膜下腔出血

E. 热衰竭

92. 男, 23 岁, 发热一周, 右下肢疼痛, 查体心肺及腹部无异常, 体温 36.5℃, 右下肢腓肠肌肿胀, 皮肤青紫, 皮温正常。实验室检查 PT12s (正常 11-13s), Aptt64s (正常 16-40s)。该患者最可能缺乏哪个凝血因子

A. II

B. V

C. VII

D. VIII

E. X

93. 男, 20 岁, 发热 2 天, 加重 7h, 查体血压 150/100mmHg, 尿常规尿蛋白 (+++), 红细胞满视野。肾脏活检免疫荧光见以 IgA 为主的颗粒状沉积于系膜区及毛细血管袢。以下选项中与预后无关的是

A. 高血压

B. 蛋白尿

C. 镜下血尿

D. 病理活检

E. 血肌酐

94. 女性, 46 岁, 乏力纳差, 一直素食, 血液检查: Hb: 74g/L, MCV: 124f1, MCHC: 34g/L。最可能的诊断是

A. 巨幼细胞性贫血

B. 再生障碍性贫血

C. 缺铁性贫血

D. 海洋性贫血

E. 急性白血病

95. 男性, 19 岁, 肉眼血尿伴尿量减少一天, 2 周前有上呼吸道感染史, 查体血压 160/90mmHg, 眼睑及双下肢水肿, 尿常规: 尿蛋白 (++), RBC10~15/HP, WBC5~10×10<sup>9</sup>/L, 血常规 C3 降低。最可能的诊断是

A. 急性肾小球肾炎

B. 急进性肾小球肾炎

C. 膜增生性肾小球肾炎

D. 微小病变型肾病

E. 肾病综合征

96. 男性, 71 岁, 不慎从楼梯摔下来, 摔伤右髌部, 既往全身情况良好。查体: 右下肢短缩 3cm、外旋 85° 畸形, 下肢轴向叩击痛阳性。该患者的骨折部位是

A. 股骨远端

B. 股骨颈

C. 股骨干

D. 股骨转子间

E. 右髌

97. 男性, 71 岁, 不慎从楼梯摔下来, 摔伤右髌部, 既往全身情况良好。查体: 右下肢短缩 3cm、外旋 85° 畸形, 下肢轴向叩击痛阳性。最特异性体征是

A. 有压痛

B. 外旋 85°

C. 右下肢短缩

D. 叩击痛

E. 红肿

98. SLE 患者, 服用激素, 查体发现左股骨头变平, 软骨下塌陷, 关节间隙变窄, 问病变分期

A. I

B. II

C. III

D. IV

E. V

99. 男性, 13 岁, 左大腿下端疼痛, 皮肤表面静脉怒张, 皮温较对侧增高。X 线片见左股骨下端骨质密度减低, 边界不清, 伴有骨膜放射样改变。最可能的诊断是

A. 骨软骨瘤

B. 骨肉瘤

C. 骨囊肿

D. 急性骨髓炎

E. 骨结核

100. 男, 60 岁, 间断心前区压榨感及咽部不适, 常试步行 200 米后, 需停下休息 5 分钟, 平板实验阳性。诊断为

A. 变异型心绞痛

B. 稳定型心绞痛

C. 初发型心绞痛

D. 不稳定性心绞痛

E. 心肌梗死

101. 男, 60 岁, 排尿等待, 尿线变细, 尿频 6 个月, 夜尿 2-3 次, 无尿痛, 尿常规正常, 血清总 PSA1.7ng/ml, B 超提示前列腺体积增大, 膀胱剩余尿 100ml, 以下治疗能够马上缓解急性症状的是

A. 口服 5α 还原酶抑制剂

- B. 经尿道前列腺切除
- C. 耻骨上前列腺切除
- D. 抗感染治疗
- E. 口服  $\alpha$  受体拮抗剂

102. 女, 32 岁, 发现血脂升高 3 年, 其父亲和哥哥均患有高胆固醇血症, 查体双侧内眦黄色瘤, 实验室检查血清胆固醇 7.5mmol/L, 血清甘油三酯 1.7mmol/L, 血清低密度脂蛋白胆固醇 5.1mmol/L。以下诊断正确的是

- A. 继发性高甘油三酯血症
- B. 原发性混合型高脂血症
- C. 继发性高胆固醇血症
- D. 家族性高甘油三酯血症
- E. 家族性高胆固醇血症

103. 男, 42 岁, 劳累性胸闷, 心悸 1 年, 晕厥一次, 既往无高血压病史和糖尿病病史, 有类似家族史, 查体血压 120/80mmHg, 心率 80 次/分, 胸骨左缘三四肋间可闻及 4/6 级收缩期喷射样杂音, 心尖部听诊区可闻及 3/6 级收缩期杂音。以下诊断正确的是

- A. 梗阻性肥厚型心肌病
- B. 扩张型心肌病
- C. 风湿性心脏瓣膜病
- D. 冠状动脉粥样硬化性心脏病
- E. 室间隔缺损

104. 男, 20 岁。1 型糖尿病病史 10 年, 平时每日 4 次胰岛素强化治疗。近 2 日发热, 咽痛, 食欲不振, 进食少, 自行停用胰岛素。晨起家属发现患者不能正确回答问题, 急诊就诊, 查体:  $T38.5^{\circ}\text{C}$ , 精神差, 轻度脱水貌。实验室检查: 血钠 140mmol/L, 血钾 4.5mmol/L, 血糖 25mmol/L, 血 pH7.25, 尿酮体 (+++)。最适合的治疗方案

- A. 恢复四次胰岛素皮下注射治疗
- B. 静脉大剂量短效胰岛素治疗
- C. 皮下胰岛素泵治疗
- D. 静脉小剂量短效胰岛素治疗
- E. 基础胰岛素皮下治疗

105. 男, 20 岁。1 型糖尿病病史 10 年, 平时每日 4 次胰岛素强化治疗。近 2 日发热, 咽痛, 食欲不振, 进食少, 自行停用胰岛素。晨起家属发现患者不能正确回答问题, 急诊就诊, 查体:  $T38.5^{\circ}\text{C}$ , 精神差, 轻度脱水貌。实验室检查: 血钠 140mmol/L, 血钾 4.5mmol/L, 血糖 25mmol/L, 血 pH7.26, 尿酮体 (+++)。最有可能存在异常的检查指标是

- A. 胰岛素
- B. 生长激素

C. ACTH

D. 胰岛素抗体

E. 胰高血糖素

106. 男, 20 岁。1 型糖尿病病史 10 年, 平时每日 4 次胰岛素强化治疗。近 2 日发热, 咽痛, 食欲不振, 进食少, 自行停用胰岛素。晨起家属发现患者不能正确回答问题, 急诊就诊, 查体: T38.5℃, 精神差, 轻度脱水貌。实验室检查: 血钠 140mmol/L, 血钾 4.5mmol/L, 血糖 25mmol/L, 血 PH7.25, 尿酮体 (+++)。尿量恢复, 该如何进行治疗

A. 补碱、补钾、补钠治疗

B. 补碱、补钾治疗

C. 补钠、补钙治疗

D. 补碱、补钠治疗

E. 补钾、补钠治疗

107. 女性, 72 岁, 摔倒后左髋疼痛伴不能活动 3 小时, 查体见左下肢缩短, 外旋畸形, X 线显示左侧股骨头下骨皮质不连续, 断端部分吻合, Garden 分型是

A. I

B. II

C. III

D. IV

E. V

108. 女性, 72 岁, 摔倒后左髋疼痛伴不能活动 3 小时, 查体见左下肢缩短, 外旋畸形, X 线显示左侧股骨头下骨皮质不连续, 断端部分吻合, 外旋畸形常见的角度

A. 60-70

B. 80-90

C. 50-60

D. 20-30

E. 30-40

109. 女性, 72 岁, 摔倒后左髋疼痛伴不能活动 3 小时, 查体见左下肢缩短, 外旋畸形, X 线显示左侧股骨头下骨皮质不连续, 断端部分吻合, 最佳治疗方法

A. 髋关节置换术

B. 对症治疗, 应用非甾体药物

C. 切开复位固定

D. 卧床骨牵引

E. 卧床休息

110. 男, 82 岁, 有多年冠心病病史。夜间睡觉时突发胸闷, 端坐呼吸, 查体 R35 次/分, BP80/50mmHg, 双肺可闻及湿罗音, 心率 102 次/分, 第一心音强弱不等。该患者最可能的诊断是

- A. 慢性左心衰
- B. 全心衰
- C. 急性左心衰
- D. 右心衰
- E. 肺栓塞

111. 男, 82 岁, 有多年冠心病病史。夜间睡觉时突发胸闷, 端坐呼吸, 查体 R35 次/分, BP80/50mmHg, 双肺可闻及湿罗音, 心率 102 次/分, 第一心音强弱不等, 应对该患者立即进行什么治疗

- A. 同步直流电复律
- B. 异丙肾上腺素
- C. 静脉泵多巴酚丁胺
- D. 静脉泵多巴胺
- E. 去甲肾上腺素

112. 男, 82 岁, 有多年冠心病病史。夜间睡觉时突发胸闷, 端坐呼吸, 查体 R35 次/分, BP80/50mmHg, 双肺可闻及湿罗音, 心率 102 次/分, 第一心音强弱不等。接下来该患者首选检查是

- A. X 线胸片
- B. 24 小时动态心电图
- C. 心肌核素扫描
- D. 冠脉造影
- E. 心肌灌注

113. 女, 42 岁, 发现心脏杂音三年, 查体血压 120/70mmHg, 律齐, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿罗音, 律齐, 心尖部可闻及 3/6 收缩期杂音和舒张期隆隆样杂音。可能的诊断是

- A. 三尖瓣关闭不全伴狭窄
- B. 二尖瓣关闭不全伴狭窄
- C. 二尖瓣狭窄
- D. 三尖瓣关闭不全
- E. 二尖瓣关闭不全

114. 女, 42 岁, 发现心脏杂音三年, 查体血压 120/70mmHg, 律齐, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿罗音, 律齐, 心尖部可闻及 3/6 收缩期杂音和舒张期隆隆样杂音, 超声心动图提示二尖瓣卷曲, 瓣口面积 1.6cm<sup>2</sup>, 最常见的原因是

- A. 退行性
- B. 感染性
- C. 先天性

D. 损失性

E. 风湿性

115. 男孩, 10 岁, 发热 8 小时, 9 月 10 日入院, 入院前曾在外面吃烧烤, 体温  $40^{\circ}\text{C}$ , 呼吸 24 次/分, 血压 70/40mmHg, 查体浅昏迷, 面色苍白, 四肢湿冷, 皮肤可见“花斑”, 检验:  $\text{WBC} 24 \times 10^9/\text{L}$ ,  $\text{NO} 0.9$ 。最可能考虑的是:

A. 伤寒

B. 中毒性菌痢

C. 乙脑

D. 流脑

E. 疟疾

116. 男孩, 10 岁, 发热 8 小时, 9 月 10 日入院, 入院前曾在外面吃烧烤, 体温  $40^{\circ}\text{C}$ , 呼吸 24 次/分, 血压 70/40mmHg, 查体浅昏迷, 面色苍白, 四肢湿冷, 皮肤可见“花斑”, 检验:  $\text{WBC} 24 \times 10^9/\text{L}$ ,  $\text{NO} 0.9$ 。目前需要立刻处理的是

A. 物理降温

B. 使用糖皮质激素

C. 使用镇静药物

D. 使用血管活性药物

E. 快速补液, 积极扩容

117. 男, 10 岁, 发热皮肤黏膜出血 2 天就诊。四肢可见出血点, 肝脾不大, 查血常规血红蛋白  $75\text{g/L}$ , 中性粒细胞  $1.0 \times 10^9/\text{L}$ , 血小板  $20 \times 10^9/\text{L}$ , 外周血见幼稚细胞 0.02,  $\text{ReT} 0.02$ , 患儿最可能的诊断是

A. 骨髓增生异常综合征

B. 再生障碍性贫血

C. 阵发性睡眠性血红蛋白尿

D. 巨幼细胞贫血

E. 急性白血病

118. 男, 10 岁, 发热皮肤黏膜出血 2 天就诊。四肢可见出血点, 肝脾不大, 查血常规血红蛋白  $75\text{g/L}$ , 中性粒细胞  $1.0 \times 10^9/\text{L}$ , 血小板  $20 \times 10^9/\text{L}$ , 外周血见幼稚细胞 0.02,  $\text{ReT} 0.02$ , 该患者可能出现下列哪项检查结果

A. 中性粒细胞增多

B. 中性粒细胞减少

C. 血涂片可见红细胞碎片

D. 晨起血红蛋白尿

E. 直接抗人球蛋白阳性

119. 患者男。48 岁。近八个月来感觉烦躁不安饥饿伴精神症状。近两个月来经常有晨起昏迷。服用糖水后清醒。发作时血糖  $1.8 \sim 2.2\text{mmol/L}$ 。否认既往有高血压糖尿病史。急诊入院查体, 呼吸 18 次/分。血压 120/80mmHg, 脉搏 94 次/分。双肺听诊无干湿啰音。无异常心音。腹部平软无压痛反跳痛。该患者若收入院后有昏迷现象, 需要



进行的治疗措施是

- A. 静脉注入, 50%的葡萄糖溶液
- B. 静脉注入 20%的葡萄糖溶液
- C. 口服葡萄糖溶液
- D. 静脉注入 10%的葡萄糖溶液
- E. 胃管饲入高碳水化合物食物

120. 患者男, 48 岁。近八个月来感觉烦躁不安饥饿伴精神症状。近两个月来经常有晨起昏迷。服用糖水后清醒。发作时血糖  $1.8 \sim 2.2 \text{ mmol/L}$ 。否认既往有高血压糖尿病史。急诊入院查体, 呼吸 18 次/分。血压 120/80mmHg, 脉搏 94 次/分。双肺听诊无干湿啰音。无异常心音。腹部平软无压痛反跳痛。未明确诊断, 应首选的检查是

- A. ACTH
- B. 胰岛素抗体
- C. 胰岛素和 C 肽
- D. 糖耐量试验
- E. 空腹血糖

121. 患者男。48 岁。近八个月来感觉烦躁不安饥饿伴精神症状。近两个月来经常有晨起昏迷。服用糖水后清醒。发作时血糖  $1.8 \sim 2.2 \text{ mmol/L}$ 。否认既往有高血压糖尿病史。急诊入院查体, 呼吸 18 次/分。血压 120/80mmHg, 脉搏 94 次/分。双肺听诊无干湿啰音。无异常心音。腹部平软无压痛反跳痛。患者最可能的病因为

- A. 胰岛素瘤
- B. 二型糖尿病
- C. 胰岛素抵抗
- D. 反应性低血糖
- E. 自主神经功能紊乱

122. 男, 60 岁, 发热乏力 3 天, 腹胀, 腹泻 2 天, 查体  $T39^{\circ}\text{C}$ , P120 次/分, R22 次/分, BP80/50mmHg 神志清, 面部潮红, 巩膜无黄染, 结膜充血, 双腋下可见划痕样出血点, 心肺无异常, 腹软, 无压痛, 反跳痛, 肝脾肋下未触及。血常规  $\text{Hb}158\text{g/L}$ ,  $\text{WBC}15 \times 10^9/\text{L}$ ,  $\text{N}0.44$ ,  $\text{L}0.40$ , 异性淋巴细胞 0.15,  $\text{Plt}75 \times 10^9/\text{L}$ , 尿蛋白 (+++), 粪常规+, 镜检  $\text{WBC}2 \sim 41\text{Hp}$ ,  $\text{RBC}0 \sim 1\text{Hp}$ 。为确诊需要进行下列哪项检查

- A. 肾活检
- B. IgM 抗体
- C. 血涂片
- D. 显微凝集试验
- E. 抗原快速检测

123. 男, 60 岁, 发热乏力 3 天, 腹胀, 腹泻 2 天, 查体  $T39^{\circ}\text{C}$ , P120 次/分, R22 次/分, BP80/50mmHg 神志清, 面部潮红, 巩膜无黄染, 结膜充血, 双腋下可见划痕样出血点, 心肺无异常, 腹软, 无压痛, 反跳痛, 肝脾肋下未



触及。血常规 Hb158g/L, WBC $15 \times 10^9$ /L, N0.44, L0.40, 异性淋巴细胞 0.15, Plt $75 \times 10^9$ /L, 尿蛋白(+++), 粪常规+, 镜检 WBC2~41/Hp, RBC0~1/Hp。下列治疗措施错误的是

- A. 静脉补充白蛋白
- B. 静脉滴注生理盐水
- C. 静脉滴注新鲜血浆
- D. 静脉滴注利巴韦林
- E. 静脉滴注阿昔洛韦

124. 女, 33 岁, 产后无乳, 闭经 4 年, 昏迷一天。查体: 体温 35 度, P90 次/分, 血压 80/40, 面色苍白, 腋毛阴毛缺失。血 K $4.5 \text{ mmol/L}$ , Na $126.4 \text{ mmol/L}$ , 血糖  $3.1 \text{ mmol/L}$ , 该患者最可能的病因为

- A. 垂体危象
- B. 垂体卒中
- C. 低血糖昏迷
- D. 黏液性水肿
- E. Addison 病

125. 女, 33 岁, 产后无乳, 闭经 4 年, 昏迷一天。查体: 体温 35 度, P90 次/分, 血压 80/40, 面色苍白, 腋毛阴毛缺失。血 K $4.5 \text{ mmol/L}$ , Na $126.4 \text{ mmol/L}$ , 血糖  $3.1 \text{ mmol/L}$ , 该患者的治疗为

- A. 降血压药
- B. 高渗葡萄糖
- C. 高渗盐水
- D. 糖皮质激素
- E. 甲状腺素

126. 患者, 女, 2 米高处跌落后 2 小时, 腰部着地, 伤后腰痛, 全程可见肉眼血尿, P90 次/分, BP110/70mmHg, 查体, 右腰部皮肤青紫, 有压痛, 腹部无压痛、反跳痛。该患者最可能损伤的部位是

- A. 输尿管
- B. 肾
- C. 脾
- D. 膀胱
- E. 尿道

127. 患者, 女, 2 米高处跌落后 2 小时, 腰部着地, 伤后腰痛, 全程可见肉眼血尿, P90 次/分, BP110/70mmHg, 查体, 右腰部皮肤青紫, 有压痛, 腹部无压痛、反跳痛。初期不适宜的治疗措施为

- A. 维持水电解质平衡
- B. 观察生命体征, 监测血红蛋白
- C. 应用抗生素预防感染

D. 镇静，止痛

E. 肾动脉造影，血管栓塞止血

128. 患者女，65 岁，近日突发呼吸困难，肺部充满湿啰音，咳粉红色泡沫痰，既往冠心病史 10 年，BP80/50mmHg，心率 102 次/分，S3 奔马律。该患者最可能的诊断是

A. 全心衰

B. 右心衰

C. 左心衰

D. 肺栓塞

E. 慢性心力衰竭急性发作

129. 患者女，65 岁，近日突发呼吸困难，肺部充满湿啰音，咳粉红色泡沫痰，既往冠心病史 10 年，BP80/50mmHg，心率 102 次/分，S3 奔马律。该患者不应选择的药物是

A. 多巴胺

B. 异丙肾上腺素

C. 去甲肾上腺素

D. 氨茶碱

E. 硝普钠

130. 患者女 65 岁，近日突发呼吸困难，肺部充满湿啰音，咳粉红色泡沫痰，既往冠心病史 10 年，心率 102 次/分，S3 奔马律。若该患者病情控制后，为进一步明确发病原因，应该首先选择下列哪项检查

A. 冠状动脉造影

B. 动态心电图

C. 动态心电图平板实验

D. 超声心动图

E. CT 肺动脉造影

131. 男性，56 岁，间断性肉眼血尿 1 月余，镜下有血凝块，无腹痛、发热，无尿频、尿急、尿痛，B 超示膀胱新生物，如果 B 超提示膀胱侧壁有一 2cm 新生物，乳头状，有蒂，该病例适宜的治疗方式为

A. 根治性膀胱切除

B. 膀胱灌注

C. 膀胱部分切除

D. 经尿道膀胱肿瘤切除

E. 全身化疗

132. 男性，56 岁，间断性肉眼血尿 1 月余，镜下有血凝块，无腹痛、发热，无尿频、尿急、尿痛，B 超示膀胱新生物，如果 B 超提示膀胱侧壁有一 2cm 新生物，乳头状，有蒂。最具价值的检查是

A. CT

B. MRI

C. 膀胱镜加活检

D. 膀胱造影

E. 腹部超声

133. 女, 62 岁, 水肿 3 个月, 肾病综合征, 病理示局灶节段性肾小球硬化, 应用强的松 60mg/d, 影像学胸片右下肺渗出, 尿蛋白 2.9g/dL, RBC3~5/HP, Alb29g/L, 此时最易发生的风险是

A. 急性肾损伤

B. 消化性溃疡

C. 肺栓塞

D. 肺部机会致病菌感染

E. 类固醇性糖尿病

134. 女, 62 岁, 水肿 3 个月, 肾病综合征, 病理示局灶节段性肾小球硬化, 应用强的松 60mg/d, 影像学胸片显示右下肺有渗出, 尿蛋白 2.9g/dL, RBC3~5/HP, Alb29g/L, 此时应如何调整用药

A. 糖皮质激素加环磷酰胺

B. 糖皮质激素加环孢素

C. 缓慢激素减量

D. 加量激素

E. 停用激素

135. 一侧肾盂结石 (长径 1.5cm), 肾功能正常。超声显示双肾内未见明显积水, 首要的治疗措施是

A. 经皮肾镜碎石取石术

B. 输尿管镜取石术

C. 体外冲击波碎石

D. 肾实质切开取石术

E. 输尿管切开取石术

136. 一侧肾内结石长径 3.5cm 伴肾积水, 首要的治疗方法

A. 经皮肾镜碎石取石术

B. 输尿管镜取石术

C. 体外冲击波碎石

D. 肾实质切开取石术

E. 输尿管切开取石术

137. 血管内溶血导致的肾损伤类型是

A. 急性间质性肾炎

B. 急性肾小管坏死

C. 新月体型肾炎

D. 血栓性微血管病变

E. 急性肾炎

138. 肺出血肾病综合征（Goodpasture）导致的肾损伤类型

A. 急性间质性肾炎

B. 急性肾小管坏死

C. 新月体型肾炎

D. 血栓性微血管病变

E. 急性肾炎

139. 右心衰特征性表现

A. 肝颈静脉回流征阳性

B. 颈静脉搏动

C. 双肺底对称细湿啰音

D. 多浆膜腔积液

E. 下肢水肿

140. 肺循环淤血表现

A. 肝颈静脉回流征阳性

B. 颈静脉搏动

C. 双肺底对称细湿啰音

D. 多浆膜腔积液

E. 下肢水肿

141. 伤寒患者已无发热，突感右上腹疼痛，伴压痛、反跳痛，叩诊肝浊音界消失，X线站立位见游离气体，该患者处于哪个病程

A. 初期

B. 极期

C. 高热期

D. 缓解期

E. 恢复期

142. 伤寒出现发热，相对脉缓，神智淡漠，间断出现谵妄，该患者处于哪个病程

A. 初期

B. 极期

C. 高热期

D. 缓解期

E. 恢复期

143. 高粘滞性多发性骨髓瘤最常见的类型

A. 轻链

B. IgA

C. IgE

D. IgM

E. IgG

144. 最常见的多发性骨髓瘤的类型

A. 轻链

B. IgA

C. IgE

D. IgM

E. IgG

145. 复位后需要曲腕尺偏固定的是

A. 桡骨小头半脱位

B. 孟氏骨折

C. 盖氏骨折

D. Colles 骨折

E. 桡骨干骨折

146. 复位后不需要固定的是

A. 桡骨小头半脱位

B. 孟氏骨折

C. 盖氏骨折

D. Colles 骨折

E. 桡骨干骨折

147. 左室舒张末压 3mmHg, 肺动脉楔压 25mmHg, 这种情况见于

A. 主动脉瓣关闭不全

B. 主动脉瓣狭窄

C. 二尖瓣关闭不全

D. 二尖瓣狭窄

E. 肺动脉瓣关闭不全

148. 动脉血压 130/50mmHg 最常见于

A. 主动脉瓣关闭不全

- B. 主动脉瓣狭窄
- C. 二尖瓣关闭不全
- D. 二尖瓣狭窄
- E. 肺动脉瓣关闭不全

149. Addison 病的体征是

- A. 苦笑面容
- B. 满月脸
- C. 面色苍白
- D. 毛发旺盛
- E. 色素沉着

150. Sheehan 综合征的体征是

- A. 苦笑面容
- B. 满月脸
- C. 面色苍白
- D. 毛发旺盛
- E. 色素沉着

## 第三单元

1. 关于自身免疫性疾病抗体说法错误的是
  - A. RF 因子可见于多种结缔组织病和感染性疾病
  - B. ANCA 可以用来诊断系统性红斑狼疮
  - C. 环瓜氨酸抗体是诊断类风湿的特异性抗体
  - D. 抗核抗体是结缔组织病的筛查项目
  - E. dsDNA 与系统性红斑狼疮相关
2. 关于外科手术患者，术后能量代谢错误的是
  - A. 葡萄糖利用能力增加
  - B. 负氮平衡
  - C. 脂肪动员增加
  - D. 蛋白质分解增多
  - E. 机体代谢加快
3. 交通性气胸应采取的首要措施是
  - A. 胸腔闭式引流
  - B. 无菌纱布覆盖伤口
  - C. 胸廓固定术
  - D. 固定、吸氧
  - E. 及时抽出胸腔气体
4. 下列哪项不是胃溃疡的病理特点
  - A. 周边粘膜充血水肿
  - B. 表面可有炎性渗出物
  - C. 可见坏死组织
  - D. 可见肉芽组织
  - E. 底部可见异型细胞
5. 胃溃疡的主要发病机制是
  - A. 胃黏膜屏障受损
  - B. 胃黏膜免疫屏障破坏
  - C. 迷走神经功能亢进
  - D. 胃泌素增加
  - E. 前列腺素合成减少
6. 十二指肠溃疡穿孔的好发部位是
  - A. 前壁

- B. 后壁
- C. 升部
- D. 降部
- E. 水平部
7. 支气管哮喘患者  $\text{PaCO}_2$  增高表明
- A. 病情好转
- B. 病情稳定
- C. 病情危重，需要机械通气
- D. 出现呼吸性碱中毒
- E. 合并心力衰竭，需要使用利尿剂
8. 肺脓肿形成单个空洞的主要致病菌是
- A. 结核菌
- B. 真菌
- C. 肺炎链球菌
- D. 金黄色葡萄球菌
- E. 厌氧菌
9. 男性，56岁，大便时发现肛门有脱出肿物，排便后可自行回纳，下列分级正确的是
- A. 1级
- B. 2级
- C. 3级
- D. 4级
- E. 5级
10. 急性胰腺炎患者出现 Grey-Turner 征的病理生理改变是
- A. 大量炎性渗出
- B. 腹腔间隔室综合征
- C. 胰腺出血坏死
- D. 肠麻痹
- E. 急性腹膜炎
11. 乳腺癌的筛查方法是
- A. 胸部正位 X 线
- B. 乳腺 X 线
- C. 乳腺 MRI
- D. 穿刺活检



E. 胸部 CT

12. 阻塞性肺炎的缺氧机制是

A. 通气血流比例失调

B. 肺泡通气量不足

C. 氧弥散功能失调

D. 分流率增加

E. 呼吸功能增加

13. 急性呼吸窘迫综合征所致顽固性低氧血症的主要机制是

A. 限制性通气功能障碍

B. 弥散功能障碍

C. 通气/血流比例失衡

D. 分流率增加

E. 呼吸功能增加

14. 男性，32 岁，出现腹部压痛、反跳痛、肌紧张，行腹部探查，术中依次探查肝、脾、膈均无损伤或出血，继续探查，应首先探查的脏器是

A. 胰腺

B. 胃

C. 直肠

D. 十二指肠

E. 空肠

15. 40 岁以上筛查结肠癌首选

A. 结肠镜

B. 腹部 CT

C. 粪潜血

D. 腹部 B 超

E. 腹部 MRI

16. 阑尾炎术后，提示肠道恢复蠕动的表现

A. 肛门排气

B. 压痛反跳痛消失

C. 腹胀消失

D. 有饥饿感

E. 腹痛消失

17. 小儿阑尾炎的特点正确的是

- A. 可保守治疗
- B. 穿孔率高
- C. 右下腹压痛，肌紧张症状典型
- D. 不发热、症状不明显
- E. 死亡率较低
18. 根除 Hp 感染后，用 C13 法复查需要在治疗多少周后
- A. 1 周
- B. 2 周
- C. 3 周
- D. 4 周
- E. 5 周
19. 胃癌术前能明确肿瘤浸润深度的检查是
- A. 腹部 CT
- B. X 线钡剂造影
- C. 染色内镜
- D. 内镜超声
- E. 腹部 MIR
20. 肝癌的手术指证是
- A. 肝癌局限于一侧肝叶或肝段内
- B. Child-Pugh 肝功能分级属 B 级或 C 级
- C. 大量腹水
- D. AFP>100
- E. 胆红素过高
21. 低钙血症所导致的 chvostek 征指的是
- A. 手指指尖样刺痛
- B. 腱反射亢进
- C. 口角紧张
- D. 面神经叩击阳性
- E. 踝阵挛
22. 肺栓塞引起的血流动力学改变是
- A. 肺血管通透性增加
- B. 肺通气功能障碍
- C. 动静脉血管分流

- D. 肺通气/血流比例失调
- E. 弥散障碍
23. 关于低位肠梗阻，下列说法正确的是
- A. 腹胀、腹痛不明显
- B. 呕吐物多为胃内容物
- C. 梗阻多位于空肠
- D. 呕吐症状早
- E. X 线腹透见腹部数个阶梯状含气液平面
24. 左侧甲状腺乳头状癌，伴同侧 VI 区淋巴结转移，适宜的手术方式为
- A. 甲状腺全切除+左侧改良根治性颈淋巴结清扫术
- B. 甲状腺左叶切除+左侧改良根治性颈淋巴结清扫术
- C. 甲状腺次全切除术+左侧改良根治性颈淋巴结清扫术
- D. 甲状腺左叶切除+左侧 VI 区淋巴结清扫术
- E. 甲状腺左叶部分切除+左侧 VI 区淋巴结清扫术
25. 确诊肺栓塞的辅助检查首选
- A. 血 D-二聚体
- B. 超声心动图
- C. CT 肺动脉造影
- D. 血气分析
- E. 肺功能检查
26. 间断腹痛腹泻 3 年，既往有肛周脓肿，现大便 3-4 日/日，粘液，无脓血，右下腹包块，压痛，边界不清。考虑什么病
- A. 慢性细菌性痢疾
- B. 溃疡性结肠炎
- C. 克罗恩病
- D. 结肠癌
- E. 中毒性巨结肠
27. 肝硬化患者呕血 800ml 后不可能出现的临床表现是
- A. 脾脏缩小
- B. 腹水减少
- C. 扑翼样震颤
- D. 腹胀、腹痛
- E. 嗜睡

28. 抗休克治疗时，指标情况改善与尿量增加直接相关的是

- A. 微循环灌注
- B. 心排血量
- C. 动脉舒张压
- D. 肺毛细血管楔压
- E. 中心静脉压

29. 患者外伤，行脾切除术后，查体：T36.5℃，P128 次/分，R30 次/分，BP88/48mmHg。动脉血气分析：PH7.28，氧分压 100mmHg，二氧化碳分压 32mmHg，碱剩余-6，乳酸 4mmol/L，患者属于哪一种酸碱平衡失衡？

- A. 呼吸合并代碱失代偿期
- B. 呼吸合并代酸失代偿期
- C. 呼吸
- D. 呼吸
- E. 代碱

30. 毕 2 式术后 5 天，左上腹痛，放射至背部，小网膜囊引流出胆汁样液体，血淀粉酶 1500U/L，最可能的诊断为

- A. 输出袢梗阻
- B. 吻合口梗阻
- C. 十二指肠残端破裂
- D. 急性胰腺炎
- E. 残胃癌

31. 胆总管无扩张，胆囊增大，肝总管和肝内外胆管扩张。考虑为

- A. Mirizzi 综合症
- B. 胰头癌
- C. 急性胆管炎
- D. 肝门胆管癌
- E. 肝内胆管结石

32. 男，30 岁。大便带血 1 个月。查体：T36.5℃，P80 次/分，R18 次/分，BP120/80mmHg。直肠指检：触及一个柔软光滑有蒂包块，直径约 1cm，指套带血。最可能诊断是

- A. 直肠息肉
- B. 直肠癌
- C. 直肠脱垂
- D. 血栓性外痔
- E. 肛瘘

33. 转移性右下腹痛 4 天，上腹痛 1 天，腹部肝脏触诊轻压痛可触及，轻度黄染，肝脏部位可能发生的病变是

- A. 肝脓肿
- B. 肝门静脉炎
- C. 胆总管结石
- D. 胆囊炎
- E. 阑尾炎
34. 胃粘膜上皮异型增生的病理改变
- A. 胃粘膜上皮和腺体被杯状细胞幽门腺细胞取代
- B. 上皮细胞增生和分化缺失
- C. 淋巴细胞，浆细胞等慢性炎症改变
- D. 腺体缺失，间质纤维化
- E. 中性粒细胞浸润
35. 病人出现反酸症状，且不能完全缓解，出现吞咽困难，首选哪种检查
- A. 胃镜
- B. CT 检查
- C. 腹部 B 超
- D. 腹部平片
- E. X 线检查
36. 中年男性出现反酸、烧心、嗝气 2 个月，胃镜检查食管黏膜未见明显异常，最可能的疾病是
- A. 反流性食管炎
- B. 胃溃疡
- C. 慢性胃炎
- D. 胆囊炎
- E. 消化性溃疡
37. 胰腺炎休克治疗时，下列措施错误的是
- A. 利尿
- B. 补充体液
- C. 补充电解质
- D. 去甲肾上腺素
- E. 抗感染
38. 因某种原因进行输血治疗过程中出现输血过敏休克反应，以下说法错误的是
- A. 减慢输血
- B. 停止输血
- C. 加速补液

- D. 抗过敏治疗
- E. 升压
39. 收缩压 90mmHg，神志尚清，此时失血量最可能为
- A. 400-800
- B. 800-1600
- C. >1600
- D. 400-200
- E. 200-100
40. 行阑尾切除术时，寻找阑尾基底部最常用的方法是
- A. 从腓窝寻找
- B. 用手指探查阑尾尖部
- C. 沿结肠带向回盲部寻找
- D. 切开盲肠外侧腹膜寻找
- E. 沿盲肠外侧寻找
41. 糖尿病病人饮食为
- A. 高热量高蛋白高维生素低纤维素饮食
- B. 控制总热量低糖低脂高纤维饮食
- C. 低脂低热量少盐粗纤维饮食
- D. 高蛋白高纤维素高铁制品饮食
- E. 低热量低盐高纤维易消化
42. 以下关于股骨干骨折出血，处理错误的是
- A. 止血带固定到手术结束
- B. 结扎创面小血管止血
- C. 持续牵引
- D. 钢板螺钉内固定
- E. 尽早进行肌肉，膝关节功能练习
43. 免疫性胃炎导致的大细胞贫血，应补充哪种营养
- A. VitB<sub>12</sub>
- B. 叶酸
- C. 维生素 C
- D. 铁离子
- E. 维生素 B
44. 十二指肠溃疡相关病史为

- A. 幽门螺杆菌感染
  - B. 饮酒
  - C. 吸烟
  - D. 应激
  - E. 自身免疫
45. 膀胱癌 TNM 分期的依据是
- A. 浸润深度
  - B. 浸润广度
  - C. 淋巴结转移数量
  - D. 侵犯周围脏器
  - E. 远处转移
46. 恶性胸水表现出的体征是
- A. 语颤减弱
  - B. 叩诊呈实音
  - C. 肋间隙变窄
  - D. 呼吸运动增强
  - E. 呼吸音增强
47. 患者，胸闷气急 3 周，胸片示右侧大量胸腔积液，胸穿抽出血性胸水 1000ml，LDH580U/L，考虑胸水的性质为
- A. 结核性胸膜炎
  - B. 癌性胸腔积液
  - C. 肺炎伴胸腔积液
  - D. 自发性液气胸
  - E. 漏出性胸腔积液
48. 急性肾小球肾炎的致病菌
- A. A 组  $\beta$  溶血性链球菌
  - B. B 组溶血性链球菌
  - C. 柯萨奇病体
  - D. 草绿色链球菌
  - E. 金黄色葡萄球菌
49. 影响伤口愈合最常见的局部因素是
- A. 局部血运障碍
  - B. 创面范围大
  - C. 感染

- D. 异物清除不彻底
- E. 年龄
50. 先天性巨结肠首选检查
- A. X 线检查
- B. CT 检查
- C. 结肠镜检查
- D. 腹部 B 超
- E. 胃镜检查
51. 关于血栓闭塞性脉管炎，以下说法不正确的是
- A. 男性多见
- B. 发作呈对称性和间歇性
- C. 起病隐匿，进展缓慢
- D. 可发生肢体坏疽
- E. 呈游走性
52. 患者腹部外伤，下腹部压痛反跳痛，导尿导出 300ml 黄色液体，伴有排尿困难，彩超提示前列腺增生，解除症状最快的方法是
- A. 经尿道前列腺电切术
- B. 经尿道腺性膀胱炎切除术
- C. 剖腹探查
- D.  $5\alpha$  还原酶抑制剂
- E.  $\alpha$  受体阻滞剂
53. COPD 患者的肺功能检查主要表现为
- A. 支气管舒张实验阳性
- B. 弥散功能下降
- C. FEV1/FVC 下降
- D. 残气量下降
- E. 肺总量下降
54. 患者已经行胆囊切除术，1 天前因腹痛行十二指肠 ERCP 手术，现突发剧烈疼痛，左中上腹明显，向背部放射。考虑什么疾病
- A. 急性胰腺炎
- B. 消化性溃疡穿孔
- C. 急性心肌梗塞
- D. 急性胆管炎



E. 胆总管结石

55. 患者做诊断性胸穿时，抽取 30ml 时，突然出现面色苍白、大汗、气急，首选处理方法为

A. 停止穿刺，卧床休息

B. 缓慢抽

C. 静点阿托品

D. 糖皮质激素治疗

E. 肾上腺素治疗

56. 患者出现食管胃底静脉曲张破裂出血，脾大，应该选择的手术方式为

A. 贲门周围血管离断，脾切除术

B. 脾切除术

C. 脾-肾静脉分流术，脾切除术

D. 门脉分流术

E. 肝总动脉结扎术

57. 患者外伤，血压 90/50mmHg，全腹压痛反跳痛，肌紧张，移动性浊音阳性，首选治疗是

A. 抗休克治疗，急症准备手术

B. 输血抗休克

C. 静脉注射糖皮质激素

D. 平卧休息

E. 观察

58. 男，68 岁，发热，干咳，全身肌肉酸痛，胸片显示双肺磨玻璃影，大部分融合。患者首选的检查是

A. 病原抗原检测

B. 病原抗体检测

C. 痰培养

D. 核酸检测

E. 血培养，药敏

59. 男，78 岁，茶色尿，大便发白，皮肤瘙痒，黄疸，肝内外肝管扩张，肝脏下缘 3cm 出可以触及无痛性肿物，可能的疾病是

A. 胆囊结石

B. 胰头癌

C. 肝内胆管癌

D. 肝外胆管结石

E. 胆总管癌

60. 男，48 岁，一小时前被机动车撞伤腹部，诉腹痛，程度逐渐加重。查体 T38.5℃，P90 次/分，R20 次/分，

BP100/74mmHg。痛苦貌，腹壁完整，全腹压痛、反跳痛、肌紧张，以脐周为著。腹部 B 超肠间少量积液，肝周、膈下未见明显异常。导尿时导出黄色尿液 300ml。最有价值的治疗方法为

- A. 大量补液、抗休克
- B. 紧急输血
- C. 急诊肠镜
- D. 腹腔引流
- E. 外科手术

61. 中年男性，冠心病史，长期口服阿司匹林，大量饮酒后呕血 800ml，查体上腹部轻压痛，余无异常，明确诊断首选辅助检查

- A. B 超
- B. X 线钡餐检查
- C. 胃镜
- D. 腹部 CT
- E. 腹部平片

62. 中年女性，血压 150/60，有感染病史，心脏听诊：心尖区收缩期吹风样和舒张期隆隆样杂音，双下肢无水肿，诊断为

- A. 动脉导管未闭
- B. 主动脉瓣关闭不全
- C. 主动脉瓣狭窄
- D. 二尖瓣关闭不全合并狭窄
- E. 肺动脉瓣狭窄

63. 男，52 岁，从高处摔落，右胸痛 25 分钟，心率 102bpm，呼吸 22 次/分，血压 110/70mmHg，右侧胸廓完全塌陷，肺压缩 10%，神志清楚，双肺未闻及干湿啰音，最有效的治疗措施是

- A. 胸腔抽刺排气
- B. 胸腔闭式引流
- C. 建立有效的呼吸
- D. 静脉补液
- E. 镇静、止痛

64. 女性，70 岁，左侧腹股沟肿块三天，绞痛两天，查体：左侧腹股沟压痛，最可能的诊断为

- A. 腹股沟斜疝
- B. 直疝
- C. 股疝
- D. 腹股沟肿块

E. 脂肪瘤

65. 男性, 32 岁, 上腹部进食后不适 6 年, x 线钡餐检查见胃窦胃小弯处龛影, 大小约 2.5cm, 龛影口部有一狭颈, 黏膜皱壁集中, 诊断最可能是

A. 胃溃疡

B. 胃癌

C. 胃炎

D. 十二指肠溃疡

E. 胃憩室

66. 女, 56 岁。排便时肛门疼痛一天, 疼痛剧烈, 厕所纸上有鲜红色血液, 既往有便秘史, 考虑诊断为

A. 内痔

B. 外痔

C. 肛裂

D. 肛管癌

E. 肛瘘

67. 女性, 34 岁, 上腹部疼痛 3 年, 进食后可加重。今日大量进食后出现上腹部刀割样疼痛, 查体可见全腹肌紧张、压痛、反跳痛, 检查首选

A. 立位腹部 X 线

B. B 超

C. CT

D. 增强 CT

E. 胃镜

68. 男性, 36 岁, 咳痰一月余, 痰中有血丝, 痰液分四层, 偶尔咯血 100ml, x 线无异常, 考虑诊断为

A. 支气管扩张

B. 肺癌

C. 结核

D. 支气管肺炎

E. 肺水肿

69. 男, 78, 右下肢行走痛, 乏力 5 年, 加重 1 年, 既往高血压 10 年, 糖尿病 5 年, 查体右足背, 腘动脉消失, 右股动脉正常, 右下肢皮温下降, 右足苍白。患者考虑为

A. 血栓闭塞性脉管炎

B. 急性动脉栓塞

C. 动脉硬化性闭塞症

D. 下肢深静脉血栓

E. 血栓性浅静脉炎

70. 男, 70 岁, 咳嗽咳痰伴痰中带血 1 月, 发热 1 周, 吸烟 40 年, 20 支/天, 有杵状指, X 线可见右肺门阴影, 为明确诊断可选择

- A. 肿瘤标志物
- B. 痰培养+药敏
- C. 经皮穿刺活检
- D. 增强 CT
- E. 痰找结核杆菌

71. 女, 36 岁, 左下腹痛, 腹泻, 大便次数 3-5 次/日, 伴黏液脓血便, 里急后重, 反复多次粪便培养, 阿米巴等均为阴性, 抗生素治疗无效, 距肛门 50cm 以下可见粘膜粗颗粒改变, 点状多发糜烂及浅溃疡, 可见黄色黏液覆盖, 治疗首选

- A. 环孢素
- B. 蒙脱石散
- C. 甲硝唑
- D. 柳氮磺吡啶
- E. 泼尼松

72. 女, 45 岁, 左手示指被鱼刺扎破 5 天, 患指红, 肿, 痛伴发热 3 天, 查体: T: 38.5℃, 左手示指甲旁红肿, 有脓点, 触痛明显, 有波动感。目前最恰当处理方法是:

- A. 外敷鱼石脂软膏
- B. 拔甲
- C. 切开引流
- D. 红外线理疗
- E. 应用抗生素

73. 女, 55 岁, 间断多关节肿痛 8 年, 近 3 年双腕关节活动逐渐受限, 长期服用泼尼松 10mg/d 治疗。X 线片示双手指间关节间隙狭窄, 双侧腕骨可见骨质吸收破坏, 间隙变窄, 该患者腕关节病变影像学分期为

- A. I
- B. II
- C. III
- D. IV
- E. V

74. 男, 47 岁, 咳嗽乏力, 四肢疼痛, 自行口服红霉素, 未见好转, 体温波动于 38℃, CT 示左下肺斑片状阴影, 实验室检查支原体 IgM 阳性, 请问此时应选用的抗菌药为

- A. 莫西沙星

B. 磺胺

C. 环丙沙星

D. 阿奇霉素

E. 罗红霉素

75. 男，体温高，心率快，血压 80/50mmHg，神智不清。Hb103g/L，白细胞  $20 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 0.82。下列治疗方法错误的是

A. 补液抗休克

B. 输入抗生素抗感染治疗

C. 物理降温

D. 输白蛋白

E. 输血抗休克

76. 患者男，23 岁，近日来出现右眼上睑下垂，CT 示前上纵膈有一三厘米的圆影，考虑诊断为

A. 畸胎瘤

B. 重症肌无力

C. 神经性肿瘤

D. 胸腺瘤

E. 胸骨后甲状腺瘤

77. 男，车祸，肺压缩 10%，左侧第 5 肋单根肋骨骨折。急救现场首先的处理是

A. 胸廓外固定

B. 镇静，止痛

C. 吸氧观察

D. 开胸探查

E. 抗休克

78. 患者腹痛高热，体查腹部压痛，反跳痛，肠鸣音消失，CT 示腹部积液，腹腔穿刺，抽出黄绿色液体，请问致病菌

A. 肺炎克雷伯

B. 大肠埃希菌

C. 变形杆菌

D. 铜绿假单胞菌

E. 肠球菌

79. 女，35 岁，体检颈前肿块 2 个月，无明显症状，查体甲状腺左叶有一硬性肿物  $1.5 \times 1\text{cm}$ ，随吞咽活动，无压痛，颈部无肿大结节，B 超示左叶上级  $1.5 \times 1\text{cm}$ ，低回声团，血流丰富、边界不清，纵横比大于 1，实验室检查 FT336.46nmol/L，FT416.5nmol/L，TSH2.5nmol/L。最可能的诊断是

A. 桥本甲状腺炎

B. 甲状腺癌

C. 甲状旁腺癌

D. 甲状腺腺瘤

E. 结节性甲状腺肿

80. 女, 40 岁, 间断咳嗽咳痰 15 年, 活动时气短 5 年, 间断双下肢水肿 2 年。查体颈静脉充盈, 双肺呼吸音减轻, 心率 90 次/分, 节律齐, P2>A2, 三尖瓣听诊区可闻及 2/6 级收缩期杂音, 最可能的诊断为

A. 风湿性心脏瓣膜病

B. 房室间隔缺损

C. 缩窄性心包炎

D. 慢性肺源性心脏病

E. 慢性血栓性肺动脉高压

81. 女性, 34 岁, 呼吸困难伴胸闷 10 个月, 近 1 月加重, 行 X 片可见双肺大片磨玻璃影, 可见融合, 血象示: 白细胞升高, 中性粒细胞升高, 最可能的诊断为

A. 间质性肺炎

B. 肺癌

C. 支扩伴感染

D. 浸润型肺结核

E. 病毒性肺炎

82. 女, 58 岁, 因胆红素结石合并左肝外叶萎缩, 行左肝外叶及胆囊切除, 胆总管切开取石加 T 管引流, 术后两周来院复查, 看胆总管是否残留结石, 行什么检查

A. 腹部 b 超

B. 经 T 管胆道造影

C. MRCP

D. PTC

E. ERCP

83. 男, 30 岁, 1 周前不慎被铁钉扎进左足底, 现出现苦笑面容, 四肢肌张力高, 以下对于预防该疾病最关键措施是

A. 观察随诊

B. 打疫苗

C. 彻底清创

D. 抗生素治疗

E. 隔离

84. 女, 26 岁, 剖宫产术后 1 周, 左下肢肿胀 5 天, 查体, 左小腿 homans 阳性, 常见因素不包括
- A. 高凝状态
  - B. 妊娠
  - C. 卧床
  - D. 剖宫产
  - E. 早日下地活动
85. 女, 20 岁, 低热干咳 1 个月, 胸痛 1 周, 查体 37.8℃, 右下肺语音震颤减弱, 叩诊实音, 最可能的诊断是
- A. 肺癌右胸腔转移
  - B. 支气管扩张
  - C. 气胸
  - D. 结核性胸膜炎
  - E. 慢阻肺
86. 女, 38 岁, 左乳 3×3 肿块, 质硬, 光滑, 边界清楚, 可推动, 无淋巴结肿大, 首选检查是
- A. 乳腺 x 线检查
  - B. 乳腺导管检查
  - C. 乳腺 B 超
  - D. CT
  - E. MRI
87. 男性, 72 岁, 贫血, 粪隐血阳性, 直肠指检未见明显异常, 肠镜见距离肛门 10 厘米处溃疡型肿块, 最佳治疗方式为
- A. Miles 手术
  - B. 腹会阴联合直肠癌根治术
  - C. Hartmann 手术
  - D. 姑息手术
  - E. 直肠低位前切除术
88. 男性, 56 岁, 上腹痛 1 月, 检查见胃角浅表溃疡, 活检示高级别上皮内瘤变, WS (+), 应首选的治疗方式为
- A. 四联疗法后 HP 复查
  - B. 胃次全切+根治术
  - C. 内镜下行黏膜剥离术
  - D. 胃大部切除术
  - E. 观察随访
89. 男, 吸烟四十余年, 喘息 5 年, 加重 3 天。咳嗽胸闷, 嗜睡, 烦躁, 球结膜充血, 口唇发绀。查体桶状胸, 右下腹可闻及湿啰音。动脉血气分析 PH7.25, PaCO<sub>2</sub>75mmHg, PaO<sub>2</sub>34mmHg, BE+3。最可能的诊断是

- A. 急性脑血管病
- B. 支气管扩张
- C. ARDS
- D. 肺性脑病
- E. 肝性脑病

90. 男, 28 岁, 发热 3 天, 查体: 胸膝位 3-6 点钟肛门红肿, 触痛, 无渗出物, 最可能的诊断是

- A. 肛痿
- B. 直肠后间隙脓肿
- C. 肛门周围脓肿
- D. 骨盆直肠间隙脓肿
- E. 坐骨肛管间隙脓肿

91. 女, 反复咳嗽多年, 今日突发咯血 200 毫升, 之前偶有咯血。胸片提示多发囊状改变。明确诊断的检查是

- A. 胸部 CT
- B. 支气管动脉造影
- C. 支气管镜
- D. PetCT
- E. 磁共振

92. 女, 反复咳嗽多年, 今日突发咯血 200 毫升, 之前偶有咯血, 胸片提示多发囊状改变, 病变局限于肺段, 最根本的治疗方法是

- A. 静滴垂体后叶素
- B. 肺叶切除手术
- C. 抗生素治疗
- D. 支气管动脉栓塞
- E. 静滴氨甲环酸

93. 男性, 36 岁, 肛周反复疼痛, 伴脓性分泌物半年, 查体截石位肛周皮肤 5 点, 7 点两处外口。挤压脓血性溢液出。首选的治疗。

- A. 硬化剂注射
- B. 抗生素治疗
- C. 温水坐浴
- D. 挂线疗法
- E. 手术切除

94. 男, 48 岁, 一小时前被机动车撞伤腹部, 诉腹痛, 程度逐渐加重。查体 T38.5℃, P90 次/分, R20 次/分, BP100/74mmHg。痛苦貌, 腹壁完整, 全腹压痛、反跳痛、肌紧张, 以脐周为著。腹部 B 超肠间少量积液, 肝周、



膈下未见明显异常。导尿时导出黄色尿液 300ml。患者最有可能是以下

- A. 肝破裂
- B. 脾破裂
- C. 小肠破裂
- D. 肾破裂
- E. 胰腺破裂

95. 女性，42 岁，反复腹胀，乏力，纳差三年。11 周来出现发热，腹部隐痛，腹围显著增大，既往乙型肝炎病史 15 年。查体慢性肝病面容，肝掌，腹部膨隆，弥漫性压痛，反跳痛。肝肋下未触及，脾肋下 3cm，移动性浊音阳性，白细胞  $15 \times 10^9/L$ ， $NO0.85$ ， $scr104 \mu mol/L$ 。BUN6.6mmol/L。最可能腹痛的原因

- A. 自发性腹膜炎
- B. 门静脉血栓
- C. 原发性肝癌
- D. 肝肾综合征
- E. 继发性腹膜炎

96. 男，30 岁，反复咯血 6 年，多为痰中带血，偶有一次大咯血 100ml，无发热，胸部 X 线片提示多发囊状改变。为明确诊断应选择以下哪项检查

- A. 支气管造影
- B. 支气管镜
- C. 胸部高分辨 CT
- D. CT 肺动脉造影
- E. 结核菌素检查

97. 男性，29 岁，大量饮酒后呕吐鲜血一小时，量约 800ml，因冠心病长期服用阿司匹林。查体 P110 次/分，血压 92/65mmHg，神志清楚，未见肝掌，蜘蛛痣，腹软，无压痛，肝脾肋下未触及，肠鸣音 12 次，为明确诊断最有意义的检查。

- A. 腹部 CT
- B. 上消化道 X 线钡餐造影
- C. 腹部 X 线平片
- D. 腹部 B 超
- E. 胃镜

98. 男，28 岁，因外伤脾破裂行脾切除术 1 天。查体：T36.5℃P128 次/分 R30 次/分 BP88/48mmHg。动脉血气分析：PH7.28， $PaCO_2 32mmHg$ ， $PaO_2 100mmHg$ ， $BE -9mmol/L$ ， $HCO_3^- 16mmol/L$ ，乳酸 4mmol/L 患者属于以下哪种酸碱平衡失调类型

- A. 呼吸性酸中毒失代偿

- B. 呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒  
C. 呼吸性碱中毒代偿期  
D. 代谢性酸中毒失代偿  
E. 代谢性碱中毒代偿期
99. 男, 58 岁, 咳嗽、咳痰, 痰中带血, X 线可见右肺门肿物, 病理检查为鳞状细胞癌, 现支气管镜提示右上叶支气管开口处可见新生肿物, 首选的治疗为
- A. 肺叶切除  
B. 肺段切除  
C. 袖状切除  
D. 全肺切除  
E. 楔形切除
100. 女性患者, 上腹部腹胀 4 个月, 上消化道造影未见异常, 此时缓解腹胀最有效的药物是
- A. 抑酸药  
B. 抗幽门螺旋杆菌药  
C. 硝酸甘油  
D. 阿司匹林  
E. 促胃动力药
101. 男, 55 岁, 左上腹疼痛, 血压 80/55mmHg, Hb106g/L, 下列处理不正确的是
- A. 广谱抗生素  
B. 维持水电解质平衡  
C. 查找病因  
D. 完善相关检查  
E. 输血
102. 男性, 34 岁, 腹痛, 腹泻, 脐周痛, 便后腹痛减轻, 大便不成形, 无脓血有粘液, 结肠镜检阴性, 下列哪项有助于诊断
- A. 大便不成形  
B. 结肠镜检阴性  
C. 腹痛腹泻  
D. 无脓血有粘液  
E. 排便与疼痛缓解有关
103. 男性, 56 岁, 腹胀, 乏力 5 年, 近来自觉肝区隐痛, 无饮酒史, 身高 170cm, 体重 88kg, 腹围 105cm, 胆固醇 6.17mmol/L, 该患者发生这种病理改变与下列哪项无关
- A. 肝星状细胞激活

- B. 胶质细胞增生
- C. 线粒体功能障碍
- D. 脂质沉积
- E. 胰岛素抵抗

104. 女, 68, 左上肺肿块, 糖尿病 10 年, 高血压 3 年, 血压 180/110mmHg, 拟手术治疗, 术前禁食, 下列处理错误的是

- A. 降糖治疗到 5.1~11
- B. 观察病情
- C. 暂停手术
- D. 快速降压到正常
- E. 不可以快速降压到正常

105. 患者大量呕吐后, 实验室检查: PH7.7, Cl<sup>-</sup>70mmol/L, K<sup>+</sup>2.5mmol/L, Na<sup>+</sup>142mmol/L, 下列哪项诊断符合题意

- A. 低氯低钾, 代谢性酸中毒
- B. 低氯低钠, 呼吸性酸中毒
- C. 低氯低钾, 代谢性碱中毒
- D. 低氯低钠
- E. 低钾低钠

106. 男性, 64 岁。右季肋部胀痛 1 月余, 伴有食欲减退及乏力, 体重减轻 4kg。查体: 体温 38.2℃, 呼吸 18 次/分, 心率 84 次/分, 血压 116/80mmHg。消瘦, 慢性病容。皮肤、巩膜明显黄染, 脸结膜苍白。肝右侧肋缘下 3cm, 质硬, 表面凹凸不平, 脾肋下未触及, 移动性浊音阴性, 双下肢轻度水肿。AFP689ng/ml。CT 提示肝脏可见大小约 3x2cm 低密度影, 动脉期出现环形强化影而病变内部强化不显著, 为明确诊断, 应首选的检查是

- A. 肝穿刺检查
- B. 超声检查
- C. X 线检查
- D. MRCP 检查
- E. CT 检查

107. 男, 低热, 体重减轻 5kg, 右下腹可疑肿块, 回盲部跳跃征, 盲肠及结肠短缩。考虑诊断为

- A. 肠结核
- B. 克罗恩病
- C. 溃疡性结肠炎
- D. 结肠癌
- E. 肠易激综合征

108. 男, 40 岁, 体温 39°, 心率 96 次/分, 轻微咳嗽, 肌肉酸痛, X 片示下肺有斑片状融合影。最可能的致病菌

是

- A. 金葡菌
- B. 军团菌
- C. 衣原体
- D. 肺炎链球菌
- E. 病毒性肺炎

109. 男, 36 岁。间断腹痛 1 年, 以右下腹为著伴有便秘和反复发作的口腔溃疡病, 无低热、乏力及消瘦。查体: 轻度贫血貌, 皮肤巩膜无黄染, 浅表淋巴结未触及肿大, 心肺未见异常, 腹软, 右下腹可触及边界不清的包块, 大小约 4x5cm, 可移动, 压痛阳性。PPD 试验阴性。两周前因肛周脓肿行手术治疗。为了明确诊断, 首选的检查方法为

- A. X 线
- B. B 超
- C. CT
- D. 肠镜
- E. CEA

110. 女, 34 岁, 月经增多, 脱发, 实验室检查: dsDNA (+), ANCA (+), 尿蛋白 (+++), 最可能的诊断是

- A. 红斑狼疮
- B. 类风湿关节炎
- C. 甲亢
- D. 干燥综合征
- E. 原发性血管炎

111. 老年患者, 全腹胀痛, 左下腹压痛, 停止排气, 既往便秘, 行 X 线检查可见

- A. 鸟嘴征
- B. 铅管征
- C. 杯口征
- D. 鹅卵石征
- E. 充盈缺损

112. 女, 28 岁, 一周前病人感觉乳房疼痛、局部红肿、发热, 查体乳腺有波动感, 应如何种治疗

- A. 切开引流
- B. 广谱抗生素
- C. 局部热敷
- D. 局部注射抗生素
- E. 促使乳汁通畅排出

113. 男, 20 岁, 看电视时突发肩胛区疼痛, 胸闷憋喘, 呼吸困难, 查体: 体型瘦高, X 线亮度增高, 肺组织压缩 40%, 其可能出现的是

- A. 患侧胸廓萎陷
- B. 患肺泡通气量/血流量 $>0.8$
- C. 吸气时向患侧偏
- D. 胸膜腔压力升高
- E. 患侧肺组织膨胀

114. 男性, 75 岁, 全身淋巴结无肿大, 查体: 脾肋缘下 5cm, 染色体 t(9; 22)(q34; q11), 最可能是什么疾病

- A. 骨髓纤维化
- B. 急性髓系白血病
- C. 慢性髓系白血病
- D. 慢性淋巴细胞白血病
- E. 急性淋巴细胞白血病

115. 男, 20 岁, 常伴发低热、咳嗽, X 线检查可见肺门哑铃状阴影, 判断患者可能的疾病

- A. 原发性肺结核
- B. 支气管肺癌
- C. 肺炎
- D. 肺结节病
- E. 肺气肿

116. 男, 65 岁, 既往咳嗽, 咳脓痰, 咯血 10 年, 近期发热、症状加重。痰培养查出铜绿假单胞菌, 应诊断为

- A. 支气管扩张+并发感染
- B. 肺癌
- C. 肺栓塞
- D. 肺炎链球菌肺炎
- E. COPD

117. 男, 65 岁, 既往咳嗽, 咳脓痰, 咯血 10 年, 近期发热、症状加重。痰培养查出铜绿假单胞菌, 患者首选治疗为

- A. 头孢呋辛
- B. 哌拉西林/他唑巴坦
- C. 阿奇霉素
- D. 罗红霉素
- E. 诺氟沙星

118. 男性, 68 岁, 咳嗽咳痰 3 个月, 胸痛 1 周, CT 示右上肺尖  $3 \times 2$ cm 肿块, 首选辅助检查为

- A. 经胸壁穿刺活检
- B. 支气管镜检查
- C. 痰涂片
- D. 血常规
- E. 肺功能检查

119. 男性, 68 岁, 咳嗽咳痰 3 个月, 胸痛 1 周, CT 示右上肺尖  $3 \times 2\text{cm}$  肿块, 假设患者未治疗, 8 个月后, 出现呼吸困难, 侧卧不能缓解, 右侧胸部大量胸腔积液, CT 示右侧肺尖部  $4 \times 3\text{cm}$  肿块, 胸椎、肋骨多发转移, 为缓解症状当前最佳治疗措施是

- A. 全身化疗
- B. 同步放化疗
- C. 胸椎放疗
- D. 局部放疗
- E. 胸腔闭式引流

120. 某男, 稻田劳动后右小腿肿痛 4 天, 体温  $38.8$ , 见皮疹,  $4 \times 4\text{cm}$ , 色鲜红, 界限清楚, 中间颜色淡, 应诊断为

- A. 疖
- B. 丹毒
- C. 急性蜂窝组织炎
- D. 痈
- E. 气性坏疽

121. 某男, 稻田劳动后右小腿肿痛 4 天, 体温  $38.8$ , 见皮疹,  $4 \times 4\text{cm}$ , 色鲜红, 界限清楚, 中间颜色淡, 错误的治疗是

- A. 红肿切开引流
- B. 抗生素治疗
- C. 硫酸镁湿敷
- D. 抬高患侧肢体
- E. 按摩理疗

122. 男, 28 岁, 图书馆管理员, 今晨整理图书馆图书期间出现突发咳嗽, 气喘, 呼吸困难, 既往过敏性鼻炎病史, 听诊双肺散在哮鸣音。什么辅助检查最有意义

- A. 支气管舒张试验
- B. 胸部 X 线片
- C. 胸部高分辨 CT
- D. 超声心动图
- E. 动脉血气分析

123. 男, 28 岁, 图书馆管理员, 今晨整理图书馆图书期间出现突发咳嗽, 气喘, 呼吸困难, 既往过敏性鼻炎病史, 听诊双肺散在哮鸣音。患者无心脏病体征。该患者考虑什么疾病

- A. 急性左心衰
- B. 支气管哮喘急性发作
- C. 支气管炎
- D. 急性呼吸窘迫综合征
- E. 上气道咳嗽综合征

124. 女, 40 岁, 发现右乳肿物 1 年, 病初约花生米大小, 近半年肿物增大, 无特殊不适。查体: 右乳外上限可触及 4cm×3cm 质硬肿物, 皮肤无粘连。右侧腋窝淋巴结可触及肿大、质硬淋巴结, 融合成团, 右侧锁骨上淋巴结未触及。乳房 x 线摄影: 右乳可见 4cm×3cm 高密度影, 周边成毛刺状, 中央可见强回声钙化点。其余检查未见远处转移。该患者疾病 TNM 分期为

- A. T2N2M0
- B. T3N2M0
- C. T3N1M0
- D. T2N1M0
- E. T1N2M0

125. 女, 40 岁, 发现右乳肿物 1 年, 病初约花生米大小, 近半年肿物增大, 无特殊不适。查体: 右乳外上限可触及 4cm×3cm 质硬肿物, 皮肤无粘连。右侧腋窝淋巴结可触及肿大、质硬淋巴结, 融合成团, 右侧锁骨上淋巴结未触及。乳房 x 线摄影: 右乳可见 4cm×3cm 高密度影, 周边成毛刺状, 中央可见强回声钙化点。其余检查未见远处转移。该患者行乳房改良根治术后, 术后病理为浸润性导管癌, 淋巴结转移 4/20, ER (-), PR (-), HER2 (-), 则接下来治疗应选择

- A. 放疗
- B. 化疗
- C. 放疗+化疗
- D. 靶向治疗
- E. 内分泌治疗

126. 男, 48 岁, 间断性腹痛 4 年, 加重 4 小时, 腹痛多于进食后 1 小时发生, 可自行缓解, 未诊治。4 小时前进食后突发剧烈疼痛, 迅速波及全腹。查体 T36.8°, P92 次/分, R18, BP: 160/80。全腹反跳痛肌紧张, 有局部压痛。引起腹痛的原因是

- A. 急性心肌梗死
- B. 急性胰腺炎
- C. 胃溃疡穿孔
- D. 急性冠心病



## E. 急性胃粘膜病变

127. 男, 48 岁, 间断性腹痛 4 年, 加重 4 小时, 腹痛多于进食后 1 小时发生, 可自行缓解, 未诊治。4 小时前进食后突发剧烈疼痛, 迅速波及全腹。查体 T36.8°, P92 次/分, R18, BP160/80。全腹反跳痛肌紧张, 有局部压痛。

诊断该病首选检查

- A. 腹部 X 钡剂检查
- B. 腹部 B 超
- C. 胃镜
- D. 腹部 CT
- E. 立位腹平片

128. 男, 48 岁, 间断性腹痛 4 年, 加重 4 小时, 腹痛多于进食后 1 小时发生, 可自行缓解, 未诊治。4 小时前进食后突发剧烈疼痛, 迅速波及全腹。查体 T36.8°, P92 次/分, R18, BP160/80。全腹反跳痛肌紧张, 有局部压痛。

该病最有效的治疗方法

- A. 迷走神经切断术
- B. 全胃切除术
- C. 胃大部切除术
- D. 穿孔修补术
- E. 抗酸+补液

129. 患者男, 腰背部疼痛 20 天, 左侧膝关节、左下肢踝关节疼痛, 晨起明显, 活动后缓解, “4”字实验阳性, 既往有虹膜炎病史。有效检查是

- A. HLA-b27
- B. 类风湿因子
- C. 关节液检查
- D. 骶髂关节 X 线
- E. 抗环瓜氨酸多肽抗体

130. 患者男, 腰背部疼痛 20 天, 左侧膝关节、左下肢踝关节疼痛, 晨起明显, 活动后缓解, “4”字实验阳性, 既往有虹膜炎病史。最可能的诊断是

- A. 膝关节结核
- B. 脊柱关节炎
- C. 类风湿关节炎
- D. 滑膜炎
- E. 骨关节炎

131. 慢性肾衰竭患者, 定期血液透析, 每周 3 次, 近两天吃了 2kg 橘子, 出现口周麻木, 四肢乏力, 心率 43 次/分。出现上述症状原因



- A. 高钾血症
- B. 代谢性酸中毒
- C. 高磷血症
- D. 低钙血症
- E. 高钙血症

132. 慢性肾衰竭患者，定期血液透析，每周 3 次，近两天吃了 2kg 橘子，出现口周麻木，四肢乏力，心率 43 次/分。治疗最有效的是

- A. 血液透析
- B. 阳离子交换树脂
- C. 注射钙剂
- D. 大量激素
- E. 利尿剂

133. 男性，40 岁。3 年前因胆囊结石行胆囊切除术。1 天前因皮肤、巩膜黄染行内镜逆行胰胆管造影检查，术后 2 小时患者出现上腹部剧烈疼痛，呈持续性，向肩背部放射，伴有恶心、呕吐。查体：皮肤、巩膜黄染，左上腹压痛，反跳痛可疑阳性，肝脾肋下未触及，肝浊音界存在，移动性浊音阴性，肠鸣音 2-3 次/分，双下肢无水肿。血淀粉酶 589U/L。该患者最可能的诊断是

- A. 急性胰腺炎
- B. 消化性溃疡穿孔
- C. 急性心肌梗塞
- D. 急性胆管炎
- E. 胆总管结石

134. 男性，40 岁。3 年前因胆囊结石行胆囊切除术。1 天前因皮肤、巩膜黄染行内镜逆行胰胆管造影检查，术后 2 小时患者出现上腹部剧烈疼痛，呈持续性，向肩背部放射，伴有恶心、呕吐。查体：皮肤、巩膜黄染，左上腹压痛，反跳痛可疑阳性，肝脾肋下未触及，肝浊音界存在，移动性浊音阴性，肠鸣音 2-3 次/分，双下肢无水肿。血淀粉酶 589U/L。为明确诊断，首选的检查为

- A. 超声
- B. 胃镜
- C. CT
- D. X 线
- E. ERCP

135. 男性，40 岁。3 年前因胆囊结石行胆囊切除术。1 天前因皮肤、巩膜黄染行内镜逆行胰胆管造影检查，术后 2 小时患者出现上腹部剧烈疼痛，呈持续性，向肩背部放射，伴有恶心、呕吐。查体：皮肤、巩膜黄染，左上腹压痛，反跳痛可疑阳性，肝脾肋下未触及，肝浊音界存在，移动性浊音阴性，肠鸣音 2-3 次/分，双下肢无水肿。血

淀粉酶 589U/L。患者可能出现的并发症不包括

- A. 胰腺假性囊肿
- B. 肝脓肿
- C. 消化道瘘
- D. 腹腔间隔室综合征
- E. SIRS

136. 女性 50 岁，烧伤 3 小时，体重 60kg，双小腿及双足有水泡，创面湿润，疼痛明显。烧伤面积为

- A. 0.2
- B. 0.19
- C. 0.13
- D. 0.21
- E. 0.3

137. 女性 50 岁，烧伤 3 小时，体重 60kg，双小腿及足有水泡，创面湿润，疼痛明显。第一个 24 小时补液量是

- A. 4700ml
- B. 5700ml
- C. 1700ml
- D. 3700ml
- E. 2700mL

138. 女，46 岁，5 年前因胆囊结石行胆囊切除术。4 小时前突发上腹部绞痛，以右上腹为著，随后出现发热。体温最高达 39.6℃，伴有恶心、呕吐，小便呈浓茶色。查体：体温 39.4℃，呼吸 20 次/分，心率 96 次/分，血压 80/50mmHg，神志不清，躁动，巩膜黄染，右上腹肌紧张，有压痛和反跳痛。X 线示胆总管及肝内外胆管扩张，下列能反应病情危重的是

- A. 皮肤黄疸
- B. 发热
- C. 谵妄休克
- D. 腹痛
- E. 低血压

139. 女，46 岁，5 年前因胆囊结石行胆囊切除术。4 小时前突发上腹部绞痛，以右上腹为著，随后出现发热。体温最高达 39.6℃，伴有恶心、呕吐，小便呈浓茶色。查体：体温 39.4℃，呼吸 20 次/分，心率 96 次/分，血压 80/50mmHg，神志不清，躁动，巩膜黄染，右上腹肌紧张，有压痛和反跳痛。X 线示胆总管及肝内外胆管扩张。目前治疗应选择

- A. 剖腹探查
- B. 纠正水、电解质平衡
- C. 穿刺引流

D. 胆管切开减压

E. 造瘘术

140. 剧烈呕吐后呕鲜血最可能的病因

A. 胃角溃疡合并出血

B. 食管贲门黏膜撕裂伤

C. 十二指肠球部溃疡出血

D. 食管胃底静脉曲张破裂出血

E. 胃恒径动脉破裂出血

141. 长期大量饮酒患者上消化道出血原因

A. 胃角溃疡合并出血

B. 食管贲门黏膜撕裂伤

C. 十二指肠球部溃疡出血

D. 食管胃底静脉曲张破裂出血

E. 胃恒径动脉破裂出血

142. 急性坏死性胰腺炎的腹痛特点是

A. 一侧腹痛，持续性，向会阴部放射

B. 上腹持续性剧烈腹痛，成束带状，像腰背部放射

C. 上腹钻顶样剧烈腹痛，阵发性加剧，间歇期完全缓解

D. 上腹剧烈样绞痛，阵发性，像右侧肩部放射

E. 上腹突发刀割样剧烈腹痛，迅速波及全腹

143. 胆总管结石嵌顿的腹痛特点

A. 一侧腹痛，持续性，向会阴部放射

B. 上腹持续性剧烈腹痛，成束带状，像腰背部放射

C. 上腹钻顶样剧烈腹痛，阵发性加剧，间歇期完全缓解

D. 上腹剧烈样绞痛，阵发性，向右侧肩放射

E. 上腹突发刀割样剧烈腹痛，迅速波及全腹

144. 肺泡通气不足容易造成的酸碱失衡是

A. 呼碱

B. 呼酸合并代碱

C. 代碱

D. 呼酸合并代酸

E. 呼酸

145. 慢性肺源性心脏病失代偿期患者，同时合并二型呼吸衰竭，为减轻双下肢水肿，大量应用袢利尿剂，可能出

现的酸碱失衡是

- A. 呼碱
- B. 呼酸合并代碱
- C. 代碱
- D. 呼酸合并代酸
- E. 呼酸

146. 慢性阻塞性肺疾病合并肝性脑病患者, 气管插管机械通气后设置了较大潮气量, 二氧化碳迅速降至正常范围, 此时可能出现的酸碱失衡是

- A. 呼碱
- B. 呼酸合并代碱
- C. 代碱
- D. 呼酸合并代酸
- E. 呼酸

147. 修补加强腹股沟管前壁修补最常见的手术方法是

- A. Bassini 法
- B. Ferguson 法
- C. McVay 法
- D. Shouldice 法
- E. Halsted 法

148. 常用于股疝修补的手术方法是

- A. Bassini 法
- B. Ferguson 法
- C. McVay 法
- D. Shouldice 法
- E. Halsted 法

149. 符合肝硬化门静脉高压的腹腔积液特点

- A. 血清腹水白蛋白梯度 $>11\text{g/L}$
- B. AFP 升高
- C. ADA 升高
- D. 白细胞  $300 \times 10^9/\text{L}$ , 中性粒细胞居多
- E. 找到异型细胞

150. 符合结核性腹膜炎的腹腔积液特点

- A. 血清腹水白蛋白梯度 $>11\text{g/L}$

- B. AFP 升高
- C. ADA 升高
- D. 白细胞  $300 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞居多
- E. 找到异型细胞

## 第四单元

1. 妊娠剧吐不能进食者，为预防 Wernicke 脑病，应补充的维生素是

- A. 维生素 PP
- B. 维生素 K
- C. 维生素 A
- D. 维生素 B<sub>1</sub>
- E. 维生素 B<sub>6</sub>

2. 早产儿发生低体温的原因不包括

- A. 缺乏棕色脂肪
- B. 体温调节中枢不完善
- C. 皮肤表面角化层较差
- D. 皮下脂肪薄
- E. 体表面积相对较小

3. 颅内压增高的早期表现不包括

- A. 视神经乳头水肿
- B. 喷射性呕吐
- C. 双侧瞳孔散大
- D. 头痛
- E. 高血压

4. 关于妊娠期的子宫，正确的是

- A. 妊娠 12 周后可在耻骨联合上方触及
- B. 子宫增大主要是因为肌细胞数目增多
- C. 妊娠晚期子宫轻度左旋
- D. 妊娠晚期子宫容量约 500ml
- E. 妊娠早期子宫呈对称的球形

5. 精神分裂症与预后不良有关的因素是

- A. 已婚
- B. 急性或亚急性起病
- C. 以阴性症状为主
- D. 初发时年龄晚
- E. 文化程度高

6. 腺病毒肺炎典型的临床表现是

- A. 发热、咳嗽，早期出现肺部细湿啰音
- B. 高热伴刺激性干咳
- C. 持续性发热，伴有憋喘，肺实变体征
- D. 反复发作呼气性呼吸困难
- E. 咳大量脓痰或反复咯血

7. 婴儿出生后各系统、器官的生长发育不平衡，呈先慢后快的是

- A. 免疫系统
- B. 神经系统
- C. 生殖系统
- D. 消化系统
- E. 呼吸系统

8. 关于双胎妊娠，下列错误的是

- A. 胎盘一个或两个
- B. 双胎性别一定一致
- C. 双胎指纹可不同
- D. 双胎外貌性格表型可不同
- E. 羊膜腔可两个，也可一个

9. 继发性不孕最常见的原因

- A. 阴道因素
- B. 宫体因素
- C. 宫颈因素
- D. 输卵管因素
- E. 精神因素

10. 具有支持作用的骨盆底肌肉是

- A. 肛提肌
- B. 会阴深横肌
- C. 尿道括约肌
- D. 坐骨海绵体肌
- E. 肛门外括约肌

11. 缓解偏头痛的首选药物是

- A. 尼莫地平
- B. 普萘洛尔

C. 丙戊酸钠

D. 阿米替林

E. 曲普坦

12. 产妇，腹痛 6 小时，宫口开大 4cm，宫缩 40s/6-7min，胎心 154 次/分，胎膜未破，胎儿骶左前，S+1，宫口可触及胎足，接下来的处理是

A. 剖宫产

B. 静滴缩宫素

C. 观察待自然分娩

D. 破膜

E. 臀位助产

13. 精神分裂症常见的幻觉是

A. 运动幻觉

B. 视幻觉

C. 听幻觉

D. 触幻觉

E. 嗅幻觉

14. 对有神经系统症状的营养性巨幼贫患儿，最重要的治疗措施是

A. 口服维生素 B<sub>12</sub>

B. 肌内注射维生素 B<sub>12</sub>

C. 口服叶酸

D. 口服葡萄糖酸钙

E. 口服铁剂

15. 对于淋病引起的子宫颈炎治疗错误的是

A. 常选用头孢曲松钠

B. 同时应用抗衣原体药物

C. 单次、大剂量治疗

D. 性伴侣同时治疗

E. 及时足量规范化

16. 与绝经综合征内分泌相关，不正确的是

A. AMH 下降

B. 孕酮下降

C. 雌激素波动大

D. GnRH 下降



- E. FSH 明显升高
17. 出生半年后才能打的疫苗是
- A. 乙肝
- B. 卡介苗
- C. 麻腮风
- D. 脊髓灰质炎
- E. 白百破
18. 颅前窝骨折最易损伤的脑神经是
- A. 面神经
- B. 嗅神经
- C. 视神经
- D. 听神经
- E. 动眼神经
19. 属于临产的标志是
- A. 规律渐强式宫缩
- B. 阴道流血
- C. 胎儿下降感
- D. 羊水早破
- E. 不规则宫缩
20. 患者左侧 T5 以下深感觉障碍，右侧 T7 以下痛温觉消失，病变部位是
- A. 左侧 T5 脊髓损伤
- B. 右侧 T5 脊髓损伤
- C. 左侧 T7 脊髓损伤
- D. 右侧 T7 脊髓损伤
- E. 脊髓震荡
21. 原发性三叉神经痛首选的药物是
- A. 氯硝西泮
- B. 左乙拉西坦
- C. 乙琥胺
- D. 卡马西平
- E. 托吡酯
22. 小儿，血钠 125mmol/L，血压稍下降，精神尚可，皮肤弹性差，考虑其脱水类型为
- A. 中度低渗性脱水

- B. 重度低渗性脱水  
C. 轻度低渗性脱水  
D. 中度等渗性脱水  
E. 中度高渗性脱水
23. 糖尿病Ⅱ型数年双下肢阵发性刺痛，考虑周围神经病变，行什么检查  
A. 心电图  
B. 肌电图  
C. 下肢血管彩超  
D. 腰椎 ct  
E. 磁共振
24. 男性 52 岁，排尿间断性中断，阴茎头部疼痛，转换体位可缓解排尿困难，最可能的诊断是  
A. 膀胱结石  
B. 前列腺增生  
C. 尿道炎  
D. 急性细菌性膀胱炎  
E. 肾积水
25. 重症肌无力禁用的药物是  
A. 新斯的明  
B. 糖皮质激素  
C. 丙种球蛋白  
D. 维生素 C  
E. 氨基糖苷类抗生素
26. 传统配方口服补液盐的张力  
A. 等张  
B. 1/2 张  
C. 1/3 张  
D. 1/5 张  
E. 2/3 张
27. 不是 1 型子宫内膜癌（非雌激素依赖）的高危因素  
A. 高血压  
B. 糖尿病  
C. 肥胖  
D. 多产

E. 绝经延迟

28. 女, 29 岁, G1P1, 足月顺产, 5 天前出现高热, 3 天前出现腹痛腹胀等。查体: T39.8℃, BP80/50mmHg, 肺部湿啰音, 意识模糊, 全腹压痛反跳痛肌紧张, 最可能的疾病是

A. 盆腔炎

B. 阴道炎

C. 宫颈炎

D. 阑尾炎

E. 感染性休克

29. 男, 52 岁, 刚进屋时看见一人影, 以为家人回来了, 开灯一看是衣帽架, 该现象是

A. 幻觉

B. 错觉

C. 妄想

D. 精神分裂

E. 躯体障碍

30. 足月产, 宫口开全, s+3, 胎心率 90/分, 出现晚期减速, 此时应采取的措施为

A. 立刻剖宫产

B. 观察

C. 静滴缩宫素

D. 硫酸镁静滴

E. 产钳助产

31. 小儿, 18 个月, 高热, 持续抽搐 15 分钟, 未缓解, 首选的药物是

A. 地西洋

B. 苯妥英钠

C. 苯巴比妥

D. 物理降温

E. 糖皮质激素

32. 女, 1 个月。出生体重 3500g, 呕吐 1 周。生后 3 周左右开始溢乳, 逐日加重, 呈喷射性呕吐, 奶汁带凝块, 不含胆汁。查体体重 3500g, 皮肤轻度黄染, 前囟稍凹, 心肺无异常, 上腹部蠕动波, 右季肋下肿块, 质较硬, 光滑, 移动。最可能的原因是

A. 先天性肥厚性幽门梗阻

B. 先天性肠扭转不良

C. 先天性巨结肠

D. 胃扭转

E. 十二指肠瘀滞症

33. 女, 42 岁, 左眼睑下垂 3 天, 突发剧烈头痛 1 小时, 伴恶心、呕吐。查体: 神情语利, 左睑下垂, 遮盖瞳孔, 左眼瞳孔扩大, 对光反射消失, 眼球处于外展位, 内收及上下视受限。该患者最可能发生的情况是

- A. 重症肌无力
- B. 短暂性脑缺血发作
- C. 蛛网膜下腔出血
- D. 脑内出血
- E. 硬膜下血肿

34. 男, 43 岁, 三月前驾车发生交通事故其妻子死于车祸, 本人受轻伤, 两月来夜间反复梦见车祸现场, 不敢看电视报道, 不敢驾车, 精神萎靡, 终日酗酒, 对该患者的诊断是

- A. 抑郁症
- B. 焦虑症
- C. 创伤后应激障碍
- D. 急性应激障碍
- E. 适应障碍

35. 女, 35 岁, 人流术后闭经 1 年余, 孕激素试验和雌孕激素序贯试验均阴性, 体温监测为双相型, 最可能的是

- A. 下丘脑性闭经
- B. 垂体性闭经
- C. 子宫性闭经
- D. 卵巢性闭经
- E. 大脑皮层功能失调性闭经

36. 初产妇, 26 岁, 顺产后 3 天。查体:  $T37.8^{\circ}\text{C}$ ,  $P60$  次/分。阴道流出血性恶露, 无异味。会阴切口略红, 无渗出。宫底平脐, 无压痛。双侧乳房胀痛。该产妇体温略高于正常的原因可能是

- A. 泌乳热
- B. 产后体温调节功能失调
- C. 会阴切口感染
- D. 急性乳腺炎
- E. 子宫内膜炎

37. 男性, 55 岁, 大量饮酒 20 余年, 2 天前停止饮酒, 肢体粗大震颤, 不认识家人, 夜间吵闹, 自称墙上有鬼, 索要他性命, 有时大吼, 并伴挥拳, 最可能的诊断是

- A. 酒精性痴呆
- B. 酒精性幻觉症
- C. 震颤谵妄

D. 柯萨可夫综合征

E. 酒精性妄想

38. 女, 2 岁, 喂养困难, 气促多汗, 生长落后, 查体: 双肺呼吸音粗, 律齐, 胸骨左缘第二肋间可闻及响亮的粗糙机器音, 心电图示: 左室肥厚, 最可能的诊断是

A. 动脉导管未闭

B. 房间隔缺损

C. 室间隔缺损

D. 法洛四联症

E. 肺动脉狭窄

39. 男, 25 岁, 车祸后四肢麻木无力 2 天。查体神志清楚, 四肢肌力 3 级, 肌张力增高。颈 4 以下的深浅感觉减退。最可能损伤的部位是

A. 颈膨大以下颈髓

B. 脑实质

C. 胸髓

D. 腰骶膨大

E. 颈膨大及以上颈髓

40. 女性, 1 岁, 间断抽搐 2 天, 近来多汗, 反复惊厥, 查体: T36.5℃, 可见枕秃, 方颅, 实验室检查血糖 3.2mmol/L, 钙 1.7mmol/L, 镁 1.0mmol/L, 磷 1.2mmol/L。该患儿最可能的诊断

A. 低镁血症

B. VitD3 缺乏性手足搐搦症

C. 婴儿痉挛

D. 低血糖症

E. 甲状旁腺激素减退

41. 女, 25 岁, 痛经 3 年, 加重半年, 不孕 2 年, 双合诊见阴道后穹窿蓝紫色结节, 双附件未扪及肿大, 最可能的诊断为

A. 子宫内膜异位症

B. 子宫腺肌病

C. 盆腔炎后遗症

D. 卵巢癌转移

E. 子宫内膜癌

42. 女性, 28 岁, 外阴瘙痒伴阴道豆腐渣样物 3 天, 2 周前人工流产术后, 术后发热, 静滴头孢曲松 10 天, 外阴阴道瘙痒最可能的直接原因是

A. 宫腔操作至病原体感染

- B. 阴道局部黏膜潮湿
- C. 术后发热阴道 Ph 升高
- D. 流产后雌激素下降
- E. 乳杆菌生长受抑制
43. 男, 30 岁, 一年前开始在公共场合用餐时, 担心有人注视自己, 怕自己出丑, 因此不敢再动筷子吃饭, 心跳加速, 手抖出汗, 此后, 常回避公共用餐及其他人场合, 患者知道自己的害怕是不必要的, 但是不能自控, 最可能的诊断是
- A. 躯体形式障碍
- B. 精神分裂症
- C. 社交焦虑障碍
- D. 创伤后应激障碍
- E. 强迫障碍
44. 女, 36 岁, 乏力, 头晕, 月经量明显增多半年, 血常规 Hb46g/L, 红细胞  $4.6 \times 10^9/L$ , WBC  $8.9 \times 10^9/L$ , Plt  $89 \times 10^9/L$ . 急诊输悬浮红细胞 50ml 时突发寒战, 高热, 腰痛, 伴心慌气短, 尿色深, 呈酱油色, 导致该患者出现上述情况的原因不可能是
- A. 患者存在溶血性疾病
- B. 输血时血液处理不当
- C. 患者尿路结石发作
- D. 血型不合输血
- E. 血液保存不当
45. 女孩, 两岁, 自幼智力运动发育迟缓, 刚能独立行走。查体, 身高 80CM, 体重 10kg, 眼距宽, 通贯手, 眼外侧上斜, 明确诊断首选的检查是
- A. 骨龄测定
- B. 血清 T3, T4, TSH
- C. 染色体核型
- D. 尿三氯化铁
- E. 血氨基酸分析
46. 男婴, 6 个月, 平时多汗, 夜间惊醒哭闹, 足月顺产, 人工喂养, T36.6°, P128/分, 枕秃明显, 无颅骨软化, 前囟 2 厘米, 双肺呼吸音清, 心率齐, 有力, 各瓣膜正常, 腹软, 肝肋下 1 厘米, 早期检查的结果是什么
- A. 磷下降
- B. 碱性磷酸酶升高
- C. 钙下降
- D. 长骨 X 线异常

E. 25 (OH) D<sub>3</sub>下降

47. 男, 3 岁, 咳嗽间断发热半月, 1 月前患麻疹, 预防接种不详, T37.6℃, P110 次/分, R22 次/分, 双肺正常, 律齐, 腹软, 无压痛, 胸部 X 线右上肺片状阴影, 右肺门影增浓, 边缘模糊, 结核菌素 48-72 小时红肿 10mm, 硬结 3mm。引起该症状的原因是

- A. 接种卡介苗正常阳性
- B. 结核菌素失效阴性
- C. 未感染结核分枝杆菌呈阳性
- D. 免疫抑制导致的假阴性
- E. 感染结核阳性

48. 男, 57 岁, 1 天前就餐时突然右上肢无力, 不能握拳, 20 分钟后正常, 反复 3 次, 每次 10-30 分钟缓解, BP150/90mmHg, 神经系统无阳性。最可能的诊断为

- A. 短暂性脑缺血
- B. 脑出血
- C. 脑梗死
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 局灶癫痫发作

49. 患者女, 16 岁, 不可自控的间断性大量饮食、情绪不稳半年, 早期大量饮食后担心发胖主动刺激咽部诱发呕吐, 后期大量进食后不用催吐亦呕吐, 体重无明显减轻, 月经不规律, 坚持上学。查体及实验室检查无阳性结果。胃镜检查示浅表性胃炎, 该患者的主要诊断是

- A. 浅表性胃炎
- B. 双相障碍
- C. 神经性呕吐
- D. 神经性厌食
- E. 神经性贪食

50. 男性, 10 岁, 诊断为肾病综合征, 使用足量泼尼松治疗 3 周, 复查尿蛋白 (++)~(+++), 目前首选的治疗方法是

- A. 加用环磷酰胺治疗
- B. 甲泼尼龙冲击治疗
- C. 继续足量泼尼松治疗
- D. 增加泼尼松剂量继续口服
- E. 减少泼尼松剂量继续口服

51. 患者, 女, 31 岁, 阴道分泌物增多 3 天, 妇科查体阴道黏膜充血, 阴道分泌物呈稀薄脓性泡沫状, 阴道分泌物检查最可能的结果是

- A. 涂片可见芽孢和菌丝

- B. 核酸扩增实验衣原体阳性
- C. 涂片见中性粒细胞内含革兰阴性双球菌
- D. 悬滴法发现阴道毛滴虫
- E. 暗视野显微镜发现螺旋体
52. 女婴，9 月，呕吐腹泻 2 天，发热 1 天，大便 5-6 次/天，蛋花汤样，无臭味，无脓血，哭有泪，尿减少，查体：体温 36.5℃，心率 128 次/分，呼吸 30 次/分，精神好，前囟平坦，皮肤弹性尚可，腹软，肠鸣音正常，最可能的诊断是
- A. 轮状病毒肠炎
- B. 产毒性大肠杆菌肠炎
- C. 生理性腹泻
- D. 侵袭性大肠杆菌肠炎
- E. 真菌性肠炎
53. 女，32 岁，继发性痛经伴经量增多 4 年，妇科检查子宫后位，呈孕 10 周大小，活动欠佳，双附件未触及异常，最可能诊断是
- A. 子宫肌瘤
- B. 子宫腺肌病
- C. 子宫肌瘤
- D. 子宫内膜异位症
- E. 子宫内膜炎
54. 女，4 岁，生长发育正常，根据骨龄简易计算方法，其腕部骨化中心的数目为
- A. 7
- B. 3
- C. 4
- D. 6
- E. 5
55. 女，32 岁，妊娠 40 周，腹痛 8 小时，宫缩 60s/3-4min，枕左后位，宫口开 3cm，S+3，阴道可见胎头，胎儿心率 110 次，突发阴道流液，胎头下方掉出条索状物，此时正确的处理是
- A. 调转体位观察
- B. 上抬胎头，同时剖宫产
- C. 上抬胎头观察
- D. 上抬胎头静滴缩宫素
- E. 上抬胎头，同时还纳条索状物
56. 男，45 岁，右眼睑下垂伴复视 2 月，既往有蛛网膜下腔出血病史，查体，右眼外斜，瞳孔变大，对光反射阴性，



增强 CT 提示，鞍区有一直径 0.5cm 圆形高密度影，无脑水肿表现。首先考虑的诊断是

- A. 鞍旁脑膜瘤
- B. 鞍叶脑脓肿
- C. 颈内动脉-后交通动脉瘤
- D. 鞍叶胶质瘤
- E. 三叉神经鞘瘤

57. 女，29 岁，结婚 3 年未避孕未孕，月经无痛，实验室检查外阴发育正常，阴道通畅。子宫大小正常，质中，无压痛，未触及包块，连续 3 年体温呈单相型，TSH3.2mu/l，不孕的原因为

- A. 子宫颈因素
- B. 宫颈管因素
- C. 甲状腺因素
- D. 子宫体因素
- E. 排卵功能障碍

58. 女，55 岁，间断上腹部隐痛 1 年，消瘦半年，Hb59g/l，WBC $6.8 \times 10^9/L$ ，plt $160 \times 10^9/L$ ，胃镜检查提示胃癌，拟行胃癌根治术，完善术前输血相关血清学检查，不包括

- A. Rh 血型鉴定
- B. ABO 血型鉴定
- C. 交叉配血试验
- D. 血小板抗体筛查
- E. 不规则抗体筛查

59. 男，27 岁，脑外伤 2 小时，伤后 2 分钟清醒，清醒后立刻给家人打电话，但无法描述受伤原因。神经检查无阳性，头颅 CT 大致正常。最可能诊断是

- A. 脑挫裂伤
- B. 脑震荡
- C. 硬膜下血肿
- D. 硬膜外血肿
- E. 脑出血

60. ICD-10 里抑郁症的标准日期至少是多久

- A. 1 天
- B. 7 天
- C. 2 周
- D. 21 天
- E. 30 天

61. 早期佝偻病的实验室检查指标下降是

- A. 血钙
- B. 血磷
- C. 血清 25-(OH) D<sub>3</sub>
- D. 碱性磷酸酶
- E. 甲状旁腺素

62. 男, 53 岁, 下火车之后感觉有一场针对自己的大阴谋正在实施, 原因是看到人都在往出站口跑, 此现象最可能属于

- A. 原发性妄想
- B. 继发性妄想
- C. 谵妄
- D. 失神发作
- E. 错觉

63. 女, 28 岁, 剖宫产术后 4 个月, 哺乳期月经未恢复, 首选的避孕措施是

- A. 宫内节育环
- B. 口服复方避孕药
- C. 避孕套
- D. 安全期避孕
- E. 紧急避孕药

64. 女, 63 岁, 因卵巢肿瘤行手术治疗, 术中见左卵巢囊实性肿物, 内壁有质脆乳头, 病理切片可见砂粒体, 为进行病情监测和疗效评估, 最常用的肿瘤标志物是

- A. AFP
- B. HCG
- C. CA125
- D. CA199
- E. E2

65. 女, 35 岁, 妊娠 22 周, 腹痛两周, 加重伴发热一天无阴道流血, 既往子宫肌瘤病史五年查体, 未触及宫缩, B 超示子宫前壁一个十厘米实性凸起, 最可能诊断是

- A. 子宫肌瘤合并感染
- B. 子宫肌瘤合并肉瘤样变
- C. 子宫肌瘤合并玻璃样变
- D. 子宫肌瘤合并红色样变
- E. 子宫肌瘤合并囊性变

66. 女, 16 岁, 月经不规律, 近半年月经量增多, 无痛经, 基础体温单相型, 盆腔 B 超子宫及双附件阴性, 最可能诊断为

- A. 子宫内膜炎
- B. 黄体功能不良
- C. 黄体萎缩不全
- D. 无排卵性子宫异常出血
- E. 子宫腺肌病

67. 女性, 已婚。停经 36 天, 平素月经规律。下列符合该孕妇妊娠生理状态的是

- A. 黏液镜下可见羊齿状结晶
- B. 尿妊娠试验阳性
- C. 双合诊可见黑加征
- D. 子宫增大为非孕时的 3 倍
- E. 出现严重的早孕反应

68. 女, 57 岁, 反复发作右侧脸颊及上唇剧痛, 疼痛频繁, 每次持续数秒钟, 刷牙洗脸进食均可诱发, 神经系统查体无异常。该患者最可能的诊断是

- A. 丛集性头痛
- B. 偏头痛
- C. 三叉神经痛
- D. 上颌窦炎
- E. 面神经麻痹

69. 女婴, 1 月, 出生史 42 周+3, 出生后母乳喂养, 吮吸及喂养差, 腹胀便秘, 少哭且哭声低, 体重 4.1kg, 皮肤轻度黄染, 脐膨隆, 肌张力低。其最有可能的诊断是

- A. 先天性甲状腺功能减退症
- B. 骨软骨发育不良
- C. 黏多糖贮积病
- D. 唐氏综合征
- E. 先天性巨结肠

70. 女, 52 岁, 停经两年, 阴道流血十天。既往有高血压, 糖尿病史。查体阴道及宫颈未见异常, 子宫体稍增大。检查子宫内膜厚 1.1cm, 血流增强。为明确诊断, 进一步的检查

- A. CA125
- B. 分段诊刮
- C. 宫颈细胞学检查
- D. 宫腔镜

E. 阴道镜

71. 女, 1 岁 8 个月。间断发热 20 天, 抽搐 1 次。查体: 体温  $37.6^{\circ}\text{C}$ , P120 次/分, 肝肺查体未见异常, 脾肋下 2cm, 腹软, 颈抵抗 (+), 克氏征 (+)。脑脊液检查无色, 白细胞  $260 \times 10^6/\text{L}$ , 中性粒细胞 0.4, 淋巴细胞 0.6, 糖原  $1.8\text{mmol/L}$ , 氯化物  $108\text{mmol/L}$ , 最可能的诊断是

A. 病毒性脑膜炎

B. 结核性脑膜炎

C. 中毒性脑病

D. 化脓性脑膜炎

E. 新型隐球菌脑膜炎

72. 男, 25 岁。尿道口不适 5 天, 晨起尿道口可见薄层分泌物附着。发病 2 周前曾有不洁性交所。查体: 尿道口轻度红肿, 挤压龟头尿道口可见少许浆液性分泌物。最有可能的诊断是

A. 淋病

B. 生殖道衣原体感染

C. 生殖道疱疹

D. 软下疳

E. 硬下疳

73. 一岁女婴, 反复发热、恶心 5 天, 喷射性呕吐一次, 克氏征阳性, 脑脊液检查 WBC:  $600 \times 10^9/\text{L}$ , N: 0.8, L: 0.2, 蛋白  $2\text{g/L}$ , 糖  $1.8\text{mmol/L}$ , 氯化物  $106\text{mmol/L}$ , 考虑诊断为

A. 化脓性脑膜炎

B. 结核性脑膜炎

C. 中毒性脑病

D. 隐球菌性脑炎

E. 病毒性脑炎

74. 女, 10 岁, 晨起眼睑水肿加重 3 天, 尿液浓茶色, 半月前曾患猩红热, 查体 P110 次/分, BP135/90mmHg, 眼睑水肿, 肝肋下 1cm, 压痛 (+), 血肌酐  $400 \mu\text{mol/L}$ 。患者不宜使用的药物为

A. 氢氯噻嗪

B. 甘露醇

C. 青霉素

D. 呋塞米

E. 硝苯地平

75. 女, 30 岁, 半年行动退化, 个性多疑, 自觉有敌对公司监视, 家里有监视器, 窃听器, 把家里墙板沙发拆掉没有发现, 仍觉得有人监视, 觉得家人被收买, 在菜里下毒, 自己买方便面吃, 经常自言自语, 突然大笑, 考虑诊断

- A. 精神分裂症
- B. 妄想障碍
- C. 强迫障碍
- D. 分离障碍
- E. 躁狂发作

76. 女, 28 岁, 外阴瘙痒伴豆腐渣状分泌物 3 天, 两周前行人流手术, 术后发热, 静滴头孢曲松钠 10 天。该症状的直接原因是

- A. 乳杆菌生长抑制
- B. 人流术后雌激素减少
- C. 宫腔手术操作后病原体感染
- D. 人流术后阴道 PH 升高
- E. 阴道 PH 升高

77. 女, 22 岁, 不规则阴道流血 10 天。产后八个月, 血 hcg40, 000u/l, B 超显示回声不均匀区域, 胸部 x 线显示双肺中下区域棉球状阴影, 首选治疗措施是

- A. 化疗
- B. 免疫治疗
- C. 中药治疗
- D. 放疗
- E. 手术治疗

78. 女, 57 岁, 阴道口脱出肿物 2 个月。妇科: 阴道可见宫颈及部分宫体, 阴道前后壁均有轻度膨出。既往有高血压, 糖尿病。药物控制血压、血糖较平稳。患者适合的治疗方案是

- A. 放置子宫颈托
- B. 阴道前后壁修补术及主韧带缩短术
- C. 经阴道全子宫切除及阴道前后壁修补
- D. 阴道全封闭术
- E. 宫颈部分切除及阴道前后壁修补

79. 女, 25 岁, 争吵后右肢活动不便, 言语不利两小时, 病后无呕吐头痛, 十年前曾患风湿热, 查体, BP120/60mmHg, 神志清醒, 颈软, 心率绝对不齐, 二尖瓣舒张期杂音, 运动性失语, 右侧中枢面舌瘫, 右侧肌力 0~2 级, 张力低, 头颅 CT 未见异常, 最可能的诊断为

- A. 缺血性卒中
- B. 蛛网膜下腔出血
- C. 转换障碍
- D. 低血糖

E. 脑出血

80. 女, 50 岁, 头痛呕吐 2 周, 发作性抽搐 3 次, 5 年前行右乳腺癌根治术, 头颅 ct 示左额大片低密度影, 占位明显, 首先考虑诊断

A. 脑炎

B. 脑膜瘤

C. 脑膜炎

D. 脑梗死

E. 转移性脑瘤

81. 婴儿前囟凹陷常见于

A. 甲减

B. 佝偻病

C. 脱水

D. 婴儿脑膜炎

E. 病毒性脑炎

82. 婴幼儿发育最快的时期是

A. 新生儿期

B. 婴儿期

C. 幼儿期

D. 学龄前期

E. 学龄期

83. 从左到右反流的先天性心脏病出现艾森曼格综合征, 出现的症状为

A. 乏力, 出汗

B. 持续性青紫

C. 发育生长迟缓

D. 心尖上翘

E. 体重下降

84. 初产妇, 妊娠 42+5 周, 既往月经规律, 一般情况下不会出现

A. 羊水增多

B. 羊水粪染

C. 胎儿生长受限

D. 胎儿过熟

E. 巨大胎儿

85. 卵巢分泌的激素是

- A. 催乳素  
B. 促黄体生成素  
C. 卵泡刺激素  
D. HCG  
E. 孕激素
86. 初产妇，38 周，宫缩 30s/7-8 分钟，骨盆正常、头位，胎心率 150 次/分，S+3，羊水三度浑浊，如何处理
- A. 剖宫产  
B. 产钳助产  
C. 继续观察  
D. 静滴缩宫素  
E. 胎头吸引
87. 初产妇，28 岁，足月临产，宫口全开 3 小时，宫缩 20 秒/7-8min，枕左后，s+3，胎心监护：胎心基线平稳，胎心为 150 次/分，骨盆正位。目前情况如何处理
- A. 手法逆时针 90 度旋转后产钳助产  
B. 手法顺时针 90 度旋转后等候  
C. 积极剖宫产  
D. 静滴缩宫素  
E. 密切监护，暂不做处理
88. 女，36 岁，发作性喘息，呼吸困难，再发加重 1 小时，既往氨茶碱可缓解，查体精神萎靡，体温 37.1℃，脉搏 128 次/分，RR：36 次/分，鼻翼煽动，双肺呼吸音粗，可闻及广泛哮鸣音，参与该病的物质有
- A. IL1  
B. IL4  
C. IL12  
D. IL2  
E. IL1
89. 女孩，2 岁，自幼智力运动发育迟缓，刚能独立行走查体：身高 80CM，体重 10kg，眼距宽，通贯手，眼外侧上斜，为明确诊断，首选的检查是
- A. 听力测试  
B. 胸部 X 线  
C. 染色体  
D. 肝功能  
E. b 超超声
90. 女，29 岁，痛经 3 年，镜下宫底和直肠子宫陷凹可见黑褐色出血点，可诊断为什么

- A. 盆腔结核
- B. 盆腔淤血综合征
- C. 腹膜间皮瘤
- D. 盆腔炎症后遗症
- E. 子宫内膜异位症

91. 女性, 29 岁, 孕 40 周。宫缩 3 小时, 宫口开 6cm。破膜后突发呼吸困难, 发绀, 大汗淋漓, 烦躁不安, 数分钟后死亡。最可能的诊断为

- A. 前置胎盘
- B. 先兆流产
- C. 癫痫
- D. 羊水栓塞
- E. 先兆子宫破裂

92. 女, 32 岁, 最近数月一直耳闻入语声, 讲“要抓他”, 非常害怕, 病人称: “家中有窃听器、摄像机, 马路上有入跟踪, 自己完全被控制了。”该患者最可能诊断为

- A. 思维散漫
- B. 被控制感
- C. 被害妄想症
- D. 错觉
- E. 关系妄想

93. 男 16 岁, 近半年对他人不关心, 对自己的事情也不关心, 对成绩下降感觉没关系, 疏于自理卫生, 对老师和家长的劝说也无所谓, 属于

- A. 情感低落
- B. 情感不稳
- C. 情感倒错
- D. 情感淡漠
- E. 情感矛盾

94. 初产妇, 25 岁, 妊娠 38 周, 产科检查: 宫口开全, 宫缩 40 次/分, 胎心 100 次/分, 羊水Ⅲ度, 正常骨盆, 头先露, S=+3, 首选的治疗措施

- A. 继续观察自然分娩
- B. 静脉滴注缩宫素
- C. 产钳助产
- D. 应用镇静剂
- E. 剖宫产



95. 新生儿，生后 15 天，拒乳，反应差 2 天，黄疸 1 天，颈部，前胸部可见多个脓疱，皮肤黄染呈中度，肝脏肋下 2.5cm，脾脏肋下 1.5cm，可诊断为

- A. 新生儿颅内出血
- B. 新生儿败血症
- C. 新生儿核黄疸
- D. 感染性肺炎
- E. 新生儿寒冷综合征

96. 男孩，2 岁，出生半年之后出现口唇青紫，活动后更加明显，胸部 X 线片提示“靴形心”阴影，家长发现小孩会行走后时常有下蹲动作，“下蹲”所产生的结果是

- A. 右向左分流减少
- B. 循环阻力下降
- C. 右心室压力增加
- D. 左心室压力下降
- E. 心脏前负荷增加

97. 男性，71 岁，行动缓慢 3 年，近期右上肢无力，右手震颤，肢体肌张力上升，呈齿轮样，头核磁未见异常，最可能的诊断为

- A. 动脉硬化
- B. 豆状核变性
- C. 阿尔兹海默症
- D. 帕金森
- E. 扭转痉挛

98. 女性，40 岁，G3P1，现在孕 18 周。既往体健，10 年前阴道产一男婴，现体健。有关唐氏综合征的检查，最合

适产前检查的技术是

- A. 无创性产前检查
- B. 羊膜腔穿刺术
- C. 超声了解颈项厚度（NT）
- D. 脐带穿刺术
- E. 母体血清检查

99. 女，18 周，发热 1 天抽搐 1 次，发作 15 分钟无缓解送急诊，查体：体温 39.5，无意识，双眼上翻，四肢抽搐。现首选药物是

- A. 口服水合氯醛
- B. 肌注苯巴比妥
- C. 静推苯妥英钠

D. 静推地西洋

E. 静推硫喷妥钠

100. 女, 33 岁, G1P0, 妊娠 26+3 周, BMI28, 空腹血糖 5.0mmol/L, 有家族糖尿病史, 下一步如何处理

A. 行 OGTT 试验

B. 复查空腹血糖

C. 定期产检

D. 查尿糖

E. 查尿酮

101. 女, 43 岁, G3P1, 宫底在脐与剑突之间, 胎心 142 次/分, 此时羊水的主要来源是

A. 胎儿尿液和肺

B. 胎儿尿液和脐带

C. 胎儿尿液和皮肤

D. 胎儿尿液和胎膜

E. 母体血清和胎儿尿液

102. 男, 29 岁, 2 年前腿部疼痛到医院就诊, 被告知怀疑“骨癌”, 当时出现不语, 行为怪异, 摇头晃脑, 但逐渐恢复正常, 此后骨癌被排除。但患者每遇到不顺心的事, 均有类似表现。该患者最有可能的诊断是

A. 分离(转换)障碍

B. 创伤后应激障碍

C. 抑郁障碍

D. 精神分裂症

E. 急性应激障碍

103. 男, 29 岁, 2 年前腿部疼痛到医院就诊, 被告知怀疑“骨癌”, 当时出现不语, 行为怪异, 摇头晃脑, 但逐渐恢复正常, 此后骨癌被排除。但患者每遇到不顺心的事, 均有类似表现。对该患者最有效的治疗方法是

A. 物理治疗

B. 暗示治疗

C. 抗焦虑药物治疗

D. 行为治疗

E. 抗精神药物治疗

104. 男, 50 岁, 10 个月前经领导肯定后出现心情好, 自我感觉良好, 认为自己能力超群。话多, 主动和陌生人打招呼, 说话, 每天睡 2~3 小时也没有困倦, 经治疗后好转。近 1 个月女儿离婚后患者心情低落, 高兴不起来, 话少, 自责惭愧, 认为自己没有给女儿找到好对象。兴趣减退, 活动明显减少。睡眠减退, 夜间睡眠差, 早醒。有自杀观念。隔空听到人说自己无能, 没用。不能正常上班。目前该患者最可能的诊断是

A. 分裂情感性障碍

- B. 精神分裂症
- C. 应激相关障碍
- D. 双相障碍抑郁发作
- E. 双相障碍躁狂发作

105. 男, 50 岁, 10 个月前经领导肯定后出现心情好, 自我感觉良好, 认为自己能力超群。话多, 主动和陌生人打招呼, 说话, 每天睡 2~3 小时也没有困倦, 经治疗后好转。近 1 个月女儿离婚后患者心情低落, 高兴不起来, 话少, 自责惭愧, 认为自己没有给女儿找到好对象。兴趣减退, 活动明显减少。睡眠减退, 夜间睡眠差, 早醒。有自杀观念。隔空听到人说自己无能, 没用。不能正常上班。该患者主要的治疗措施是

- A. 抗焦虑药
- B. 抗抑郁药
- C. 镇静催眠药
- D. 心境稳定剂
- E. 抗精神药

106. 女, 53 岁, 3 月前坐长途火车时突然出现不认识女儿, 并对空气大喊“有蜘蛛”, 并出现各种兴奋症状, 手舞足蹈, 经治疗后好转。1 周前得知儿子意外死亡后, 感觉总能看到儿子, 感觉自责, 后面还想要自杀解脱。既往有高血压五年, 200/90mmHg。查定向障碍, 视幻觉, 思维不连贯。高血压加重时症状加重。应诊断为

- A. 双相障碍
- B. 精神分裂症
- C. 脑血管病引起的精神障碍
- D. 躯体疾病引起的精神障碍
- E. 急性应激障碍

107. 女, 53 岁, 3 月前坐长途火车时突然出现不认识女儿, 并对空气大喊“有蜘蛛”, 感觉看到自己儿子, 经治疗后好转。1 周前得知儿子去世消息后再次出现类似症状。既往有高血压五年, 200/90mmHg。查定向障碍, 视幻觉, 思维不连贯。高血压加重时症状加重。最有意义的检查是

- A. 头 MRI
- B. 脑电图
- C. 脑脊液
- D. 人格测试
- E. 头颅 CT

108. 女孩, 1 岁, 发热伴咳嗽 4 天, 查体 T38.8℃, P128 次/分, R38 次/分, 双肺闻及固定的湿啰音, 腹稍胀, 肝肋下 2cm, 实验室检查, 血 WBC $13.5 \times 10^9/L$ , N0.72, L0.18。最可能的诊断是

- A. 支气管肺炎
- B. 支气管炎

- C. 大叶性肺炎
- D. 间质性肺炎
- E. 毛细支气管炎

109. 女孩, 1 岁, 发热伴咳嗽 4 天, 查体 T38.8℃, P128 次/分, R38 次/分, 双肺闻及固定的湿啰音, 腹稍胀, 肝肋下 2cm, 实验室检查, 血 WBC $13.5 \times 10^9/L$ , N0.72, L0.18。假设信息: 治疗中患儿呼吸困难加重, 呕吐少许咖啡样物。查体 P140 次/分, R46 次/分, 严重腹胀, 肠鸣音消失, 最可能发生的并发症是

- A. 感染性休克
- B. 中毒性肠麻痹
- C. 心衰
- D. 脑性低钠血症
- E. 中毒性脑病

110. 男, 31 岁。车祸致枕部着地昏迷 1 小时。查体: P60 次/分, R12 次/分, BP170/90mmHg。右侧顶枕部头皮血肿, GSC 评分 7 分, 右侧瞳孔 2mm, 对痛觉刺激无反应。左侧瞳孔 4mm, 瞳孔对光反射消失。患者左侧额颞底部弥漫性挫裂伤, 血肿体积约 60ml, 致同侧脑室受压, 中线向右移位 15mm。可能的损伤机制是

- A. 切线性损伤
- B. 加速性损伤
- C. 减速性损伤
- D. 挥鞭伤
- E. 挤压伤

111. 男, 31 岁。车祸致枕部着地昏迷 1 小时。查体: P60 次/分, R12 次/分, BP170/90mmHg。右侧顶枕部头皮血肿, GSC 评分 7 分, 右侧瞳孔 2mm, 对痛觉刺激无反应。左侧瞳孔 4mm, 瞳孔对光反射消失。患者左侧额颞底部弥漫性挫裂伤, 血肿体积约 60ml, 致同侧脑室受压, 中线向右移位 15mm。最有价值的诊断

- A. 脑 CT
- B. 脑 MRI
- C. 脑电图
- D. 肌电图
- E. 脑血管造影

112. 男, 31 岁。车祸致枕部着地昏迷 1 小时。查体: P60 次/分, R12 次/分, BP170/90mmHg。右侧顶枕部头皮血肿, GSC 评分 7 分, 右侧瞳孔 2mm, 对痛觉刺激无反应。左侧瞳孔 4mm, 瞳孔对光反射消失。患者左侧额颞底部弥漫性挫裂伤, 血肿体积约 60ml, 致同侧脑室受压, 中线向右移位 15mm。最适宜采取的治疗措施为

- A. 绝对卧床休息
- B. 腰椎穿刺排放脑脊液
- C. 大剂量糖皮质激素

D. 脑室外引流

E. 急诊开颅手术

113. 女, 40 岁, G3P1, 孕 42 周, 规律宫缩 7 小时, 宫口开 7CM, S+3, LOA, 预估胎儿体重 3500g, 胎心率正常, 体温 37.8℃, 血压 140/90mmhg, 心率正常, WBC $15.6 \times 10^9/L$ , 支持产妇绒毛羊膜炎诊断的依据是

A. 血压 140/90mmhg

B. 体温 37.8 摄氏度

C. 胎心率正常

D. 宫口开 7CM

E. WBC $15.6 \times 10^9/L$

114. 女, 40 岁, G3P1, 孕 42 周, 规律宫缩 7 小时, 宫口开 7CM, S+3, LOA, 预估胎儿体重 3500g, 胎心率正常, 体温 37.8℃, 血压 140/90mmhg, 心率正常, WBC $15.6 \times 10^9/L$ , 入院复测血压 150/90mmhg, 除了应用抗生素还应进行的处理是

A. 继续观察

B. 静滴缩宫素

C. 静滴硫酸镁

D. 剖宫产

E. 口服降压药

115. 女, 38 岁, G2P2, 接触性阴道流血半年, 妇科检查, 外阴阴道无异常, 宫颈糜烂状, 下唇略突起, 宫体正常大小, 双附件区未触及包块, 双合诊双侧宫旁无异常, TCT 检查示 HSIL, 高危型 HPV 阳性, 首选的处理

A. LEEP 手术

B. 分段诊刮术

C. 宫腔镜检查

D. 阴道镜下宫颈活检

E. 宫颈锥切术

116. 女, 38 岁, G2P2, 接触性阴道流血半年, 妇科检查, 外阴阴道无异常, 宫颈糜烂状, 下唇略突起, 宫体正常大小, 双附件区未触及包块, 双合诊双侧宫旁无异常, TCT 检查示 HSIL, 高危型 HPV 阳性, 若结果示 HSIL (CIN3) 累及腺体, 6 点处为鳞状细胞癌, 局部间质浸润深度 8mm, 分期为

A. IIA 期

B. IA 期

C. IIIA 期

D. IIB 期

E. IB 期

117. 女, 38 岁, G2P2, 接触性阴道流血半年, 妇科检查, 外阴阴道无异常, 宫颈糜烂状, 下唇略突起, 宫体正常

大小，双附件区未触及包块，双合诊双侧宫旁无异常，TCT 检查示 HSIL，高危型 HPV 阳性，最适合的手术方式

- A. 广泛性子宫切除术+盆腔淋巴结切除术
- B. 宫颈锥切术
- C. 筋膜外全子宫切除术
- D. 改良广泛性子宫切除术+盆腔淋巴结切除术
- E. 筋膜内全子宫切除术

118. 女，23，腹痛一周，发热 2 天，半月前使用药物流产并清宫。检查 T38.8℃，R19 次/分，BP135/90mmHg。妇科检查，宫颈光滑，宫口少量流液，子宫稍大有压痛。WBC $13.8 \times 10^9/L$ ，N0.8。该患者最可能的诊断是什么

- A. 急性宫颈炎
- B. 急性子宫内膜炎
- C. 急性阑尾炎
- D. 急性腹膜炎
- E. 急性膀胱炎

119. 女，23，腹痛 1 周，发热 2 天，半月前使用药物流产并清宫。检查 T38.8℃，R19 次/分，BP135/90mmHg。妇科检查，宫颈光滑，宫口少量流液，子宫稍大有压痛。WBC $13.8 \times 10^9/L$ ，N0.8。该患者最适宜的治疗为

- A. 中药治疗
- B. 手术治疗
- C. 抗感染治疗
- D. 输液治疗
- E. 物理降温

120. 女婴，10 个月，发热咳嗽 5 天，烦躁呕吐 2 天，抽搐 2 次。查体 40℃，嗜睡，前囟隆起，呼吸急促，双肺闻及细湿啰音，颈无抵抗，双侧巴氏征阳性，脑脊液检查，外观浑浊，白细胞  $800 \times 10^6/L$ ，N0.80，L0.20，蛋白质 2g/L，糖 1.8mmol/L，氯化物 102mmol/L，涂片找菌阴性，PPD 阴性。最有可能的诊断是

- A. 化脓性脑膜炎
- B. 结核性脑膜炎
- C. 中毒性脑病
- D. 热性惊厥
- E. 病毒性脑炎

121. 女婴，10 个月，发热咳嗽 5 天，烦躁呕吐 2 天，抽搐 2 次。查体 40℃，嗜睡，前囟隆起，呼吸急促，双肺闻及细湿啰音，颈无抵抗，双侧巴氏征阳性，脑脊液检查，外观浑浊，白细胞  $800 \times 10^6/L$ ，N0.80，L0.20，蛋白质 2g/L，糖 1.8mmol/L，氯化物 102mmol/L，涂片找菌阴性，PPD 阴性。假设信息，患儿经治疗后好转，3 日后再次发热，呕吐，惊厥发作，最可能出现的并发症是

- A. 硬膜下积液

- B. 脑脓肿
- C. 抗利尿激素分泌异常综合征
- D. 脑室管膜炎
- E. 脑水肿

122. 女婴, 10 个月, 发热咳嗽 5 天, 烦躁呕吐 2 天, 抽搐 2 次。查体 40℃, 嗜睡, 前囟隆起, 呼吸急促, 双肺闻及细湿啰音, 颈无抵抗, 双侧巴氏征阳性, 脑脊液检查, 外观浑浊, 白细胞  $800 \times 10^6/L$ , NO. 80, LO. 20, 蛋白质 2g/L, 糖 1.8mmol/L, 氯化物 102mmol/L, 涂片找菌阴性, PPD 阴性。假设信息, 患儿经治疗后好转, 3 日后再次发热, 呕吐, 惊厥发作。首选检查为

- A. 肌电图
- B. MRI
- C. 心电图
- D. 头颅透光检查
- E. 硬膜下穿刺

123. 男婴, 11 个月, 发热 4 天, 皮疹 1 天。体温波动在 39~40℃, 伴发热, 咳嗽, 声嘶。查体: 颜面, 躯干可见红色斑丘疹, 结膜充血, 口腔黏膜充血且粗糙, 可见细小小白点, 双肺闻及少量干啰音。最有诊断价值的临床表现是

- A. 结膜充血
- B. Koplik 斑
- C. 眼鼻卡他样症状
- D. 发热
- E. 皮疹形态

124. 男婴, 11 个月, 发热 4 天, 皮疹 1 天。体温波动在 39~40℃, 伴发热, 咳嗽, 声嘶。查体: 颜面, 躯干可见红色斑丘疹, 结膜充血, 口腔黏膜充血且粗糙, 可见细小小白点, 双肺闻及少量干啰音。对该病治疗不正确的是

- A. 补充维生素 A
- B. 高热可给与退热药物
- C. 静脉糖皮质激素
- D. 呼吸道管理
- E. 躁狂可给与镇静药物

125. 早产儿, 孕龄 32, 自然分娩, 出生后 2 小时出现呼吸困难, 进行加重。查体面紫, 呻吟, 三凹征阳性, 支气管管声低, 未闻及啰音, 腹软, 肝下 2cm。最可能的诊断是

- A. 湿肺
- B. 新生儿溶血
- C. 吸入胎粪性肺炎



D. 新生儿呼吸窘迫综合征

E. 产程过长

126. 早产儿，孕龄 32，自然分娩，出生后 2 小时出现呼吸困难，进行加重。查体面紫，呻吟，三凹征阳性，支气管声低，未闻及啰音，腹软，肝下 2cm。X 线的表现最不可能为

A. 白肺

B. 颗粒状阴性

C. 磨玻璃样影

D. 肺大疱

E. 支气管充气征

127. 早产儿，孕龄 32，自然分娩，出生后 2 小时出现呼吸困难，进行加重。查体面紫，呻吟，三凹征阳性，支气管声低，未闻及啰音，腹软，肝下 2cm。该病的发病机制为

A. 肺表面活性物质缺乏

B. 肺炎引起

C. 肺泡液挤出障碍

D. 宫内缺氧

E. 宫内窘迫

128. 2 岁女孩，发热咳嗽 5 天，呕吐 2 天，抽搐 2 次，查体，体温 40 度，双肺闻及湿啰音，前囟膨隆，颈软，双侧巴士征 (+)，脑脊液检查，浑浊，白细胞  $800 \times 10^6/L$ ，N0.8，L0.2。蛋白质 2g/L，葡萄糖 1.2mol/L，氯化物 108mmol/L。诊断为肺炎合并

A. 中毒性脑膜炎

B. 结核性脑膜炎

C. 化脓性脑膜炎

D. 病毒性脑炎

E. 热性惊厥

129. 2 岁女孩，发热咳嗽 5 天，呕吐 2 天，抽搐 2 次，查体，体温 40 度，双肺闻及湿啰音，前囟膨隆，颈软，双侧巴士征 (+)，脑脊液检查，浑浊，白细胞  $800 \times 10^6/L$ ，N0.8，L0.2。蛋白质 2/L，葡萄糖 1.2mol/L，氯化物 108mmol/L。该患儿治疗后无明显好转，前囟膨大，发热，以下哪项操作不合适。

A. 物理降温

B. 静脉注射地西洋

C. 腰穿放脑脊液

D. 甘露醇

E. 呋塞米

130. 女孩，2 岁，高热四天，温度 39.0~39.8 度，使用青霉素治疗无效。查体：多形性红斑，手足指端硬性水肿，



双眼球结膜充血，颈部淋巴结肿大，口咽部黏膜弥漫性充血，口唇皲裂，舌乳头轮廓突出，血常规  $WBC 14 \times 10^9/L$ ， $NO.84$ ，血小板  $200 \times 10^9/L$ ， $CRP 50mg/L$ 。本病最可能的诊断

- A. 猩红热
- B. 咽结合膜热
- C. 传染性单核细胞增多症
- D. 手足口病
- E. 川崎病

131. 女孩，2岁，高热四天，温度  $39.0 \sim 39.8$  度，使用青霉素治疗无效。查体：多形性红斑，手足指端硬性水肿，双眼球结膜充血，颈部淋巴结肿大，口咽部黏膜弥漫性充血，口唇皲裂，舌乳头轮廓突出，血常规  $WBC 14 \times 10^9/L$ ， $NO.84$ ，血小板  $200 \times 10^9/L$ ， $CRP 50mg/L$ 。对该病预后最有价值的检查

- A. X线示心脏心影上部扩大
- B. 超声心动图示冠状动脉扩大
- C. 血沉速度快
- D. 抗EBV-IgM抗体阳性
- E. 抗角蛋白抗体谱

132. 女孩，2岁，高热四天，温度  $39.0 \sim 39.8$  度，使用青霉素治疗无效。查体：多形性红斑，手足指端硬性水肿，双眼球结膜充血，颈部淋巴结肿大，口咽部黏膜弥漫性充血，口唇皲裂，舌乳头轮廓突出，血常规  $WBC 14 \times 10^9/L$ ， $NO.84$ ，血小板  $200 \times 10^9/L$ ， $CRP 50mg/L$ 。选用什么药物治疗

- A. 青霉素
- B. 伐昔洛韦
- C. 利巴韦林
- D. 丙种球蛋白
- E. 糖皮质激素

133. 男婴，10个月，面色苍白1个月。出生以来一直母乳喂养。查体发育可，皮肤粘膜苍白，肝肋下3cm，脾肋下1cm。实验室检查血  $Hb 74g/L$ ， $RBC 2.8 \times 10^{12}/L$ 。外周血涂片：血细胞大小不等，以小细胞为主，中央淡染区扩大。最可能的诊断是

- A. 生理性贫血
- B. 营养性巨幼细胞性贫血
- C. 地中海贫血
- D. 缺铁性贫血
- E. 肺含铁血黄素沉着症

134. 男婴，10个月，面色苍白1个月。出生以来一直母乳喂养。查体发育可，皮肤粘膜苍白，肝肋下3cm，脾肋下1cm。实验室检查血  $Hb 74g/L$ ， $RBC 2.8 \times 10^{12}/L$ 。外周血涂片：血细胞大小不等，以小细胞为主，中央淡染区扩

大。最有助于诊断的检查

- A. 铁代谢
- B. 骨髓活检
- C. 血清维生素 B<sub>12</sub> 和叶酸
- D. 胸部 X 线片
- E. 血 Hb

135. 男婴，10 个月，面色苍白 1 个月。出生以来一直母乳喂养。查体发育可，皮肤粘膜苍白，肝肋下 3cm，脾肋下 1cm。实验室检查血 Hb74g/L，RBC $2.8 \times 10^{12}$ /L。外周血涂片：血细胞大小不等，以小细胞为主，中央淡染区扩大。最主要的治疗

- A. 口服铁剂和维生素 C
- B. 合理营养，及时添加辅食
- C. 口服维生素 B<sub>12</sub> 和叶酸
- D. 口服泼尼松
- E. 输血

136. 女，26 岁。停经 9 周，阴道不规则流血 2 周，阴道检查无异常，子宫如孕 4 月大。超声示宫腔内充满光点和小囊状强回声。最可能的诊断是

- A. 葡萄胎
- B. 绒癌
- C. 双胞胎妊娠
- D. 妊娠合并子宫肌瘤
- E. 胎盘早剥

137. 女，26 岁。停经 9 周，阴道不规则流血 2 周，阴道检查无异常，子宫如孕 4 月大。超声示宫腔内充满光点和小囊状强回声。目前最佳的处理方法是

- A. 清宫术
- B. 化疗
- C. 放疗
- D. 保胎治疗
- E. 全子宫切除术

138. 女，30 岁，G2P2。孕 32 周。半夜惊醒突然发现大量阴道流血。急诊至医院后少量阴道流血。查体：腹软。P：90 次/分。血压：108/80mmHg。胎心：120 次/分。为明确诊断，最佳的检查是

- A. 阴道检查
- B. 产科超声
- C. 双合诊

D. CRP

E. 查血 hcg

139. 女, 30 岁, G2P2。孕 32 周。半夜惊醒突然发现大量阴道流血。急诊至医院后少量阴道流血。查体: 腹软。P: 90 次/分。血压: 108/80mmHg。胎心: 120 次/分。以下处理措施哪项是错误的

A. 检测胎心

B. 急诊剖宫产

C. 输血

D. 促胎肺成熟

E. 预防感染

140. 女, 35 岁, G3P1, 妊娠 42+2 周, 既往月经规律。未临产, 6 年前自然顺产一男婴, 人工流产一次, 查体 T36.8℃, P70 次/分, R14 次/分, BP140/85mmHg。产科检查: 宫高 35cm, 腹围 98cm, 枕先露, 胎头浮, 胎心 140 次/分, 宫颈软, 宫口未开。核对孕周还需要问什么病史

A. 妊娠反应出现的时间

B. 胎儿身长

C. 宫底高度

D. 估计胎儿体重

E. 停经时间

141. 女, 35 岁, G3P1, 妊娠 42+2 周, 既往月经规律。未临产, 6 年前自然顺产一男婴, 人工流产一次, 查体 T36.8℃, P70 次/分, R14 次/分, BP140/85mmHg。产科检查: 宫高 35cm, 腹围 98cm, 枕先露, 胎头浮, 胎心 140 次/分, 宫颈软, 宫口未开。入院复查 BP150/90mmHg, 尿蛋白阴性, 肾功能正常。NST 反应型。B 超羊水最大深度 4cm, 胎儿估重 3500g。该如何处理

A. 口服利尿剂

B. 静滴硫酸镁

C. 口服降压药

D. 口服抗生素

E. 静滴白蛋白

142. 对放疗敏感的卵巢肿瘤

A. 浆液性癌

B. 无性细胞瘤

C. 胚胎瘤

D. 卵黄囊瘤

E. 未成熟畸胎瘤

143. 常伴 AFP 升高的卵巢肿瘤

- A. 浆液性癌
- B. 无性细胞瘤
- C. 胚胎瘤
- D. 卵黄囊瘤
- E. 未成熟畸胎瘤

144. 男孩 2 岁，低热 2 天，轻咳，食欲欠佳，皮肤瘙痒。查体胸腹部见红色斑丘疹及水疱，部分已结痂。考虑诊断为

- A. 猩红热
- B. 水痘
- C. 小儿急疹
- D. 手足口病
- E. 麻疹

145. 女孩，1 岁。发热 4 天，半天前体温降至正常后出现皮疹。查体：颈部、躯干充血性斑丘疹，结膜无充血，咽稍红，心肺查体无异常。最可能的诊断是

- A. 猩红热
- B. 水痘
- C. 小儿急疹
- D. 手足口病
- E. 麻疹

146. 女孩，9 岁。发热伴咽痛 2 天，今日全身皮肤出现鲜红色粟粒疹，疹间皮肤充血，咽部充血明显，舌质红，舌壮乳头明显突起于舌苔表面，腋下、肘窝可见帕氏线。最可能的诊断是

- A. 猩红热
- B. 水痘
- C. 小儿急疹
- D. 手足口病
- E. 麻疹

147. 停经 40 天，阴道少量流血，B 超示宫内妊娠，胚胎存活，可能的诊断是

- A. 难免流产
- B. 不全流产
- C. 流产合并感染
- D. 先兆流产
- E. 稽留流产

148. 妊娠 13 周，无不适，体查子宫耻骨联合上未扪及，胎心未闻及，B 超提示胚胎停止发育，胚胎如 8 周大小，

最可能的诊断是

- A. 难免流产
- B. 不全流产
- C. 流产合并感染
- D. 先兆流产
- E. 稽留流产

149. 男，48 岁，包皮周围反复发作水疱伴痒痛 1 年，劳累后好发，可自行好转，查体可见簇集的粟米大小水疱，疱液清亮，该病的致病原为

- A. 单纯疱疹病毒
- B. 人乳头状瘤病毒
- C. 麻疹病毒
- D. 巨细胞病毒
- E. HIV

150. 女，28 岁，外阴赘生物 1 个月，外阴大阴唇鸡冠状赘生物，醋酸白实验阳性，该病是由什么病毒导致

- A. 单纯疱疹病毒
- B. 人乳头状瘤病毒
- C. 麻疹病毒
- D. 巨细胞病毒
- E. HIV

# 临床执业医师 2022 年真题答案解析

## 第一单元

### 1. 【答案】D

#### 【解析】

- A. 肾小球滤过率降低：肾小球滤过率降低是急性肾损伤的一个重要特征，但并不直接导致肾小管原尿回漏。
- B. 肾间质水肿，挤压肾小管：虽然肾间质水肿会影响肾小管功能，但其主要表现为肾小管重吸收障碍，而非原尿回漏。
- C. 输尿管梗阻：输尿管梗阻会导致尿液回流，但并不会直接引起肾小管原尿回漏。
- D. 肾小管上皮细胞坏死、脱落：在急性肾损伤后，肾小管上皮细胞可能会发生坏死和脱落，这将破坏肾小管的完整性，导致原尿在小管内回漏，这是本题的正确答案。
- E. 肾小管的水钠重吸收减弱：这种情况会导致尿液中水和钠的排泄增加，但并不直接导致原尿回漏。

### 2. 【答案】A

#### 【解析】

- A. 生存的需要：这是马斯洛需要层次中的最底层，包括食物、水、睡眠等基本生理需求。这些需求是人类生存的基础，是最基本也是最重要的需求。正确答案。
- B. 安全的需要：这是马斯洛需要层次中的第二层，当生理需求得到满足后，人们会追求安全感，包括身体安全、经济安全等。但这不是最低层次的需要，所以此选项错误。
- C. 归属与爱的需要：这是马斯洛需要层次中的第三层。当生理需求和安全需求得到满足后，人们会追求社交和情感的满足，包括友情、家庭、恋人等。但这不是最低层次的需要，所以此选项错误。
- D. 尊重的需要：这是马斯洛需要层次中的第四层。当生理需求、安全需求和归属与爱的需求得到满足后，人们会追求尊重和自尊，包括他人的尊重和自我尊重。但这不是最低层次的需要，所以此选项错误。
- E. 自我实现的需要：这是马斯洛需要层次中的最高层，当其他所有需求都得到满足后，人们会追求自我实现，包括个人成就、创造性活动等。但这不是最低层次的需要，所以此选项错误。

### 3. 【答案】C

#### 【解析】

选项 A：非急症患者不可急诊就诊。这个选项是错误的，因为虽然分级诊疗制度鼓励非急症患者到基层医院首诊，但并没有规定非急症患者不能去急诊就诊。

选项 B：自下向上进行转诊。这个选项也是错误的，分级诊疗制度中有“双向转诊”的原则，即既可以从基层向高级别医疗机构转诊，也可以从高级别医疗机构向基层转诊。

选项 C：鼓励非急症患者到基层医院首诊。这个选项是正确的，分级诊疗制度的一个重要原则就是鼓励非急症患者

到基层医疗机构首诊，以减轻大医院的压力，优化医疗资源的配置。

选项 D：各级医院报销比例相等。这个选项是错误的，不同级别的医院，其医保报销比例是不同的，通常基层医疗机构的报销比例会更高。

选项 E：患者可根据自己意愿就诊。这个选项是错误的，虽然患者确实可以根据自己的意愿选择就诊的医疗机构，但这并不是分级诊疗制度所倡导的，分级诊疗制度是希望通过合理的诊疗流程，优化医疗资源的配置。

4. 【答案】D

【解析】

A. 尊重：尊重是医务人员间相互协作的一个重要因素，但不是最基础的。尊重来源于信任，没有信任就无法建立真正的尊重。

B. 竞争：竞争并不是医务人员之间相互协作的基础，反而过度的竞争可能会破坏协作关系。

C. 平等：平等是医务人员之间应有的态度，但它不能作为协作的基础。即使在平等的基础上，如果没有信任，协作也难以进行。

D. 信任：正确答案。信任是医务人员之间相互协作的基础。只有建立起信任，才能形成有效的协作关系。

E. 独立：独立是指医务人员在职务上的独立，这与协作的基础并无直接关系。

5. 【答案】C

【解析】

选项 A、B、D 和 E 都是喉部的重要组成部分，但只有环状软骨（选项 C）直接支撑呼吸道。

选项 A：甲状软骨是最大的喉软骨，位于环状软骨与会厌软骨之间，左、右软骨板的融合处称前角，前角上端向前突出，称为喉结。但其主要功能并非支撑呼吸道，所以 A 选项错误。

选项 B：杓状软骨位于环状软骨板上方向中线两侧，底面有向前伸出的突起称声带突，是声韧带附着处；向外侧伸出的突起称肌突，大部分喉肌附着于此。它主要参与声音的产生，而非直接支撑呼吸道，所以 B 选项错误。

选项 C：环状软骨是喉软骨中唯一完整的软骨环，位于甲状软骨的下方。环状软骨由前部低窄的环状软骨弓和后部高阔的环状软骨板构成。环状软骨的主要作用就是支撑呼吸道，保持其畅通，所以 C 选项正确。

选项 D：麦状软骨常位于甲状舌骨外侧韧带内，它不直接支撑呼吸道，所以 D 选项错误。

选项 E：会厌软骨位于舌骨体后方，会厌软骨被覆黏膜构成会厌。它的主要功能是在吞咽时防止食物进入呼吸道，而非直接支撑呼吸道，所以 E 选项错误。

6. 【答案】E

【解析】

A 选项：右心室壁前壁肺动脉圆锥膨隆。这是慢性肺源性心脏病的常见表现，由于肺动脉高压导致右心室壁前壁肺动脉圆锥部位膨出。

B 选项：右心室壁肥厚增生。同样，这也是慢性肺源性心脏病的常见表现，右心室为了克服肺动脉阻力增加，会发生肥厚。

C 选项：心尖圆钝。在慢性肺源性心脏病中，由于右心室的扩大，会使得心尖变得圆钝。



D 选项：右心室腔扩张。这是肺动脉高压和右心衰竭的结果，右心室内的血液残留量增加，导致右心室腔扩张。

E 选项：右心室乳头肌和肉柱萎缩。这通常见于冠脉供血不足，是心肌梗死的常见并发症，而非慢性肺源性心脏病的表现。

7. 【答案】B

【解析】

A 选项：A 抗原。O 型血中并不含有 A 抗原，所以 A 选项是错误的。

B 选项：H 抗原。O 型血中含有 H 抗原，因此 B 选项是正确的。H 抗原是形成 A、B 抗原的结构基础，但其抗原性很弱，所以血清中一般没有抗 H 抗体。

C 选项：O 抗原。O 抗原，又称菌体抗原，是革兰氏阴性细菌细胞壁上的一种脂多糖物质，具有毒性。这与 O 型血无关，所以 C 选项是错误的。

D 选项：B 抗原。O 型血中并不含有 B 抗原，所以 D 选项是错误的。

E 选项：MHC 抗原。主要组织相容性复合体（MHC）是一组与免疫应答密切相关、决定移植组织是否相容、紧密连锁的基因群，不是 O 型血所含的抗原，所以 E 选项是错误的。

8. 【答案】A

【解析】

A. 扁鹊：正确。扁鹊是我国古代著名的医学家，他提出了“六不治”的理念，包括骄恣不论于理、轻身重财、衣食不能适、阴阳并、脏气不定、形羸不能服药、信巫不信医等六类病人他不治。

B. 张仲景：错误。张仲景是我国古代著名的医学家，他著有《伤寒杂病论》，确立了“辨证论治”原则，是中医临床的基本原则，但他并未提出“六不治”这一理念。

C. 孙思邈：错误。孙思邈著有《千金方》，是中国历史上第一部临床医学百科全书，他也是第一个完整论述医德的人，但他并未提出“六不治”这一理念。

D. 陈实功：错误。陈实功著有《外科正宗》，以“列症最详，论治最精”著称，但他并未提出“六不治”这一理念。

E. 苏耽：错误。苏耽，传说中的仙人，又称“苏仙公”，他并未提出“六不治”这一理念。

9. 【答案】C

【解析】

选项 A：烟草燃烧所产生的一氧化碳量。一氧化碳会与血红蛋白结合，降低氧合血红蛋白的数量，同时降低红细胞携氧能力，抑制血红蛋白中氧的释放，导致机体处于相对低氧状态，进而促进肺癌的产生。因此，这个选项是错误的。

选项 B：吸烟量。吸烟量越多，机体接受的有害致癌物质越多，患癌风险越高。因此，这个选项也是错误的。

选项 C：烟草中尼古丁含量。尼古丁主要是烟草中的成瘾物质，与致癌关系不大，因此这个选项是正确的。

选项 D：烟草中焦油含量。焦油是确定的致癌物，能诱发人体细胞突变，抑制人体免疫功能的发挥。因此，这个选项是错误的。

选项 E：吸烟年数。吸烟时间越长，机体接受的有害致癌物质越多，患癌风险越高。因此，这个选项也是错误的。



## 10. 【答案】B

## 【解析】

选项 A：姓名。正确。在进行输液操作时，需要核对患者的姓名，以确保药物给予正确的患者。

选项 B：性别。错误。在进行输液操作时，性别并不是需要特别核对的一项。因此，这个选项是不属于七对原则的一部分。

选项 C：剂量。正确。在进行输液操作时，需要核对药物的剂量，以确保按照医嘱正确给药。

选项 D：药物。正确。在进行输液操作时，需要核对药物名称，以确保给予正确的药物。

选项 E：床号。正确。在进行输液操作时，需要核对患者的床号，以确保药物给予正确的患者。

## 11. 【答案】D

## 【解析】

A. 分子形状：在 SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳中，分子形状对迁移速度的影响较小，因为所有蛋白质颗粒表面都覆盖了一层 SDS 分子，消除了蛋白质分子间的电荷差异。

B. 分子电荷：在一定 pH 条件下，所有蛋白质颗粒表面都覆盖了一层 SDS 分子，消除了蛋白质分子间的电荷差异，因此分子电荷对迁移速度的影响也较小。

C. 分子极性：分子极性主要影响分子的溶解性，但在 SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳中，由于所有蛋白质颗粒表面都覆盖了一层 SDS 分子，消除了蛋白质分子间的电荷差异，因此分子极性对迁移速度的影响也较小。

D. 分子量大小：在 SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳中，由于所有蛋白质颗粒表面都覆盖了一层 SDS 分子，消除了蛋白质分子间的电荷差异，因此蛋白质在电场中的迁移速度主要与蛋白质颗粒大小（即分子量大小）有关。

E. 分子溶解度大小：分子溶解度主要影响分子的溶解性，但在 SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳中，由于所有蛋白质颗粒表面都覆盖了一层 SDS 分子，消除了蛋白质分子间的电荷差异，因此分子溶解度对迁移速度的影响也较小。

## 12. 【答案】A

## 【解析】

A. 正常：这是正确答案。患者的  $BMI = \text{体重}(\text{kg}) / \text{身高}^2(\text{m}^2) = 72 / 1.8^2 \approx 22.22 \text{kg/m}^2$ ，属于  $18.5 \sim 24 \text{kg/m}^2$  的范围，根据我国 BMI 标准，该患者的体质量指数为正常。

B. 消瘦：不正确。根据我国 BMI 标准，消瘦的 BMI 值应小于  $18.5 \text{kg/m}^2$ ，而该患者的 BMI 值为  $22.22 \text{kg/m}^2$ ，所以不属于消瘦。

C. 超重：不正确。超重的 BMI 值应在  $24 \sim 28 \text{kg/m}^2$  之间，而该患者的 BMI 值为  $22.22 \text{kg/m}^2$ ，所以不属于超重。

D. 肥胖：不正确。肥胖的 BMI 值应大于  $28 \text{kg/m}^2$ ，而该患者的 BMI 值为  $22.22 \text{kg/m}^2$ ，所以不属于肥胖。

E. 轻度肥胖：不正确。轻度肥胖的 BMI 值应在  $28 \sim 32 \text{kg/m}^2$  之间，而该患者的 BMI 值为  $22.22 \text{kg/m}^2$ ，所以不属于轻度肥胖。

## 13. 【答案】E

## 【解析】

选项 A：硬膜下隙是硬脊膜与蛛网膜间的潜在间隙，内含浆液，而不是椎内静脉丛的位置，所以选项 A 错误。

选项 B：椎体内主要是椎体内静脉，而非椎内静脉丛，所以选项 B 错误。

选项 C：椎体旁主要为腰升静脉，这并非椎内静脉丛的位置，所以选项 C 错误。

选项 D：蛛网膜下隙内充满脑脊液，有脑神经根和脊神经根由隙内穿过，这并非椎内静脉丛的位置，所以选项 D 错误。

选项 E：椎内静脉丛位于椎管内的硬膜外隙中，自枕骨大孔至骶骨尖端连续不断，收纳椎骨、脊髓回流的静脉。椎内、外丛之间互相交通，向两侧注入椎静脉、肋间后静脉及腰静脉。所以选项 E 正确。

14. 【答案】C

【解析】

A. A-G：此选项不正确。在 DNA 中，腺嘌呤（A）通常与胸腺嘧啶（T）配对，而鸟嘌呤（G）通常与胞嘧啶（C）配对。B. A-T：此选项不正确。虽然 A-T 之间存在两对氢键连接，但其稳定性低于 C-G，因为 C-G 之间有三对氢键。C. G-C：此选项正确。在 DNA 中，C 和 G 之间形成三对氢键，比 A-T 的两对氢键更稳定。D. A-U：此选项不正确。在 DNA 中，不存在 A-U 的配对，A-U 的配对通常出现在 RNA 中。E. C-U：此选项不正确。在 DNA 中，不存在 C-U 的配对，C-U 的配对也通常出现在 RNA 中。

15. 【答案】A

【解析】

A. 卫生服务需要：这是正确答案。它是根据人们的实际健康状况与理想健康状态之间存在的差距，对预防、保健、医疗、康复等卫生服务的客观需求。

B. 卫生服务需求：这个选项错误。它主要指在一定时期内和一定价格水平上，人们愿意且有能力消费的卫生服务量，从经济和价值观念出发。

C. 卫生服务利用：这个选项错误。它指的是需求者实际利用卫生服务的数量，是卫生服务需要量和卫生资源供给量相互制约的结果。

D. 卫生服务提供：这个选项错误。它主要指的是卫生系统为人群健康提供卫生服务的过程。

E. 卫生服务购买：这个选项错误。它主要指的是人们购买卫生服务的行为。

16. 【答案】B

【解析】

A. 有效性：非处方药的有效性对于其分类并不是决定性的依据，所以选项 A 不正确。

B. 安全性：非处方药分为甲类和乙类的主要依据就是安全性。甲类非处方药安全性较高，可以自行购买和使用；乙类非处方药相对来说安全性较低，需要在药师的指导下使用。所以选项 B 是正确答案。

C. 可及性：非处方药的可及性对于其分类并不是决定性的依据，所以选项 C 不正确。

D. 稳定性：非处方药的稳定性对于其分类并不是决定性的依据，所以选项 D 不正确。

E. 经济性：非处方药的经济性对于其分类并不是决定性的依据，所以选项 E 不正确。

17. 【答案】A

【解析】

- A. 原发性转运：正确。原发性转运是直接利用细胞代谢产生的能量将物质逆浓度梯度和（或）电位梯度转运的过程，胃壁细胞上存在的是一种氢钾泵，分泌  $H^+$  摄入  $K^+$ ，将  $H^+$  分泌到胃液中。
- B. 继发性转运：错误。继发性转运主要见于葡萄糖在小肠黏膜上皮的吸收以及在近端肾小管上皮的重吸收，与胃壁细胞分泌  $H^+$  无关。
- C. 出胞作用：错误。出胞作用是指胞质内的大分子物质以分泌囊泡的形式排出细胞的过程，如神经递质的释放，与胃壁细胞分泌  $H^+$  无关。
- D. 单纯扩散：错误。单纯扩散转运的物质都是脂溶性（非极性）物质或少数不带电荷的极性小分子物质，如  $O_2$ 、 $CO_2$ 、 $N_2$  等，与胃壁细胞分泌  $H^+$  无关。
- E. 易化扩散：错误。易化扩散是指非脂溶性的小分子物质或带电离子在跨膜蛋白帮助下，顺浓度梯度和（或）电位梯度进行的跨膜转运，与胃壁细胞分泌  $H^+$  无关。

## 18. 【答案】A

## 【解析】

- A. 血小板粘附于创面上，填补创面，止血栓形成：这是血小板在生理性止血过程中的主要作用，也是本题的正确答案。
- B. 血小板释放 5-HT 等缩血管物质，引起血管收缩：虽然血小板有这个功能，但并非其主要作用。
- C. 释放 ADP 和  $TXA_2$ ，引起血小板聚集：这是血小板的另一项功能，但不是其在生理性止血过程中的主要作用。D. 纤溶蛋白原转换成不溶性的纤溶蛋白，加固止血栓形成：这是凝血因子的作用，而不是血小板的主要功能。
- E. 提供磷脂表面，止血栓形成：这是血小板在血液凝固过程中的一个功能，但不是其主要作用。

## 19. 【答案】C

## 【解析】

- 选项 A：血清白蛋白是一种蛋白质，需要 T 细胞辅助才能刺激 B 细胞产生抗体，所以它是胸腺依赖性抗原，不符合题干要求。
- 选项 B：卡介苗是一种细菌制品，需要 T 细胞辅助才能刺激 B 细胞产生抗体，所以它是胸腺依赖性抗原，不符合题干要求。
- 选项 C：脂多糖是一种细菌的成分，可以直接刺激 B 细胞产生抗体，不需要 T 细胞辅助，所以它是胸腺非依赖性抗原，符合题干要求，所以 C 是正确答案。
- 选项 D：类毒素是一种蛋白质，需要 T 细胞辅助才能刺激 B 细胞产生抗体，所以它是胸腺依赖性抗原，不符合题干要求。
- 选项 E：抗病毒血清是一种蛋白质，需要 T 细胞辅助才能刺激 B 细胞产生抗体，所以它是胸腺依赖性抗原，不符合题干要求。

## 20. 【答案】D

## 【解析】

- A 选项：危及病人生命急需输血。这是正确的，因为在临床实践中，如果病人的生命处于危险之中，而输血治疗是

唯一能够挽救病人生命的手段，那么就必须立即进行输血。

B 选项：所在地血站无法及时提供血液，且无法及时从其他机构调剂血液，而其他医疗措施不能替代输血治疗。这也是正确的，因为在某些情况下，如果血站无法及时提供血液，而其他医疗措施也不能替代输血治疗，那么就需要进行临时急性用血。

C 选项：各抢救科室具备处理输血反应的能力和条件。这是正确的，因为在进行输血治疗的过程中，可能会出现各种输血反应，因此，抢救科室必须具备处理输血反应的能力和条件。

D 选项：临床机构批准，并不属于临时急性用血的原则，因此这个选项是错误的。

E 选项：符合采血标准。这是正确的，因为在进行临时急性用血的过程中，必须严格遵守采供血相关操作规程和技术标准，确保血液的安全和有效。

21. 【答案】A

【解析】

A. 血液型缺氧：此类型的缺氧是由于血液中血红蛋白的量或质发生改变，导致血红蛋白结合的氧不易释放，从而引起缺氧。在本题中，患者食用了大量腌制腊肉和咸菜后出现消化系统症状，有可能是亚硝酸盐中毒，亚硝酸盐会使正常的血红蛋白氧化为失去携氧运输能力的高铁血红蛋白，因此导致的缺氧类型为血液型缺氧。

B. 组织型缺氧：这种类型的缺氧是由于组织细胞利用氧异常所引起的缺氧。在本题中，没有相关证据表明患者存在组织细胞利用氧异常的情况。

C. 循环型缺氧：这种类型的缺氧是由于组织血流量减少，使得组织氧供应减少所引起的。在本题中，没有相关证据表明患者存在血流量减少的情况。

D. 乏氧型缺氧：这种类型的缺氧是由于肺泡氧分压降低，或静脉血分流入动脉，血液从肺摄取的氧减少，以致动脉血氧含量减少导致的。在本题中，没有相关证据表明患者存在肺泡氧分压降低或血液从肺摄取的氧减少的情况。

E. 低张型缺氧：这种类型的缺氧是由于动脉血氧分压降低所引起的。在本题中，没有相关证据表明患者存在动脉血氧分压降低的情况。

22. 【答案】B

【解析】

A 选项：错误。暗适应是在暗环境中，视觉感受性不断提高的过程，而非降低。

B 选项：正确。暗适应是指在暗环境中，由于视网膜上的杆细胞对光线更敏感，使得人眼对光的敏感度逐渐提高的过程。

C 选项：错误。视觉感觉阈限并不会在暗适应过程中提高，相反，在暗环境中，由于视网膜上的杆细胞对光线更敏感，人眼对光的敏感度会提高，视觉感觉阈限会下降。

D 选项：错误。视觉的差别阈限是指刚刚能引起差别感觉的刺激的最小差异量，与暗适应无直接关联。

E 选项：错误。视觉对比度是指视觉系统对空间亮度分布的反应，与暗适应无直接关联。

23. 【答案】D

【解析】

- A. 一级医院：不正确。一级医院的医师通常只能获得非限制使用级抗菌药物处方权，而题干中的医师经过培训和考核获得了使用权，这更符合二级以上医院的规定。
- B. 乡镇卫生院：不正确。乡镇卫生院的医师通常只能获得非限制使用级抗菌药物处方权，这与题干的情况不符。
- C. 社区卫生服务中心：不正确。社区卫生服务中心的医师通常只能获得非限制使用级抗菌药物处方权，这与题干的情况不符。
- D. 二级医院：正确。《抗菌药物临床应用管理办法》规定，二级以上医院应定期对医师和药师进行抗菌药物临床应用知识和规范化管理的培训，并经考核合格后，才能获得相应的处方权。
- E. 村卫生室：不正确。村卫生室的医师通常只能获得非限制使用级抗菌药物处方权，这与题干的情况不符。

24. 【答案】D

【解析】

- A. 当地政府部门：当地政府部门主要负责执行和监督传染病的防控工作，但并无权增加或减少乙类传染病。
- B. 全国人大常委会：全国人大常委会主要是立法机关，虽有权制定和修改《传染病防治法》，但具体的分类决定权不在其手中。
- C. 县级卫生部门：县级卫生部门主要负责当地的卫生工作，包括传染病的防控，但并无权增加或减少乙类传染病。
- D. 国务院卫生行政部门：根据《传染病防治法》规定，国务院卫生行政部门有权增加或减少乙类传染病，此为正确答案。
- E. 疾病控制预防中心：疾病控制预防中心主要负责疾病的预防和控制工作，但并无权增加或减少乙类传染病。

25. 【答案】C

【解析】

- A. 分工合作，联防联控：这是正确的应急管理措施，当发生群体性不明原因疾病时，需要各部门分工合作，实现联防联控。
- B. 及时上报：这也是正确的应急管理措施，一旦发现此类疾病，应及时上报，以便快速响应和处理。
- C. 统一领导，统一响应：这是错误的应急管理措施。正确的应该是“统一领导，分级负责”，根据突发公共卫生事件的范围、性质和危害程度，实行分级管理。
- D. 信息共享，及时沟通：这同样是正确的应急管理措施，确保信息的透明度和及时性是有效应对突发公共卫生事件的关键。
- E. 控制与治疗并重：这也是正确的应急管理措施，对于群体性不明原因疾病，既要控制疾病的扩散，又要对已经感染的人进行治疗。

26. 【答案】A

【解析】

- A. 肺血栓栓塞：在此病状下，肺部的血流会因为血栓阻塞而显著减少，但通气功能可能保持正常，从而导致肺通气/血流比值大于 0.8。因此，选项 A 是正确答案。
- B. 肺气肿：肺气肿时，肺部终末细支气管远端气腔出现异常持久的扩张，并伴有肺泡和细支气管的破坏，而无明



显的肺纤维化，肺血流/通气比增大减小的可能性均有，因此，选项 B 不正确。

C. 哮喘：哮喘时，由于气道炎症和痉挛，通气量会明显下降，导致肺通气/血流比值下降，因此，选项 C 不正确。

D. 慢性支气管炎：慢性支气管炎时，由于气道炎症和黏液堵塞，通气量也会下降，导致肺通气/血流比值下降，因此，选项 D 不正确。

E. 肺水肿：肺水肿时，由于肺泡充满液体，通气量会大幅度下降，导致肺通气/血流比值下降，因此，选项 E 不正确。

27. 【答案】C

【解析】

A 选项：结合多个底物分子。这个选项是错误的，因为酶活性中心以外必需基团的功能并不包括结合多个底物分子，这一功能主要是由酶活性中心内的必需基团完成的。

B 选项：调控其他的酶活性。这个选项也是错误的，酶活性中心以外的必需基团并不直接调控其他酶的活性。

C 选项：维持酶活性中心的空间结构。这个选项是正确的，酶活性中心以外的必需基团主要的功能就是维持酶活性中心的空间结构。

D 选项：加快催化反应。这个选项是错误的，加快催化反应的主要是酶活性中心内的必需基团。

E 选项：生成成肽键。这个选项是错误的，生成成肽键主要是由酶活性中心内的必需基团完成的。

28. 【答案】B

【解析】

选项 A：传染性单核细胞增多症是由 Epstein-Barr 病毒引起的一种急性传染病。其组织学表现为淋巴细胞主要分布在副皮质区，滤泡增大，但不会引起淋巴结窦性组织细胞增生。

选项 B：癌肿引流区的淋巴结容易引发淋巴结窦性组织细胞增生。这是因为肿瘤细胞通过淋巴管道进入淋巴结，刺激淋巴结产生反应，导致淋巴结窦性组织细胞增生。

选项 C：药物过敏反应通常引发淋巴滤泡增生，生发中心扩大，但不会引起淋巴结窦性组织细胞增生。

选项 D：化脓性感染主要引发淋巴滤泡增生，生发中心扩大，但不会引起淋巴结窦性组织细胞增生。

选项 E：病毒接种不良反应也会引发淋巴滤泡增生，生发中心扩大，但不会引起淋巴结窦性组织细胞增生。

29. 【答案】C

【解析】

A 选项：单个囊腺泡，内上皮为单层扁平状上皮。这个描述并不符合卵巢黏液性囊腺瘤的特征，因此选项 A 是错误的。

B 选项：内层为多层高柱状上皮。卵巢黏液性囊腺瘤的囊壁通常由单层黏液柱状上皮组成，而非多层，所以选项 B 是错误的。

C 选项：大小不一的囊腔，充满富含糖蛋白的粘稠液体。这正是卵巢黏液性囊腺瘤的主要特征，因此选项 C 是正确的。

D 选项：囊腔和间质可见多个砂粒体。这个特征更多地出现在卵巢浆液性癌中，而非卵巢黏液性囊腺瘤，所以选项

D 是错误的。

E 选项：可见明显异型性细胞。卵巢黏液性囊腺瘤通常不会有明显的细胞异型性，这是卵巢黏液性癌的特征，所以选项 E 是错误的。

30. 【答案】B

【解析】

A 选项：甲状腺素对促甲状腺素释放激素的调节是负反馈机制。当体内甲状腺素浓度过高时，会抑制下丘脑释放 TRH（促甲状腺素释放激素），从而抑制垂体前叶分泌 TSH（促甲状腺素），减少甲状腺素的产生。

B 选项：排卵前黄体生成素 (LH) 的释放是正反馈机制。在月经周期中，排卵前雌激素水平上升会刺激垂体前叶大量分泌 LH，促进排卵。这个过程就是正反馈机制。

C 选项：皮质醇对下丘脑的调控是负反馈机制。当体内皮质醇浓度过高时，会抑制下丘脑和垂体前叶的 ACTH 分泌，从而降低皮质醇的分泌。

D 选项：肺牵张反射是一种保护机制，防止肺部过度膨胀，不属于正反馈机制。

E 选项：降压反射是一种负反馈机制。当血压过高时，心血管系统会通过降压反射来降低血压。

31. 【答案】E

【解析】

选项 A：呼吸链电子传递速度。这是影响氧化磷酸化速率的关键因素，电子传递速度越快，释放的能量越多，驱动 ADP 磷酸化生成 ATP 的能力也就越强，因此这个选项是错误的。

选项 B：ATP 合酶活性。ATP 合酶是氧化磷酸化过程中的关键酶，其活性直接影响 ATP 的生成，因此这个选项也是错误的。

选项 C：ADP 水平。ADP 的数量会影响 ATP 的生成，因为 ADP 是 ATP 生成的原料，所以这个选项是错误的。

选项 D：细胞内解耦联。这是指质子不通过 ATP 合酶、而是通过其他途径回流至线粒体基质，使得 ATP 的生成受到抑制，因此这个选项是错误的。

选项 E：蛋白激酶的作用。蛋白激酶并不直接参与细胞的氧化磷酸化过程，因此它不会直接影响氧化磷酸化的速率，所以这个选项是正确的。

32. 【答案】C

【解析】

A. 1 年：错误。根据《处方管理办法》，麻醉药品处方至少保存 3 年，所以选项 A 的 1 年不符合规定。

B. 2 年：错误。虽然精神药品处方需要至少保存 2 年，但麻醉药品处方的保存年限更长，为 3 年。

C. 3 年：正确。根据《处方管理办法》，医疗机构应当对麻醉药品处方至少保存 3 年。

D. 4 年：错误。虽然 4 年大于规定的 3 年，但题目问的是最低保存年限，所以是 3 年。

E. 5 年：错误。同 D，虽然 5 年大于规定的 3 年，但题目问的是最低保存年限，所以是 3 年。

33. 【答案】A

【解析】

选项 A：正确。良性前列腺增生的病理特征是腺体、平滑肌和纤维均有增生。

选项 B：错误。虽然良性前列腺增生中，基质可能会有一定的增生，但这并不是其主要的病理特点。

选项 C：错误。血管增生并非良性前列腺增生的主要病理特征，更多的是见于肿瘤等病变中。

选项 D：错误。上皮细胞增生虽然在良性前列腺增生中可能出现，但并不全面，不能代表良性前列腺增生的全部病理特点。

选项 E：错误。腺上皮化生常见于恶性病变，不是良性前列腺增生的特点。

34. 【答案】B

【解析】

选项 A：侵入淋巴细胞。这是错误的，因为伤寒并不直接侵入淋巴细胞，而是全身单核巨噬细胞系统细胞的增生为其病变特征。

选项 B：感染性肉芽肿。这是正确的，伤寒杆菌引起的伤寒会导致巨噬细胞吞噬伤寒杆菌、红细胞和细胞碎片等，形成伤寒肉芽肿，这是一种感染性肉芽肿。

选项 C：干酪样坏死。这是错误的，干酪样坏死多见于结核病，而非伤寒。

选项 D：淋巴细胞增多。这是错误的，淋巴细胞增多常见于病毒感染、淋巴细胞白血病、淋巴瘤等，并非伤寒的特征。

选项 E：假膜的形成。这是错误的，假膜的形成常见于细菌性痢疾、白喉等，并非伤寒的特征。

35. 【答案】E

【解析】

选项 A：作品在心理测验中，常作为测验的一种参考内容，并非参考指标。所以选项 A 错误。

选项 B：信度是指一个测验工具在对同一对象的几次测量中所得结果的一致程度。它反映工具的可靠性和稳定性。但它并非心理测评的参考指标，而是评价测评工具质量的指标。所以选项 B 错误。

选项 C：效度指一个测量工具能够测量出其所要测东西的真实程度。它反映工具的有效性、正确性。和信度一样，效度也是评价测评工具质量的指标，而非心理测评的参考指标。所以选项 C 错误。

选项 D：误差是指与测验目的无关的因素所引起的测验结果不稳定或不准确的效应。这是我们在进行测评时需要尽可能避免的，而非参考指标。所以选项 D 错误。

选项 E：常模是可比较的标准，测试结果需要与常模进行比较，才能得出结论，常模相当于心理测评的“参考指标”。所以选项 E 正确。

36. 【答案】B

【解析】

A 选项：髂股韧带，起自髂前下棘，人字形向下，经囊的前方止于转子间线，对于限制大腿过伸和维持人体直立姿势有很大作用，但它并不属于髋关节囊内韧带，因此 A 选项错误。

B 选项：股骨头韧带，位于髋关节囊内，起关节牢固性作用，为滑膜所包被，内含营养股骨头的血管。这是唯一一个属于髋关节囊内韧带的选项，因此 B 选项正确。



C 选项：坐股韧带，起自坐骨体，斜向外上与关节囊融合，附着于大转子根部，可限制大腿的旋内运动，但并不属于关节囊内韧带，因此 C 选项错误。

D 选项：髌白横韧带，包绕髌白切迹，位于髌关节外，是关节囊韧带的连接点，因此 D 选项错误。

E 选项：耻骨韧带，位置错误，不在髌关节囊内，因此 E 选项错误。

37. 【答案】B

【解析】

A. 核受体激活：肾上腺素不能与核受体结合，故不能激活核受体。错误。

B. cAMP 升高：肾上腺素与受体结合后，通过 G 蛋白（Gs）传递信号，经过 cAMP-PKA 途径，活化 PKA，使多种蛋白质底物的丝氨酸/苏氨酸残基发生磷酸化，进而发挥生物学效应。正确。

C. cGMP 升高：肾上腺素与受体结合后，cAMP 会升高，而不是 cGMP。错误。

D. 细胞内受体结合：肾上腺素主要与细胞膜受体结合，不是细胞内受体。错误。

E. IP<sub>3</sub> 降解：肾上腺素与受体结合，对 IP<sub>3</sub> 的影响不大。错误。

38. 【答案】E

【解析】

A. 肌球蛋白：肌球蛋白是构成肌纤维的主要蛋白之一，它参与肌肉收缩的过程，但并不是启动肌肉收缩的关键因素。

B. 原肌球蛋白：原肌球蛋白是肌肉收缩时与肌动蛋白相互作用的蛋白质，但也不是启动肌肉收缩的关键因素。

C. 钙调蛋白：钙调蛋白在平滑肌收缩中有重要作用，但它并不直接启动肌肉收缩，主要是参与肌球蛋白轻链激酶的生化过程。

D. 肌动蛋白：肌动蛋白是肌肉收缩时与原肌球蛋白相互作用的蛋白质，但也不是启动肌肉收缩的关键因素。

E. 肌钙蛋白：肌钙蛋白是肌肉收缩的关键启动因素，它能与胞质内的  $\text{Ca}^{2+}$  结合，进而引发一系列的生化反应，导致肌肉收缩。

39. 【答案】A

【解析】

A. 预防疾病、宣传健康、职业病管理：这是公共卫生的核心功能，包括预防各种疾病的发生，对健康知识进行宣传教育，以及对职业病进行有效的管理和控制。这些都是公共卫生工作的主要内容。因此，选项 A 是正确的。

B. 环境保护，预防传染病，保障卫生服务：虽然这些都是公共卫生的重要工作，但并不能完全概括公共卫生的核心功能。因此，选项 B 是错误的。

C. 发布医疗卫生有关信息，促进卫生经济调控：这些属于公共卫生的一部分工作，但并不是其核心功能。因此，选项 C 是错误的。

D. 对灾难作出应急反应，保证卫生服务的有效性和及时性：这是公共卫生在特定情况下的工作内容，而非其核心功能。因此，选项 D 是错误的。

E. 防治传染病，职业病管理，母婴保健：虽然这些都是公共卫生的重要工作，但并不能完全概括公共卫生的核心

功能。因此，选项 E 是错误的。

40. 【答案】D

【解析】

- A. 同情：医学工作者需要有同情心，但这不是医学科研的灵魂和科研人员的良心，所以选项 A 错误。
- B. 公正：公正是医学工作者的一种基本道德准则，但并非医学科研的灵魂和科研人员的良心，所以选项 B 错误。
- C. 廉洁：廉洁是医学工作者在医疗活动中需要遵循的道德准则，但并非医学科研的灵魂和科研人员的良心，所以选项 C 错误。
- D. 诚实：诚实是医学科研的灵魂和科研人员的良心，因为科研工作需要严谨的态度和真实的数据，任何的造假都是对科研工作的极大伤害，所以选项 D 正确。
- E. 勤奋：虽然勤奋是科研工作的基础，但并非医学科研的灵魂和科研人员的良心，所以选项 E 错误。

41. 【答案】D

【解析】

- A. 目的基因的选择并不是“转”的含义，这是基因工程中选择特定的基因进行操作的步骤，与“转”无关，所以选项 A 错误。
- B. DNA 转录为 RNA 是生物学中的一个基本过程，但这并不是基因工程中“转”的含义，所以选项 B 错误。
- C. 逆转录 RNA 的合成虽然在某些基因工程操作中 useful，但它并不是“转”的含义，所以选项 C 错误。
- D. 目的 DNA 转入受体细胞正是基因工程中的“转”的含义，所以选项 D 正确。
- E. 目的基因导入质粒是制备重组 DNA 的步骤，虽然涉及到了 DNA 的移动，但并不是“转”的含义，所以选项 E 错误。

42. 【答案】E

【解析】

- A. 角化：这是一种细胞表现，但并非肾母细胞瘤的特征，故不正确。
- B. 胞质透明：这也是一种细胞表现，但并非肾母细胞瘤的特征，故不正确。
- C. 梭状：这是细胞形态的描述，而在肾母细胞瘤中，间叶细胞确实可能呈梭形，但这并不全面地反映了肾母细胞瘤的组织学特征，故不正确。
- D. 形状，大小不等：这是对细胞形态的描述，虽然肾母细胞瘤的细胞的确可能形状大小不等，但这并不全面地反映了肾母细胞瘤的组织学特征，故不正确。
- E. 包括间叶组织的细胞，上皮细胞，和幼稚细胞：这是肾母细胞瘤的组织学特征，反映了肾母细胞瘤的细胞成分，故正确。

43. 【答案】D

【解析】

- A. 以治疗疾病为导向-错误。临床预防并非以治疗疾病为导向，而是以预防疾病和促进健康为主。
- B. 以收集临床资料为主-错误。虽然收集临床资料是临床预防的一部分，但不是其主要工作。临床预防更注重对健

康危险因素的评价和预防干预。

- C. 以健康体检为主-错误。健康体检是临床预防的一部分，但不是全部。临床预防更注重健康咨询和健康促进。
- D. 以健康咨询和健康促进为主-正确。临床预防的核心是以健康咨询和健康促进为主，通过医患共同决策，实施个性化的预防干预措施。
- E. 以医生的决策为导向-错误。临床预防注重医患共同决策，而非单方面由医生决策。

44. 【答案】A

【解析】

选项 A：正确。重大疾病医疗保险的保障对象为城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗的参保人。

选项 B：错误。重大疾病医疗保险并不包括城镇职工医保。

选项 C：错误。重大疾病医疗保险并不涵盖所有大病居民，而是只涵盖城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗的参保人。

选项 D：错误。重大疾病医疗保险并不包括城镇职工医疗保险与城乡新农合。

选项 E：错误。重大疾病医疗保险并不涵盖所有参保公民，而是只涵盖城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗的参保人。

45. 【答案】E

【解析】

A. 隔离病人：这是针对传染源的措施，通过隔离病人来防止病毒的进一步传播，但并不是切断传播途径。

B. 医学隔离：同样是针对传染源的措施，通过医学隔离来防止病毒的传播，但并不直接切断传播途径。

C. 治愈病人：治愈病人可以消除传染源，但并不直接切断传播途径。

D. 注射疫苗：注射疫苗是针对易感人群的措施，可以提高免疫力防止病毒感染，但并不直接切断传播途径。

E. 消毒：消毒是直接切断传播途径的有效方式，通过消毒可以清除环境中的病毒，防止其通过空气、物体等途径传播。

46. 【答案】C

【解析】

选项 A：急诊患者，这类患者往往需要立即进行医疗干预，而非临终关怀。

选项 B：重症患者，这类患者病情严重，但并非所有的重症患者都处于生命的终末阶段，所以不完全符合临终关怀的范围。

选项 C：晚期肿瘤患者，这类患者处于疾病的终末阶段，且病情无法逆转，是临终关怀的主要对象。因此，这个选项是正确的。

选项 D：慢性病患者，这类患者虽然病程长，但并非所有的慢性病患者都处于生命的终末阶段，所以不完全符合临终关怀的范围。

选项 E：危重症患者，这类患者病情危重，但并非所有的危重症患者都处于生命的终末阶段，所以不完全符合临终关怀的范围。

## 47. 【答案】B

## 【解析】

A 选项： $\beta_1$ 受体主要分布在心脏，激动  $\beta_1$ 受体会增加心脏收缩力和心率，与支气管哮喘治疗无关，所以 A 选项错误。

B 选项：沙丁胺醇是一种短效  $\beta_2$ 受体激动剂，可以激动气道的  $\beta_2$ 受体，使支气管平滑肌舒张，缓解哮喘症状。因此，B 选项正确。

C 选项：虽然异丙肾上腺素能激动  $\beta_1$ 、 $\beta_2$ 受体，但它并非沙丁胺醇的作用机制，所以 C 选项错误。

D 选项： $\alpha$ 受体主要分布在血管平滑肌，其激动会导致血管收缩，增加血压，与支气管哮喘治疗无关，所以 D 选项错误。

E 选项：虽然肾上腺素、多巴胺、麻黄碱等能激动  $\alpha$ 、 $\beta$ 受体，但这并非沙丁胺醇的作用机制，所以 E 选项错误。

## 48. 【答案】B

## 【解析】

A. 血常规：呋达帕胺和氨氯地平在治疗高血压的过程中，一般不会对血常规造成显著影响，因此选项 A 错误。

B. 血钾：呋达帕胺为抗高血压药，是一种磺胺类利尿剂，可引起低钾血症，治疗期间应监测血浆钾离子水平，必要时补钾，因此选项 B 正确。

C. 血肌酐：呋达帕胺和氨氯地平在治疗高血压的过程中，一般不会对血肌酐造成显著影响，因此选项 C 错误。

D. 血丙氨酸转移酶：呋达帕胺和氨氯地平在治疗高血压的过程中，一般不会对血丙氨酸转移酶造成显著影响，因此选项 D 错误。

E. 血 PH：呋达帕胺和氨氯地平在治疗高血压的过程中，一般不会对血 PH 造成显著影响，因此选项 E 错误。

## 49. 【答案】A

## 【解析】

选项 A：疟疾。此题的情景描述符合疟疾的典型表现，如隔日发热，高热伴随寒战和头痛，旅居疟疾流行区，且血象显示红细胞和血红蛋白下降。因此，选项 A 是正确答案。

选项 B：血吸虫病。虽然血吸虫病也会导致发热，但通常前期少有寒战，且多数患者会有腹泻表现，与题目描述不符，所以排除。

选项 C：登革热。登革热的症状包括突然发热、全身肌肉、骨、关节痛、极度疲乏、皮疹、淋巴结肿大及白细胞减少，与题目描述不符，所以排除。

选项 D：钩端螺旋体病。这种病症的特点是急起发热，伴畏寒或寒战，眼结膜充血，可发生结膜下出血，与题目描述不符，所以排除。

选项 E：艾滋病。艾滋病的潜伏期长，患者的淋巴细胞计数明显下降，与题目描述不符，所以排除。

## 50. 【答案】A

## 【解析】

A. 他汀类药物：主要对低密度脂蛋白（LDL-C）的降低作用最强，胆固醇（TC）次之。他汀类药物或其代谢产物与

底物 HMG-CoA 的化学结构相似, 且对 HMG-CoA 还原酶的亲和力比 HMG-CoA 高数千倍, 对该酶发生竞争性抑制作用, 从而使胆固醇合成受阻。因此, 对于高胆固醇, 低密度脂蛋白偏高的情况, 首选他汀类药物。

B. 贝特类药物: 主要用于以甘油三酯 (TG) 或极低密度脂蛋白 (VLDL) 升高为主的原发性高脂血症, 不适用于本题所述情况。

C. 烟酸类: 属 B 族维生素, 大剂量烟酸能降低血浆 TG 和 VLDL, 对于高胆固醇, 低密度脂蛋白偏高的情况, 效果不明显。

D. 普罗布考: 是疏水性抗氧化剂, 可使血浆 TC 和 LDL-C 下降, 而 HDL-C 及 ApoAI 同时明显下降, 对血浆 TG 和 VLDL 一般无影响。若与他汀类或胆汁酸结合树脂伍用, 可增强调血脂作用, 不作为首选。

E. 依折麦布: 为新型胆固醇吸收抑制药, 多与他汀类药物合用, 单独使用效果不明显。

51. 【答案】D

【解析】

A. PH: 血液的 pH 值可以用来判断体内是否存在酸碱平衡紊乱, 但不能用来确定具体的代谢性酸中毒类型。

B. AB: 实际碳酸氢盐, 它与标准碳酸氢盐结合可以用来判断代酸代碱或呼酸呼碱, 但不能判断代谢性酸中毒的类型。

C. BE: 碱剩余, 主要用来判断代谢性酸中毒和代谢性碱中毒, 但不能判断代谢性酸中毒的类型。

D. AG: 阴离子间隙, 是一项受到广泛重视的酸碱指标, AG 升高时可帮助区分代谢性酸中毒的类型和诊断混合型酸碱平衡紊乱。

E. PaCO<sub>2</sub>: 动脉血二氧化碳分压, 可以用来辅助判断是否为代谢性酸中毒, 但不能判断代谢性酸中毒的类型。

52. 【答案】C

【解析】

A. 临床路径: 这是一种医疗服务的管理模式, 用于指导某一特定疾病或手术的全程治疗和护理, 但它并不是卫生法的形式之一。

B. 临床实践指南: 这是基于最新科研成果, 为临床医生提供诊疗决策参考的指南, 也不属于卫生法的形式。

C. 卫生法规: 这是由国家立法机关制定的, 属于卫生法的形式之一, 因此是正确答案。

D. 卫生标准: 这是规定医疗卫生活动应达到的最低要求, 虽然具有法律效力, 但并非卫生法的形式。

E. 专家共识: 这是专家针对某一问题的共同认识或建议, 不属于卫生法的形式。

53. 【答案】D

【解析】

A. 心理范围、文化范围、社会范围: 这个选项缺少了医学范围, 医学心理学是心理学和医学相结合的学科, 因此这个选项是错误的。

B. 心理范围、文化范围、病理范围: 这个选项同样缺少了医学范围, 并且将病理范围作为一个主要范围, 但病理范围并不是医学心理学主要关注的领域, 因此这个选项也是错误的。

C. 文化范围、社会范围、病理范围: 这个选项缺少了心理范围和医学范围, 医学心理学正是以心理学为基础, 应



用于医学领域的学科，因此这个选项是错误的。

D. 心理范围、社会范围、医学范围：这个选项正确地包含了医学心理学的三个主要范围，因此这个选项是正确的。

E. 病理范围、文化范围、心理范围：这个选项虽然包含了心理范围，但是缺少了医学范围和社会范围，因此这个选项是错误的。

54. 【答案】D

【解析】

选项 A：吗啡在急性左心衰竭引发的肺水肿中有一定作用，它可以迅速缓解患者的气促和窒息感，促进肺水肿液的吸收，但其效果没有呋塞米显著。

选项 B：氨茶碱主要用于急性重度哮喘或哮喘持续状态时，以迅速缓解喘息与呼吸困难等症状，而不是用于缓解肺水肿。

选项 C：硝酸甘油能迅速缓解各种类型心绞痛，还可舒张肺血管，降低肺血管阻力，改善肺通气，用于急性呼吸衰竭及肺动脉高压的治疗，但并非首选药物。

选项 D：呋塞米是一种袢利尿药，迅速扩张容量血管，使回心血量减少，在利尿作用发生之前即可缓解急性肺水肿，是急性肺水肿的迅速有效的治疗手段之一。所以这是正确答案。

选项 E：洋地黄制剂是一类正性肌力药物，对治疗心力衰竭有着很好疗效，但在这个问题中并非首选。

55. 【答案】D

【解析】

A.  $\alpha_1$  受体激动剂：这是错误的，因为  $\alpha_1$  受体激动剂如坦洛新，会增加心肌收缩力，而非降低。

B.  $\beta_2$  受体阻断剂：这也是错误的， $\beta_2$  受体阻断剂对心肌收缩力的影响不明显，美托洛尔主要阻断  $\beta_1$  受体。

C. M 受体激动剂：这是错误的，M 受体激动剂如乙酰胆碱、毛果芸香碱等，其主要功能并非降低心肌收缩力。

D.  $\beta_1$  受体阻断剂：这是正确的，美托洛尔是  $\beta_1$  受体阻断剂，可以减弱心肌收缩力，降低心排出量，减少心肌耗氧量，降低血压。

E.  $\alpha_2$  受体激动剂：这是错误的， $\alpha_2$  受体激动剂如羟甲唑啉等，并非主要通过降低心肌收缩力来发挥作用。

56. 【答案】A

【解析】

选项 A：高血压伴支气管哮喘。普萘洛尔会增加气道阻力，使得在支气管哮喘时症状加重，因此对于有支气管哮喘的高血压患者，普萘洛尔是禁用的。所以选项 A 是正确的。

选项 B：急性心肌梗死。普萘洛尔可以使心率减慢、心排量降低、冠脉血流量下降、减少心肌耗氧，因此可以用于急性心肌梗死的治疗。所以选项 B 是错误的。

选项 C：心力衰竭。普萘洛尔可以抑制交感神经激活对心力衰竭代偿的不利作用，长期应用能减轻症状、改善预后、降低死亡率和住院率，因此可以用于心力衰竭的治疗。所以选项 C 是错误的。

选项 D：心绞痛。普萘洛尔可以使冠脉血流量下降、减少心肌耗氧，因此可以用于心绞痛的治疗。所以选项 D 是错误的。

选项 E：心律失常。普萘洛尔对心肌收缩力、窦房结及房室结功能均有抑制作用，因此可以用于心律失常的治疗。所以选项 E 是错误的。

57. 【答案】A

【解析】

- A. 肺栓塞：肺栓塞会引起肺动脉压力增高，使得  $P2 > A2$ ，所以这个选项是正确的。
- B. 肺炎：肺炎主要影响呼吸，不直接影响心脏的  $P2$  和  $A2$ ，所以这个选项是错误的。
- C. 肺结核：肺结核主要影响肺部，不直接影响心脏的  $P2$  和  $A2$ ，所以这个选项是错误的。
- D. 主动脉夹层：主动脉夹层会影响主动脉的血流，但不会导致  $P2 > A2$ ，所以这个选项是错误的。
- E. 胸腔积液：胸腔积液会对心脏产生压力，但不会导致  $P2 > A2$ ，所以这个选项是错误的。

58. 【答案】D

【解析】

- A. 脊神经节：错误。脊神经节是在脊髓后根有一膨大部分，内含假单极神经元。位于后根入椎间孔处。为深浅感觉传入神经的第一级神经元，而非二级神经元。
- B. 内侧丘系：错误。内侧丘系为二级神经元发出纤维交叉至对侧组成的。主要传导的是躯体深感觉（即本体感觉）和精细触-压觉，而不是肢体浅感觉。
- C. 白质前联合：错误。白质前联合是脊髓中交叉纤维的部分，而非二级神经元所在位置。
- D. 脊髓后角：正确。肢体浅感觉的传入纤维进入脊髓后在中央灰质后角换元，二级神经元发出纤维经白质前联合交叉至对侧，在脊髓前外侧部上行，形成前外侧索传入系统。
- E. 薄束核：错误。薄束核是深浅感觉传入神经在延髓下方更换神经元的位置，而非二级神经元所在位置。

59. 【答案】A

【解析】

- A. 鳞癌：鳞癌主要发生在子宫颈部，而不是子宫内膜。因此，这个选项是正确答案，因为它不属于子宫内膜癌的病理类型。
- B. 粘液性癌：粘液性癌是子宫内膜癌的一种类型，占比约 5%，预后较好。因此，这个选项是错误的。
- C. 透明细胞癌：透明细胞癌也是子宫内膜癌的一种类型，占比不足 5%，恶性程度高，易早期转移。因此，这个选项是错误的。
- D. 腺癌：腺癌是子宫内膜癌的最常见类型，与子宫内膜增生和雌激素长期持续作用有关。因此，这个选项是错误的。
- E. 浆液性癌：浆液性癌占 1%~9%，恶性程度高，易有深层浸润和腹腔播散，以及淋巴结及远处转移，预后差。因此，这个选项是错误的。

60. 【答案】D

【解析】

- A. 中立性原则：心理治疗时所遵循的原则之一，要求治疗师对待所有客户都保持公正、公平的态度，不受任何因

素影响。在这个问题中，中立性原则并不适用，因为我们需要考虑到个体的特定情况（如教育背景和健康状况），而不是仅仅依赖于智商测试的结果。

B. 保密性原则：心理测验的一条伦理道德标准，要求测验内容、答案及记分方法只有作此项工作的有关人员才能掌握，不能随意扩散，也不能在出版物上公开发表。但在这个问题中，保密性原则并不涉及。

C. 标准化原则：指测量应采用公认的标准化的工具，施测方法要严格根据测验指导手册的规定执行。这是提高测验结果的信度和效度的可靠保证。但在这个问题中，标准化原则并不是决定两个人智力状态的关键因素。

D. 客观性原则：对结果的解释要符合受试者的实际情况。在这个问题中，我们看到大学教授和未接受过正规教育的老人得到相同的智商测试结果。由于他们的教育背景和健康状况不同，我们不能简单地将智商分数作为衡量他们智力的唯一标准。因此，客观性原则是正确答案。

E. 综合性原则：并不属于心理测验的原则，所以这个选项是错误的。

61. 【答案】B

【解析】

选项 A：缓解。这是一个可以作为观察结局的选项，因为缓解是衡量药物治疗效果的重要指标。

选项 B：复发。这是题目的正确答案，因为复发不适合作为观察结局。复发是指疾病在一段时间内再次出现，但是无法准确判断是否由于药物治疗导致。

选项 C：车祸死亡。这是一个不适合作为观察结局的选项，因为车祸死亡与药物治疗效果无关。

选项 D：失访。这也是一个不适合作为观察结局的选项，因为失访是指研究对象在研究过程中丢失，无法获取其后续信息。

选项 E：自行出组。这也是一个不适合作为观察结局的选项，因为自行出组是指研究对象主动退出研究，无法获取其后续信息。

62. 【答案】A

【解析】

A. 支链氨基酸治疗肝性脑病的机理是通过竞争性抑制芳香族氨基酸进入大脑，减少假性神经递质的形成，因此是正确答案。

B. 羟基化合物是药物代谢过程中的一种产物，不能作为肝性脑病的治疗药物，所以选项错误。

C. 芳香氨基酸在肝性脑病中并没有治疗效果，反而可能增加假性神经递质的形成，所以选项错误。

D. 抗生素主要用于对抗微生物感染，并不能直接治疗肝性脑病，所以选项错误。

E. 碱性肥皂水灌肠会改变肠道内的 PH 值，导致氨的吸收增加，加重肝性脑病的病情，所以选项错误。

63. 【答案】A

【解析】

A. 效果指数：正确。在评价乙肝疫苗的流行病学预防效果时，效果指数是最佳指标。效果指数=对照组发病率/接种组发病率。

B. 发病率：错误。发病率只是表示在一定期间内特定人群中某病新发病例出现的频率，不能直接反映疫苗的预防



效果。

C. 感染率：错误。感染率表示在某个时间内被检查的人群中，某病现有感染者人数所占的比例，不能直接反映疫苗的预防效果。

D. 死亡率：错误。死亡率指在一定期间内，某人群中死于某病的频率，不能直接反映疫苗的预防效果。

E. 病死率：错误。病死率表示一定时期内，患某病的全部患者中因该病死亡者所占的比例，不能直接反映疫苗的预防效果。

64. 【答案】D

【解析】

选项 A：单克隆 B 细胞是指经过特定抗原刺激后，某一特定的 B 细胞克隆扩增，产生的抗体类型单一，对应的是单克隆抗体，但破伤风抗毒素的来源并非单克隆 B 细胞。

选项 B：单克隆 T 细胞是指经过特定抗原刺激后，某一特定的 T 细胞克隆扩增，但它们主要负责细胞免疫反应，与此题无关。

选项 C：NK 细胞是自然杀伤细胞，主要负责清除体内的肿瘤细胞和病毒感染细胞，并不参与抗体的生成。

选项 D：多克隆 B 细胞是指同时有多种 B 细胞克隆被激活，每个克隆分泌不同特异性的抗体，形成的是多克隆抗体。破伤风抗毒素就是由这些多克隆 B 细胞产生的。

选项 E：多克隆 T 细胞是指同时有多种 T 细胞克隆被激活，但它们主要负责细胞免疫反应，与此题无关。

65. 【答案】C

【解析】

A. 体重指数：体重指数（BMI）是反映人体肥胖程度和是否健康的一个指标，与运动强度无直接关系，但可以间接反映运动的效果。

B. 运动中的主观运动强度：主观运动强度是个体对自己在运动中身体感受的主观评价，是反应运动相对强度的一个重要指标。

C. 运动的代谢当量：代谢当量（MET）是衡量运动强度的一个常用指标，但它是绝对强度的表现，不是相对强度的表现，所以这是正确答案。

D. 运动的持续时间：运动的持续时间可以反映运动的相对强度，因为强度越大，持续时间通常越短。

E. 运动的绝对强度：运动的绝对强度是衡量运动负荷的一个重要指标，但它并不能准确反映出运动的相对强度。

66. 【答案】A

【解析】

A. 异柠檬酸脱氢酶：正确。在三羧酸循环中，异柠檬酸脱氢酶催化柠檬酸氧化脱羧转变为  $\alpha$ -酮戊二酸，这是一个限速步骤，因此它是关键酶。

B. 丙酮酸激酶：错误。丙酮酸激酶催化糖酵解的最后一步，生成丙酮酸，不属于三羧酸循环中的关键酶。

C. 6-磷酸葡萄糖激酶：错误。6-磷酸葡萄糖激酶是糖异生中葡萄糖-6-磷酸水解为葡萄糖的催化酶，与三羧酸循环没有直接关系。

- D. 琥珀酸脱氢酶：错误。琥珀酸脱氢酶虽然是三羧酸循环中的催化酶，但其催化的是可逆反应，不属于关键酶。
- E. 苹果酸脱氢酶：错误。苹果酸脱氢酶也是三羧酸循环中的催化酶，但其催化的是可逆反应，不属于关键酶。

67. 【答案】E

【解析】

- A. 内基小体：这是嗜酸性包涵体，可以用来诊断狂犬病。与衣原体的繁殖形式无关，所以 A 选项错误。
- B. 中介体：这是细菌部分细胞膜内陷、折叠、卷曲形成的囊状物，参与细菌的分裂。但不是衣原体的繁殖形式，所以 B 选项错误。
- C. 二十面体：常见于病毒的立体结构，与衣原体的繁殖形式无关，所以 C 选项错误。
- D. 原体：衣原体的一种形态，具有强感染性，在宿主细胞外较为稳定，但无繁殖能力，所以 D 选项错误。
- E. 始体：也称网状体，是衣原体在宿主细胞内通过二分裂方式繁殖的形态，因此 E 选项正确。

68. 【答案】C

【解析】

- A. 粘连：主动脉瓣粘连通常见于感染性心内膜炎，但患者没有相关症状，故排除。
- B. 钙化：主动脉瓣钙化多见于老年人，但临床表现与此患者不符，故排除。
- C. 增厚：风湿性心脏病形成的瘢痕和收缩可使瓣叶增厚，增厚扩张随之引起瓣环扩大互相之间无法闭合，左心室在收缩期向主动脉排出血液，在舒张期反向流入左心室。此选项符合患者的临床表现。
- D. 卷曲：主动脉瓣卷曲多见于先天性心脏病，与此患者的临床表现不符，故排除。
- E. 变硬：主动脉瓣变硬多见于动脉硬化病变，但患者的临床表现更符合风湿性心脏病，故排除。

69. 【答案】A

【解析】

选项 A：体检。体检是二级预防的一种方式，通过早期发现，早期诊断进行适当的治疗，来防止疾病临床前期或临床初期的变化。正确答案。

选项 B：预防并发症。预防并发症更多的是在疾病已经发生后的管理，属于三级预防范畴，因此不正确。

选项 C：术后护理。术后护理主要是为了防止手术后的并发症，也属于三级预防范畴，因此不正确。

选项 D：术后康复锻炼。术后康复锻炼主要是为了恢复身体功能，属于三级预防范畴，因此不正确。

选项 E：开展健康教育工作。开展健康教育工作主要是为了提高人们的健康意识，防止疾病的发生，属于一级预防范畴，因此不正确。

70. 【答案】D

【解析】

- A. 乙酰化修饰：这是一种蛋白质翻译后的加工修饰步骤，与 mRNA 的加工无关，所以选项 A 错误。
- B. 磷酸化修饰：这也是一种蛋白质翻译后的加工修饰步骤，与 mRNA 的加工无关，所以选项 B 错误。
- C. 高尔基体糖基化修饰：这是一种糖蛋白分子的修饰步骤，在高尔基体中进行，与 mRNA 的加工无关，所以选项 C 错误。

D. 内含子剪切：这是真核生物前体 mRNA 转录后的一个重要加工步骤，对应题干内容，所以选项 D 正确。

E. 在内质网折叠：这是蛋白质在内质网中进行的一种加工修饰步骤，与 mRNA 的加工无关，所以选项 E 错误。

71. 【答案】E

【解析】

选项 A：医源性感染不是肉毒梭菌或肉毒毒素的主要侵入途径。医源性感染通常涉及的微生物有铜绿假单胞菌、葡萄球菌、变形杆菌、绿脓杆菌等，而非肉毒梭菌。

选项 B：经被污染的空气吸入也不是肉毒梭菌或肉毒毒素的主要侵入途径。这种方式通常与流感病毒、疱疹病毒等病原体的传播有关。

选项 C：经伤口入侵也不是肉毒梭菌或肉毒毒素的主要侵入途径。这种方式常见于破伤风杆菌、艾滋病毒等病原体的入侵。

选项 D：节肢动物叮咬也不是肉毒梭菌或肉毒毒素的主要侵入途径。这种方式常见于鼠疫、疟疾、丝虫病等疾病的传播。

选项 E：污染的食物是肉毒梭菌或肉毒毒素的主要侵入途径。人们食用了含有肉毒梭菌或肉毒毒素的变质肉类、豆制品或罐头等食物，可能会引起肉毒中毒。

72. 【答案】C

【解析】

A. 生物医学模式：这种模式主要关注疾病的生物学原因，如细菌、病毒等。希波克拉底的观点“一是语言，二是药物”并不符合此模式，因为他强调的不仅仅是药物治疗，还包括语言的影响。

B. 生物-心理-社会医学模式：这种模式强调生物、心理和社会因素在疾病发生和治疗中的作用。尽管希波克拉底的观点包含了语言（心理）和药物（生物）两方面，但他的观点产生的时代早于这一模式的形成。

C. 自然哲学医学模式：这种模式认为人体是自然界的一部分，强调与自然的和谐共生。希波克拉底的“四体液”学说和“一是语言，二是药物”的治疗观都反映了这一模式的特点。因此，此选项正确。

D. 神灵医学模式：这种模式认为疾病是由神灵造成的，治疗方法主要是祈祷和仪式。希波克拉底的观点与此模式不符。

E. 机械医学模式：这种模式将人体视为一个机械系统，疾病是由于某个部分的故障引起的。希波克拉底的观点与此模式不符。

73. 【答案】D

【解析】

A. 左侧面神经核受损：错误。患者表现为口角歪向右侧，左侧鼻唇沟消失，这些症状都是右侧面部肌肉无法正常工作的结果，而不是左侧。

B. 右侧面神经核受损：错误。如果右侧面神经核受损，应该会导致右侧面部肌肉无法正常工作，但患者的症状是左侧面部肌肉无法正常工作。

C. 左侧面神经核上瘫：错误。这个选项和 A 一样，都是错误的理解。面神经核上瘫会导致对侧的面部肌肉无法正

常工作，但患者的症状是左侧面部肌肉无法正常工作。

D. 右侧面神经核上瘫：正确。患者的症状是左侧面部肌肉无法正常工作，这是因为右侧面神经核上部受损，导致对侧的面部肌肉无法正常工作。

E. 左侧面神经受损：错误。如果左侧面神经受损，应该会导致左侧面部肌肉无法正常工作，但患者的症状是左侧面部肌肉无法正常工作。

74. 【答案】B

【解析】

选项 A：脂肪的特殊动力效应约为 4%，低于蛋白质，所以选项 A 错误。

选项 B：蛋白质的特殊动力效应最高，约为 30%，所以选项 B 正确。

选项 C：糖类的特殊动力效应约为 6%，低于蛋白质，所以选项 C 错误。

选项 D：维生素在人体中主要起到调节机体新陈代谢和增强机体免疫功能的作用，并不直接参与能量供应，所以选项 D 错误。

选项 E：氨基酸是蛋白质的组成部分，但其本身的特殊动力效应并没有超过蛋白质，所以选项 E 错误。

75. 【答案】C

【解析】

A. 互相信任：虽然互相信任在心理治疗中很重要，但它并不是心理治疗中医生和患者的桥梁，而是良好医患关系的一部分。

B. 医疗技术：医疗技术在心理治疗中起着一定的作用，但它不能建立医生和患者之间的联系，因此不是桥梁。

C. 医生与患者的良好关系：这是正确答案。在心理治疗中，医生与患者的良好关系才是真正的桥梁，可以帮助患者更好地接受治疗。

D. 医生的医疗水平：医生的医疗水平对治疗效果有影响，但它不能建立医生和患者之间的联系，因此不是桥梁。

E. 互相尊重：互相尊重也是良好医患关系的一部分，但它本身并不是医生和患者的桥梁。

76. 【答案】C

【解析】

A. 配对设计的 Z 检验：Z 检验通常用于大样本（即样本容量大于 30）的平均值差异性检验，因此这个选项不适用于本题的场景。

B. 成组设计的 t 检验：这种检验方法用于比较两个独立样本的均数是否有显著差异，但在本题中，我们的样本并非独立，而是配对的，因此这个选项也不适用。

C. 配对设计的 t 检验：配对 t 检验用于比较两个相关样本的均数是否有显著差异，适用于本题的场景。因此，这是正确答案。

D. 成组设计的 Z 检验：与选项 A 一样，Z 检验通常用于大样本的平均值差异性检验，因此这个选项也不适用于本题的场景。

E. q 检验：q 检验主要用于对可疑值（异常值）进行取舍判断，与本题的场景不符，因此这个选项错误。

## 77. 【答案】A

## 【解析】

- A. 健康促进活动：根据题干中的“某大学实行戒烟活动，开展戒烟班，规定吸烟者不可领奖学金，不得参与学生会”，这是一种组织性的行动，通过设立规定来改变人们的态度和环境，以提高人们的健康水平，因此属于健康促进活动。因此，选项 A 是正确的。
- B. 行为相关活动：虽然题干中的活动与吸烟行为有关，但该活动的主要目标是改善环境和人们的态度，而不仅仅是改变行为，所以选项 B 不准确。
- C. 健康引导活动：虽然该活动对吸烟者进行了一定的引导，但其核心不仅仅是引导，而是通过有组织的行动来改变环境和态度，所以选项 C 不准确。
- D. 健康咨询活动：健康咨询通常在临床场所进行，帮助个体和家庭改变不良行为，而本题中的活动是在校园中进行的，所以选项 D 不准确。
- E. 卫生指导行为：卫生指导行为通常是指导个体如何维护个人卫生，而本题中的活动是通过有组织的行动来改变环境和态度，所以选项 E 不准确。

## 78. 【答案】A

## 【解析】

- A. 大肠埃希菌：该选项是正确答案。根据题干中的描述，患者的脓液培养为革兰阴性杆菌，吲哚试验及乳糖发酵式样均阳性，这些都是大肠埃希菌的特征。
- B. 痢疾杆菌：虽然痢疾杆菌也是革兰阴性杆菌，但它不能进行乳糖发酵，所以此选项不正确。
- C. 志贺氏菌：志贺氏菌也是革兰阴性杆菌，但它不能进行乳糖发酵，且通常引起腹泻，而非肝脓肿，所以此选项不正确。
- D. 沙门菌属：沙门菌属也是革兰阴性杆菌，但它不能进行乳糖发酵，且通常引起胃肠道疾病，而非肝脓肿，所以此选项不正确。
- E. 脆弱拟杆菌：脆弱拟杆菌是革兰阴性杆菌，但它不能进行乳糖发酵，且主要感染免疫功能低下的人群，所以此选项不正确。

## 79. 【答案】D

## 【解析】

- A. 积极对传染病进行防治：此选项考察的是医生在面对传染病时应有的态度和行动，但在这个案例中，主管医生的行为并没有涉及到这一点。
- B. 尊重科学，无私奉献：此选项考察的是医生的职业精神和态度，但在这个案例中，主管医生的行为并没有体现出尊重科学和无私奉献的精神。
- C. 进行宣传教育：此选项考察的是医生在面对传染病时，是否有进行宣传教育的责任，但在这个案例中，主管医生的行为并没有涉及到这一点。
- D. 保密和隐私原则：此选项是正确答案。在这个案例中，主管医生在公共场合询问患者是否有冶游史，违反了保密和隐私原则。



密和隐私原则。

E. 对传染病进行上报和登记：此选项考察的是医生在面对传染病时，是否有上报和登记的责任，但在这个案例中，主管医生的行为并没有涉及到这一点。

80. 【答案】E

【解析】

A. 未变更执业地点：虽然心理治疗师在新的咨询所工作，但题目没有明确指出其是否已变更执业地点，所以无法确定。

B. 擅自予以心理咨询：题目中并未提到心理治疗师擅自给出心理咨询，所以此选项不正确。

C. 未征得原单位同意：题目没有提到心理治疗师是否征得原单位的同意，所以此选项也不准确。

D. 未给予行政部门备案：题目没有提到关于备案的信息，所以此选项不正确。

E. 注册地点之外的机构开展医疗活动：根据《执业医师法》的规定，医师只能在注册的执业地点、执业类别、执业范围内进行执业，所以此选项是正确的。

81. 【答案】E

【解析】

A. 抗利尿激素增多：由于心衰导致有效循环血量不足，体内会通过增加抗利尿激素的分泌来减少尿液的排泄，以保持血容量，因此选项 A 错误。

B. 醛固酮增多：同样是由于心衰导致有效循环血量不足，体内会通过增加醛固酮的分泌来增加钠的重吸收，进而带动水的重吸收，因此选项 B 错误。

C. 肾小球滤过率下降：在心衰的情况下，由于肾血流量减少，肾小球的滤过率也会下降，这会导致尿液生成减少，因此选项 C 错误。

D. 肾血流量减少：心衰会导致全身循环血量减少，肾血流量也会随之减少，这会导致尿液生成减少，因此选项 D 错误。

E. 肾小球滤过分数减小：肾小球滤过分数=肾小球滤过率/肾血浆流量，当肾血浆流量下降时，肾小球滤过分数会增加，而不是减少，因此选项 E 正确。

82. 【答案】A

【解析】

选项 A：胃酸-正确。这个病例的症状符合十二指肠溃疡的典型表现，其发病机制是胃酸和胃蛋白酶对胃黏膜的侵袭作用与黏膜屏障的防御能力失去平衡。因此，胃酸是影响该病的主要因素。

选项 B：胃蛋白酶原-错误。虽然胃蛋白酶原在十二指肠溃疡的发病机制中起到一定的作用，但它本身并不是影响病症的主要因素。

选项 C：组胺-错误。组胺主要参与过敏反应和炎症反应，但对于十二指肠溃疡的发病机制影响不大。

选项 D：粘液-错误。粘液可以保护胃黏膜，防止胃酸和胃蛋白酶的侵袭，但它并不是影响该病症的主要因素。

选项 E：促胃液素-错误。促胃液素可以刺激胃酸的分泌，但它并不是影响该病症的主要因素。

## 83. 【答案】D

## 【解析】

- 选项 A: 伦理。此选项过于宽泛, 虽然医生违反了伦理, 但没有具体指出是哪一种伦理被违反, 所以此选项不正确。
- 选项 B: 患者利益至上原则。此选项描述的是医生在治疗过程中应始终将患者的利益放在第一位, 但题目描述的情况并未明显违反此原则, 所以此选项不正确。
- 选项 C: 尊重原则。尊重原则主要体现在尊重患者的知情同意权、尊重患者的决定权。虽然医生告诉患者的同伴患者的病情, 但并未明显违反尊重原则, 所以此选项不正确。
- 选项 D: 保密原则。心理咨询师在进行心理治疗时, 需要遵守的一个重要原则就是保密性原则。在本题中, 心理咨询师将患者的病情告诉了他的同伴, 导致患者的隐私被暴露, 严重违反了保密性原则, 所以此选项是正确的。
- 选项 E: 综合性原则。此选项并未明确指出具体哪个原则被违反, 所以此选项不正确。

## 84. 【答案】E

## 【解析】

- A. 尊重原则与公正原则: 尊重原则是指医生应尊重患者的自主权, 公正原则要求医务人员合理分配和实现人们的医疗和健康利益。在这个案例中, 首诊医师有尊重患者的自主权, 但没有涉及到公正原则的应用, 所以选项 A 不正确。
- B. 保护原则与有利原则: 保护原则是指医生应该保护患者的利益, 避免患者受到伤害。有利原则是指医生应该优先考虑患者的利益。在这个案例中, 首诊医师建议手术是出于有利原则, 但患者拒绝手术, 医生并没有违反保护原则, 因为他尊重了患者的决定, 所以选项 B 也不正确。
- C. 公正原则与有利原则: 公正原则要求医务人员合理分配和实现人们的医疗和健康利益, 有利原则是指医生应该优先考虑患者的利益。在这个案例中, 首诊医师有遵循有利原则, 但没有涉及到公正原则的应用, 所以选项 C 不正确。
- D. 尊重原则与自保原则: 尊重原则是指医生应尊重患者的自主权, 自保原则是指医生需要保护自身的权益。在这个案例中, 首诊医师有尊重患者的自主权, 但并没有涉及到自保原则的应用, 所以选项 D 不正确。
- E. 有利原则与尊重原则: 有利原则是指医生应该优先考虑患者的利益, 尊重原则是指医生应尊重患者的自主权。在这个案例中, 首诊医师既建议手术遵循了有利原则, 又尊重了患者拒绝手术的决定, 体现了有利原则和尊重原则的冲突, 所以选项 E 是正确的。

## 85. 【答案】B

## 【解析】

- A. P25: P25 不是确定乳腺癌靶向治疗方案的标志物, 故此选项错误。
- B. HER-2: HER-2 是乳腺癌靶向治疗的关键标志物, HER-2 阳性表达的乳腺癌患者可进行特殊的靶向治疗。因此, 此选项正确。
- C. ER: ER 是雌激素受体, 虽然其在乳腺癌的发生发展中起着重要作用, 但它并非确定靶向治疗方案的关键标志物, 故此选项错误。



D. Ki-67: Ki-67 是一种细胞增殖的标志物, 它可以反映肿瘤的生长速度, 但并非确定靶向治疗方案的关键标志物, 故此选项错误。

E. PR: PR 是孕激素受体, 虽然其在乳腺癌的发生发展中起着重要作用, 但它并非确定靶向治疗方案的关键标志物, 故此选项错误。

86. 【答案】B

【解析】

A. 标准差: 这是一种衡量数据离散程度的指标, 但因为它与原始数据的量纲相同, 在两组数据的均数相差较大时, 不适合用标准差来比较两个样本的变异程度。所以此选项错误。

B. 变异系数: 变异系数是标准差除以均数的结果, 它可以消除数据量纲和规模的影响, 适合用于比较两组均数相差较大的数据的离散趋势。所以此选项正确。

C. 四分位数间距: 这是一种稳定的统计指标, 用于描述数据的离散程度, 但在本题中, 新生儿和 6 岁儿童的身高数据并没有给出具体的分布情况, 无法计算四分位数间距。所以此选项错误。

D. 极差: 极差是观测值中最大值和最小值之差, 用于表示数据的变异程度。但在本题中, 只给出了均值和标准差, 并未给出最大值和最小值, 无法计算极差。所以此选项错误。

E. 离均差平方和: 它描述了每个观测值相对于平均水平的离散程度。但在本题中, 只给出了均值和标准差, 并未给出每个观测值, 无法计算离均差平方和。所以此选项错误。

87. 【答案】A

【解析】

选项 A: 伦理审查。根据题干描述, 研究组在一名受试者感染黄热病死亡后, 并未向伦理委员会上报, 而是继续招募受试者进行试验。这明显违反了接受监督原则, 即接受伦理审查。因此, 选项 A 是正确答案。

选项 B: 依法赔偿。题干并未提及研究组是否给予受试者或其家属应有的赔偿, 因此, 我们无从判断研究组是否违反了依法赔偿的原则。所以, 选项 B 不正确。

选项 C: 免费赔偿。同样, 题干中并未提及赔偿相关的内容, 因此, 选项 C 也不正确。

选项 D: 控制风险。虽然研究组在实验过程中确实没有有效地控制风险, 但这并不是题目主要考察的伦理原则。所以, 选项 D 也不正确。

选项 E: 特殊保护。题干中并未提及研究组是否对受试者进行了特殊保护, 因此, 我们无法判断研究组是否违反了特殊保护的原则。所以, 选项 E 也不正确。

88. 【答案】E

【解析】

选项 A: 按压人中, 是一种常用的中医穴位按压方法, 可以帮助缓解头痛、头晕等症状, 但对于本题的场景(中暑)来说, 这并非首要救助措施。

选项 B: 灌注清凉饮料, 可以帮助补充流失的水分, 降低体温, 但也不是首要的救助措施。

选项 C: 酒精擦浴, 可以帮助降低体表温度, 但对于已经中暑的情况, 这也不是首要的救助措施。

选项 D: 静脉注射氯丙嗪, 主要用于处理迅速降温后出现的寒战症状, 但在本题的场景中, 不适用。

选项 E: 脱离工作环境, 是对于中暑的首要救助措施, 因为中暑的主要原因是长时间处于高温环境, 脱离高热环境是最直接有效的救助方式。

89. 【答案】E

【解析】

选项 A: WISC 是韦氏儿童智力量表, 主要用于测评儿童的智力水平, 与本题抑郁症状的诊断无关, 故不正确。

选项 B: EPQ 是艾森克人格问卷, 主要用于测评个体的人格特质, 与本题抑郁症状的诊断无关, 故不正确。

选项 C: MMPI 是明尼苏达多项人格测验, 主要用于测评人格障碍, 与本题抑郁症状的诊断无关, 故不正确。

选项 D: 16-PF 是卡特尔 16 种人格因素测验, 主要用于测评个体的人格特质, 与本题抑郁症状的诊断无关, 故不正确。

选项 E: SDS 是抑郁自评量表, 常用于评定个体的抑郁症状程度, 与本题描述的情况相符, 故正确。

90. 【答案】C

【解析】

A. 前斜角肌: 错误。前斜角肌的主要功能是控制颈部同侧屈曲和对侧旋转, 但题干中的症状并非此肌肉的功能异常所致。

B. 后斜角肌: 错误。后斜角肌也主要控制颈部同侧屈曲和对侧旋转, 同样与题干描述的症状不符。

C. 胸锁乳突肌: 正确。胸锁乳突肌的功能是使头部向同侧倾斜和面面向对侧旋转, 与题干描述的症状相符。

D. 颈阔肌: 错误。颈阔肌的功能是使口部向下伸展, 与题干描述的症状不符。

E. 斜方肌: 错误。斜方肌主要控制肩胛骨的运动, 与题干描述的症状无关。

91. 【答案】A

【解析】

选项 A: NADPH, 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶的主要功能是催化  $\text{NADP}^+$  还原为 NADPH, 因此, 该酶缺乏会导致 NADPH 生成减少。正确答案。

选项 B: ATP, 虽然与能量代谢有关, 但并非由葡萄糖-6-磷酸脱氢酶直接生成, 因此, 该选项错误。

选项 C: cAMP, 是一种重要的细胞内信号分子, 与葡萄糖-6-磷酸脱氢酶无直接关系, 因此, 该选项错误。

选项 D: NADP, 是葡萄糖-6-磷酸脱氢酶的底物, 该酶缺乏并不影响 NADP 的生成, 因此, 该选项错误。

选项 E: FAD, 是一种重要的辅酶, 与葡萄糖-6-磷酸脱氢酶无直接关系, 因此, 该选项错误。

92. 【答案】A

【解析】

A. 单核巨噬细胞吞噬: 在这种情况下, 单核巨噬细胞吞噬并不是主要机制。因此, 这是正确答案。

B. 血小板大量损耗: 在胎盘早剥的情况下, 血液在底蜕膜和胎盘之间形成血肿, 会导致血小板的大量消耗。

C. 纤维蛋白溶解产物增加: 由于胎盘早剥, 大量组织凝血活酶从剥离处的胎盘绒毛和蜕膜中释放进入母体血液循环, 激活纤维蛋白溶解系统, 产生大量的纤维蛋白原降解产物 (FDP), 引起继发性纤溶亢进。

D. 纤维蛋白原溶解增加：由于胎盘早剥，大量组织凝血活酶从剥离处的胎盘绒毛和蜕膜中释放进入母体血液循环，激活纤维蛋白溶解系统，增加纤维蛋白原的溶解。

E. 凝血因子消耗：在胎盘早剥的情况下，大量凝血因子被消耗，最终导致凝血功能障碍。

93. 【答案】C

【解析】

A. 0.2：该选项可能误把肠道传染病的发病率 20%当作是全体工人的患病率。

B. 0.05：该选项没有明显的解析依据，可能是随机设定的干扰选项。

C. 0.1：正确答案，根据题目中给出的各类传染病的发病率计算得出。

D. 0.26：该选项可能误把所有传染病的发病率相加（ $20\%+10\%+2\%=32\%$ ），未考虑到工地人数的总和。

E. 0.9：该选项没有明显的解析依据，可能是随机设定的干扰选项。

94. 【答案】A

【解析】

A. 电话心理咨询：正确答案。对于有自杀念头的人，应立即进行电话心理咨询，这是一种迅速、随时可用的危机干预方式。

B. 门诊心理咨询：虽然门诊心理咨询也是一种有效的心理援助方式，但在紧急情况下，可能无法及时到达门诊进行咨询。

C. 社会心理咨询：社会心理咨询通常不适用于紧急情况，而且可能无法提供针对性的帮助。

D. 团体咨询：团体咨询可能需要更多的时间和准备，不适合紧急情况。

E. 面对面心理咨询：面对面心理咨询虽然可以提供直接的帮助，但在紧急情况下，可能无法及时实施。

95. 【答案】E

【解析】

选项 A：省级医疗管理部门，这个选项错误，因为在接种合格疫苗后出现异常反应的赔偿不由医疗管理部门负责。

选项 B：为其接种的工作人员，这个选项错误，因为工作人员只是执行接种任务，并不承担赔偿责任。

选项 C：为其接种的机构，这个选项错误，因为虽然是接种机构执行了接种，但赔偿责任并不在接种机构。

选项 D：疫苗上市许可持有人，这个选项错误，因为疫苗质量合格，接种过程符合规范，疫苗上市许可持有人并没有过错。

选项 E：省级财政部门，这个选项正确，因为根据相关规定，预防接种异常反应的一次性补偿费用由省、自治区、直辖市人民政府财政部门在预防接种工作经费中安排。

96. 【答案】B

【解析】

选项 A：分层抽样，这个选项错误，因为分层抽样是在抽样之前，先将总体按对研究指标影响较大的一定特征（如性别、年龄等）分成若干次级总体或层，然后在每层内分别进行抽样。在本题中，并没有提到这种分层操作。

选项 B：系统抽样，这个选项正确。系统抽样是随机确定起始点，然后按照设定的间隔进行抽样。在本题中，第一

户被随机抽取，然后每隔 4 户抽取 1 户，符合系统抽样的定义。

选项 C：整群抽样，这个选项错误。整群抽样是先将总体按照某种与主要研究指标无关的特征划分为若干“群”，然后再随机抽取若干“群”。在本题中，没有涉及到以群为单位进行抽样。

选项 D：简单抽样，这个选项错误。简单抽样是在总体中以完全随机的方法抽取部分观察单位组成样本，即总体中每一个观察单位都有同等的机会被抽到样本中。在本题中，抽样并非完全随机，而是按照一定的规则进行。

选项 E：多级抽样，这个选项错误。多级抽样是指在抽取样本时，分为两个及两个以上的阶段从总体中抽取样本的一种抽样调查方法。在本题中，抽样过程并没有分为多个阶段进行。

97. 【答案】A

【解析】

A. 需联合药物治疗：正确。幽门螺杆菌感染的治疗主要以秘剂或 PPI 为基础，联合抗生素治疗。

B. 革兰染色阳性：错误。幽门螺杆菌是革兰阴性菌。

C. 营养要求不高：错误。幽门螺杆菌是一种营养要求高的微需氧菌。

D. 厌氧菌：错误。幽门螺杆菌是微需氧菌，而非厌氧菌。

E. 生化反应活跃：错误。幽门螺杆菌的生化反应不活泼，不能分解糖类。

98. 【答案】D

【解析】

A. 2：这是组间变异自由度的计算结果，不是组内变异自由度，所以选项 A 错误。

B. 3：这是实验组数，不是任何变异自由度的计算结果，所以选项 B 错误。

C. 29：这是总变异自由度的计算结果，不是组内变异自由度，所以选项 C 错误。

D. 27：这是根据组内变异自由度的计算公式  $n-k$  得出的结果，其中  $n$  为总样本数， $k$  为组数。所以选项 D 正确。

E. 26：此选项既不是组间变异自由度也不是组内变异自由度的计算结果，所以选项 E 错误。

99. 【答案】B

【解析】

A. 阴道毛滴虫：阴道毛滴虫是滴虫阴道炎的病原菌，主要表现为阴道分泌物稀薄、发黄、有异味，外阴瘙痒。本题中病人的症状是尿频尿痛和尿道口大量脓性分泌物，并无阴道分泌物等症状，所以选项 A 错误。

B. 淋病奈瑟氏菌：淋病奈瑟氏菌是淋病的病原菌，症状包括尿频尿痛，尿道口有脓性分泌物，龟头和阴茎红肿。这与病人的症状相符，所以选项 B 正确。

C. 白假丝酵母：白假丝酵母菌是外阴阴道假丝酵母菌病的病原菌，临床表现为阴道分泌物白色稠厚，呈凝乳状或豆腐渣样。本题病人的症状并不符合，所以选项 C 错误。

D. 梅毒螺旋体：梅毒螺旋体是梅毒的病原菌，主要表现为硬下疳、梅毒疹、树胶肿等。本题病人的症状并不符合，所以选项 D 错误。

E. 人类支原体：人类支原体是非淋性尿道炎的主要病原体，但其症状一般较轻，尿道口分泌物较少，不像本题病人尿道口有大量脓性分泌物，所以选项 E 错误。



## 100. 【答案】C

## 【解析】

选项 A: 氰苷中毒常见于食用苦杏仁、桃仁等食物时,中毒时口苦流涎,头晕头痛、恶心呕吐、心悸乏力重者胸闷、呼吸困难、昏迷全身阵发性痉挛甚至死亡。本题中没有提到相关食物,所以排除。

选项 B: 龙葵素中毒常见于食用发芽马铃薯后中毒,潜伏期 1~12 小时,咽部瘙痒或烧灼感,胃部烧灼样疼痛,急性胃肠炎症状,头晕耳鸣、瞳孔散大。本题中没有提到相关食物,所以排除。

选项 C: 组胺中毒,青皮红肉鱼中富含丰富的组氨酸,当鱼体不新鲜或腐败、同时又受到富含组氨酸脱羧酶的细菌污染时,鱼肉中的游离组氨酸脱羧基而形成组胺,组胺是一种生物胺,可导致支气管平滑肌强烈收缩,引起支气管痉挛;循环系统表现为局部或全身的毛细血管扩张,患者出现低血压,心律失常,甚至心脏骤停。潜伏期 10 分钟~2 小时,面部、胸部或全身皮肤潮红,眼结膜充血,头晕头痛、心慌胸闷、呼吸加快。部分患者出现口唇肿或口舌、四肢发麻,以及恶心、呕吐、腹痛、腹泻、荨麻疹等。符合题干描述,故为正确答案。

选项 D: 亚硝酸盐中毒常见于食用腌制食品后,临床表现为肠源性青紫、同时伴有头晕、头痛、乏力、胸闷等症状。本题中没有提到相关食物,所以排除。

选项 E: 组氨酸在正常情况下无毒,但在特定条件下可以转化为组胺,导致中毒。本题中的情况是组氨酸已经转化为组胺,所以这个选项不正确。

## 101. 【答案】D

## 【解析】

选项 A 主治医生可自行摘取患者器官。这个选项错误,根据《人体器官移植条例》规定,无论任何情况下,主治医生都不能自行摘取患者的器官。

选项 B 脑死亡患者不能捐献器官。这个选项错误,脑死亡患者在法律上被认为是死亡,他们的器官在得到合法授权后可以被用于移植。

选项 C 未婚患者不能捐献器官。这个选项错误,婚姻状况并不影响一个人能否捐献器官,只要满足法律规定的条件,任何人都可以捐献器官。

选项 D 外甥无权捐献该患者器官。这个选项正确,根据《人体器官移植条例》规定,只有配偶、成年子女、父母可以以书面形式共同表示同意捐献该公民人体器官的意愿,外甥并不在这个范围内。

选项 E 器官捐献需经患者本人同意。这个选项错误,如果患者生前未表示不同意捐献其人体器官,那么在患者死亡后,其配偶、成年子女、父母可以以书面形式共同表示同意捐献该公民人体器官的意愿。

## 102. 【答案】C

## 【解析】

选项 A: 2 小时,不正确。《医疗事故处理条例》规定,因抢救急危患者,未能及时书写病历的,有关医务人员应当在抢救结束后 6 个小时内据实补记,并加以注明。

选项 B: 4 小时,不正确。同理,规定时限为 6 小时。

选项 C: 6 小时,正确。符合《医疗事故处理条例》的规定。

选项 D: 8 小时, 不正确。超出了规定的 6 小时时限。

选项 E: 12 小时, 不正确。同样超出了规定的 6 小时时限。

103. 【答案】B

【解析】

选项 A: 心源性休克, 不正确。心源性休克是由于心脏功能低下, 泵血不足导致各组织器官灌注减少引发的休克, 患儿常有相应的心脏疾病表现, 本题中并未提及此类症状。

选项 B: 感染性休克, 正确。患儿发热烦躁, 体温  $38.7^{\circ}\text{C}$ , 白细胞  $19 \times 10^9/\text{L}$ , 四肢皮温低, 可见大理石纹, X 线左下肺片状影, 最可能的诊断为肺炎导致的感染性休克。

选项 C: 神经源性休克, 不正确。神经源性休克是动脉阻力调节功能严重障碍, 血管张力丧失, 引起血管扩张, 导致周围血管阻力降低, 有效血容量减少性休克, 本题中并未提及此类症状。

选项 D: 低血容量性休克, 不正确。低血容量性休克常因大量出血或体液丢失, 或液体积存于第三间隙, 导致有效循环量降低引起, 本题中并未提及是否有体液丢失。

选项 E: 过敏性休克, 不正确。过敏性休克是一种强烈的全身性变态反应综合征, 属于 I 型变态反应, 常发生在已经存在过敏反应的群体身上, 是常见的一种急性病症, 可表现极短时间内突然发生血压急剧下降、呼吸困难等, 本题中并未提及此类症状。

104. 【答案】C

【解析】

选项 A: 主动脉神经传入冲动减少, 心交感传出增强。此选项错误, 因为在这种情况下, 主动脉神经的传入冲动不会减少。

选项 B: 主动脉神经传入冲动减少, 心交感传出减少。此选项错误, 因为虽然主动脉神经传入冲动可能会减少, 但是心交感传出应该会增强以提高心率。

选项 C: 窦神经传入冲动减少, 心交感传出增强。此选项正确, 当体位改变时, 血压下降, 窦神经传入冲动减少, 导致心交感传出增强, 心率升高。

选项 D: 窦神经传入冲动减少, 心迷走传出增强。此选项错误, 因为在这种情况下, 心迷走传出应该减弱而不是增强, 以便提高心率。

选项 E: 窦神经传入冲动增强, 心迷走传出增强。此选项错误, 因为窦神经传入冲动应该减少, 而心迷走传出应该减弱。

105. 【答案】A

【解析】

选项 A: CO, 一氧化碳。一氧化碳中毒的典型症状为晕倒和皮肤黏膜呈樱桃红色, 与题干描述的情况相符, 因此是正确答案。

选项 B: CO<sub>2</sub>, 二氧化碳。二氧化碳中毒的临床表现为恶心、呕吐、头晕等, 无口唇黏膜樱桃红色, 与题干描述的情况不符, 所以错误。

选项 C:  $\text{NH}_3$ , 氨气。氨气中毒的表现为刺激性气味、眼部刺痛、咽部烧灼痛等, 无口唇黏膜樱桃红色, 与题干描述的情况不符, 所以错误。

选项 D:  $\text{SO}_2$ , 二氧化硫。二氧化硫中毒有二氧化硫接触史, 出现流泪、畏光等眼部不适与呼吸系统受损的临床表现, 无口唇黏膜樱桃红色, 与题干描述的情况不符, 所以错误。

选项 E:  $\text{NO}$ , 一氧化氮。一氧化氮中毒轻度时患者仅有头痛、头晕等症状, 中度中毒时粘膜呈樱桃红色, 但结合病因判断,  $\text{CO}$  中毒可能性更大, 所以错误。

106. 【答案】D

【解析】

选项 A: 精神性疾病主要表现为认知、情感、意志和行为等精神活动出现不同程度障碍。此患者虽有可能存在心理问题, 但主要症状为腹痛, 且无实质性、组织性损害, 故不符合。

选项 B: 感染性疾病是由病原体入侵人体引起的。此患者的症状在就医过程中缓解, 且查体无器质性改变, 故不符合。

选项 C: 神经性疾病主要表现为感觉、运动、意识、植物神经功能障碍。此患者主要症状为腹痛, 且无其他神经功能障碍的表现, 故不符合。

选项 D: 心身障碍是在不良心理因素的作用下, 引起的身体障碍, 但并无器质性病变, 是可逆的。此患者的症状与心身障碍的特点相符, 故此为正确答案。

选项 E: 自身免疫性疾病是机体对自身抗体发生免疫反应而导致自身组织损害。此患者查体无器质性改变, 故不符合。

107. 【答案】B

【解析】

选项 A: 肝细胞腺瘤多见于成年女性, 为肝脏良性病变, 多见于肝右叶, 镜下细胞核小, 肝血窦受压变窄。所以, 此选项错误。

选项 B: 老年男性患者, 既往有乙肝病史, 体检发现肝左叶占位 (肝脏肿瘤可能性大), 血 AFP 明显增高 (肝癌可能)。肝活检, 增生细胞呈片状, 血窦丰富, 体积大, 胞浆丰富, 核大, 核仁明显。核分裂像易见, 最可能的病理诊断应为肝细胞癌。所以, 此选项正确。

选项 C: 胆管细胞癌与肝硬化和 HBV 或 HCV 感染无关, 镜下癌细胞呈腺管状排列, 可分泌黏液, 癌组织间质较多。所以, 此选项错误。

选项 D: 海绵状血管瘤多见于中年女性, 镜下可见充盈扩大的肝血窦, 血窦之间常有薄层纤维膜。所以, 此选项错误。

选项 E: 肝硬化镜下常有特征性病理改变假小叶。所以, 此选项错误。

108. 【答案】B

【解析】

A. 中性粒细胞吞噬导致红细胞破坏-错误。中性粒细胞主要的功能是吞噬和杀灭细菌, 而不是导致红细胞破坏。



- B. 补体激活导致红细胞溶解-正确。补体系统激活后,会在红细胞表面形成 MAC(膜攻击复合物),导致红细胞溶解。
- C. NK 细胞裂解红细胞-错误。NK 细胞主要的功能是识别和杀灭肿瘤细胞和被病毒感染的细胞,而不是裂解红细胞。
- D. CTL 细胞杀伤红细胞-错误。CTL(细胞毒性 T 淋巴细胞)主要的功能是杀伤被病毒感染的细胞和肿瘤细胞,而不是杀伤红细胞。
- E. 巨噬细胞吞噬导致红细胞破坏-错误。巨噬细胞主要的功能是吞噬和处理体内的异物,包括病原体和死亡或受损的自身细胞,但它并不会主动破坏正常的红细胞。

109. 【答案】C

【解析】

- A. 浆液和红细胞:此选项不正确,虽然在大叶性肺炎的早期充血水肿期,肺泡内可见浆液和红细胞,但根据题干中的症状描述,患者已经进入了红色肝样变期,此时肺泡腔内主要成分为纤维素和红细胞。
- B. 中性粒细胞和纤维素:此选项不正确,中性粒细胞在感染早期可能出现,但在红色肝样变期,肺泡腔内主要成分为纤维素和红细胞。
- C. 纤维素和红细胞:此选项正确,青年男性,高热,咳铁锈色痰,痰培养:肺炎链球菌,影像学提示右肺下野大片致密影,结合临床表现,考虑处于红色肝样变期,此时镜下可见肺泡腔内充满纤维素及大量红细胞。
- D. 浆液和巨噬细胞:此选项不正确,巨噬细胞在感染后期可能出现,但在红色肝样变期,肺泡腔内主要成分为纤维素和红细胞。
- E. 淋巴细胞和纤维素:此选项不正确,淋巴细胞在感染后期可能出现,但在红色肝样变期,肺泡腔内主要成分为纤维素和红细胞。

110. 【答案】A

【解析】

- A. 感觉适应:这是正确答案。感觉适应是指当某一恒定强度的刺激持续作用于一个感受器时,其传入神经纤维上动作电位的频率会逐渐降低。这就是为什么在花香的地方停留久了,我们就不再那么明显地感觉到花香了。
- B. 感觉减退:这不是正确答案。感觉减退是指对事物个别属性的感受减退,即大刺激引起小感受,严重时不引起任何感受,常见于神经系统器质性疾病。在这个例子中,花香并未引起感受减退。
- C. 感觉相互作用:这不是正确答案。感觉相互作用是指在一定条件下,各种不同的感觉都可能发生相互作用,从而使感受性发生变化。在这个例子中,只存在一种刺激,不存在两种及以上不同的刺激。
- D. 感觉过敏:这不是正确答案。感觉过敏是指对轻微刺激产生强烈反应。在这个例子中,花香并未引起感觉过敏。
- E. 疲劳:这不是正确答案。疲劳时,对某一强度的刺激产生适应之后,如果再增加该刺激的强度,则传入冲动不再增加。在这个例子中,并未涉及到疲劳。

111. 【答案】B

【解析】

选项 A: 不正确。医疗服务并不以治疗是否有效或是否成功作为收取费用的前提。

选项 B: 正确。在医疗活动中,患者应履行的主要义务之一就是给付医疗费用的义务。即使治疗失败,只要医务人

员付出了劳动，并且尽职尽责不存在过错，患者及其家属就应交纳相应的医疗费用。

选项 C：不正确。社区医院并无义务因患者病情未好转而减少部分费用。

选项 D：不正确。患者对服务不满意并不能成为拒绝支付医疗费的理由。

选项 E：不正确。医疗费用有固定的收费标准，不能以患者的经济水平决定收费水平。

112. 【答案】A

【解析】

A. 左甲状腺素长期服用：这是正确答案。左甲状腺素是一种合成的甲状腺激素，可以用来治疗甲状腺功能低下的疾病，包括甲状腺肿大。

B. 糖皮质激素：糖皮质激素主要用于治疗各种炎症和免疫性疾病，并不能直接治疗甲状腺肿大。

C. 补充甲状腺激素：虽然补充甲状腺激素可以帮助调节甲状腺功能，但对于已经形成的甲状腺肿大，补充甲状腺激素并不能有效缩小。

D. 氢化可的松静脉滴注：氢化可的松主要用于治疗慢性肾上腺皮质功能不全、风湿性关节炎等疾病，并不能治疗甲状腺肿大。

E. 头孢呋辛：头孢呋辛是一种抗生素，主要用于治疗细菌感染，并不能治疗甲状腺肿大。

113. 【答案】A

【解析】

A. 相关性：正确。因为陈某虽然知道吸烟的危害，但他不认为吸烟会对自己造成伤害。因此，需要强调吸烟与他的健康状况的相关性，使他认识到戒烟与他自身的密切关系。

B. 益处：错误。陈某已经知道了吸烟的危害，但他不觉得吸烟会对自己造成伤害。此时，强调戒烟的益处可能并不能改变他的观念。

C. 反复：错误。虽然反复强调戒烟的重要性是必要的，但在此情况下，更重要的是让陈某意识到吸烟对他自身的危害，即相关性。

D. 障碍：错误。在陈某还没有决定戒烟之前，讨论可能遇到的障碍并不适合。

E. 风险：错误。陈某已经知道吸烟的风险，但他不认为这些风险会影响到自己。因此，再次强调风险可能并不能改变他的观念。

114. 【答案】A

【解析】

A. 筛检：正确。题干中描述的情况是对一定数量的自然人群进行粪便检查，再对阳性人员进行确诊检查，这种方法就是筛检。

B. 研究：错误。研究主要是指探寻事物或疾病的原理或进展，本题中表现的是一种检查方法，并非研究。

C. 抽查：错误。抽查为抽样调查，抽取其中的一部分进行检查。本题中对整体 600 人进行检查，并非抽查。

D. 调查：错误。调查是指为了解情况而进行考察。本题侧重于在整体样本中筛选出阳性患者，并非调查。E. 确诊：错误。确诊是对已经筛选出来的阳性人群进行的，而不是筛选的过程。

115. 【答案】A

【解析】

- A. 骨骼肌震颤：正确。有机磷农药中毒的患者会出现烟碱样症状，其中包括骨骼肌震颤。
- B. 瞳孔扩大：错误。有机磷农药中毒会导致副交感神经末梢过度兴奋，表现为瞳孔缩小，而非扩大。
- C. 出汗减少：错误。有机磷农药中毒会导致腺体分泌增加，表现为大汗，而非出汗减少。
- D. 气道分泌物减少：错误。有机磷农药中毒会导致气道分泌物增多，表现为咳嗽、气促、呼吸困难，严重者发生肺水肿。
- E. 唾液分泌减少：错误。有机磷农药中毒会导致腺体分泌增加，表现为流涎，而非唾液分泌减少。

116. 【答案】E

【解析】

- A. 副半奇静脉：此选项错误。副半奇静脉位于胸椎体左侧下行，注入半奇静脉或向右跨过脊柱前面注入奇静脉，它主要收集左侧上部的肋间后静脉的血液，不会被右侧肺门部肿瘤压迫。
- B. 右头臂静脉：此选项错误。右头臂静脉与左头臂静脉在肺门上方向下汇合成上腔静脉，不在肿瘤可能的压迫范围内。
- C. 右锁骨下静脉：此选项错误。右锁骨下静脉在第1肋外侧缘续于腋静脉，向内行于腋动脉前下方，至胸锁关节后方与颈内静脉汇合成头臂静脉，也不在肿瘤可能的压迫范围内。
- D. 半奇静脉：此选项错误。半奇静脉在左膈脚处起自左腰升静脉，沿胸椎体左侧上行，约达第8胸椎体高度经胸主动脉和食管后方向右跨越脊柱，注入奇静脉，其位置不会被右侧肺门部肿瘤压迫。
- E. 奇静脉：此选项正确。奇静脉位于胸腔中央，从下腔静脉汇合处起，向上行至右锁骨下静脉汇合处止，由于位置较中央，因此最可能被右肺门部的肿瘤压迫。

117. 【答案】B

【解析】

- A. HSV-1 骶神经节：HSV-1 主要导致口唇疱疹，而不是生殖器疱疹，所以此选项不正确。
- B. HSV-2 骶神经节：正确答案。HSV-2 主要导致生殖器疱疹，并且在发病后，病毒会潜伏在骶神经节中。
- C. VZV 脊髓后根神经节：VZV 即水痘带状疱疹病毒，主要导致水痘和带状疱疹，与此病例无关，所以此选项不正确。
- D. HSV-2 三叉神经节：HSV-2 虽然可以导致生殖器疱疹，但是它潜伏的位置是骶神经节，而不是三叉神经节，所以此选项不正确。
- E. HSV-1 三叉神经节：HSV-1 主要导致口唇疱疹，而不是生殖器疱疹，所以此选项不正确。

118. 【答案】B

【解析】

- A. 基因治疗：此项不符合题干描述的情况，医生在发现妊娠严重并发症时，首要任务是保障孕妇及胎儿的生命安全，而非进行基因治疗。
- B. 终止妊娠：根据《母婴保健法》规定，如果妊娠可能对孕妇的生命安全构成威胁或者严重影响孕妇和胎儿的健康，医生可以建议终止妊娠。

康，医生应当提出终止妊娠的医学意见。此选项符合题干描述的情况。

C. 给出指导意见并完善相关检查：虽然这是医生的一项常规职责，但在面对可能危及孕妇生命的严重妊娠并发症时，更紧急的医学行为是终止妊娠。

D. 指导妊娠和胎儿保健：与 C 选项类似，这也是医生的一项常规职责，但在此特定情况下，不是首要的医学行为。

E. 产前诊断：产前诊断主要用于检测胎儿是否存在遗传性疾病或出生缺陷，不适用于已经发现的妊娠并发症。

119. 【答案】D

【解析】

A. 医务科科长：虽然在医疗机构中有一定的领导地位，但并不是所有的医务科科长都具备职业病诊断资格，因此不能随意在职业病诊断证明上签字。

B. 该医院医务部负责人：同样，医务部负责人虽然在医院中有领导地位，但如果他/她没有取得职业病诊断资格，也不能在职业病诊断证明上签字。

C. 科主任：科主任的职责主要是管理和领导科室的工作，如果他/她没有职业病诊断资格，也不能在职业病诊断证明上签字。

D. 该病人诊断医生且具有职业病诊断资格的人：这是正确答案。只有取得职业病诊断资格的医生才能在职业病诊断证明上签字。

E. 该病人诊断医生及病人：病人自己无权在职业病诊断证明上签字。

120. 【答案】C

【解析】

选项 A：直方图，用于表示连续变量频数分布情况，体重和身高的关系并不是连续变量频数分布，所以 A 选项错误。

选项 B：直条图，用于表示相互独立的统计指标数值大小和它们之间的对比关系，体重和身高并非相互独立的统计指标，所以 B 选项错误。

选项 C：散点图，可以直观地表现出两指标之间的关系，适合表示体重和身高的关系，所以 C 选项正确。

选项 D：线图，适合描述一个变量随另一个变量变化的趋势和波动情况，但体重和身高的关系并不适合用线图表示，所以 D 选项错误。

选项 E：圆图，用来表示全体中各部分所占的比例，但体重和身高的关系并不适合用圆图表示，所以 E 选项错误。

121. 【答案】D

【解析】

A. 毛玻璃样肝细胞：这是乙型肝炎的特殊形态学特征，肝细胞体积较大，胞质内充满嗜酸性细颗粒物质，胞质不透明似毛玻璃样。本题中，虽然患者是 HBsAg 阳性，但是肝细胞质不透明并未提及有嗜酸性细颗粒物质，因此 A 选项错误。

B. 气球样变肝细胞：这种肝细胞体积肿大，形状为圆球形，胞质几乎完全透明。本题中，虽然患者是 HBsAg 阳性，但并未提及肝细胞体积肿大或胞质透明，因此 B 选项错误。

C. 嗜酸性样肝细胞：这种病变肝细胞由于胞质水分脱水浓缩使肝细胞体积变小，胞质嗜酸性增强，红染。本题中，

并未提及肝细胞体积变小或胞质嗜酸性增强，因此 C 选项错误。

D. 嗜酸性小体：这种小体又称凋亡小体，由嗜酸性变发展而来，胞质进一步浓缩，核也浓缩消失，最终形成深红色浓染的圆形小体。本题中，患者肝细胞胞质不透明，内有颗粒状小体，与嗜酸性小体的描述相符，因此 D 选项正确。

E. 点状坏死肝细胞：这种情况是指散在分布的单个或数个肝细胞的坏死为点状坏死。本题中，并未提及肝细胞出现坏死，因此 E 选项错误。

122. 【答案】D

【解析】

选项 A：自我健康检测。这是一种自我监测的方式，但对于可能暴露于新冠病毒的人来说，仅依靠自我健康检测并不足够，需要专业的医疗观察和隔离，因此选项 A 不正确。

选项 B：给予口服预防药物。目前尚无针对新冠病毒的特效预防药物，因此选项 B 不正确。

选项 C：隔离治疗。隔离治疗通常适用于已经确诊的患者，而该男子并未被确诊，故选项 C 不正确。

选项 D：隔离观察。根据《中华人民共和国传染病防治法》，与传染源有过接触且有受感染可能者应进行隔离观察，因此选项 D 是正确答案。

选项 E：注射丙种球蛋白。丙种球蛋白主要用于提高机体免疫力，但无法防止新冠病毒的感染，因此选项 E 不正确。

123. 【答案】B

【解析】

A. 前列腺周围带：前列腺癌多发生在前列腺周围带，而此题中的病例是前列腺增生，故此选项错误。

B. 前列腺移行区：前列腺增生主要发生于前列腺中央区和移行区，增生组织呈多发结节，并逐渐增大。因此，这是正确答案。

C. 射精管：射精管与前列腺增生无直接关系，故此选项错误。

D. 尿道：虽然前列腺增生可能引起尿道压迫，但病变部位并非尿道，故此选项错误。

E. 纤维肌层：纤维肌层与前列腺增生无直接关系，故此选项错误。

124. 【答案】C

【解析】

A. 肝左管：错误。患者无肝内外胆管扩张的影像学表现，说明肝左管并未发生梗阻。

B. 肝右管：错误。同样，患者无肝内外胆管扩张的影像学表现，说明肝右管并未发生梗阻。

C. 胆囊管：正确。患者有胆囊泥沙样结石病史，现胆囊肿大明显，且无肝内外胆管扩张，最可能的梗阻部位是胆囊管。

D. 胆总管：错误。如果胆总管发生梗阻，影像学上会见到肝外胆管扩张，但患者未见此表现。

E. 肝总管：错误。肝总管梗阻通常会导致肝内外胆管扩张，但患者影像学上并未见到这种情况。

125. 【答案】D

【解析】



- A. 自愿：虽然患者的兄弟自愿捐献肾脏，但这并不是主治医师选择移植左肾的主要依据。因此，选项 A 不正确。
- B. 患者健康至上：这一原则是移植过程中的一个重要考虑因素，但在这个情况下，主治医师的决策更多地是基于保护供体（即患者的兄弟）。因此，选项 B 也不正确。
- C. 唯一性：这并不是移植过程中的一个伦理原则，所以选项 C 不正确。
- D. 保护供者：这是主治医师选择移植左肾的主要依据。尽管左肾的功能稍差，但这样可以保护供体（即患者的兄弟）的健康，因为他将保留功能更好的右肾。因此，选项 D 是正确的。
- E. 知情同意：虽然知情同意是移植过程中的一个重要原则，但它并不是主治医师选择移植左肾的主要依据。因此，选项 E 不正确。

126. 【答案】D

【解析】

- A. 尿酸增加：尿酸是嘌呤代谢的最后产物，与此题描述的病理状态无直接关系，故排除。
- B. 乳酸增加：乳酸是糖酵解过程的产物，虽然会导致酸中毒，但在此题的情境下，因为患者有一型糖尿病，血糖升高，且未监测血糖，因此不太可能是由于乳酸增加导致的酸中毒，故排除。
- C. 丙酮酸增加：丙酮酸是糖酵解的中间产物，其增加并不直接导致酮体增加，故排除。
- D. 酮体增加：在糖尿病患者中，胰岛素的缺乏导致脂肪分解加速，从而产生大量的酮体，进一步导致酮症酸中毒。结合题干，这个选项最符合患者的病理状态。
- E. 转氨酶增加：转氨酶的增加通常与肝脏疾病有关，与此题目的病理状态无直接关系，故排除。

127. 【答案】D

【解析】

- 选项 A：组氨酸脱羧酶，这种酶在组氨酸脱羧形成组胺时发挥作用，与本题无关。
- 选项 B：半胱氨酸蛋白酶，一般存在于溶酶体，主要参与细胞吞噬和细胞内多余物质的清除和消化，与本题无关。
- 选项 C：色氨酸羟化酶，催化色氨酸形成 5-羟色氨酸，最终形成 5-羟色胺，与本题无关。
- 选项 D：酪氨酸酶，这种酶在黑色素细胞中，酪氨酸经其作用，羟化生成多巴，后者经氧化、脱羧等反应转变成吲哚醌，最后吲哚醌聚合为黑色素。本题描述的症状符合酪氨酸酶缺乏引起的白化病。
- 选项 E：苯丙氨酸羟化酶，先天性苯丙氨酸羟化酶缺陷病人，不能将苯丙氨酸羟化为酪氨酸，导致大量的苯丙酮酸及其部分代谢产物（苯乳酸及苯乙酸等）由尿排出，称为苯丙酮尿症，与本题无关。

128. 【答案】D

【解析】

- 选项 A：窒息。窒息是由于呼吸道阻塞或者环境中缺乏氧气导致的严重状况，但在这个案例中，虽然氮氧化合物泄漏可能导致呼吸困难，但不会直接导致窒息。
- 选项 B：肺气肿。肺气肿主要是由于慢性阻塞性肺疾病（如慢性支气管炎、肺气肿）引起的，与氮氧化合物泄漏无直接关系。
- 选项 C：休克。休克是一种严重的、需要立即医疗干预的状况。虽然氮氧化合物泄露可能导致身体应激反应，但不

太可能直接导致休克。

选项 D：急性中毒性肺水肿。氮氧化物对深部呼吸道有较大的刺激性，能与粘膜上的水缓慢作用，形成硝酸和亚硝酸对肺组织产生强烈的刺激和腐蚀，损害肺终末支气管和肺泡上皮，使肺泡和毛细血管通透性增加，导致肺水肿。

选项 E：硅肺。硅肺是由于吸入含硅尘埃引发的一种职业病，与本题中的氮氧化合物泄漏无直接关系。

129. 【答案】D

【解析】

- A. 维生素 A：错误。维生素 A 缺乏的患儿主要表现为皮肤角化过度 and 干眼症，与题干中的症状不符。
- B. 铁：错误。铁缺乏的患儿常表现为缺铁性贫血，与题干中的症状不符。
- C. 维生素 C：错误。维生素 C 缺乏的患儿常表现为坏血病，与题干中的症状不符。
- D. 维生素 D：正确。维生素 D 缺乏会导致钙、磷代谢障碍，引发佝偻病。佝偻病初期见于 6 个月以内的小婴儿，表现为神经兴奋性增高，如易激惹、烦闹、汗多等，颅骨改变为主，前囟边较软，颅骨薄，可有乒乓球样的触感，与题干中的症状相符。
- E. 锌：错误。锌缺乏常表现为异食癖、生长发育落后，与题干中的症状不符。

130. 【答案】C

【解析】

- A. 抗原抗体交叉反应：这并非抗精子抗体生成的机制，而是一种免疫反应的机制。在此情况下，一个抗体能够识别并结合到多种不同的抗原上，但这与本题所描述的情况无关。
- B. B 细胞克隆抗体：这是人工制备的抗体，不属于自身抗体，所以也不是本题的正确答案。
- C. 隐蔽性抗原释放：这是本题的正确答案。在睾丸外伤或感染的情况下，原本被隔离的抗原（称为隐蔽抗原或隔离抗原）可能会释放入血液和淋巴液，与免疫系统接触，从而激活自身反应性淋巴细胞，导致自身免疫病。
- D. 表位抗原扩展：这是指免疫系统先针对抗原的优势表位发生免疫应答，如果未能及时清除抗原，可相继对隐蔽表位发生免疫应答，常见于系统性红斑狼疮、类风湿，但这并非本题所考察的内容。
- E. 自身抗原反应：这是指生物、物理、化学以及药物等因素可能导致自身抗原发生改变，从而产生针对改变自身抗原的自身抗体和 T 细胞，引起自身免疫病，常见于类风湿、溶血性贫血等，但这并非本题所考察的内容。

131. 【答案】C

【解析】

- A. 罚款：根据《医疗机构管理条例实施细则》规定，李某的行为是需要被罚款的，但仅仅罚款无法完全表达对其行为的惩罚，因此此选项不全面。
- B. 警告：警告通常用于轻微违规行为，而李某的行为已经造成了严重后果，因此警告显然不能作为唯一的处罚手段，此选项错误。
- C. 吊销执业证：根据《医疗机构管理条例实施细则》规定，李某的行为属于严重违规，应吊销《医疗机构执业许可证》，此选项正确。
- D. 训诫：训诫通常用于教育和提醒，但李某的行为已经造成了严重后果，训诫无法作为唯一的处罚手段，此选项



错误。

E. 暂扣许可证：暂扣许可证虽然可以作为一种处罚方式，但在这种情况下，因为李某的行为已经造成了患者死亡，这种行为的严重性超过了暂扣许可证的处罚范围，此选项错误。

132. 【答案】E

【解析】

选项 A：慢性炎症细胞浸润，通常会引起关节痛，但是极少会急性起病，且无肌肉痉挛、抽搐的症状，所以此选项不正确。

选项 B：应激性溃疡是严重创伤或疾病后出现的消化道溃疡，常表现为呕血和黑便，与患者的症状不符，所以此选项不正确。

选项 C：局部组织凝固性坏死常见于干性坏疽，肺梗死等，无肌肉关节疼痛表现，所以此选项不正确。

选项 D：血液中二氧化碳浓度升高常见于呼吸系统疾病，较少合并四肢痉挛、抽搐，所以此选项不正确。

选项 E：患者的症状（潜水后快速上升出水，随后出现四肢肌肉痉挛、疼痛、抽搐及关节痛）符合减压病的表现，其疼痛原因最可能是血管腔内起泡栓塞，所以此选项正确。

133. 【答案】C

【解析】

选项 A：机械识记，指的是记人名、地名、电话号码、外文生词、元素符号、历史年代，商品或仪器型号等，由于材料无内在联系或无意义，只得根据外在的时空顺序去强记。这与题干描述的情况不符，所以选项 A 不正确。

选项 B：有意识记，也叫随意识记，是指事先有一定识记意图和任务，并需要一定意志努力，运用一定的方法和策略所进行的识记。这种记忆方式需要明确的目的和任务，而题干中的工人并没有预设目标去记忆坠落过程，所以选项 B 不正确。

选项 C：无意识记，也叫做不随意识记，是指事先没有预定目的，也不需要意志努力的识记。虽然没有提出明确的识记的目的和任务，也没有付出特殊的努力和采取什么特殊的措施，但是这些活动和内容情节却可能自然而然地被识记下来。这与题干中工人的记忆情况相符，所以选项 C 是正确答案。

选项 D：逻辑识记，又称语义记忆，是指以概念、公式、理论、推理等为内容的记忆。这种记忆方式需要逻辑性的思维过程，与题干描述的情况不符，所以选项 D 不正确。

选项 E：创伤性应激，常表现为延续和长期性的一种精神障碍。虽然工人的坠楼事件可能会产生创伤性应激，但题目考察的是记忆的分类，所以选项 E 不正确。

134. 【答案】A

【解析】

选项 A：肾小管内液体渗透压增高。这是正确答案，糖尿病时，由于血糖浓度升高，超滤液中的葡萄糖量超过近端小管对糖的最大转运率，造成小管液溶质浓度升高，一部分水保留在小管内，导致多尿。

选项 B：肾滤过率降低。这并不是引起多尿的原因，反而在某些病理情况下，如急性肾功能衰竭，可能会出现尿量减少。

选项 C: 抗利尿激素减少。抗利尿激素（尤其是抗利尿激素 ADH）的减少可能导致尿量增加，但在这个病例中，主要原因是肾小管内液体渗透压增高，而不是 ADH 的减少。

选项 D: 醛固酮增多。醛固酮主要作用是保持体液和电解质的平衡，其增多并不能直接导致多尿。

选项 E: 抗利尿激素增多。如果抗利尿激素增多，应该会导致尿量减少，而不是增加。

135. 【答案】A

【解析】

A. 现患病例：这是正确答案。现患病例是指当前正在患病的个体，他们的记忆对于食管癌的发病危险因素会相对准确，因为他们正在经历这个过程，回忆偏差的可能性较小。

B. 死亡病例：此选项不准确。死亡病例无法提供直接的信息，因为他们无法回忆或描述他们的情况。

C. 现存病例：此选项不准确。现存病例可能包括已经康复的病例，他们的回忆可能不如现患病例准确。

D. 住院病例：此选项不准确。住院病例的记忆可能受到住院环境的影响，可能无法准确回忆食管癌的发病危险因素。

E. 新发病例：此选项不准确。新发病例可能还未完全理解他们的病情，他们的回忆可能不准确。

136. 【答案】A

【解析】

A. 高胰岛素促进蛋白和脂肪合成，抑制脂肪分解：正确。在糖尿病妊娠女性中，高血糖刺激胎儿胰岛素分泌增加，形成高胰岛素血症。胰岛素能促进蛋白质和脂肪的合成，抑制脂肪的分解，导致胎儿体重过大。

B. 高胰岛素促进蛋白合成，促脂肪分解：错误。高胰岛素会抑制脂肪分解，并不会促进脂肪分解。

C. 高胰岛素促进蛋白和脂肪合成，促进脂肪分解：错误。高胰岛素同样会抑制脂肪分解，不会促进脂肪分解。

D. 高胰岛素促进蛋白和脂肪合成，促蛋白分解：错误。胰岛素会促进蛋白质的合成，而不是分解。

E. 高胰岛素促脂肪合成，蛋白质分解：错误。胰岛素会促进蛋白质的合成，而不是分解。

137. 【答案】B

【解析】

A. 甲状腺乳头状癌：这种疾病的特点是肿瘤一般呈球形，无包膜，切面灰白色，质地较硬。乳头上皮常呈单层，癌细胞核染色质少，常呈透明毛玻璃样，无核仁，有核沟，核内假包涵体，核相互重叠。这与题干中的病理表现不符，所以排除。

B. 甲状腺滤泡性腺瘤：这种疾病的特点是肿瘤组织由大滤泡或大小不一的滤泡组成，滤泡内充满胶质，并可互相融合成囊。这与题干中的病理表现完全符合，所以是正确答案。

C. 单纯性甲状腺肿：这种疾病的特点是滤泡上皮增生呈立方或低柱状，伴小滤泡形成，胶质较少，间质充血。这与题干中的病理表现不符，所以排除。

D. 桥本氏甲状腺炎：这种疾病的特点是甲状腺广泛破坏、萎缩，大量淋巴细胞及不等量的嗜酸性粒细胞浸润、淋巴滤泡形成，纤维组织增生。这与题干中的病理表现不符，所以排除。

E. 甲状腺髓样癌：这种疾病的特点是瘤细胞圆形或多角形或梭形，核圆或卵圆形，核仁不明显，核分裂罕见。这

与题干中的病理表现不符，所以排除。

138. 【答案】C

【解析】

- A. 发散思维，也称求异思维，是指解决一个问题时，沿着各种不同的方向去进行积极的思考，找出符合条件的多种答案、解决方法或结论的一种思维。这与题干描述的情况不符，所以 A 选项错误。
- B. 动作思维，是以实际动作或操作来解决问题的思维，即思维以动作为支柱，依赖实际操作解决个体直观的问题。这与题干描述的情况不符，所以 B 选项错误。
- C. 形象思维，是利用具体形象解决问题的思维，思维活动依赖具体形象和已有的表象。这与题干描述的情况相符，所以 C 选项正确。
- D. 抽象思维，是以抽象的概念和理论知识来解决问题的思维，这是人类思维的核心形式。这与题干描述的情况不符，所以 D 选项错误。
- E. 聚合思维，也称求同思维，就是把解决问题所能提供的各种信息聚合起来，得出一个正确的答案或一个最好的解决问题的方案。这与题干描述的情况不符，所以 E 选项错误。

139. 【答案】D

【解析】

- A. 补体功能缺陷：补体系统是免疫系统的一部分，对于防御病原微生物有重要作用。但在这个病例中，没有提到患者有补体功能缺陷。
- B. B 细胞被抑制：B 细胞负责体液免疫应答，产生抗体。虽然泼尼松和他克莫司有抑制 B 细胞的作用，但巨细胞病毒主要通过细胞免疫应答来清除，所以 B 细胞被抑制并不是主要原因。
- C. 中性粒细胞亢进：中性粒细胞是对抗细菌和真菌感染的主要免疫细胞，而非病毒感染。在这个病例中，患者的中性粒细胞计数正常，所以这个选项不正确。
- D. T 细胞被抑制：T 细胞是对抗病毒感染的主要免疫细胞。泼尼松和他克莫司都有抑制 T 细胞的作用，因此这是导致患者容易被巨细胞病毒感染的主要原因。
- E. 巨噬细胞被抑制：巨噬细胞是吞噬和清除病原微生物的免疫细胞，但在这个病例中，没有提到患者的巨噬细胞功能被抑制。

140. 【答案】A

【解析】

- A. 厚敷料加压包扎：一般用于处理开放性骨折或伤口，但题目中未提及是否为开放性骨折，故此选项不准确。
- B. 胸腔穿刺术：主要用于处理胸腔积液、气胸等问题，但题目中并未描述出这样的症状，故此选项不正确。
- C. 胸腔闭式引流术：同样是处理胸腔积液、气胸等方法，题目中并未描述出这样的症状，故此选项不正确。
- D. 胸廓固定：对于多根多处肋骨骨折的患者，能有效消除反常呼吸，维持生命体征，应作为现场急救的首选，故此选项正确。
- E. 镇痛，对症处理：虽然能缓解疼痛，但不能解决反常呼吸的问题，不应作为现场急救的首选，故此选项不正确。

## 141. 【答案】E

## 【解析】

选项 A: 血清  $\beta 2$  微球蛋白测定。 $\beta 2$  微球蛋白是一种免疫球蛋白轻链, 多发性骨髓瘤中可能升高, 但其特异性不如 M 蛋白明显, 所以此选项不正确。

选项 B: 尿本周蛋白测定。本周蛋白是一种小分子蛋白, 多发性骨髓瘤中可能出现在尿中, 但同样, 其特异性不如 M 蛋白明显, 所以此选项不正确。

选项 C: 尿常规。尿常规是一种基础检查, 对于多发性骨髓瘤的诊断帮助有限, 所以此选项不正确。

选项 D: 血清钙测定。多发性骨髓瘤可能会出现高钙血症, 但这并不是所有患者都会出现的症状, 且其特异性也不如 M 蛋白明显, 所以此选项不正确。

选项 E: 血清 M 蛋白及免疫球蛋白。多发性骨髓瘤的特点是血清中出现 M 蛋白, 这是本病的突出特点, 所以此选项正确。

## 142. 【答案】A

## 【解析】

A. 分秒必争的抢救患者: 正确。在急诊抢救中, 医生需要迅速、熟练地作出反应, 对需要紧急医疗照护的患者无偏见或偏袒。对于本题中的患者, 因为急性酒精中毒, 神志不清, 无法作出决策, 医生应立即进行急救, 确保患者的生命安全。

B. 满足心理需求: 错误。虽然满足患者的心理需求是医生的职责之一, 但在急诊抢救中, 最重要的是迅速处理患者的生命威胁情况。

C. 遵从社会公益: 错误。虽然医生需要遵从社会公益, 但在急诊抢救中, 主要的关注点应该是患者的生命安全。

D. 患者家属知情同意: 错误。在非紧急情况下, 医生需要获取患者或其家属的知情同意。但在本题中, 患者的生命处于危险之中, 医生需要立即采取行动。

E. 团结协作: 错误。虽然团结协作是医疗团队的重要原则, 但在本题中, 最关键的是迅速处理患者的生命威胁情况。

## 143. 【答案】B

## 【解析】

选项 A: 共同参与型, 适用于具有一定医学知识背景或长期的慢性病患者, 医患双方共同参与医疗方案的讨论、制订与分享。在本题中, 患者处于昏迷状态, 无法参与医疗决策, 所以 A 选项不正确。

选项 B: 主动-被动型, 适用于昏迷、休克、精神病患者发作期、严重智力低下者以及婴幼儿等一些难以表达主观意志的患者。在本题中, 患者过量饮酒后, 急性酒精中毒, 处于昏迷状态, 不能自己作出决策, 故而为主动-被动型, 所以 B 选项是正确的。

选项 C: 主动合作型, 这种类型没有在解析中提到, 可能是考察的知识点以外的内容, 因此 C 选项不正确。

选项 D: 指导参与型, 这种类型也没有在解析中提到, 可能是考察的知识点以外的内容, 因此 D 选项不正确。

选项 E: 指导-合作模式, 适用于大多数患者, 患者被看作有意识、有思想的人, 具有一定的主动性, 能够主动述



说病情，反映诊治情况，配合检查和治疗。但对医生的诊治措施既提不出异议，也提不出反对意见，医者仍具有权威性，仍居于主导地位。在本题中，患者处于昏迷状态，无法表达自己的意愿，所以 E 选项不正确。

144. 【答案】C

【解析】

- A. 再到当地公安局备案后：此选项错误，因为在急性病情下，医务人员的首要职责是尽快进行抢救，而不是先去公安局备案。
- B. 在经过主任医师同意后：此选项错误。虽然主任医师的同意在某些情况下可能需要，但在这种紧急情况下，等待主任医师的同意可能会耽误抢救时间。
- C. 在医院授权的负责人批准后：此选项正确。在无法联系到患者家属或者关系人的情况下，医疗机构负责人或者被授权负责人的批准是必需的，以便进行紧急治疗。
- D. 联系到患者家属后：此选项错误。在紧急情况下，等待联系到患者家属可能会耽误抢救时间。
- E. 找到酒友后：此选项错误。酒友并不具备法定代理人的权限，他们的同意不能替代医院负责人或被授权的负责人的批准。

145. 【答案】B

【解析】

- A. 不伤害原则：要求医务人员在诊治过程中，尽量避免对患者造成生理上和心理上的伤害。本题中，女医生让男学生回避，并没有直接避免伤害，所以 A 选项不正确。
- B. 尊重原则：要求医务人员尊重患者，包括知情同意、知情选择、要求保守秘密和隐私等。在本题中，女医生让男学生回避，尊重了女生的隐私和感受，所以 B 选项是正确的。
- C. 有利原则：要求医务人员的诊治行为应该保护患者的利益、促进患者健康、增进其幸福。在本题中，虽然女医生的行为有利于患者，但并非主要体现了这一原则，所以 C 选项不正确。
- D. 公正原则：要求医务人员合理分配和实现人们的医疗和健康利益。在本题中，这个原则并未被提及或体现，所以 D 选项不正确。
- E. 保密原则：要求医务人员保护患者的隐私。在本题中，虽然女医生的行为有助于保护患者的隐私，但这个原则可以纳入尊重原则中，所以 E 选项不正确。

146. 【答案】A

【解析】

- A. 体贴关心，充分尊重：这是正确答案。在这个情境中，女医生注意到患者对男学生的疏离感，主动让他回避，这显示了对患者隐私的尊重和体贴。
- B. 过程耐心：虽然女医生在询问病情时表现出耐心，但这并不是题目主要考察的点，所以此选项不正确。
- C. 心正无私，正确引导：这个选项描述的是医生的品德，但在这个情境中，并没有明确体现，所以此选项不正确。
- D. 全面系统，认真仔细：这个选项更多的是描述医生在诊断和治疗过程中的态度和方法，而非本题主要考察的内容，所以此选项不正确。

E. 态度热情：虽然态度热情是医生应有的品质，但在这个情境中并未明确提及，所以此选项不正确。

147. 【答案】A

【解析】

A. 个人隐私权：这是正确答案。在这个情境中，女医生注意到患者对男学生的疏离感，主动让他回避，这显示了对患者隐私的尊重和保护。

B. 人身自由权：此选项不正确。人身自由权主要涉及到患者是否有权利选择接受或拒绝治疗，或者自由选择医生和医院，而在这个情境中并没有提到相关内容。

C. 知情同意权：此选项不正确。知情同意权是指患者在接受任何医疗操作前，医生需要向其充分解释病情、治疗方案、可能的风险等信息，并得到患者的同意。在这个情境中，并没有涉及到这个权利。

D. 平等就医权：此选项不正确。平等就医权是指患者有权在医疗服务中得到公平对待，无论其性别、年龄、种族、宗教信仰、社会经济地位等。在这个情境中，并没有涉及到这个权利。

E. 自主决定权：此选项不正确。自主决定权是指患者有权自主决定接受或拒绝医疗服务。在这个情境中，并没有涉及到这个权利。

148. 【答案】C

【解析】

选项 A：分析性研究是进一步在有选择的人群中观察可疑病因与疾病和健康状况之间有无关联的一种研究方法。本题中，研究者并未深入分析病因与疾病之间的关联，所以这不是分析性研究。

选项 B：理论性研究是对社会现象、社会生活的内在联系及其规律的研究。本题中，研究者并没有进行理论性的探索，所以这不是理论性研究。

选项 C：描述性研究是将专门调查或常规记录所获得的资料，按照不同地区、不同时间和不同人群特征分组，以展示该人群中疾病或健康状况分布特征的一种观察性研究。本题中，研究者进行了抽样调查，并详细记录了患病人数、性别、新发病人数等，符合描述性研究的定义。

选项 D：实验性研究属于同质总体随机分组，比较组间差异，已知和未知的混杂因素皆被均衡，若控制了其他可能发生的偏倚，该类研究应该能确认实验措施与观察结局之间是否有因果关联。本题中，研究者并没有进行实验性研究。

选项 E：生态学研究是描述性研究的一种，在群体水平上研究暴露因素与疾病之间的关系。本题中，研究者并未从群体水平上研究暴露因素与疾病之间的关系，所以这不是生态学研究。

149. 【答案】D

【解析】

A. 200/10000，这个选项错误，因为它计算的是所有人群中女性乙肝患者的比例，而不是女性人群中乙肝患者的比例。

B. 350/1000，这个选项错误，因为它计算的是所有患者中女性乙肝患者的比例，而不是女性人群中乙肝患者的比例。

- C. 300/1000，这个选项错误，因为它计算的是所有患者中女性患者的比例，而不是女性人群中乙肝患者的比例。
- D. 200/4000，这个选项正确，因为它准确地计算了女性人群中乙肝患者的比例，符合题目的要求。
- E. 无法计算，这个选项错误，因为我们有足够的数据来计算女性人群中乙肝患者的比例。

150. 【答案】E

【解析】

- A. 700/6000：这个选项将男性乙肝患者的数目错误地理解为男性病毒性肝炎新发病率，不正确。
- B. 650/6000：这个选项没有给出其计算依据，且无法从题干中获取相关信息，不正确。
- C. 300/6000：这个选项将男性乙肝新发病例数错误地理解为男性病毒性肝炎新发病率，不正确。
- D. 400/1000：这个选项将男性乙肝患者的数目错误地理解为男性病毒性肝炎新发病率，不正确。
- E. 无法计算：由于题干中没有提供男性新发病人数，因此无法计算男性病毒性肝炎新发病率，正确。



## 第二单元

### 1. 【答案】D

#### 【解析】

选项 A：鼠疫是甲类传染病，属于强制管理的烈性传染病，发现后 2 小时内需通过传染病疫情监测信息系统上报，因此 A 选项错误。

选项 B：霍乱也是甲类传染病，同样属于强制管理的烈性传染病，发现后 2 小时内需上报，因此 B 选项错误。

选项 C：流行性腮腺炎属于丙类传染病，为监测管理传染病，并不需要严格管理，因此 C 选项错误。

选项 D：艾滋病属于乙类传染病，是需要严格管理的传染病，诊断后 24 小时内需上报，因此 D 选项正确。

选项 E：麻风病同样属于丙类传染病，为监测管理传染病，并不需要严格管理，因此 E 选项错误。

### 2. 【答案】C

#### 【解析】

A. 低钾血症：蛋白质-能量营养不良症时，由于 ATP 合成减少，钠-钾-ATP 酶的运转能力减弱，钠在细胞内滞留，易出现低血钾。

B. 低钙血症：在此病症中，低钙血症常见，因为营养不良导致钙的摄入减少。

C. 碱中毒：此症状多伴随呕吐出现，而非蛋白质-能量营养不良症伴腹泻，所以 C 为正确答案。

D. 低钠血症：由于钠-钾-ATP 酶的运转能力减弱，钠在细胞内滞留，易出现低血钠。

E. 脱水：蛋白质-能量营养不良症时，由于脂肪大量消耗，细胞外液容量增加，呈现水肿，易出现伴随腹泻的低渗性脱水。

### 3. 【答案】E

#### 【解析】

A. 头疼：头疼在缺血性和出血性脑梗塞中都可能出现，但不能作为鉴别的关键因素。

B. 意识障碍：意识障碍同样在两种脑梗塞中都可能出现，也不能作为鉴别的决定因素。

C. 脑电图：虽然脑电图可以反映大脑的电生理活动，但对于脑梗塞的类型鉴别不具有决定性作用。

D. 安静时突发：这是脑梗塞的一种常见表现，但无法区分是缺血性还是出血性脑梗塞。

E. 颅脑 CT：颅脑 CT 能够直观地显示脑部的结构和病变，是鉴别缺血性和出血性脑梗塞的最重要手段。

### 4. 【答案】A

#### 【解析】

选项 A：硬膜下血肿。根据病人的年龄、头部外伤史以及 CT 检查结果，这是最可能的诊断。硬膜下血肿的 CT 表现为新月形低密度影，与病例描述相符。

选项 B：硬膜外血肿。病人的症状和 CT 检查结果并不符合硬膜外血肿的典型表现，所以不太可能。

选项 C：脑出血。虽然病人有头痛和肢体无力的症状，但 CT 检查结果并不符合脑出血的典型表现，所以排除。

选项 D：脑水肿。病人的 CT 检查结果并不符合脑水肿的典型表现，所以排除。

选项 E：脑梗死。虽然病人有头痛和肢体无力的症状，但 CT 检查结果并不符合脑梗死的典型表现，所以排除。

## 5. 【答案】A

## 【解析】

选项 A：意识。正确答案。在急救过程中，首先应判断患者是否有意识，这是因为意识状况可以反映大脑的灌注情况，对于判断生命威胁的紧急情况至关重要。若患者无意识，可能存在心脏骤停等生命威胁的紧急情况。

选项 B：呼吸。错误选项。虽然呼吸是生命的重要指标，但在此情况下，首先应判断患者是否有意识。如果患者无意识，再进一步判断呼吸和脉搏。

选项 C：桡动脉搏动。错误选项。在急救过程中，桡动脉搏动的判断通常用于评估循环情况，但首先应判断患者是否有意识。

选项 D：血压。错误选项。血压是评估循环状态的重要指标，但在现场急救中，由于条件限制，不易快速准确测量血压，因此首先应判断患者是否有意识。

选项 E：股动脉搏动。错误选项。股动脉搏动的判断通常用于评估大血管的循环情况，但首先应判断患者是否有意识。

## 6. 【答案】B

## 【解析】

A. 骨髓活检：这是一种检查方法，主要用于诊断急性白血病、骨髓增生异常综合征、骨髓侵犯的淋巴瘤等疾病，对于再生障碍性贫血的诊断价值有限。

B. 骨髓细胞学检查：这是诊断再生障碍性贫血的主要方法。可以看到多部位骨髓增生重度减低，粒、红系及巨核细胞明显减少且形态大致正常，淋巴细胞及非造血细胞比例明显增高，骨髓小粒均空虚。

C. 血常规：这种检查方法可以看到全血细胞减少，但是缺乏特异性，不能明确诊断为再生障碍性贫血。

D. 外周血涂片：这种检查方法也可以看到全血细胞减少，但是同样缺乏特异性，不能明确诊断为再生障碍性贫血。

E. 脑脊液：这种检查方法主要用于神经系统疾病的诊断，对血液系统疾病的诊断价值有限。

## 7. 【答案】A

## 【解析】

A 选项：急性左心衰。根据题干描述，患者有明显的急性肺淤血体征，如双肺湿啰音和咳泡沫痰，这是由于左心衰竭导致血液回流到肺部引起的。同时，患者无下肢水肿的体征，进一步支持了急性左心衰的诊断。因此，A 选项是正确的。

B 选项：急性右心衰。右心衰竭主要表现为体循环淤血，如下肢水肿、颈静脉怒张等。题干中患者无下肢水肿的体征，因此，B 选项是错误的。

C 选项：全心衰。全心衰通常会同时出现左、右心衰竭的症状，包括肺淤血和下肢水肿。但是，题干中患者无下肢水肿的体征，因此，C 选项是错误的。

D 选项：慢性心衰。慢性心衰的症状通常是逐渐出现的，不会像题干中描述的那样急性发病。因此，D 选项是错误的。

E 选项：支气管扩张。支气管扩张主要症状为持续或反复的咳嗽、咳痰或咳脓痰，而非急性肺淤血体征。因此，E

选项是错误的。

8. 【答案】C

【解析】

选项 A: 前位椎体置换术是一种开放手术, 主要用于治疗脊柱肿瘤或严重的骨质破坏。对于本题中的老年女性患者, 由于她的骨折程度相对较轻, 且有骨质疏松的情况, 因此不适合进行这种大型手术。

选项 B: 经皮胸背段支架固定主要用于胸椎骨折或胸椎手术后限制胸椎活动。但对于这位患者, 由于她的骨折位置在 T12, 且骨折程度并未达到需要进行支架固定的程度, 因此这个选项也不适合。

选项 C: 经皮穿刺椎体成形术是一种微创手术, 常用于治疗骨质疏松性压缩性骨折。它通过在椎体内注入骨水泥来达到恢复椎体高度和稳定脊柱的效果。对于这位患者, 由于她的骨折程度和年龄, 以及保守治疗未能改善的情况, 这是最合适的治疗方法。

选项 D: 切开复位钢钉固定是一种较大的手术, 不适用于老年患者, 因为他们的身体可能无法承受手术的压力。

选项 E: 继续卧床制动是一种保守治疗, 但对于这位患者来说, 由于已经进行了一个月的保守治疗且病情没有改善, 因此需要考虑其他的治疗方法。

9. 【答案】A

【解析】

A. 退行性: 根据患者的年龄和长期高血压、糖尿病的病史, 结合主动脉瓣第二听诊区的舒张期吹风样递减型杂音, 推断为退行性主动脉瓣病变。瓣叶钙化导致主动脉瓣关闭不全。

B. 风湿性: 风湿性瓣膜病多合并主动脉瓣狭窄和二尖瓣病变, 病人通常有风湿热病史, 此处不符合。

C. 先天性: 先天性畸形多见于二叶式主动脉瓣、主动脉瓣穿孔、室间隔缺损伴主动脉瓣脱垂等, 此处不符合。

D. 感染性: 感染性瓣膜病多有前驱感染史, 此处不符合。

E. 自身免疫性: 自身免疫因素导致的瓣膜病多合并全身症状, 此处不符合。

10. 【答案】C

【解析】

选项 A: 感染性心内膜炎。错误。感染性心内膜炎最常见的症状为发热, 患者会有贫血、皮肤黏膜出血以及各脏器动脉栓塞引起的症状。本题中的病人并未表现出这些典型症状。

选项 B: 急性心梗。错误。急性心梗时常有相邻导联 ST 段弓背向上抬高, ST 改变的演进在数小时内发生, 范围通常不如心包炎时广泛。而本题中的病人心电图除 aVR 外, 多导联 ST 段弓背向下型抬高, 更符合急性心包炎的表现。

选项 C: 急性心包炎。正确。患者既往有上呼吸道感染病史, 心电图检查可见: 除 aVR 外, 多导联 ST 段弓背向下抬高, 听诊心前区抓刮样粗噪音, 这些都是急性心包炎的典型表现。

选项 D: 主动脉夹层。错误。主动脉夹层病人通常表现为前胸、后背或腹部突发性剧烈的撕裂样或刀割样锐痛, 疼痛可沿大动脉走行方向传导和转移至腹部或下腹部。本题中的病人并未表现出这些典型症状。

选项 E: 心肌梗死后综合征。错误。心肌梗死后综合征常在心肌梗死数周或数月后出现, 表现为心包炎、胸膜炎或肺炎, 有发热、胸痛等症状。本题中并未提及是否有心肌梗死病史。

## 11. 【答案】C

## 【解析】

选项 A: 正中神经损伤。如果是正中神经损伤, 会出现拇外展、对掌功能及拇、示指捏物功能丧失; 感觉障碍位于手掌桡侧半, 拇、示、中指和环指桡侧半, 拇指指间关节和示、中指及环指桡侧半近侧指间关节以远的背面。但题干中未提到这些症状, 所以此选项不正确。

选项 B: 缺血性肌挛缩。这种情况通常在较短时间或程度严重的不完全缺血后大部分肌肉坏死, 形成挛缩畸形, 严重影响病肢功能。但题干中未提到这样的症状, 所以此选项不正确。

选项 C: 肱动脉损伤。这是正确答案。因为题干中提到右手掌着地, 右肘部肿胀, 肘后三角正常, 骨皮质不连续(骨折), 最可能的诊断为伸直型肱骨髁上骨折。在肱骨髓内、前方, 有肱动脉、正中神经经过。一旦发生骨折, 神经血管容易受到损伤。患儿手指皮肤苍白发凉, 最可能是骨折近端向前移位损伤肱动脉, 导致手部血运障碍。

选项 D: 骨筋膜室综合征。这是由骨、骨间膜、肌间隔和深筋膜形成的骨筋膜室内肌肉和神经因急性缺血而产生的一系列早期综合征。但题干中未提到这样的症状, 所以此选项不正确。

选项 E: 桡神经损伤。如果是桡神经损伤, 主要以感觉障碍为主。但题干中未提到这样的症状, 所以此选项不正确。

## 12. 【答案】A

## 【解析】

A. 慢性前列腺炎: 患者的年龄、性别和症状(尿频尿急尿痛, 尿道口滴白, 会阴部胀痛, 下腹按压痛、无反跳痛)都符合慢性前列腺炎的典型表现, 因此这是正确答案。

B. 泌尿系结核: 这种疾病通常伴有终末血尿, 但患者并没有这个症状, 所以这个选项不正确。

C. 膀胱炎: 虽然膀胱炎也会引起尿频尿急尿痛, 但该病常见于女性, 且症状发病突然, 患者的症状持续时间较长, 不符合膀胱炎的特点, 故此选项不正确。

D. 肾癌: 肾癌的常见症状为间歇无痛肉眼血尿, 但患者并未出现此症状, 所以此选项不正确。

E. 膀胱结石: 膀胱结石的典型症状为排尿突然中断, 疼痛放射至远端尿道及阴茎头部, 伴排尿困难和膀胱刺激症状。

## 13. 【答案】B

## 【解析】

选项 A: 理疗。对于冻结肩, 早期给予理疗、针灸、适度的推拿按摩, 可以改善症状。所以此选项是正确的。

选项 B: 肩关节固定。冻结肩的治疗中, 无论病程长短, 症状轻重, 均应每日进行肩关节的主动活动, 活动以不引起剧痛为限。所以此选项是错误的, 为本题的正确答案。

选项 C: 热敷。热敷可以改善肩周炎的症状, 所以此选项是正确的。

选项 D: 消炎。疼痛持续、夜间难以入睡时, 可短期服用非留体抗炎药。所以此选项是正确的。

选项 E: 锻炼。无论病程长短, 症状轻重, 均应每日进行肩关节的主动活动, 活动以不引起剧痛为限。所以此选项是正确的。

## 14. 【答案】B



## 【解析】

- A. 慢性肝炎导致肝硬化：通常会有特征性的“假小叶”现象，但该患者超声检查并未发现此现象，且血常规显示白细胞计数和中性粒细胞百分比升高，提示感染可能性大。
- B. 肝脓肿：患者有持续高热和肝区疼痛，超声检查发现肝区多发小结节，血常规显示白细胞计数和中性粒细胞百分比升高，肝穿刺见脓细胞和脓球，这些都是肝脓肿的典型表现。
- C. 亚急性重症肝炎：起病急，常以急性黄疸型肝炎起病，15日至26周内出现极度乏力、食欲减退等消化道症状，而该患者的症状并不符合。
- D. 肝细胞癌：起病隐匿，早期缺乏典型症状，一旦出现症状和体征，疾病多已进入中晚期，而该患者的症状并不符合。
- E. 肝胆管细胞癌：沿胆道浸润生长，确诊时可能已发生肝内转移、淋巴结转移，但该患者的超声检查并未发现此现象。

## 15. 【答案】E

## 【解析】

- A. 静脉注射胺碘酮：胺碘酮主要用于治疗室性心律失常，但在此种情况下，由于患者血压低，应优先考虑电复律。
- B. 静脉注射利多卡因：利多卡因也是一种抗心律失常药物，但同样在此种情况下，应优先考虑电复律。
- C. 静脉注射西地兰：西地兰是一种强心药，用于治疗心力衰竭，但不能解决此时的心动过速问题。
- D. 静脉注射维拉帕米：维拉帕米主要用于治疗室上性心律失常，但在此种情况下，应优先考虑电复律。
- E. 同步直流电复律：对于存在严重血流动力学障碍的恶性心律失常，同步直流电复律是最有效的紧急处理方法。

## 16. 【答案】C

## 【解析】

- A. 抗生素治疗：抗生素主要用于抑制或杀灭细菌，对于HIV病毒无效，所以选项A不正确。
- B. 免疫球蛋白治疗：免疫球蛋白主要用于提高机体的免疫力，对于已经进入体内的HIV病毒无法直接抵抗，所以选项B不正确。
- C. 抗病毒药治疗：医生在手术过程中可能接触到患者的血液，如果患者是HIV阳性，医生就有感染HIV的风险。此时，医生需要采取抗病毒药物治疗，以抑制病毒复制，降低感染风险，所以选项C是正确答案。
- D. 输液：在这种情况下，输液并不能有效防止HIV的感染，所以选项D不正确。
- E. 观察：仅仅观察并不能有效防止HIV的感染，所以选项E不正确。

## 17. 【答案】B

## 【解析】

- 选项A：复方倍他米松注射液是一种糖皮质激素，虽然可以治疗痛风，但副作用较大，长期使用可导致“满月脸、水牛背、骨质疏松”等症状。
- 选项B：秋水仙碱是治疗急性痛风首选药物，其治疗效果好且不良反应少，48小时内使用效果更好。
- 选项C：甲氨蝶呤为二氢叶酸还原酶抑制药，多用于治疗儿童急性白血病和绒毛膜上皮癌，与本题无关。

选项 D: 苯溴马隆可以用来治疗原发性高尿酸血症, 主要促进尿酸的排泄, 但禁用于肾功能不全及有肾结石患者。

选项 E: 非布司他主要用于发作间歇期和慢性期的处理, 而非急性期。

18. 【答案】A

【解析】

A. Buerger 实验阳性: Buerger 实验是用来检测动脉供血障碍的。在此例中, 患者抬高下肢后皮肤苍白, 放下后颜色恢复, 说明存在动脉供血障碍, 因此 Buerger 实验阳性。

B. Trendelenburg 实验阳性: Trendelenburg 试验主要用于检查大隐静脉瓣膜功能。在此例中, 没有描述关于静脉瓣膜功能的相关信息, 所以不能得出 Trendelenburg 实验阳性。

C. Lasegue 实验阳性: Lasegue 实验主要用于诊断坐骨神经痛, 该试验在抬高下肢时会产生疼痛。在此例中, 没有描述关于坐骨神经痛的相关症状, 所以不能得出 Lasegue 实验阳性。

D. Perthes 实验阳性: Perthes 实验主要用于检查深静脉阻塞。在此例中, 没有描述关于深静脉阻塞的相关症状, 所以不能得出 Perthes 实验阳性。

E. Pratt 实验阳性: Pratt 试验主要用于检查交通静脉瓣膜功能。在此例中, 没有描述关于交通静脉瓣膜功能的相关信息, 所以不能得出 Pratt 实验阳性。

19. 【答案】B

【解析】

A. 结核性脑膜炎: 通常伴有系统中毒症状, 脑脊液蛋白质显著增高, 结核菌素试验阳性。本题中年男性病例的表现与此不符, 故排除。

B. 单纯疱疹病毒性脑炎: 主要表现为口唇疱疹、发热、神经系统症状, 脑脊液检查提示淋巴细胞增多、蛋白升高、糖含量正常, 与本题病例表现一致, 故选择此项。

C. 化脓性脑膜炎: 主要表现为颈项强直, Kernig 征和 Brudzinski 征阳性, 脑脊液以中性粒细胞升高为主, 蛋白质升高, 糖含量下降, 与本题病例表现不符, 故排除。

D. 中毒性脑膜炎: 无明确的病理生理机制, 一般不作为首选诊断, 故排除。

E. 乙型脑炎: 病程长, 脑脊液中白细胞计数的高低与预后无关, 病初 2~5 天以中性粒细胞为主, 以后则以淋巴细胞为主。蛋白轻度增高, 糖正常或偏高, 与本题病例表现不符, 故排除。

20. 【答案】C

【解析】

A 选项: 腹股沟斜疝多发生于儿童及青壮年, 外形椭圆或梨形, 上部呈蒂柄状, 此选项不符合题干描述, 故排除。

B 选项: 股疝多见于 40 岁以上妇女, 平卧回纳内容物后, 疝块有时不能完全消失, 此选项不符合题干描述, 故排除。

C 选项: 腹股沟直疝多见于老年男性, 且疝块可按压回纳, 放手又复出, 这与题干中的描述相符, 故此为正确答案。

D 选项: 切口疝是发生于腹壁手术切口处的疝, 本题中患者未提及是否有手术史, 故此选项不符合题干描述, 排除。

E 选项: 脂肪瘤为正常脂肪样组织的瘤状物, 好发于四肢、躯干。境界清楚, 呈分叶状, 质软可有假囊性感、无痛。

生长缓慢，但可达巨大体积。此选项不符合题干描述，排除。

21. 【答案】A

【解析】

选项 A：维生素 B<sub>1</sub>。Wernicke 脑病是由于缺乏维生素 B<sub>1</sub>引起的，主要表现为突然发作的神经系统功能障碍，如眼外肌麻痹、精神异常及共济失调等。因此，选项 A 是正确的。

选项 B：维生素 B。这是一个较大的维生素类别，包括了多种维生素 B，但并不是所有的维生素 B 都会导致 Wernicke 脑病，所以选项 B 是错误的。

选项 C：维生素 B<sub>6</sub>。维生素 B<sub>6</sub> 缺乏主要表现为肢体的远端出现感觉丧失无力，或者是腱反射的减低，可以表现为肢端烧灼感或者感觉出现障碍。这与 Wernicke 脑病的症状不符，所以选项 C 是错误的。

选项 D：维生素 A。维生素 A 缺乏主要表现为夜盲症、皮肤干燥等症状，这与 Wernicke 脑病的症状不符，所以选项 D 是错误的。

选项 E：维生素 C。维生素 C 缺乏主要导致坏血病，这与 Wernicke 脑病的症状不符，所以选项 E 是错误的。

22. 【答案】A

【解析】

A. 急性脊髓炎：此病常在上呼吸道感染后出现，以低热、脊椎疼痛、胸段以下瘫痪为主要症状，与题干描述一致，故此选项正确。

B. 脊髓压迫症：该病的典型症状是瘫痪、肢体感觉障碍、大小便失禁，部分患者会出现疼痛、肌肉不自主抖动等伴随症状。题干中并未提及这些症状，故此选项错误。

C. 周期性瘫痪：常有甲亢、原发性醛固酮增多症等早期疾病，题干中并未提及这些病史，故此选项错误。

D. 重症肌无力：表现为极易疲劳、眼睑下垂、复视、抬头、抬手困难、吞咽困难等症状，严重者累及呼吸肌造成呼吸衰竭，发生全身型重症肌无力危象。题干中并未提及这些症状，故此选项错误。

E. 放射性脊髓病：表现为患者接受放射治疗后，与放射治疗位置大致一致的部位出现轻微的感觉异常，如颈肩部放射性疼痛、手足麻木、蚁走感等，对外界的刺激反应过度灵敏、迟钝或错乱等，均提示患者可能存在早期放射性脊髓病。题干中并未提及病人有接受过放射治疗的病史，故此选项错误。

23. 【答案】C

【解析】

选项 A：140/90mmHg。这是一般高血压患者的血压控制目标，但对于合并慢性阻塞性肺疾病的高血压患者，这个血压水平可能过高，所以选项 A 不正确。

选项 B：150/90mmHg。这个血压值对于高血压患者而言明显偏高，尤其是对于合并慢性阻塞性肺疾病的高血压患者，更是不能接受的血压控制目标，所以选项 B 不正确。

选项 C：130/80mmHg。根据《高血压实践指南》，合并慢性阻塞性肺疾病的高血压患者，血压控制目标应在 130/80mmHg 以下，所以选项 C 是正确答案。

选项 D：140/80mmHg。虽然这个血压值的收缩压控制较好，但舒张压相较于指南推荐的目标值偏高，因此选项 D



不正确。

选项 E: 130/90mmHg。虽然这个血压值的收缩压控制较好, 但舒张压相较于指南推荐的目标值偏高, 因此选项 E 不正确。

24. 【答案】E

【解析】

A. 肾上腺素是心肺复苏的首选药物, 主要用于电击无效的室颤、无脉室速、心脏停搏或无脉性电生理活动。在这个病例中, 虽然患者经历了心脏骤停, 但已经通过心肺复苏恢复, 因此肾上腺素不是首选治疗药物。

B. 去甲肾上腺素和 D. 多巴胺都可以用于治疗严重的低血压。但在这个病例中, 患者的主要问题是心率过慢, 而这两种药物并不能有效地提高心率。

C. 异丙肾上腺素主要用于治疗一些难治性的室性心律失常, 如多形性室速、尖端扭转型室速、快速单形性室速或室扑以及难治性室颤。在这个病例中, 患者的心律失常表现为心率过慢, 因此异丙肾上腺素也不适用。

E. 阿托品是治疗缓慢型心律失常的首选药物, 可以通过阻断副交感神经来增加心率, 因此是这个病例的首选治疗药物。

25. 【答案】A

【解析】

A.  $\beta$  受体阻滞剂:  $\beta$  受体阻滞剂是梗阻性肥厚型心肌病的一线治疗用药, 可以改善心室松弛, 减轻左心室流出道梗阻。因此, 选项 A 是正确的。

B. 硝酸甘油: 硝酸甘油主要用于冠心病心绞痛的治疗及预防, 也可用于降低血压或治疗充血性心力衰竭, 但对梗阻性肥厚型心肌病的左心室流出道梗阻无明显效果, 所以选项 B 是错误的。

C. 地高辛: 地高辛适用于高血压、瓣膜性心脏病、先天性心脏病等急性和慢性心功能不全, 尤其适用于伴有快速心室率的心房颤动的心功能不全。然而, 对于梗阻性肥厚型心肌病的左心室流出道梗阻治疗效果有限, 因此选项 C 是错误的。

D. 异丙肾上腺素: 异丙肾上腺素主要用于治疗心源性或感染性休克, 完全性房室传导阻滞、心搏骤停等, 对梗阻性肥厚型心肌病的左心室流出道梗阻治疗效果不明显, 所以选项 D 是错误的。

E. 去甲肾上腺素: 去甲肾上腺素适用于治疗急性心肌梗死、体外循环等引起的低血压, 对血容量不足所致的休克、低血压或嗜铬细胞瘤切除后的低血压, 作为急救时补充血容量的辅助治疗。然而, 对于梗阻性肥厚型心肌病的左心室流出道梗阻治疗效果有限, 因此选项 E 是错误的。

26. 【答案】A

【解析】

选项 A: 跖屈位。正确答案。在跖屈位(脚尖向下)时, 距骨较窄的后部进入关节窝, 此时踝关节稳定性较差, 容易发生损伤。

选项 B: 背屈位。错误答案。在背屈位(脚尖向上)时, 距骨较宽的前部进入关节窝, 此时踝关节稳定性较好。

选项 C: 内翻位。错误答案。内翻位是指脚尖向内翻, 这种体位并不直接影响踝关节的稳定性。

选项 D：外翻位。错误答案。外翻位是指脚尖向外翻，这种体位并不直接影响踝关节的稳定性。

选项 E：中立位。错误答案。中立位是指脚尖既不向内翻也不向外翻，这种体位并不直接影响踝关节的稳定性。

27. 【答案】B

【解析】

A 选项：伸直，外展，外旋畸形。这个选项是错误的，因为髌关节前脱位时，患者的下肢通常会呈现屈曲、外旋、外展畸形，而不是伸直、外展、外旋畸形。

B 选项：屈曲，外旋，外展畸形。这个选项是正确的，髌关节前脱位时，最典型的临床表现就是屈曲、外旋、外展畸形。

C 选项：屈曲，内收，内旋畸形。这个选项是错误的，这种表现更符合髌关节后脱位的临床表现。

D 选项：伸直，外展，内收畸形。这个选项是错误的，这种表现并不符合髌关节前脱位的临床表现。

E 选项：屈曲，内收，外旋畸形。这个选项是错误的，这种表现也并不符合髌关节前脱位的临床表现。

28. 【答案】E

【解析】

选项 A：符合肾小球源性血尿的特点，红细胞管型是由于红细胞通过肾单位时形成的。

选项 B：符合肾小球源性血尿的特点，通常全程无痛。

选项 C：符合肾小球源性血尿的特点，常伴有蛋白尿。

选项 D：符合肾小球源性血尿的特点，红细胞因通过肾小球基底膜而变形。

选项 E：不符合肾小球源性血尿的特点，肾小球源性血尿的红细胞形态不均一，变形红细胞为主，而非均一性。

29. 【答案】D

【解析】

A. 阻断 M 受体：这是错误的。虽然阻断 M 受体可以舒张支气管平滑肌，但这是异丙托溴铵、噻托溴铵等药物的作用机制，不是氨茶碱的。

B. 激动  $\beta$  受体：这也是错误的。激动  $\beta$  受体确实可以舒张支气管平滑肌，但这是沙丁胺醇、沙美特罗等药物的作用机制，不是氨茶碱的。

C. 激动腺苷受体：这是错误的。氨茶碱的作用机制是抑制磷酸二酯酶，而不是激动腺苷受体。

D. 抑制磷酸二酯酶：这是正确的。氨茶碱是一种茶碱类药物，其主要作用机制就是通过抑制磷酸二酯酶，增加细胞内 cAMP 或 cGMP 的浓度，从而导致支气管平滑肌的舒张。

E. 激活鸟苷酸环化酶：这是错误的。氨茶碱的作用机制是抑制磷酸二酯酶，而不是激活鸟苷酸环化酶。

30. 【答案】D

【解析】

A. 一过性晕厥和黑朦不适：这是一种常见的症状，可以在许多疾病中出现，如直立性低血压、急性心肌梗死等，因此它不能特异性地指向梗阻性肥厚型心肌病。

B. 心电图提示左室高电压与 T 波倒置，有病理性 Q 波：这些心电图表现可能在心肌梗死中出现，但并非梗阻性肥

厚型心肌病的特征。

- C. 感胸闷不适：这是一种非特异性的症状，不能作为诊断梗阻性肥厚型心肌病的依据。
- D. 超声心动图示舒张期室间隔与左室后壁厚度之比 $>1.5$ ，二尖瓣前叶收缩期向前运动：这是梗阻性肥厚型心肌病的重要诊断依据。超声心动图可以显示出心室不对称肥厚而无心室腔增大，这是该病的特征。
- E. 可闻及胸骨左缘2~4肋间舒张期杂音：这是流出道梗阻的病人可能出现的症状，但其为喷射性收缩期杂音，而非舒张期杂音。

31. 【答案】B

【解析】

- A. 肾衰竭型：虽然肾衰竭是一种严重的并发症，但在钩端螺旋体病中，单纯的肾衰竭型较少见，通常是与黄疸出血型并存，而且黄疸出血型的肾损害最为突出。所以A选项不正确。
- B. 黄疸出血型：这是钩端螺旋体病的一种严重型态，病情重，进展快，且肾损害最为突出，是主要的死亡原因。所以B选项正确。
- C. 肺出血型：虽然肺出血型也是钩端螺旋体病的一种严重型态，但其主要死亡原因是肺出血导致的缺氧，而非肾衰竭。所以C选项不正确。
- D. 单纯型：单纯型的病情相对较轻，不会导致肾衰竭，所以D选项不正确。
- E. 脑膜脑炎型：虽然脑膜脑炎型的病情严重，但其主要死亡原因是脑部并发症，而非肾衰竭。所以E选项不正确。

32. 【答案】B

【解析】

- A. 横形骨折：指的是骨折线与骨长轴成直角的骨折。属于完全性骨折。
- B. 裂缝骨折：骨折线不穿过整个骨头，只有部分骨质破裂，属于不完全性骨折。
- C. 压缩性骨折：多发生在椎体，由于外力作用使骨体受压缩而产生的骨折。属于完全性骨折。
- D. 螺旋形骨折：指的是骨折线沿骨长轴螺旋上升的骨折。属于完全性骨折。
- E. 嵌插骨折：指的是骨折端相互嵌入的骨折。属于完全性骨折。

33. 【答案】D

【解析】

- A. 光荣献血制度：错误。虽然献血是一种光荣的行为，但我国提倡的献血制度是无偿献血制度。
- B. 义务献血制度：错误。我国并没有将献血定为公民的义务，而是鼓励无偿献血。
- C. 强制献血制度：错误。我国并未实行强制献血制度，而是基于自愿原则的无偿献血制度。
- D. 无偿献血制度：正确。我国提倡的就是无偿献血制度，这是为了保证血液的安全和血源的稳定。
- E. 自愿献血制度：错误。虽然无偿献血制度是基于自愿原则的，但更强调的是无偿的部分。

34. 【答案】B

【解析】

选项A：错误。裂头蚴是引起裂头蚴病的寄生虫，而非囊尾蚴病。

选项 B：正确。囊尾蚴病主要是由于摄入了猪带绦虫卵导致的。猪带绦虫卵在人体内孵化为囊尾蚴，进一步发育并在人体内形成囊肿。

选项 C：错误。猪带绦虫幼虫不具有传染性，但具有致病性，不是囊尾蚴病的直接原因。

选项 D：错误。牛带绦虫幼虫是肠绦虫病的主要感染源，与囊尾蚴病无关。

选项 E：错误。摄入牛带绦虫卵会引起肠绦虫病，而非囊尾蚴病。

35. 【答案】A

【解析】

A. 甲氨蝶呤是一种细胞毒类抗肿瘤药，它通过抑制二氢叶酸还原酶来阻止 DNA 的合成和修复，从而抑制肿瘤细胞的生长。但是，它并不直接针对特定的分子靶点，所以不属于肿瘤靶向药物。

B. 全反式维 A 酸是一种肿瘤靶向药物，它通过调节细胞分化和凋亡来抑制肿瘤的生长。

C. HER-2 是一种肿瘤靶向药物，它通过结合到 HER-2 蛋白上，阻断相关的信号通路，从而抑制肿瘤细胞的增殖。

D. 硼替佐米是一种肿瘤靶向药物，它通过阻断微管的聚合和解聚，从而抑制肿瘤细胞的分裂和生长。

E. 利妥昔单抗是一种肿瘤靶向药物，它通过结合到 HER-2 蛋白上，阻断相关的信号通路，从而抑制肿瘤细胞的增殖。

36. 【答案】E

【解析】

A. 红霉素是大环内酯类抗生素，其主要作用对象是 G<sup>+</sup>菌，对铜绿假单胞菌（G<sup>-</sup>杆菌）的抗菌作用不强。

B. 青霉素是 β-内酰胺类抗生素，虽然对一些 G<sup>-</sup>杆菌有较强作用，但对铜绿假单胞菌的效果并不理想。

C. 美西律是抗心律失常药，主要用于治疗室性心律失常，与抗菌治疗无关。

D. 甲氧苄啶（二氢还原酶抑制剂）主要用于治疗呼吸道感染、老年性慢性支气管炎等，对铜绿假单胞菌的效果并不明显。

E. 头孢他啶是第三代头孢菌素，对铜绿假单胞菌及厌氧菌有较强作用，对 β-内酰胺酶有较高的稳定性。它是治疗危及生命的败血症、脑膜炎、肺炎、骨髓炎及尿路严重感染的首选药物。

37. 【答案】D

【解析】

A. 尿路结石：尿路梗阻可能导致尿路结石，但这并不是最严重的并发症。

B. 尿路感染：尿路梗阻可能引发尿路感染，但相比肾衰竭，其严重性较小。

C. 尿路积水：尿路梗阻可能导致尿路积水，但这只是初级阶段的并发症，严重程度没有肾衰竭高。

D. 肾衰竭：下尿路梗阻持续时间长，膀胱压力过高，尿液反流至肾脏，可能引发肾功能障碍，最终导致肾衰竭。这是最严重的并发症。

E. 尿外渗：尿路梗阻可能导致尿外渗，但严重程度没有肾衰竭高。

38. 【答案】C

【解析】

- A. 肾上腺髓质细胞：肾上腺髓质细胞分泌儿茶酚胺类激素，如肾上腺素和去甲肾上腺素，这些激素在机体的应急反应中起重要作用，因此具有内分泌功能。
- B. 甲状旁腺主细胞：甲状旁腺主细胞分泌甲状旁腺素，这种激素能调节血钙浓度，因此具有内分泌功能。
- C. 胰腺导管细胞：胰腺导管细胞主要负责分泌含有碱性物质和电解质的胰液，属于胰腺的外分泌功能，因此不具有内分泌功能。
- D. 甲状腺滤泡上皮细胞：甲状腺滤泡上皮细胞分泌甲状腺激素，这种激素能调节机体的新陈代谢和生长发育，因此具有内分泌功能。
- E. 睾丸间质细胞：睾丸间质细胞分泌雄激素，这种激素能调节男性的二次性特征和精子的生成，因此具有内分泌功能。

39. 【答案】E

【解析】

- A. 室间隔内侧壁：这是心脏的一部分，但在感染性心内膜炎合并心衰的情况下，它并非最常损伤的部位，所以选项 A 错误。
- B. 二尖瓣：虽然二尖瓣在某些心脏疾病中可能会受到损伤，但在感染性心内膜炎合并心衰的情况下，二尖瓣并非最常损伤的部位，所以选项 B 错误。
- C. 三尖瓣：同样，三尖瓣也不是感染性心内膜炎合并心衰最常损伤的部位，所以选项 C 错误。
- D. 肺动脉瓣：肺动脉瓣在感染性心内膜炎合并心衰的情况下，也并非最常损伤的部位，所以选项 D 错误。
- E. 主动脉瓣：主动脉瓣是感染性心内膜炎合并心衰最常损伤的部位，所以选项 E 正确。

40. 【答案】A

【解析】

- A 选项：生理性或结构性异常，应力均匀。这个选项是错误的，因为当存在生理性或结构性异常时，应力分布通常不会均匀。这种不均匀的应力分布可能导致某些部位过度负荷，从而引发慢性损伤。
- B 选项：操作技术不熟练。这个选项是正确的，操作技术不熟练可能导致不正确的动作和姿势，这可能增加特定部位的应力，进而引发慢性损伤。
- C 选项：长期慢性损伤。这个选项是正确的，长期的慢性损伤是运动系统慢性损伤的一个重要原因。
- D 选项：超越人体局部代偿。这个选项是正确的，当身体的某一部位超越了其代偿能力，就可能导致损伤。
- E 选项：急性损伤后未得到正确的康复。这个选项是正确的，如果急性损伤后没有得到正确的康复，可能转变为慢性损伤。

41. 【答案】C

【解析】

- 选项 A：甲状腺肿大并不是甲状腺毒症的特征，因为其他如甲亢、甲状腺癌等疾病也可能导致甲状腺肿大。
- 选项 B：在甲状腺毒症中，血液中的 T3 和 T4 会升高，但由于甲状腺细胞的摄碘功能减低，所以碘 131 的摄取率不会升高，而是会降低。



选项 C: 这是正确答案。在甲状腺毒症中, 由于甲状腺滤泡被炎症破坏, 储存的甲状腺激素会释放到血液中, 导致血液中的 T3 和 T4 升高。同时, 甲状腺细胞的摄碘功能会减低, 导致碘 131 的摄取率降低。

选项 D: 在甲状腺功能亢进的情况下, TSH 会显著降低, 而非甲状腺毒症。

选项 E: 在桥本氏甲状腺炎中, 甲状腺功能是正常的, 但 TgAb 与 TPOAb 的滴度会明显升高。

42. 【答案】C

【解析】

- A. 骨髓纤维化早期骨髓有核细胞显著增生, 特别是粒系和巨核细胞, 外周血中性粒细胞碱性磷酸酶可呈阳性结果, 所以选项 A 错误。
- B. 细菌性肺炎时, 血白细胞计数升高, 中性粒细胞多在 80% 以上, 并有核左移, NAP 可呈阳性, 所以选项 B 错误。
- C. 慢性髓系白血病的 NAP 活性明显降低, 积分值常为 0, 因此选项 C 正确。
- D. 急性淋巴细胞白血病的 NAP 多增高, 所以选项 D 错误。
- E. 类白血病反应的 NAP 活性极度增高, 所以选项 E 错误。

43. 【答案】C

【解析】

- A. ABC, 表示“开放气道-人工呼吸-胸外按压”的顺序, 这在过去是心肺复苏的标准步骤, 但已被新的指南所取代, 因此此选项不正确。
- B. ACB, 表示“开放气道-胸外按压-人工呼吸”的顺序, 虽然开放气道是重要的, 但现在的指南强调首先进行胸外按压, 因此此选项不正确。
- C. CAB, 表示“胸外按压-开放气道-人工呼吸”的顺序, 这是现行的心肺复苏指南推荐的步骤, 因此此选项正确。
- D. CBA, 表示“胸外按压-人工呼吸-开放气道”的顺序, 这与现行的心肺复苏指南不符, 因此此选项不正确。
- E. BAC, 表示“人工呼吸-开放气道-胸外按压”的顺序, 这与现行的心肺复苏指南不符, 因此此选项不正确。

44. 【答案】B

【解析】

- 选项 A: 脉率 > 90 次/分。这个条件并不能确定休克失代偿期, 因为休克失代偿期的脉率通常会大于 100 次/分, 所以选项 A 是错误的。
- 选项 B: 收缩压 < 90mmHg。这是休克失代偿期的一个重要诊断条件, 当收缩压降至 90mmHg 以下时, 标志着病人已经进入休克失代偿期, 所以选项 B 是正确的。
- 选项 C: 脉压 < 20mmHg。虽然脉压可以作为休克的监测指标, 但通常认为收缩压 < 90mmHg、脉压 < 20mmHg 是休克存在的表现, 并不能确定是休克失代偿期, 所以选项 C 是错误的。
- 选项 D: 谵妄。休克失代偿期时, 患者神志尚清楚, 表情淡漠, 不会出现谵妄, 所以选项 D 是错误的。
- 选项 E: 四肢末梢皮肤湿冷。虽然休克失代偿期可能出现四肢厥冷, 但并不一定会出现四肢末梢湿冷, 所以选项 E 是错误的。

45. 【答案】D

## 【解析】

选项 A: 10 小时, 不足以达到稳态血药浓度, 因为需要经过 4-5 个半衰期, 每个半衰期为 8 小时。

选项 B: 20 小时, 不足以达到稳态血药浓度, 同理。

选项 C: 30 小时, 虽然超过了 4 个半衰期, 但还未到达 5 个半衰期, 所以不完全正确。

选项 D: 40 小时, 符合 4-5 个半衰期的规律, 是正确答案。

选项 E: 50 小时, 超过了 5 个半衰期, 不符合一级动力学消除的药物达到稳态血药浓度所需的时间。

## 46. 【答案】C

## 【解析】

A 选项: 开始运动时心前区疼痛, 行走 5 分钟后缓解。这种情况可能是由于运动初期, 心脏对氧气需求增加, 但血液供应未能及时跟上引起的疼痛, 随着行走时间的增加, 血液循环改善, 疼痛缓解。这并非稳定型心绞痛的典型表现。

B 选项: 搬重物感心前区针刺样疼痛, 伴呼吸困难。这种情况可能是心肌梗死的表现, 尤其是伴有呼吸困难, 应该立即就医。这不符合稳定型心绞痛的特点。

C 选项: 骑自行车上坡时感心前区疼痛, 休息 5 分钟自行缓解。这是稳定型心绞痛的典型表现, 发作时常因体力劳动或情绪激动, 休息后可自行缓解。

D 选项: 夜间呼吸困难, 坐位缓解。这种情况多考虑为左心衰竭, 患者在平卧位时, 由于肺部充血而出现呼吸困难, 坐位后症状缓解。这不符合稳定型心绞痛的特点。

E 选项: 休息时, 突发心前区针扎样刺痛, 持续半小时左右, 服用硝酸甘油后缓解。这是静息型心绞痛的表现, 发作时无明显诱因, 疼痛持续时间较长, 需要药物缓解。

## 47. 【答案】A

## 【解析】

选项 A: 高龄。顽固性高血压或难治性高血压在人群中较为常见, 原因可能与老年人的生理特点有关, 如动脉硬化、肾功能下降等。因此, 答案 A 是正确的。

选项 B: 遗传。虽然遗传因素对高血压的发生有一定影响, 但并不是顽固性高血压最常见的原因。

选项 C: 病程长。病程的长短对高血压的控制有一定影响, 但并非顽固性高血压最常见的原因。

选项 D: 体位性。体位性高血压指的是由于体位改变而导致的血压变化, 这并非顽固性高血压最常见的原因。

选项 E: 未规律服药。不规律服药可能导致血压无法得到有效控制, 但并非顽固性高血压最常见的原因。

## 48. 【答案】D

## 【解析】

A. 查血浆浓度和尿渗透压: 虽然这两个指标在尿崩症的诊断中有一定的参考价值, 但并不能明确区分中枢性尿崩和肾性尿崩。

B. 查尿渗透压和尿钠: 这两个指标主要用于评估肾脏的排泄功能和浓缩能力, 但同样无法明确鉴别中枢性尿崩和肾性尿崩。



C. 禁饮水实验：此实验可以观察患者在禁水情况下尿液的浓缩能力，但在鉴别中枢性尿崩和肾性尿崩方面，其效果并不明显。

D. 加压素实验：加压素实验是鉴别中枢性尿崩和肾性尿崩的主要方法。中枢性尿崩症患者注射加压素后，尿渗透压会进一步升高；而肾性尿崩症患者注射加压素后，尿渗透压无反应。因此，此选项为正确答案。

E. 测定尿渗透压和比重：虽然尿渗透压和比重的测定在诊断尿崩症中有一定的参考价值，但并不能明确区分中枢性尿崩和肾性尿崩。

49. 【答案】E

【解析】

A. 超声心动图：UA 和 NSTEMI 在超声心动图检查结果上相似，不能作为鉴别点，故 A 错误。

B. ST 段抬高：两者都可能出现 ST 段抬高，但区别在于 NSTEMI 可表现为心电图动态改变持续 12 小时以上，故 B 错误。

C. 冠状动脉造影：虽能鉴别是继发于稳定型心绞痛的 UA 还是新发作的 UA，但不是本题考察的鉴别 UA 和 NSTEMI 的关键点，故 C 错误。

D. 持续时间：UA 和 NSTEMI 的病因和临床表现相似，故持续时间无太大区别，故 D 错误。

E. 肌钙蛋白：UA 和 NSTEMI 的主要鉴别依靠心脏标志物检查（心脏肌钙蛋白）。若在症状发生后的 24 小时内，肌钙蛋白的峰值超过正常对照值的 99 个百分位需考虑 NSTEMI 的诊断，故 E 正确。

50. 【答案】E

【解析】

A. 胃肠：一氧化碳中毒不直接损伤胃肠，此选项错误。

B. 肝：虽然肝脏是人体的重要代谢器官，但在一氧化碳中毒中，其并不是主要受损的器官，此选项错误。

C. 肺：一氧化碳通过呼吸进入人体，虽然经过肺部，但肺部并不是其主要损伤的器官，此选项错误。

D. 肾：肾脏主要负责排泄代谢废物，对于一氧化碳中毒，其并不是主要受损的器官，此选项错误。

E. 脑：一氧化碳中毒主要影响脑部，由于一氧化碳与血红蛋白结合形成 COHb，影响氧气的运输，导致脑部缺氧，所以此选项正确。

51. 【答案】D

【解析】

A. 无需用药，择期手术。这个选项是错误的，因为患者有风湿性心脏病和感染性心内膜炎的病史，拔牙可能导致口腔链球菌进入血液，引发感染性心内膜炎的复发。因此，患者需要预防性地使用抗生素。

B. 术前抗风湿治疗三个月。这个选项也是错误的，因为患者目前没有风湿性心脏病的活动，不需要进行抗风湿治疗。

C. 术前三个月行瓣膜置换手术。这个选项是错误的，因为患者目前没有瓣膜疾病的症状，不需要进行瓣膜置换手术。

D. 术前口服阿莫西林。这个选项是正确的，因为阿莫西林可以有效预防口腔链球菌引发的感染性心内膜炎。

E. 术前加强强心、利尿、扩血管治疗。这个选项是错误的，因为患者目前没有心脏衰竭的症状，不需要进行强心、利尿、扩血管治疗。

52. 【答案】C

【解析】

A. 经尿道膀胱肿瘤内切术：该选项主要用于治疗膀胱肿瘤，但根据题干描述，患者并未出现明显的肿瘤相关症状，因此这个选项不正确。

B. 经尿道前列腺切除术：这是治疗前列腺疾病的常见手术，但患者的症状并不符合前列腺疾病，所以这个选项也不正确。

C. 经尿道膀胱结石碎石术：根据患者的症状，如排尿困难、间断血尿等，最有可能的诊断是膀胱结石，所以这个选项是正确的。

D. 抗结核治疗：如果患者有结核病的症状，这个选项才可能是正确的，但根据题干描述，患者并未出现结核病的典型症状，因此这个选项不正确。

E. 经尿道腺性膀胱炎电切术：这是治疗腺性膀胱炎的手术，但患者的症状并不符合腺性膀胱炎，所以这个选项也不正确。

53. 【答案】B

【解析】

A. 高血压 2 级，很高危：错误。根据病人的最高血压 190/100mmHg，应判断为 3 级高血压，而非 2 级。

B. 高血压 3 级，很高危：正确。病人的最高血压 190/100mmHg，属于 3 级高血压，且有吸烟喝酒、血脂高、糖尿病等多项危险因素，属于很高危。

C. 高血压 1 级，很高危：错误。根据病人的最高血压 190/100mmHg，应判断为 3 级高血压，而非 1 级。

D. 高血压 2 级：错误。根据病人的最高血压 190/100mmHg，应判断为 3 级高血压，而非 2 级。

E. 高血压：错误。此选项没有具体指出高血压的级别和危险程度，不够准确。

54. 【答案】B

【解析】

A. 口服补液：此选项不正确。虽然口服补液是治疗轻度脱水的首选，但对于本题中出现低血压、心率增快的患者，已经存在中重度脱水，需要快速补液，口服补液并不能满足需求。

B. 快速静脉补液：此选项正确。该患者已经出现低血压和心率增快，这是低血容量性休克的表现，需要立即进行快速静脉补液以恢复血容量，改善循环。

C. 糖皮质激素治疗：此选项不正确。糖皮质激素在此情况下并无直接作用，不能解决患者当前的问题。

D. 缓慢静脉补液治疗：此选项不正确。考虑到患者已经出现低血压和心率增快，这是低血容量性休克的表现，需要立即进行快速静脉补液，缓慢补液不能及时改善患者病情。

E. 观察：此选项不正确。患者已经出现低血容量性休克的表现，需要立即进行治疗，不能仅仅观察。

55. 【答案】A

## 【解析】

- A. 锁骨骨折：患儿摔倒后右肩疼痛，头偏向右侧，右肩下沉，右侧上肢活动障碍，皮肤出现淤血，Dugas 征阴性，这些都是锁骨骨折的典型症状。因此，这是正确答案。
- B. 正中神经损伤：正中神经损伤主要表现为手部功能障碍，不会导致肩部下沉或者头偏斜，所以这个选项是错误的。
- C. 桡骨头半脱位：桡骨头半脱位主要影响肘关节，不会导致头偏斜或肩部下沉，所以这个选项是错误的。
- D. 肘关节脱位：肘关节脱位也主要影响肘部，不会导致头偏斜或肩部下沉，所以这个选项是错误的。
- E. 肩关节脱位：虽然肩关节脱位会导致肩部疼痛和活动障碍，但 Dugas 征阴性排除了这种可能，所以这个选项是错误的。

## 56. 【答案】C

## 【解析】

- A. 骨肉瘤：这是一种最常见的恶性骨肿瘤，其特点是肿瘤产生骨样基质。骨膜反应明显，呈侵袭性发展，可见 Codman 三角或呈“日光射线”形态。在本题中，病人无骨膜反应，因此 A 选项不正确。
- B. 骨巨细胞瘤：这是一种交界性或行为不确定的肿瘤，主要症状为疼痛和肿胀，与病情发展相关。典型的 X 线特征为骨端偏心位、溶骨性、囊性破坏而无骨膜反应，病灶膨胀生长、骨皮质变薄，呈肥皂泡样改变。然而在本题中，病变表面光滑，不符合骨巨细胞瘤的特征，因此 B 选项不正确。
- C. 骨软骨瘤：这是一种在干骺端可见从皮质突向软组织的骨性突起的病变，其皮质和松质骨以窄小或宽广的蒂与正常骨相连，彼此髓腔相通，皮质相连续，突起表面为软骨帽。这与题目中病人的症状相符，因此 C 选项是正确答案。
- D. 骨囊肿：X 线表现为干骺端圆形或椭圆形界限清楚的溶骨性病灶，骨皮质有不同程度的膨胀变薄，单房或多房性，经常毗邻骨骺生长板，但不越过生长板。在本题中，病变的特征不符合骨囊肿，因此 D 选项不正确。
- E. 骨软骨肉瘤：发病缓慢，以疼痛和肿胀为主。X 线表现为一密度减低的溶骨性破坏，边界不清，病灶内有散在的钙化斑点或絮状骨化影，典型者可有云雾状改变。然而在本题中，病变的特征不符合骨软骨肉瘤，因此 E 选项不正确。

## 57. 【答案】B

## 【解析】

- 选项 A：肾肿瘤。肾肿瘤通常会有全程无痛的肉眼血尿，但在这个病例中，患者并未出现这种症状，因此 A 选项错误。
- 选项 B：肾结核。根据病例描述，中年女性，反复膀胱刺激征，伴低热一年，尿常规呈酸性，有较多红细胞、白细胞。CT 检查可见双肾斑片状钙化，这些都是肾结核的典型表现，因此 B 选项正确。
- 选项 C：肾结石合并感染。肾结石合并感染可能会出现腰部疼痛和全身症状，但在这个病例中，患者并未出现这种症状，因此 C 选项错误。
- 选项 D：输尿管结石。输尿管结石通常表现为肾绞痛或输尿管绞痛，疼痛剧烈难忍，阵发性发作，位于腰部或上腹

部，并沿输尿管行径放射至同侧腹股沟，还可放射到同侧阴唇。但在这个病例中，患者并未出现这种症状，因此 D 选项错误。

选项 E：尿路感染。虽然患者有尿路感染的一些症状，如反复膀胱刺激征，但是 CT 检查未发现斑片状钙化，这不符合尿路感染的常见表现，因此 E 选项错误。

58. 【答案】C

【解析】

A. 多喝水，优质蛋白饮食>40g：这是针对肾结石的一种常见的保守治疗方法，多喝水可以帮助排出小的结石，优质蛋白饮食可以提供身体所需的营养。

B. 根据肾小球滤过率调整抗生素：这是针对肾功能不全患者的抗生素使用原则，肾小球滤过率下降，抗生素的排泄减少，应适当减少抗生素的剂量。

C. 联合应用 3 种抗生素：一般情况下，治疗肾盂肾炎并不需要联合应用 3 种抗生素，过多的抗生素可能会造成药物相互作用，增加药物毒性。

D. 抗生素应足量足疗程：这是抗生素使用的基本原则，足量足疗程可以确保彻底杀灭病原微生物，防止病情反复。

E. 抗生素延长使用 2 周~4 周：对于慢性肾盂肾炎的治疗，一般需要较长时间的抗生素治疗，以确保彻底清除感染。

59. 【答案】A

【解析】

选项 A：急性化脓性关节炎通常在外伤后迅速出现，表现为寒战、高热、短暂谵妄等症状，关节部位红肿热痛明显，浮髌试验阳性，实验室检查可见白细胞升高和血沉加快。这与题干描述的情况相符，因此 A 是正确答案。

选项 B：软骨肉瘤的发病过程缓慢，主要表现为疼痛和肿胀，X 线可见密度减低的溶骨性破坏，病灶内有散在的钙化斑点或絮状骨化影，典型者可有云雾状改变。这与题干描述的情况不符，所以 B 不正确。

选项 C：膝关节结核起病缓慢，有全身症状如低热、乏力、疲倦、食欲缺乏、消瘦、贫血等，血沉增高。虽然也可能有浮髌试验阳性，但并不符合题干描述的病情，故 C 不正确。

选项 D：急性骨髓炎起病急，有寒战、高热至 39℃ 以上，可出现脓毒症症状。重者有昏迷与感染性休克。但其并无明显的关节肿胀疼痛，与题目描述不符，所以 D 不正确。

选项 E：类风湿关节炎通常为多发性、对称性小关节病变，与题目描述的单个大关节病变不符，所以 E 不正确。

60. 【答案】A

【解析】

A. 多巴胺水平：正确答案。帕金森症状的改善药物如复方左旋多巴，其机制是提高脑内的多巴胺水平。

B. 去甲肾上腺素水平：错误。去甲肾上腺素和帕金森病的发生并无直接关系。

C. GABA 水平：错误。GABA 是大脑中的主要抑制性神经递质，但并不是帕金森病的主要影响因素。

D. 乙酰胆碱水平：错误。乙酰胆碱在帕金森病中的作用并未得到明确证实。

E. 5-HT 水平：错误。5-HT（即 5-羟色胺）主要与情绪调节等有关，与帕金森病无直接关系。

61. 【答案】A



## 【解析】

选项 A：三度房室传导阻滞。这是一个严重的心脏传导障碍，通常会导致心跳过缓和血压下降。在此题中，患者心率 35 次/分（心跳过缓），血压 60-90mmHg，符合三度房室传导阻滞的表现，因此 A 选项正确。

选项 B：右束支传导阻滞。此项并不会导致心跳过缓，因此 B 选项错误。

选项 C：二度一型传导阻滞。这种情况主要发生在部分健康的成年人、儿童及运动员，并不会导致心跳过缓，因此 C 选项错误。

选项 D：房颤。房颤的心电图上有典型的小 f 波，而本题中的心电图并未提到此点，因此 D 选项错误。

选项 E：左束支传导阻滞。虽然左束支阻滞可以发生在各种心脏疾病中，但并不会导致心跳过缓，因此 E 选项错误。

## 62. 【答案】B

## 【解析】

A. TSH（促甲状腺激素）：主要反应甲状腺功能，与此题目的症状表现无明显关联，故不是最有意义的检查。

B. PTH（甲状旁腺激素）：直接反应甲状旁腺功能，与病人的症状（肾结石、全骨疼痛、口渴、夜尿增多）高度相关，故是最有意义的检查。

C. ACTH（促肾上腺皮质激素）：主要反应肾上腺功能，与此题目的症状表现无明显关联，故不是最有意义的检查。

D. GH（生长激素）：与甲状旁腺功能检查无明显关联，故不是最有意义的检查。

E. FSH（卵泡刺激素）：无直接关联，故不是最有意义的检查。

## 63. 【答案】A

## 【解析】

选项 A：血浆肾素，醛固酮。这是正确答案。患者的高血压和低血钾可能是由于原发性醛固酮增多症引起的。在这种情况下，血浆醛固酮水平会增高，而肾素、血管紧张素 II 水平会降低。

选项 B：生长激素。这不是正确答案。生长激素过多会导致巨人症或肢端肥大症，分泌不足会导致侏儒症。这与患者的症状不符。

选项 C：甲状腺激素。这不是正确答案。甲状腺激素过多会导致甲亢，分泌不足会导致甲减或呆小症。这与患者的症状不符。

选项 D：血浆 ACTH，皮质醇。这不是正确答案。ACTH 和皮质醇过多会导致肥胖、库欣综合征等表现，这与患者的症状不符。

选项 E：血浆儿茶酚胺。这不是正确答案。儿茶酚胺是肾上腺髓质激素，不能反应肾上腺皮质激素水平，与患者的症状不符。

## 64. 【答案】B

## 【解析】

A 选项：应用消肿止痛药。这是常见的处理疼痛的方式，但在本题中，患者的症状可能是由于石膏过紧所导致的，因此仅靠消肿止痛药不能解决根本问题。

B 选项：立即松绑石膏观察。这是正确的处理方式。当石膏过紧，可能会压迫血管神经，导致疼痛和感觉运动障碍。

此时应立即松绑石膏，减少压力，恢复血液循环。

C 选项：抬高患肢促进血液回流。这也是处理肿胀和疼痛的常见方式，但同样不能解决石膏过紧导致的问题。

D 选项：切开减张术。这是处理骨筋膜室综合征的方法，但在本题中，应优先考虑松绑石膏。

E 选项：继续观察。这种被动的处理方式并不适合本题中的情况，因为患者的症状可能会因为石膏过紧而持续加重。

65. 【答案】D

【解析】

A. FV II（凝血酶）缺乏会导致 PT 和 APTT 同时延长，此题中 PT 正常，所以 A 选项错误。

B. FV（凝血因子 V）缺乏同样会使 PT 和 APTT 同时延长，所以 B 选项错误。

C. FX（凝血因子 X）缺乏也会使 PT 和 APTT 同时延长，所以 C 选项错误。

D. FVIII（凝血因子 VIII）缺乏只会导致 APTT 延长，符合题干描述，所以 D 选项正确。

E. FII（凝血因子 II）缺乏会导致 PT 和 APTT 同时延长，所以 E 选项错误。

66. 【答案】B

【解析】

A. 急迫性尿失禁：主要表现为尿频、尿急，膀胱不受意识控制就开始排尿，通常继发于膀胱炎、神经源性膀胱以及重度膀胱出口梗阻。本题中，患者并无尿频、尿急的症状，因此 A 选项不正确。

B. 充溢性尿失禁：也称假性尿失禁，是指膀胱功能完全失代偿，膀胱呈慢性扩张，并且从未完全排空，当膀胱过度充盈后，尿液会不断溢出。本题中，患者的症状（前列腺增生、膀胱有余尿）符合充溢性尿失禁的特点，因此 B 选项是正确答案。

C. 真性尿失禁：尿液持续地昼夜从膀胱或泌尿道中流出，几乎没有正常的排尿，膀胱呈空虚状态。常见的原因因为外伤、手术或先天性疾病引起的膀胱颈和尿道括约肌的损伤。本题患者并无这些情况，因此 C 选项不正确。

D. 混合性尿失禁：既可以由尿急，又可以由用力、打喷嚏或咳嗽引起的不自主漏尿。主要表现为在打喷嚏时、咳嗽或者剧烈运动时出现漏尿，或者在喝少量水后、接触水或听见流水的声音后出现漏尿。本题患者并无这些情况，因此 D 选项不正确。

E. 压力性尿失禁：当腹内压突然增高（咳嗽、喷嚏、大笑、运动等）时，尿液不随意地流出。这是由于膀胱和尿道之间正常解剖关系改变，使腹内压突然增加时传导至膀胱和尿道的压力不等，膀胱压力增高而没有相应的尿道阻力增加，从而产生漏尿。本题患者并无这些情况，因此 E 选项不正确。

67. 【答案】C

【解析】

A. 利多卡因：抗心律失常药物，用于治疗室性心律失常，但在此情况下不适合。

B. 胺碘酮：抗心律失常药物，用于治疗和预防各种心律失常，但在此情况下不适合。

C. 阿托品：中枢神经系统刺激剂，可以增加心率，对于心动过缓有良好效果，是本题的正确答案。

D. 西地兰：心脏补剂，用于治疗心力衰竭，但在此情况下不适合。

E. 多巴酚丁胺：抗心律失常药物，用于治疗和预防各种心律失常，但在此情况下不适合。



## 68. 【答案】A

## 【解析】

选项 A：高钾血症。患者肾衰竭五期，肾脏排钾能力下降，食用大量橘子（富含钾元素）后，出现胸闷不适、四肢乏力伴口周发麻，心率明显降低，这些都是高钾血症的典型症状，因此 A 选项正确。

选项 B：代谢性酸中毒。此病症的症状包括疲乏、眩晕、嗜睡，感觉迟钝或烦躁，呼吸加快加深，而题目中并未提到这些症状，所以 B 选项错误。

选项 C：高磷血症。高磷血症并不产生特殊临床症状，但常导致低钙血症，引起抽搐、心律失常、低血压等症状，题目中并未提到这些症状，所以 C 选项错误。

选项 D：低钙血症。低钙血症时神经肌肉兴奋性升高，出现口周和指（趾）尖麻木及针刺感、手足抽搐、腱反射亢进，题目中并未提到这些症状，所以 D 选项错误。

选项 E：高钙血症。高钙血症常无特异性症状，但当血钙浓度进一步增高时，可出现疲乏无力、精神不集中、失眠、抑郁、腱反射迟钝、肌力下降等症状，题目中并未提到这些症状，所以 E 选项错误。

## 69. 【答案】A

## 【解析】

选项 A：血液透析。这是最有效的治疗方式，因为它能快速有效地降低血钾水平。患者出现的胸闷不适、四肢乏力伴口周发麻和心率降低等症状，都是高钾血症的表现。因此，选项 A 是正确的。

选项 B：阳离子交换树脂。这种方法可以通过口服或灌肠的方式排出钾离子，但并不是最有效的方法。

选项 C：注射钙剂。这种方法可以促进钾离子转入细胞内，但并非最有效的方法。

选项 D：大量激素。这种方法对排钾无帮助，因此是错误的。

选项 E：利尿剂。尽管利尿剂可以促进钾的排出，但对于肾衰竭患者来说，效果往往并不理想。

## 70. 【答案】A

## 【解析】

选项 A：变异型心绞痛。正确答案。患者症状及心电图变化与变异型心绞痛相符，特别是在静息时发病，心电图有一过性 ST 段抬高，但肌钙蛋白正常，无心肌损伤的证据。

选项 B：急性下壁心肌梗死。错误。尽管患者有胸痛和心电图 ST 段抬高，但肌钙蛋白正常，不支持心肌梗死的诊断。

选项 C：急性心包炎。错误。急性心包炎的心电图特征为 ST 段弓背向下，而非向上，与患者情况不符。

选项 D：劳力性心绞痛。错误。患者在睡眠时发病，无劳力诱发，不符合劳力性心绞痛的特点。

选项 E：不稳定型心绞痛。错误。虽然变异型心绞痛属于不稳定型心绞痛的一种特殊类型，但对于本例，选项 A 更为精确。

## 71. 【答案】E

## 【解析】

A. 膜性肾病：主要发生在中老年男性，典型特征是光镜下可见钉突形成。本题患者年龄、病程与此不符，故排除。

- B. 膜增生性肾小球肾炎：也称为系膜毛细血管性肾小球肾炎，特点是光镜下可见系膜细胞和系膜基质弥漫重度增生，形成“双轨征”。本题中没有提及“双轨征”，故排除。
- C. 局灶节段性肾小球肾炎：电镜下可见肾小球上皮细胞足突广泛融合、基底膜塌陷，系膜基质增多，电子致密物沉积。本题中没有提及这些典型表现，故排除。
- D. 系膜增生性肾小球肾炎：光镜下可见肾小球系膜细胞和系膜基质弥漫增生，依其增生程度可分为轻、中、重度。本题没有提到这些典型表现，故排除。
- E. 新月体性肾小球肾炎：一般在上呼吸道感染后发病，临床表现为肾功能急剧恶化，血肌酐显著增高，B超显示双肾体积增大。本题中患者的表现与此相符，故选 E。

## 72. 【答案】B

## 【解析】

- A. 肾小管疾病：肾小管疾病主要表现为尿液中电解质、酸碱平衡失调，尿浓缩稀释功能障碍等，而本题中的症状和体征如眼睑水肿，尿蛋白，棘球红细胞等更符合肾小球疾病。
- B. 肾小球疾病：女性，20岁，眼睑水肿，尿常规 RBC20-30/HP，尿蛋白（++），尿相差显微镜可见棘球红细胞，这些都是肾小球疾病的典型症状，因此 B 选项正确。
- C. 肾静脉疾病：通常会有明显的肾脏疼痛、高血压等症状，而本题中并未表现出这些症状，因此 C 选项错误。
- D. 肾动脉疾病：肾动脉疾病常会引起高血压、肾功能损害等症状，本题中并未表现出这些症状，因此 D 选项错误。
- E. 肾间质疾病：肾间质疾病通常会有尿频、尿急、尿痛等症状，而本题中并未表现出这些症状，因此 E 选项错误。

## 73. 【答案】D

## 【解析】

- A. 急性前壁心肌梗死的心电图表现为 V1-V5 或 V3-V5 导联 ST 段抬高，所以 A 选项错误。
- B. 急性下壁心肌梗死的心电图表现为 II、III、aVF 导联 ST 段抬高，所以 B 选项错误。
- C. 急性后壁心肌梗死的心电图表现为 V7、V8 导联 ST 段抬高，所以 C 选项错误。
- D. 急性前间壁心肌梗死的心电图表现为 V1-V3 导联 ST 段抬高，符合题干描述，所以 D 选项正确。
- E. 急性侧壁心肌梗死的心电图表现为 V5-V7 导联 ST 段抬高，所以 E 选项错误。

## 74. 【答案】C

## 【解析】

- A. 抗甲状腺药物：正确。抗甲状腺药物（如丙硫氧嘧啶）是甲状腺危象的主要治疗方法之一，可以阻止甲状腺激素的合成和释放。
- B. 碘剂：正确。碘剂可以减少甲状腺激素的释放，也是甲状腺危象的常规治疗方法之一。
- C. 阿司匹林降温：错误。阿司匹林属于乙酰水杨酸类药物，虽然可以降温，但在甲状腺危象中不推荐使用，因为它可能会加重甲状腺功能亢进的症状。
- D. 抗生素：正确。如果甲状腺危象的诱因是感染，应该使用抗生素进行治疗。
- E. 糖皮质激素：正确。糖皮质激素可以降低甲状腺激素的合成和释放，是治疗甲状腺危象的重要措施。

## 75. 【答案】D

## 【解析】

- A. 内侧副韧带损伤：不符合题目描述，内侧副韧带损伤的特点是侧方应力实验阳性，但题目中未提及。
- B. 外侧副韧带损伤：不符合题目描述，外侧副韧带损伤的特点也是侧方应力实验阳性，同样在题目中未提及。
- C. 髌骨骨折：不符合题目描述，髌骨骨折一般不会出现浮髌试验阳性。
- D. 交叉韧带损伤：符合题目描述，青少年摔伤膝盖后，浮髌试验阳性（提示膝关节肿胀），Lachman 实验阳性（提示存在交叉韧带损伤）。
- E. 半月板损伤：不符合题目描述，半月板损伤时，半月板旋转挤压试验（McMurray 试验）呈阳性，但题目中此实验为阴性。

## 76. 【答案】B

## 【解析】

- 选项 A：皮肤干燥。缺铁性贫血可以导致皮肤干燥，因此，这是可能出现的症状。
- 选项 B：共济失调和行动不稳。这是巨幼细胞性贫血的症状，而非缺铁性贫血，因此，这是不可能出现的症状，是正确答案。
- 选项 C：烦躁易怒。缺铁性贫血可以导致精神行为异常，如烦躁、易怒，因此，这是可能出现的症状。
- 选项 D：异食癖。缺铁性贫血可以导致异食癖，因此，这是可能出现的症状。
- 选项 E：口腔炎。缺铁性贫血可以导致口腔炎，因此，这是可能出现的症状。

## 77. 【答案】C

## 【解析】

- A. 结核杆菌：结核杆菌是结核病的致病菌，但本题中没有描绘出结核病相关全身症状，且膝关节早期，关节穿刺可获得比较清亮的液体。因此，A 选项错误。
- B. 乙型脑炎病毒：这是乙脑的致病菌，乙脑多表现为中枢神经系统症状。在这个情况下，没有提到任何中枢神经系统症状，所以 B 选项错误。
- C. 金黄色葡萄球菌：这是化脓性关节炎常见的致病菌。在这个情况下，患者有右膝关节肿胀疼痛无法活动，主被动运动均受限，提示存在右膝关节感染，浮髌试验阳性，提示关节积液较多，关节腔中分层抽出浑浊液体。因此，C 选项正确。
- D. 大肠杆菌：在一定条件下可以引起人和多种动物发生胃肠道感染或尿道等多种局部组织器官感染，但在这里并不符合题意，所以 D 选项错误。
- E. 溶血性链球菌：可引起皮肤和皮下组织的化脓性炎症、呼吸道感染，还可通过食品引起猩红热、流行性咽炎的暴发流行。然而在此情况，没有提到这些相关症状，因此 E 选项错误。

## 78. 【答案】D

## 【解析】

- A. 心力衰竭：此选项不符合题干中症状描述。心力衰竭的主要症状是呼吸困难，乏力，水肿等，并且不会出现反

复低热和胸痛。

- B. 胸膜炎：虽然题干中的摩擦音可能提示存在心包炎或胸膜炎，但是胸膜炎更多的表现为胸痛，呼吸困难，咳嗽，痰中带血等症状，不符合题干描述。
- C. 心脏破裂：心脏破裂常在起病 1 周内出现，在胸骨左缘第 3~4 肋间出现响亮的收缩期杂音，常伴有震颤，而题干中并未提及这些症状，因此此选项不对。
- D. 心肌梗死后综合征：此为正确答案。心肌梗死后综合征是一种自身免疫性疾病，其特征为心肌梗死后 2~3 天至数周出现反复发热、胸痛、心包摩擦音和其他全身症状，符合题干描述。
- E. 结核性心包炎：结核性心包炎的症状主要是全身症状，如低热，消瘦，盗汗等，并且发病缓慢，与题干描述不符。

79. 【答案】C

【解析】

- A. 附睾囊肿：此疾病一般无症状，且囊肿大小相对稳定，病情发展缓慢。如果囊肿体积较大，少数可出现疼痛或阴囊部坠胀感。但本题中的病人症状在平卧后可消失，与附睾囊肿的特征不符。
- B. 附睾结核：此疾病的临床表现以局部症状为主，表现为附睾缓慢增大的硬结，破溃后流出液体，形成瘰管。病程久的患者可出现盗汗、低热、消瘦和全身无力等全身症状。然而，本题中的病人没有这些症状。
- C. 交通性鞘膜积液：这是一种常见的儿童阴囊肿大疾病，特点是阴囊肿大，透光实验阳性，平卧后可消失。这与题目中的病人症状完全一致，因此这是正确答案。
- D. 睾丸鞘膜积液：这种疾病呈球形或卵圆形，表面光滑，有弹性和囊样感，无压痛，一般触不到睾丸和附睾，平卧不会消失，与题目中的病人症状不符。
- E. 睾丸肿瘤：其典型表现为病侧阴囊内单发无痛性肿块。睾丸肿瘤较小时，临床症状不明显，随着肿瘤逐渐增大，可表现为病侧睾丸质硬而沉重，有轻微坠胀或钝痛。附睾、输精管多无异常，与题目中的病人症状不符。

80. 【答案】B

【解析】

- A. 伊曲康唑：这是抗真菌药，但氟康唑治疗中枢神经系统新型隐球菌病的疗效优于伊曲康唑。所以此选项错误。
- B. 氟康唑：此药物是治疗中枢神经系统新型隐球菌病的首选药物。所以此选项正确。
- C. 恩替卡韦：这是抗病毒类药物，对隐球菌病无效。所以此选项错误。
- D. 卡泊芬净：主要用来治疗念珠菌感染，不适用于此题的病例。所以此选项错误。
- E. 制霉菌素：有广谱抗真菌作用，是膜渗透性增强剂，对念珠菌最敏感，对隐球菌有一定的活性，但不作为首选用药。所以此选项错误。

81. 【答案】B

【解析】

- A 选项：II 期 B，指的是淋巴瘤仅在横膈一侧的淋巴结发生，并且有全身症状。但该患者的颈部和腹股沟淋巴结均有肿大，显示横膈上下两区域同时受侵，因此排除。

B 选项：III 期 B，表示淋巴瘤在横隔两侧的淋巴结发生，并且有全身症状，如发热、盗汗等。这与题干中的情况相符，故为正确答案。

C 选项：III 期 A，表示淋巴瘤在横隔两侧的淋巴结发生，但没有全身症状。然而，题干中的患者出现了发热，故排除。

D 选项：II 期 A，表示淋巴瘤仅在横隔一侧的淋巴结发生，且无全身症状。同样，由于患者的情况并不符合，故排除。

E 选项：IV 期 A，表示淋巴瘤已经扩散到体外的器官，而且没有全身症状。题干中并未提到有体外器官受侵，故排除。

82. 【答案】B

【解析】

A. 系膜增生性肾病：虽然也可能导致深静脉血栓，但发生的概率低于膜性肾病。

B. 膜性肾病：此类肾病会导致大量蛋白尿，从而引起体内低白蛋白血症和血液高凝状态，容易出现深静脉血栓，因此是正确答案。

C. 微小病变性肾病：虽然也可能导致深静脉血栓，但发生的概率低于膜性肾病。

D. 膜增生性肾病：虽然也可能导致深静脉血栓，但发生的概率低于膜性肾病。

E. 局灶节段性肾小球硬化：虽然也可能导致深静脉血栓，但发生的概率低于膜性肾病。

83. 【答案】C

【解析】

A 选项：骨髓纤维化的主要诊断标准包括骨髓活检有巨核细胞增生和异型巨核细胞，常常伴有网状纤维或胶原纤维化。这与题干中的病人情况不符，所以 A 选项错误。

B 选项：急性髓性白血病的主要特征是骨髓象有核细胞显著增生，以原始细胞为主。这与题干中的病人情况不符，所以 B 选项错误。

C 选项：慢性髓性白血病的主要特征包括老年男性患者，消瘦，查体：脾大，全身淋巴结未触及。实验室检查：白细胞远超正常，血小板稍高，细胞遗传学检查可见染色体 t(9;22)(q34;q11)。这与题干中的病人情况完全符合，所以 C 选项正确。

D 选项：慢性淋巴细胞白血病是一种进展缓慢的成熟 B 淋巴细胞增殖性肿瘤，以外周血、骨髓、脾和淋巴结等淋巴组织中出现大量克隆性 B 淋巴细胞为特征。这与题干中的病人情况不符，所以 D 选项错误。

E 选项：急性淋巴细胞白血病的主要特征是骨髓象有核细胞显著增生，以原始细胞为主。这与题干中的病人情况不符，所以 E 选项错误。

84. 【答案】E

【解析】

A. 血清  $\beta 2$  微球蛋白测定：此项检查可以作为多发性骨髓瘤的一个检验指标，但其特异性较低，不如血清 M 蛋白测定准确。



- B. 尿本周蛋白测定：同样，这也是多发性骨髓瘤的一个检验指标，但其特异性不高。
- C. 尿常规：尿常规是一种常规检查，对于本病的诊断帮助不大。
- D. 血清钙测定：血清钙测定在多发性骨髓瘤中有一定的参考价值，但没有血清 M 蛋白特异性高。
- E. 血清 M 蛋白及免疫球蛋白：血清中出现 M 蛋白是多发性骨髓瘤的突出特点，故此选项为正确答案。

85. 【答案】C

【解析】

- A. 房性心动过速：此选项错误。虽然病人有心悸的症状，但心电图上并没有出现 P 波提前发生，与窦性 P 波形态不同的现象，所以这不是房性心动过速。
- B. 阵发性室上性心动过速：此选项错误。阵发性室上性心动过速的心电图特征是 QRS 波群形态正常、RR 间期规则的快速心律，而病人的心电图上出现了不规则的 f 波代替 P 波，所以这不是阵发性室上性心动过速。
- C. 房颤：此选项正确。病人的心电图上出现了不规则的 f 波代替 P 波，这是房颤的特征性心电图表现。同时，病人的脉率小于心率，这也是房颤的典型表现。
- D. 房扑：此选项错误。房扑的心电图特征是窦性 P 波消失，代之以振幅、间距相同的有规律的锯齿状扑动波，称为 F 波，而病人的心电图上并没有出现这种现象，所以这不是房扑。
- E. 室速：此选项错误。室速的心电图表现为 3 个或以上的室性期前收缩连续出现，而病人的心电图上并没有出现这种现象，所以这不是室速。

86. 【答案】B

【解析】

- A. 阿司匹林：阿司匹林是抗血小板药物，可用于急性心肌梗死的治疗，但对于改善左心室重构并无直接效果。
- B. 培哚普利：培哚普利是 ACEI 类药物，对于改善心肌梗死后的左心室重构有明显效果，因此是正确答案。
- C. 辛伐他汀：辛伐他汀是一种调脂药，虽然能降低心肌梗死的风险，但对改善左心室重构无直接效果。
- D. 硝酸异山梨酯和 E. 硝普钠：这两种都是硝酸酯类药物，可以扩张冠状动脉，缓解心绞痛，但对改善左心室重构无直接效果。

87. 【答案】A

【解析】

- A. 红细胞膜 CD55、CD59 表达低下：这是阵发性睡眠性血红蛋白尿的特征，属于正细胞性贫血，与患者的大细胞性贫血不符，所以这是正确答案。
- B. 叶酸、维生素 B<sub>12</sub>可正常：这两种物质的缺乏可能导致大细胞性贫血，但患者的病情并未明确这两种物质的缺乏，所以可能出现异常。
- C. 骨髓病理是大片网状纤维增生：这是骨髓异常增生综合征的特征，与患者的病情符合，所以可能出现异常。
- D. 骨髓造血功能低下，巨核细胞明显减少：这也是骨髓异常增生综合征的特征，与患者的病情符合，所以可能出现异常。
- E. 骨髓红系粒系巨核系病态造血：这同样是骨髓异常增生综合征的特征，与患者的病情符合，所以可能出现异常。



## 88. 【答案】D

## 【解析】

- A. 前脊髓综合征：主要发生在颈脊髓损伤时，引起脊髓前中央动脉闭塞，出现四肢瘫痪，下肢瘫痪重于上肢瘫痪，但下肢和会阴部仍保持位置觉和深感觉。与题目描述的病人情况不符。
- B. 后脊髓综合征：脊髓受损平面以下运动功能和痛温觉、触觉存在，但深感觉全部或部分消失。与题目描述的病人情况不符。
- C. 胸段脊髓震荡：临床上表现为损伤平面以下感觉、运动及反射完全消失或大部分消失。一般经过数小时至数天，感觉和运动开始恢复，不留任何神经系统后遗症。与题目描述的病人情况不符。
- D. 脊髓圆锥损伤：脊髓圆锥位于 T12 与 L1 左右，损伤表现为会阴部皮肤感觉缺失，括约肌功能丧失致大小便不能控制和性功能障碍，双下肢的感觉和运动仍保持正常。这与题目描述的病人情况完全符合。
- E. 马尾神经损伤：马尾神经起自第 2 腰椎的骶脊髓，一般终止于第 1 骶椎下缘。表现为损伤平面以下弛缓性瘫痪，有感觉及运动功能及性功能障碍及括约肌功能丧失，肌张力降低，腱反射消失，没有病理性锥体束征。与题目描述的病人情况不符。

## 89. 【答案】B

## 【解析】

- A. 家畜是重要的传染源-正确。血吸虫病是人兽共患病，传染源是患者和保虫宿主，其中包括多种家畜如牛、猪、犬、羊、马等。
- B. 感染后获得持久性免疫-错误。血吸虫病感染后只有部分免疫力，不能获得持久性免疫，这也是此题的正确答案。
- C. 多发生在湖沼区-正确。血吸虫病以湖沼区最为严重，因为钉螺（血吸虫的中间宿主）更多地生活在这些地方。
- D. 钉螺为唯一的中间宿主-正确。钉螺是日本血吸虫必需的唯一中间宿主。
- E. 接触疫水可感染-正确。当水体中存在感染血吸虫的阳性钉螺时，便成为疫水，接触疫水可以导致感染。

## 90. 【答案】D

## 【解析】

- A. 股神经：股神经主要支配缝匠肌、股四头肌，以及股前部和小腿内侧皮肤的感觉。因此，如果是股神经受损的话，会出现股四头肌麻痹导致的膝关节伸直障碍以及股前和小腿内侧感觉障碍。
- B. 胫神经：胫神经主要支配小腿后侧屈肌群和足底感觉。如果是胫神经受损，会出现小腿后侧屈肌群及足底内在肌麻痹，导致踝跖屈、内收、内翻障碍，足趾跖屈、外展和内收障碍，以及小腿后侧、足背外侧、跟外侧和足底感觉功能障碍。
- C. 腓肠神经：腓肠神经主要分布于小腿后区下部及足背外侧的皮肤，如果损伤，会影响相关区域的感觉。
- D. 腓总神经：腓总神经支配小腿前外侧伸肌群及小腿前外侧和足背皮肤。损伤会导致小腿前外侧伸肌麻痹，出现踝背伸、外翻功能障碍，呈足内翻下垂畸形。伸拇、伸趾功能丧失，小腿前外侧和足背前、内侧感觉障碍。
- E. 隐神经：隐神经来自股神经，分布于髌骨下方、小腿内侧和足内侧缘的皮肤，如果受损，会影响相关区域的感觉。

## 91. 【答案】C

## 【解析】

选项 A: 热射病, 常表现为高热伴神智障碍, 本题中, 患者虽有发热, 但神志清楚, 故排除。

选项 B: 横纹肌溶解, 主要表现为肌肉的疼痛、压痛、肿胀及无力等肌肉受累的情况, 尿外观: 呈茶色或红葡萄酒色尿, 本题中, 患者并未出现这些症状, 故排除。

选项 C: 热痉挛, 常发生在剧烈活动后, 大量出汗和饮用低张液体后出现头痛、头晕和肢体、腹壁肌群痛性痉挛, 无明显体温升高, 无神志障碍。本题中, 患者的症状与此相符, 故选择 C。

选项 D: 蛛网膜下腔出血, 临床表现为突然发生的剧烈头痛、恶心、呕吐和脑膜刺激征, 伴或不伴局灶体征。本题中, 患者虽有头痛、恶心、呕吐, 但无脑膜刺激征, 故排除。

选项 E: 热衰竭, 多见于老年人、儿童和慢性病病人。严重热应激时, 体液和体钠丢失过多引起循环容量不足所致。本题中, 患者为青年男性, 且血压正常, 故排除。

## 92. 【答案】D

## 【解析】

A. II: 凝血因子 II 缺乏的情况下, 会导致 APTT 和 PT 均延长, 而此题中, 患者的 PT 正常, 所以排除。

B. V: 凝血因子 V 缺乏同样会导致 APTT 和 PT 均延长, 此题中, 患者的 PT 正常, 所以排除。

C. VII: 凝血因子 VII 缺乏, 会表现为 PT 延长而 APTT 正常, 与题目中的情况不符, 排除。

D. VIII: 凝血因子 VIII 缺乏会引起血友病 A 型, 这种情况下, APTT 会延长, 而 PT 会保持正常, 与题目中的情况匹配, 所以是正确选项。

E. X: 凝血因子 X 缺乏, APTT、PT 均会延长, 而题目中, 患者的 PT 正常, 所以排除。

## 93. 【答案】C

## 【解析】

A. 高血压: IgA 肾病患者若出现持续难以控制的高血压, 会加重肾脏损伤, 影响预后, 故此选项与预后有关。

B. 蛋白尿: 蛋白尿  $>1\text{g/d}$  是 IgA 肾病预后不良的指标之一, 故此选项与预后有关。

C. 镜下血尿: 虽然 IgA 肾病常见表现为无症状性血尿, 但血尿的存在并不能作为预后指标, 故此选项与预后无关, 是正确答案。

D. 病理活检: 病理活检表现为肾小球硬化、间质纤维化和肾小管萎缩, 或伴大量新月体形成, 这些都是预后不良的指标, 故此选项与预后有关。

E. 血肌酐: 血肌酐升高表示肾功能损害, 是预后不良的指标, 故此选项与预后有关。

## 94. 【答案】A

## 【解析】

选项 A: 巨幼细胞性贫血。根据题干信息, 患者是中年女性, 完全素食者, 存在中度贫血,  $\text{MCV}: 124\text{fL}$ ,  $\text{MCHC}: 34\text{g/L}$ , 这些特征指向巨幼细胞性贫血。因为完全素食者可能导致  $\text{VitB}_{12}$  缺乏, 而  $\text{VitB}_{12}$  缺乏会引发 DNA 合成障碍, 进而导致巨幼细胞性贫血。所以, 这是正确答案。

选项 B: 再生障碍性贫血。此类型贫血的特点是正常细胞性贫血, MCV: 80~100f1, MCHC: 32~35%, 与题干描述不符, 故排除。

选项 C: 缺铁性贫血和 D: 海洋性贫血。这两种贫血都属于小细胞低色素性贫血, MCV<80f1, MCHC<32%, 与题干描述不符, 故排除。

选项 E: 急性白血病。此病人常有不同程度的正细胞性贫血, 但题干中并未提及白血病的相关症状, 故排除。

95. 【答案】A

【解析】

选项 A: 急性肾小球肾炎, 符合患者的临床表现和实验室检查结果, 所以是正确答案。

选项 B: 急进性肾小球肾炎, 病情进展迅速, 早期即出现少尿或无尿, 肾功能快速恶化, 病人会有不同程度的贫血, 而患者的表现并不符合。

选项 C: 膜增生性肾小球肾炎, 通常会有大量蛋白尿出现, 但患者尿蛋白仅为弱阳性。

选项 D: 微小病变型肾病, 也会有大量蛋白尿出现, 但患者的实验室检查结果并不符合。

选项 E: 肾病综合征, 同样会有大量蛋白尿, 而患者的实验室检查并未发现此情况。

96. 【答案】D

【解析】

选项 A: 股骨远端骨折, 一般会表现为膝关节和股骨远端部位有肿胀、畸形和压痛, 但题干中没有提到这些症状, 所以选项 A 错误。

选项 B: 股骨颈骨折, 患肢会出现外旋畸形, 一般在  $45^{\circ} \sim 60^{\circ}$ , 而题干中的外旋畸形达到了  $85^{\circ}$ , 所以选项 B 错误。

选项 C: 股骨干骨折, 极有可能损伤血管神经, 患者会出现感觉、运动障碍, 但题干中没有提到这些症状, 所以选项 C 错误。

选项 D: 股骨转子间骨折, 可以出现转子间压痛, 肿胀, 下肢外旋畸形明显, 可达  $90^{\circ}$ , 有轴向叩击痛。这与题干描述的症状完全吻合, 所以选项 D 是正确答案。

选项 E: 右髌损伤, 合并髌关节脱位时常有屈曲畸形, 较少出现下肢短缩, 而题干中明确提到了下肢短缩, 所以选项 E 错误。

97. 【答案】B

【解析】

选项 A: 有压痛。这是骨折的一种常见体征, 但并不特异, 因为许多其他类型的损伤, 如软组织挫伤, 关节脱位等也可能出现压痛。

选项 B: 外旋  $85^{\circ}$ 。这是股骨转子间骨折的特异性体征, 因为在此类骨折中, 股骨头被强制性外旋, 导致下肢出现明显的外旋畸形。所以这是正确答案。

选项 C: 右下肢短缩。这也是骨折的一种常见体征, 但除了股骨转子间骨折, 股骨颈骨折等也可能导致下肢短缩, 所以并不特异。

选项 D: 叩击痛。这是骨折的一种常见体征,但并不特异,因为许多其他类型的损伤也可能出现叩击痛。

选项 E: 红肿。这是伤害后体液积聚的结果,可以在任何类型的软组织损伤或骨折中出现,所以并不特异。

98. 【答案】D

【解析】

A. I 期: 此阶段股骨头外形完整,关节间隙正常。但在本题中,患者的股骨头已经变平且关节间隙变窄,所以不符合 I 期的特征。

B. II 期: 此阶段股骨头外形完整,关节间隙正常,股骨头负重区关节软骨下骨质密度增高。但在本题中,患者的股骨头已经变平且关节间隙变窄,所以不符合 II 期的特征。

C. III 期: 此阶段股骨头负重区的软骨下骨呈不同程度的变平和塌陷,股骨头失去了圆而光滑的外形,关节间隙仍保持正常宽度。但在本题中,患者的关节间隙已经变窄,所以不符合 III 期的特征。

D. IV 期: 此阶段股骨头负重区严重塌陷,股骨头变扁平,关节间隙可以变窄。这与题干中患者的症状相符,所以是正确答案。

E. V 期: 在股骨头坏死的分期中并没有 V 期,所以此选项错误。

99. 【答案】B

【解析】

A. 骨软骨瘤是一种良性肿瘤,表现为骨表面的骨性突起,顶面有软骨帽,X 线可见从皮质突向软组织的骨性突起。此病例无此类特征。

B. 骨肉瘤是一种恶性肿瘤,好发于青少年,常见症状包括局部疼痛、肿块、关节活动受限等,X 线可见骨膜反应明显。此病例的表现与骨肉瘤的特征相符,故为正确答案。

C. 骨囊肿多数无明显症状,X 线表现为干骺端圆形或椭圆形溶骨性病灶,此病例无此类特征。

D. 急性骨髓炎全身症状明显,如恶寒、高热、呕吐等,此病例无此类全身症状。

E. 骨结核常有肺结核病史或家庭结核病史,起病较缓慢,症状隐匿,此病例无此类特征。

100. 【答案】B

【解析】

选项 A: 变异型心绞痛,又称普林兹梅塔尔综合征,通常在安静状态下突然发作,与体力活动无关,因此不符合题干描述的症状。

选项 B: 稳定型心绞痛,也被称为劳力性心绞痛,其特点是心前区疼痛或憋闷,常在体力活动时发作,休息后可缓解,平板试验阳性。这完全符合题干中的症状描述,因此是正确答案。

选项 C: 初发型心绞痛,是指首次出现的心绞痛,可以是稳定型也可以是不稳定型,由于题干中没有明确提到是首次发作,因此不能确定为此类型。

选项 D: 不稳定性心绞痛,其特点是心绞痛的发作频率、严重程度、持续时间或者需要的硝酸甘油剂量有所增加,或者在静息或轻微活动时也能引发,题干中的症状并不符合。

选项 E: 心肌梗死,主要表现为持续的严重胸痛,伴有恶心、呕吐、出冷汗等症状,平板试验通常是禁忌的,因此

不符合题干描述。

101. 【答案】B

【解析】

- A. 口服 5α 还原酶抑制剂：这种药物主要用于治疗前列腺增生，但起效较慢，无法马上缓解急性症状，所以选项 A 错误。
- B. 经尿道前列腺切除：这是一种手术方法，可以快速缓解由前列腺增生导致的尿潴留等症状，所以选项 B 正确。
- C. 耻骨上前列腺切除：这也是一种手术方法，但一般仅在前列腺体积巨大或有合并巨大膀胱结石者选用，所以选项 C 错误。
- D. 抗感染治疗：患者的尿常规正常，不存在感染症状，所以无需抗感染治疗，选项 D 错误。
- E. 口服 α 受体拮抗剂：这种药物也主要用于治疗前列腺增生，但同样起效较慢，无法马上缓解急性症状，所以选项 E 错误。

102. 【答案】E

【解析】

- A. 继发性高甘油三酯血症：此选项不正确，因为患者的血清甘油三酯水平虽然略有升高，但并未明显增高，且没有提到有导致血脂异常的原发疾病或药物使用历史。
- B. 原发性混合型高脂血症：此选项不正确，因为此病表现为甘油三酯与胆固醇均升高，而患者的甘油三酯并未明显增高。
- C. 继发性高胆固醇血症：此选项不正确，因为没有提到有导致血脂异常的原发疾病或药物使用历史。
- D. 家族性高甘油三酯血症：此选项不正确，因为患者的甘油三酯并未明显增高。
- E. 家族性高胆固醇血症：此选项正确。患者年纪较轻，有家族史，血清胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇水平明显升高，且体检发现双侧内眦黄色瘤，这些都是家族性高胆固醇血症的典型特征。

103. 【答案】A

【解析】

选项 A 梗阻性肥厚型心肌病：此病例中年男性，劳累后胸闷，心悸。有类似家族史，无高血压和糖尿病史。胸骨左缘三四肋间（主动脉瓣第二听诊区）可闻及 4/6 级收缩期喷射样杂音（提示流出道狭窄），心尖区可闻及 3/6 级收缩期杂音（二尖瓣关闭不全），患者最可能的诊断为：梗阻性肥厚型心肌病。

选项 B 扩张型心肌病：表现为活动时呼吸困难和活动耐量下降，严重时可出现心功能不全表现。合并心律失常是可表现为心悸、头晕、黑朦甚至猝死。但在这个病例中，没有提到这些症状，因此排除。

选项 C 风湿性心脏瓣膜病：患者既往多有风湿病史，常以心脏瓣膜病变为主，多见二尖瓣狭窄。但在这个病例中，没有提到风湿病史，因此排除。

选项 D 冠状动脉粥样硬化性心脏病：主要表现为胸闷、胸痛、心悸、呼吸困难等，但是本病例中并未提及相关症状，因此排除。

选项 E 室间隔缺损：症状包括喘息、气促、劳力性呼吸困难、胸闷、心悸、生长发育迟缓、乏力、发绀（皮肤和



黏膜呈青紫色改变)、多汗、下肢水肿等,但在这个病例中,没有提到这些症状,因此排除。

104. 【答案】D

【解析】

- A. 恢复四次胰岛素皮下注射治疗:该方案在平时的控制糖尿病中是有效的,但对于本例患者急性糖尿病酮症酸中毒情况下,起效较慢,无法立即降低血糖,故不适用。
- B. 静脉大剂量短效胰岛素治疗:大剂量胰岛素可能会导致血糖下降过快,引发低血糖反应,且容易导致血钾过低,故不适用。
- C. 皮下胰岛素泵治疗:皮下胰岛素泵治疗主要用于长期血糖控制,对于急性糖尿病酮症酸中毒,起效慢,不能立即降低血糖,故不适用。
- D. 静脉小剂量短效胰岛素治疗:此方案可以使血清胰岛素浓度恒定,有抑制脂肪分解和酮体生成的最大效应以及相当强的降低血糖效应,且促进钾离子运转的作用较弱,对于急性糖尿病酮症酸中毒的治疗最为适宜。
- E. 基础胰岛素皮下治疗:基础胰岛素主要用于长期控制血糖,对于急性糖尿病酮症酸中毒,起效慢,不能立即降低血糖,故不适用。

105. 【答案】A

【解析】

- 选项 A:胰岛素。该患者为 1 型糖尿病患者,由于自行停用胰岛素,导致胰岛素水平降低,出现高血糖、酮症和酸中毒等症状,因此,胰岛素是存在异常的检查指标。
- 选项 B:生长激素。生长激素是由人体脑垂体前叶分泌的一种肽类激素,能促进骨骼、内脏和全身生长,影响蛋白质合成,影响脂肪和矿物质代谢,与糖尿病酮症酸中毒无关。
- 选项 C:ACTH。ACTH 是促肾上腺皮质激素,能促进肾上腺皮质的组织增生以及皮质激素的生成和分泌,与本题考察的糖尿病酮症酸中毒无关。
- 选项 D:胰岛素抗体。胰岛素抗体异常常见于 1 型糖尿病,是 1 型糖尿病的主要发病机制,但本题主要考察的是患者停用胰岛素后出现的酮症酸中毒,因此胰岛素抗体并非存在异常的检查指标。
- 选项 E:胰高血糖素。胰高血糖素主要在血糖降低时分泌,能提高血糖,但其检查无特异性,不是本题考察的异常检查指标。

106. 【答案】E

【解析】

- 选项 A:补碱、补钾、补钠治疗。这个选项不正确,因为虽然患者的血 pH 值偏低,显示出酸中毒的情况,但是这种酸中毒主要由酮体中酸性代谢产物引起,经输液和胰岛素治疗后,酸中毒可以自行纠正,一般不必补碱。
- 选项 B:补碱、补钾治疗。这个选项也不正确,原因同选项 A,一般不需要补碱。
- 选项 C:补钠、补钙治疗。这个选项不正确,因为患者的血钠值已经在正常范围内,而且补钙在这种情况下并没有明确的指征。
- 选项 D:补碱、补钠治疗。这个选项不正确,原因同选项 A 和 B,一般不需要补碱,而且患者的血钠值已经在正常



范围内。

选项 E：补钾、补钠治疗。这个选项是正确的，患者的尿量已经恢复，血钾在正常范围内，可以进行补钾治疗。

107. 【答案】C

【解析】

- A. Garden I 型：不完全骨折。本题中，X 线显示股骨头下骨皮质不连续，断端部分吻合，因此不是 Garden I 型。
- B. Garden II 型：无移位的完全骨折。本题中，骨折已经发生了部分移位，因此不是 Garden II 型。
- C. Garden III 型：完全骨折，部分移位。本题中，X 线显示股骨头下骨折，断端部分吻合，符合 Garden III 型的特征，因此答案为 C。
- D. Garden IV 型：完全骨折，完全移位。本题中，骨折只有部分移位，因此不是 Garden IV 型。
- E. 无 Garden V 型：Garden 分型没有 V 型，因此选项 E 错误。

108. 【答案】C

【解析】

- A. 60-70 度：此选项不正确，股骨颈骨折后外旋畸形的角度通常在 45-60 度，因此这个范围过大。
- B. 80-90 度：此选项不正确，这个角度远超过了股骨颈骨折后外旋畸形的常见角度。
- C. 50-60 度：此选项是正确答案，股骨颈骨折后外旋畸形的角度通常在这个范围内。
- D. 20-30 度：此选项不正确，这个角度太小，不符合股骨颈骨折后外旋畸形的常见角度。
- E. 30-40 度：此选项不正确，虽然这个角度较小，但仍超出了股骨颈骨折后外旋畸形的常见角度。

109. 【答案】A

【解析】

- A. 髋关节置换术：这是最佳治疗方法，适用于老年患者，特别是全身情况尚好，预期寿命比较长的 Garden III、IV 型股骨颈骨折的老年病人。
- B. 对症治疗，应用非甾体药物：这种方法虽然可以缓解疼痛，但不能解决骨折问题，因此不是最佳选择。
- C. 切开复位固定：这种方法主要用于手法复位失败，或骨折不愈合时，对于此题中的患者来说，并不适用。
- D. 卧床骨牵引：这种方法虽然可以保持骨折部位的相对静止，促进骨折愈合，但效果并不明显，且恢复期长，不适合老年人。
- E. 卧床休息：这种方法只能暂时缓解疼痛，无法解决根本问题，因此不是最佳选择。

110. 【答案】C

【解析】

选项 A：慢性左心衰。此病状常见于心肌病变或心脏负荷过度，表现为心肌收缩力下降和心脏排血量减少。但本题中，患者的症状是突发的，与慢性左心衰的逐渐出现的症状不符，所以 A 选项错误。

选项 B：全心衰。全心衰同时包含了左心衰和右心衰的症状，但本题中，患者并未出现右心衰的特征性症状，如颈静脉怒张、肝大等，所以 B 选项错误。

选项 C：急性左心衰。患者的症状（夜间突发胸闷、端坐呼吸、血压低）与急性左心衰的症状相符，所以 C 选项正

确。

选项 D：右心衰。右心衰常见于肺部疾病或长期高血压，表现为体循环淤血，如颈静脉怒张、肝大等，但本题中，患者并未出现这些症状，所以 D 选项错误。

选项 E：肺栓塞。肺栓塞的常见症状包括胸痛、呼吸困难、咯血等，但本题中，患者并未出现这些症状，所以 E 选项错误。

111. 【答案】A

【解析】

A. 同步直流电复律：此方案是正确的。老年男性患者，既往有冠心病史，夜间突发胸闷、端坐呼吸，呼吸频率增加，血压低，可能诊断为急性左心衰。第一心音强弱不等，提示可能存在房颤，心脏再同步化治疗（CRT）通过改善房室、室间和（或）室内收缩同步性增加心排量，可改善心衰症状、运动耐量，提高生活质量，减少住院率并明显降低死亡率。

B. 异丙肾上腺素：此方案是错误的。异丙肾上腺素主要用于治疗心源性或感染性休克；完全性房室传导阻滞、心搏骤停。

C. 静脉泵多巴酚丁胺：此方案是错误的。多巴酚丁胺为药物治疗，起效慢，不作为首选。

D. 静脉泵多巴胺：此方案是错误的。多巴胺也是药物治疗，起效慢，不作为首选。

E. 去甲肾上腺素：此方案是错误的。去甲肾上腺素也是药物治疗，起效慢，不作为首选。

112. 【答案】D

【解析】

选项 A：X 线胸片主要用于诊断肺部疾病，虽然此患者有湿罗音，但并不能确定是否为肺部疾病，所以此选项不正确。

选项 B：24 小时动态心电图主要用于监测心律失常等心电活动的变化，虽然此患者有第一心音强弱不等的情况，但并不能确定是否为心律失常，所以此选项不正确。

选项 C：心肌核素扫描主要用于评估心肌的血流和功能，虽然此患者有冠心病史，但并不能确定此次症状是否由冠心病引起，所以此选项不正确。

选项 D：冠脉造影是直接查看冠脉狭窄或阻塞程度的检查方法，此患者有多年冠心病史，此次急性心衰可能由冠心病引起，所以此选项是正确的。

选项 E：心肌灌注主要用于评估心肌的血流情况，虽然此患者有冠心病史，但并不能确定此次症状是否由冠心病引起，所以此选项不正确。

113. 【答案】B

【解析】

A. 三尖瓣关闭不全伴狭窄：这种情况下，常在三尖瓣听诊区（胸骨右缘第 2 肋间、胸骨左缘第 3 肋间）闻及舒张期杂音，与题干不符。

B. 二尖瓣关闭不全伴狭窄：符合题干描述，心尖部可闻及 3/6 收缩期杂音和舒张期隆隆样杂音。

- C. 二尖瓣狭窄：只有狭窄的情况下，一般不会同时出现收缩期和舒张期杂音，所以此选项不符合题干描述。
- D. 三尖瓣关闭不全：同 A，常在三尖瓣听诊区闻及舒张期杂音，与题干不符。
- E. 二尖瓣关闭不全：只有关闭不全的情况下，一般不会同时出现收缩期和舒张期杂音，所以此选项不符合题干描述。

114. 【答案】E

【解析】

选项 A：退行性。主要是指瓣膜组织因为老化等原因引起的病变，常见于老年人，以主动脉瓣受累最常见，与题干中的情况不符。

选项 B：感染性。感染性心内膜炎常常会引起瓣膜病变，但是最常累及的是主动脉瓣，与题干中的二尖瓣病变不符。

选项 C：先天性。先天性心脏病通常在出生时就已经存在，而本题中的患者是 42 岁才发现心脏杂音，所以先天性病变的可能性较小。

选项 D：损失性。此项一般指的是由于外伤或手术等原因导致的瓣膜损伤，题干中并未提及此类情况。

选项 E：风湿性。风湿性心脏病是一种常见的心脏病，特别是在中年女性中，二尖瓣是最常受到影响的瓣膜，因此，这个选项是正确的。

115. 【答案】B

【解析】

A. 伤寒：伤寒通常表现为持续性高热，特殊的中毒面容，相对缓脉，皮肤玫瑰疹，肝脾肿大，周围血象白细胞总数低下，嗜酸性粒细胞消失。这些症状与题干描述的病情并不完全符合，因此 A 选项错误。

B. 中毒性菌痢：中毒性菌痢起病、发展快，高热可达 40℃ 以上，迅速发生呼吸衰竭、休克或昏迷，肠道症状多不明显甚至无腹痛与腹泻。这与题干描述的病情完全符合，因此 B 选项正确。

C. 乙脑：乙脑主要病变为脑实质炎症，临床以高热、意识障碍、惊厥、抽搐、呼吸衰竭和脑膜刺激征为特征。但乙脑通常是经蚊叮咬传播，流行于夏秋季节，与题干描述的病情不完全符合，因此 C 选项错误。

D. 流脑：流脑主要临床表现为突起发热、头痛、呕吐、皮肤有瘀点、瘀斑或紫癜及颈项强直等脑膜刺激征。但流脑的脑脊液呈化脓性改变，这与题干描述的病情不符，因此 D 选项错误。

E. 疟疾：疟疾多呈周期性发作，表现为间歇性寒热发作。一般在发作时先有明显的寒战，全身发抖，面色苍白，口唇发绀，寒战持续约 10 分钟至 2 小时，接着体温迅速上升，常达 40℃ 或更高，面色潮红，皮肤干热，烦躁不安，高热持续约 2~6 小时后，全身大汗淋漓，大汗后体温降至正常或正常以下。这与题干描述的病情不完全符合，因此 E 选项错误。

116. 【答案】E

【解析】

选项 A：物理降温。虽然患者有高热，但此时最紧急的问题是休克，所以物理降温并不是首要处理措施。

选项 B：使用糖皮质激素。糖皮质激素在某些情况下可以用于休克的治疗，但对于此种可能由食物中毒引起的休克，首要的治疗方法应是补液和扩容。

选项 C：使用镇静药物。镇静药物在这种情况下并无直接帮助，不能解决休克的问题。

选项 D：使用血管活性药物。血管活性药物在一些休克的治疗中有作用，但在此情况下，需要先进行补液和扩容。

选项 E：快速补液，积极扩容。患者出现低血压、四肢湿冷等休克症状，首要的处理方法就是补液和扩容，以恢复血流动力，纠正休克。

117. 【答案】A

【解析】

选项 A：骨髓增生异常综合征的特点是贫血症状，如乏力、疲倦，血象和骨髓象持续一系或多系血细胞减少。此患儿的血红蛋白、中性粒细胞、血小板均降低，且外周血有幼稚细胞出现，符合骨髓增生异常综合征的诊断标准，因此是正确答案。

选项 B：再生障碍性贫血也可见三系减少，但无外周幼稚细胞出现，与患儿情况不符。

选项 C：阵发性睡眠性血红蛋白尿表现为血红蛋白尿，也可能全血细胞减少，但无幼稚细胞出现，与患儿情况不符。

选项 D：巨幼细胞贫血也可能出现全血细胞减少，但无幼稚细胞出现，与患儿情况不符。

选项 E：急性白血病可出现幼稚细胞，但临床上常有脾大，与患儿无脾大的情况不符。

118. 【答案】B

【解析】

A. 中性粒细胞增多：该选项错误。根据题干中的实验室检查结果，患者的中性粒细胞计数为  $1.0 \times 10^9/L$ ，较正常值低，所以不是中性粒细胞增多。

B. 中性粒细胞减少：该选项正确。如上所述，患者的中性粒细胞计数为  $1.0 \times 10^9/L$ ，较正常值低，故为中性粒细胞减少。

C. 血涂片可见红细胞碎片：该选项错误。红细胞碎片通常出现在溶血性贫血中，而题干中并未提供此类信息。

D. 晨起血红蛋白尿：该选项错误。晨起血红蛋白尿是阵发性睡眠性血红蛋白尿的特征表现，题干中并未提供此类信息。

E. 直接抗人球蛋白阳性：该选项错误。直接抗人球蛋白阳性是温抗体型溶血性贫血的诊断标准，题干中并未提供此类信息。

119. 【答案】A

【解析】

选项 A：静脉注入 50% 的葡萄糖溶液。这是正确答案。在低血糖昏迷的情况下，需要迅速提高血糖，通常选择静脉注入高浓度的葡萄糖溶液。

选项 B：静脉注入 20% 的葡萄糖溶液。这个选项不正确。虽然也可以提高血糖，但是在昏迷的情况下，可能无法快速有效地提高血糖。

选项 C：口服葡萄糖溶液。这个选项不正确。在昏迷的情况下，患者无法口服，而且口服的吸收速度比静脉注入慢。

选项 D：静脉注入 10% 的葡萄糖溶液。这个选项不正确。虽然可以提高血糖，但是在昏迷的情况下，可能无法快速有效地提高血糖。

选项 E: 胃管饲入高碳水化合物食物。这个选项不正确。在昏迷的情况下, 胃管饲入高碳水化合物食物可能无法快速有效地提高血糖。

120. 【答案】C

【解析】

- A. ACTH: 促肾上腺皮质激素, 不直接影响体内血糖浓度, 故此选项不正确。
- B. 胰岛素抗体: 多用来诊断糖尿病的病因, 但在这个问题中, 患者的主要表现是低血糖, 所以此选项不正确。
- C. 胰岛素和 C 肽: 这是正确的答案。胰岛素和 C 肽检查可用来测定低血糖的病因, 若测得的血浆胰岛素浓度过高, 可能提示胰岛素过量, 符合内源性高胰岛素血症 (如胰岛素瘤)。
- D. 糖耐量试验: 多用来确诊糖尿病, 但在这个问题中, 患者的主要表现是低血糖, 所以此选项不正确。
- E. 空腹血糖: 虽然可以用来检查血糖水平, 但无法确定低血糖的具体病因, 所以此选项不正确。

121. 【答案】A

【解析】

- A. 胰岛素瘤: 由于胰岛  $\beta$  细胞瘤或  $\beta$  细胞增生, 分泌大量胰岛素, 引起发作性低血糖症状的功能性胰腺神经内分泌肿瘤, 大部分为良性肿瘤。典型表现为 Whipple 三联征, 符合患者症状, 因此 A 选项正确。
- B. 二型糖尿病: 通常会导致血糖升高, 服用糖水后可能导致高糖高渗性昏迷, 与患者症状不符, 因此 B 选项错误。
- C. 胰岛素抵抗: 典型表现为高血压、高血脂、血中尿酸增高、高胰岛素血症等, 与患者症状不符, 因此 C 选项错误。
- D. 反应性低血糖: 也称为餐后低血糖反应, 主要表现为餐后 2-4 个小时左右出现的心慌、出汗、乏力等低血糖反应, 与患者症状不符, 因此 D 选项错误。
- E. 自主神经功能紊乱: 表现为体位性低血压、心悸、胃肠功能紊乱、尿频尿急等, 与患者症状不符, 因此 E 选项错误。

122. 【答案】B

【解析】

选项 A: 肾活检对明确肾脏疾病, 尤其是各种肾小球疾病的诊断有重要价值。但在这个病例中, 患者的临床表现和实验室检查结果更符合肾综合症出血热的特征, 所以不需要进行肾活检。

选项 B: IgM 抗体检测可以在疾病的早期阶段即可检出特异性 IgM 抗体, 对于肾综合症出血热的诊断具有重要的意义。因此, 这是正确答案。

选项 C: 血涂片对肾综合症出血热的诊断无特异性, 不能作为确诊的依据。

选项 D: 显微凝集试验主要用于钩端螺旋体病的诊断, 与本题患者的病情不符。

选项 E: 抗原快速检测主要用于新型冠状病毒肺炎等疾病的筛查, 对于肾综合症出血热的诊断无特异性。

123. 【答案】C

【解析】

- A. 静脉补充白蛋白: 该患者处于休克期, 需要进行扩容补液, 白蛋白可以提高血浆比重, 增强组织液回流, 改善



微循环，是正确的治疗措施。

B. 静脉滴注生理盐水：生理盐水可以补充体液，改善休克状态，是正确的治疗措施。

C. 静脉滴注新鲜血浆：该患者处于出血热的高凝状态，新鲜血浆含有大量的凝血因子，可能加重高凝状态，应避免使用。

D. 静脉滴注利巴韦林：利巴韦林是一种抗病毒药物，可以减少病毒在体内的复制，是正确的治疗措施。

E. 静脉滴注阿昔洛韦：阿昔洛韦也是一种抗病毒药物，可以减少病毒在体内的复制，是正确的治疗措施。

124. 【答案】A

【解析】

选项 A：垂体危象。考察点是垂体疾病及其临床表现。患者产后无乳、闭经 4 年、毛发缺失（性腺功能减退），血钠低、血压低（肾上腺功能减退），面色苍白、低血糖、低体温，这些都是垂体危象的典型症状，因此选 A 正确。

选项 B：垂体卒中。考察点是垂体疾病及其临床表现。垂体卒中主要表现为突发头痛、视觉障碍和意识障碍，而非本题中的症状，因此选 B 错误。

选项 C：低血糖昏迷。考察点是内分泌疾病及其临床表现。本题中血糖  $3.1\text{mmol/L}$ ，尚未达到低血糖昏迷标准（通常是血浆葡萄糖浓度低于  $2.8\text{mmol/L}$ ），因此选 C 错误。

选项 D：黏液性水肿。考察点是甲状腺疾病及其临床表现。黏液性水肿是由甲减导致的一种症状，而非本题中的症状，因此选 D 错误。

选项 E：Addison 病。考察点是肾上腺疾病及其临床表现。Addison 病的典型症状包括全身皮肤色素明显加深，多呈弥漫性，以暴露部，经常摩擦部位和指（趾）甲根部，疤痕，乳晕，外生殖器，肛门周围，牙龈，口腔粘膜，结膜为明显，而非本题中的症状，因此选 E 错误。

125. 【答案】B

【解析】

选项 A 降血压药：此选项不正确。患者的血压已经偏低（ $80/40$ ），如果再使用降血压药，会进一步降低血压，对患者的生命安全构成威胁。

选项 B 高渗葡萄糖：此选项是正确答案。患者的血糖水平偏低（ $3.1\text{mmol/L}$ ），应立即给予高渗葡萄糖以纠正低血糖状态，同时也能纠正失水。

选项 C 高渗盐水：此选项不正确。虽然患者的血钠水平偏低（ $126.4\text{mmol/L}$ ），但在此情况下，首先应纠正低血糖，而非直接给予高渗盐水。

选项 D 糖皮质激素：此选项不正确。虽然糖皮质激素可以用于垂体危象的治疗，但在本题中，首先应纠正低血糖，再进行其他治疗。

选项 E 甲状腺素：此选项不正确。甲状腺素可以用于垂体功能减退症的治疗，但在本题中，首先应纠正低血糖，再进行其他治疗。

126. 【答案】B

【解析】



- A. 输尿管：输尿管位于腹膜后间隙，周围组织对其有良好的保护，因此外界暴力所致的输尿管外伤很少见，多为医源性外伤。
- B. 肾：肾脏是腰部的重要器官，患者从高处跌落后腰部着地，查体可见腰部皮肤青紫（淤血瘀斑），有压痛，全程肉眼血尿，最可能损伤的部位在肾。
- C. 脾：脾破裂常有腹膜刺激征表现，伤者血压显著降低，而该患者血压正常，故脾不是最可能损伤的部位。
- D. 膀胱：膀胱空虚时位于骨盆深处，受到周围筋膜、肌肉、骨盆及其他软组织的保护，除贯通伤或骨盆骨折外，一般不易发生膀胱外伤。
- E. 尿道：尿道损伤，外伤后即有鲜血自尿道外口滴出或溢出，为前尿道外伤最常见的症状。但在这个案例中，患者并没有这样的表现。

127. 【答案】E

【解析】

- 选项 A：维持水电解质平衡。对于肾损伤的患者，保持水、电解质平衡是非常重要的，因为这有助于保持足够的尿量，防止尿毒症的发生。因此，选项 A 是错误的。
- 选项 B：观察生命体征，监测血红蛋白。对于任何外伤患者，密切观察生命体征以及血红蛋白水平都是必要的，以便及时发现和处理可能的并发症。因此，选项 B 也是错误的。
- 选项 C：应用抗生素预防感染。肾损伤患者容易发生尿路感染，因此早期使用抗生素预防感染是合理的。所以，选项 C 也是错误的。
- 选项 D：镇静，止痛。外伤患者往往会有疼痛，使用镇静剂和止痛药物可以减轻患者的痛苦，因此选项 D 也是错误的。
- 选项 E：肾动脉造影，血管栓塞止血。这是一种针对肾损伤并发症的治疗方法，不适用于初期治疗，因此选项 E 是正确的。

128. 【答案】C

【解析】

- 选项 A：全心衰，指的是左右心同时衰竭。但此患者的体循环淤血表现不明显，所以 A 选项不正确。
- 选项 B：右心衰，主要表现为体循环淤血，如下肢水肿、肝大等，这些在题干描述中并未出现，所以 B 选项不正确。
- 选项 C：左心衰，主要表现为肺循环淤血，如呼吸困难、咳粉红色泡沫痰等，与题干描述相符，所以 C 选项是正确答案。
- 选项 D：肺栓塞，典型表现为呼吸困难、胸痛、咯血，但题干中并未提及胸痛和咯血，所以 D 选项不正确。
- 选项 E：慢性心力衰竭急性发作，通常是在原有慢性心衰的基础上，由于某些诱因而引发的急性心衰。但该患者的表现主要为左心衰，所以 E 选项不正确。

129. 【答案】E

【解析】

- A. 多巴胺：多巴胺是一种  $\beta$  受体兴奋剂，能增加心肌收缩力和心肌射血量。在本例中，患者出现急性左心衰，使

用多巴胺可以提高心肌收缩力，改善病情。

B. 异丙肾上腺素：异丙肾上腺素能增加心肌收缩力，对于急性左心衰的患者是适合的。

C. 去甲肾上腺素：去甲肾上腺素有血管收缩作用，同时能扩张冠脉，有助于改善本例患者的病情。

D. 氨茶碱：氨茶碱能解除气道痉挛，同时有一定的正性肌力作用，对于急性左心衰的患者是适合的。

E. 硝普钠：硝普钠是动静脉血管扩张剂，对于血压已经偏低的患者来说，使用硝普钠会进一步降低血压，可能导致休克，因此是不适合的。

130. 【答案】A

【解析】

A. 冠状动脉造影：此项为正确答案。患者有冠心病史，现呈现急性左心衰表现，考虑由冠心病引发。冠状动脉造影能够观察冠状动脉血流及解剖情况，明确冠状动脉病变的性质、部位、范围、程度。

B. 动态心电图：动态心电图主要检测非持续性心律失常及短暂心肌缺血发作，但在本例中，主要问题是冠状动脉病变，所以此项不适用。

C. 动态心电图平板实验：此实验通过运动增加心脏负荷诱发心肌缺血，对于诊断冠心病有一定帮助，但无法像冠状动脉造影那样直接查看冠状动脉病变情况。

D. 超声心动图：超声心动图主要用于检测主动脉根部、二尖瓣和左心室的功能活动，并不能直接检测到冠状动脉病变。

E. CT 肺动脉造影：此检查是诊断肺栓塞的金标准，但在本例中，主要问题是冠心病引发的急性左心衰，此项不适用。

131. 【答案】D

【解析】

A. 根治性膀胱切除：通常用于肌层浸润性膀胱癌的治疗，能减少局部复发和远处转移，提高病人生存率。但在这个病例中，患者的病情并未进展到需要进行根治性膀胱切除的程度。

B. 膀胱灌注：术后辅助化疗常用方式，但是在这个病例中，患者并未进行手术，因此不适合。

C. 膀胱部分切除：只适用于特定条件的病人，而在这个病例中，患者的病情并未进展到需要进行膀胱部分切除的程度。

D. 经尿道膀胱肿瘤切除：对于早期的膀胱癌，这是一个重要的诊断方法和主要的治疗手段。在这个病例中，患者的临床表现和B超结果都指向早期的膀胱癌，因此这是最适合的治疗方式。

E. 全身化疗：通常是无法手术治愈的转移性膀胱癌的首选治疗方法，但在这个病例中，患者并未出现转移性膀胱癌的情况，因此不适合。

132. 【答案】C

【解析】

A. CT：虽然CT可以判断肿瘤浸润膀胱壁深度、淋巴结以及内脏转移的情况，但对于直接诊断膀胱癌的价值不如膀胱镜活检。

- B. MRI：同样，MRI 也可以判断肿瘤浸润膀胱壁深度、淋巴结以及内脏转移的情况，但对于直接诊断膀胱癌的价值不如膀胱镜活检。
- C. 膀胱镜加活检：膀胱镜下可以直接观察到肿瘤的部位、大小、数目、形态，初步估计浸润程度等，并可对肿瘤和可疑病变进行活检，是诊断膀胱癌最具价值的检查方法。
- D. 膀胱造影：虽然膀胱造影可显示膀胱内的充盈缺损，对诊断是否为癌症有一定价值，但其诊断价值不如膀胱镜。
- E. 腹部超声：虽然腹部超声简便易行，能发现直径 $>0.5\text{cm}$  的肿瘤，可作为病人的最初筛查，但其诊断价值不如膀胱镜。

133. 【答案】D

【解析】

- A. 急性肾损伤：虽然肾病综合征可能导致急性肾损伤，但根据题干信息，这不是此时最易发生的风险。
- B. 消化性溃疡：消化性溃疡是强的松的并发症之一，但题干中并未提供相关信息，因此此选项不正确。
- C. 肺栓塞：肾病综合征确实可能导致血液黏稠度增加，从而引发肺栓塞，但根据题干信息，这不是此时最易发生的风险。
- D. 肺部机会致病菌感染：患者使用强的松，免疫功能可能受到抑制，加上题干中提到的右下肺渗出，这是肺部感染的表现，因此此选项正确。
- E. 类固醇性糖尿病：虽然强的松可能导致类固醇性糖尿病，但根据题干信息，这不是此时最易发生的风险。

134. 【答案】C

【解析】

- A. 糖皮质激素加环磷酰胺：这种方案适用于激素依赖型或激素抵抗型的患者，但患者虽有部分症状改善，无表现为激素依赖或抵抗，所以选项 A 错误。
- B. 糖皮质激素加环孢素：此方案用于治疗激素及细胞毒性药物无效的肾病综合征，患者并未显示出对激素及细胞毒性药物无效，所以选项 B 错误。
- C. 缓慢激素减量：患者已经强的松治疗 3 个月，症状有部分改善，此时应缓慢激素减量，符合糖皮质激素的使用原则，所以选项 C 正确。
- D. 加量激素：没有迹象显示患者需要增加激素剂量，反而可能加重肺部感染，所以选项 D 错误。
- E. 停用激素：患者的病情尚未得到完全控制，此时停用激素可能导致病情恶化，所以选项 E 错误。

135. 【答案】C

【解析】

- A. 经皮肾镜碎石取石术：适用于所有需手术干预的肾结石，包括完全性和不完全性鹿角结石、 $\geq 2\text{cm}$  的肾结石等。对于本题中的肾盂  $1.5\text{cm}$  结石，肾功能正常，无明显积水，此方法可能过于侵入性。
- B. 输尿管镜取石术：主要适用于中、下段输尿管结石，体外冲击波碎石失败的输尿管上段结石等。本题中的肾盂结石并不适合此法。
- C. 体外冲击波碎石：适用于直径 $\leq 2\text{cm}$  的肾结石及输尿管上段结石。对于本题中的肾盂  $1.5\text{cm}$  结石，肾功能正常，

无明显积水，此方法是最佳选择。

D. 肾实质切开取石术：主要应用于结石所在部位较深，其他方法难以取出的情况。但对于本题中的肾盂 1.5cm 结石，此方法过于侵入性。

E. 输尿管切开取石术：主要适用于嵌顿较久或其他的治疗方法治疗失败的结石。本题中的肾盂结石并不适合此法。

136. 【答案】A

【解析】

选项 A：经皮肾镜碎石取石术是一种常用的治疗肾结石的手术方法，特别是对于直径大于 2cm 的肾结石，或者体外冲击波碎石治疗失败的结石，以及部分 L4 以上较大的输尿管上段结石。因此，对于这道题目中的情况，经皮肾镜碎石取石术是最佳的选择，所以选项 A 是正确的。

选项 B：输尿管镜取石术主要适用于中、下段输尿管结石，以及体外冲击波碎石治疗失败的输尿管上段结石。但是，对于这道题目中的情况，该方法并不适用，所以选项 B 是错误的。

选项 C：体外冲击波碎石主要适用于直径小于或等于 2cm 的肾结石和输尿管上段结石。但是，对于这道题目中的情况，体外冲击波碎石并不适用，因为结石的直径大于 2cm，所以选项 C 是错误的。

选项 D：肾实质切开取石术是一种较少使用的方法，通常只在结石位于特定部位时才会使用。对于这道题目中的情况，该方法并不适用，所以选项 D 是错误的。

选项 E：输尿管切开取石术主要适用于嵌顿较久或其他治疗方法治疗失败的结石。但是，对于这道题目中的情况，该方法并不适用，所以选项 E 是错误的。

137. 【答案】B

【解析】

A. 急性间质性肾炎主要由药物、感染、自身免疫因素引发，与题干中的血管内溶血无直接关系，故 A 选项错误。

B. 血管内溶血时，游离血红蛋白会超过肾小球的处理能力，从而滤过进入肾小管，导致肾小管上皮细胞损伤，形成急性肾小管坏死，故 B 选项正确。

C. 新月体型肾炎多表现为急进性肾炎综合征，通常与其他肾小球疾病伴发，与血管内溶血无直接关系，故 C 选项错误。

D. 血栓性微血管病变主要由内皮细胞损伤或血小板聚集引发，常见的病因是感染和药物，与血管内溶血无直接关系，故 D 选项错误。

E. 急性肾炎主要由链球菌等微生物感染引起，与题干中的血管内溶血无直接关系，故 E 选项错误。

138. 【答案】C

【解析】

选项 A：急性间质性肾炎主要表现为肾间质水肿和炎症细胞浸润，肾小球受累较轻。这与肺出血肾综合征的表现不符，所以 A 选项错误。

选项 B：急性肾小管坏死是急性肾衰竭中最常见的类型，主要原因包括肾组织缺血、中毒等，导致肾小管上皮细胞坏死、损伤。这种情况较少引起肺部病变，所以 B 选项错误。



选项 C：新月体型肾炎是肺出血肾综合征的主要肾损伤类型，因此 C 选项正确。

选项 D：血栓性微血管病主要特征为微血管性溶血性贫血，血小板减少，及急性肾衰竭，这与肺出血肾综合征的表现不符，所以 D 选项错误。

选项 E：急性肾炎主要表现为急性起病，血尿、蛋白尿、水肿和高血压等症状，极少合并肺出血，所以 E 选项错误。

139. 【答案】A

【解析】

A. 肝颈静脉回流征阳性：这是右心衰竭的特征性表现，当右心室功能减退，不能有效地将血液泵入肺动脉，导致体循环血液回流不畅，引发肝淤血，进而出现肝颈静脉回流征阳性。所以，选项 A 正确。

B. 颈静脉搏动：颈静脉搏动增强、充盈、怒张是右心衰时的主要体征，但不如肝颈静脉回流征阳性具有特征性，所以选项 B 错误。

C. 双肺底对称细湿啰音：这是左心衰竭的典型体征，由于左心室功能减退，肺循环血液回流不畅，引起肺淤血，出现双肺底对称细湿啰音。所以，选项 C 错误。

D. 多浆膜腔积液：多浆膜腔积液可能是心衰的一种表现，但不具有特异性，左右心衰都可能出现，所以选项 D 错误。

E. 下肢水肿：下肢水肿是右心衰竭的常见体征，但不如肝颈静脉回流征阳性具有特征性，所以选项 E 错误。

140. 【答案】C

【解析】

选项 A：肝颈静脉回流征阳性，这是体循环淤血的表现，与肺循环淤血无直接关系，故此选项错误。

选项 B：颈静脉搏动，同样是体循环淤血的表现，与肺循环淤血无直接关系，故此选项错误。

选项 C：双肺底对称细湿啰音，这是肺循环淤血的典型表现，由于肺毛细血管血压升高，液体渗入到肺泡腔，出现湿啰音，故此选项正确。

选项 D：多浆膜腔积液，这是体循环淤血的表现，与肺循环淤血无直接关系，故此选项错误。

选项 E：下肢水肿，这也是体循环淤血的表现，与肺循环淤血无直接关系，故此选项错误。

141. 【答案】D

【解析】

A. 初期：伤寒的初期，病情逐渐加重，体温呈阶梯形上升，可在 57 天内达到 39~40℃。发热前可有畏寒，少有寒战，出汗不多。初期末常已能触及肿大的脾脏与肝脏。因此，根据题干描述，患者已无发热，不符合初期的特点。

B. 极期：极期常伴有伤寒的典型表现，肠出血与肠穿孔等并发症亦较多在本期发生。但是，根据题干描述，患者已无发热，不符合极期的特点。

C. 高热期：伤寒并无所谓的“高热期”，这是一个错误的选项。

D. 缓解期：缓解期体温开始下降，患者仍觉虚弱，食欲开始恢复，腹胀减轻。肿大的脾脏回缩，压痛减退。本期仍有可能出现各种并发症，包括肠出血、肠穿孔等严重并发症仍可发生。肠穿孔时 X 线立位可见游离气体。根据题干描述，患者已无发热，突感右上腹痛，伴压痛、反跳痛，叩诊肝浊音界消失，X 线站立位见游离气体，符合

缓解期的特点。

E. 恢复期：恢复期体温恢复正常，食欲正常，通常需要一个月左右才能完全康复。根据题干描述，患者的病情并未完全恢复，不符合恢复期的特点。

142. 【答案】B

【解析】

A. 初期：伤寒的初期，病情逐渐加重，体温呈阶梯形上升，但不会出现神智淡漠或谵妄等神经系统症状。因此，选项 A 错误。

B. 极期：伤寒的极期是病情最严重的时期，常伴有伤寒的典型表现，如玫瑰疹、稽留热、消化道症状、神经系统症状等。这些症状与题干中描述的病人症状相符。因此，选项 B 正确。

C. 高热期：伤寒并无所谓的“高热期”，这不是伤寒病程的标准划分。因此，选项 C 错误。

D. 缓解期：在伤寒的缓解期，体温开始下降，患者虽然仍感到虚弱，但神智淡漠和谵妄等症状通常不会出现。因此，选项 D 错误。

E. 恢复期：恢复期体温恢复正常，食欲正常，通常需要一个月左右才能完全康复，此时不会出现题干中描述的症状。因此，选项 E 错误。

143. 【答案】B

【解析】

选项 A：轻链型多发性骨髓瘤占比约 15%-20%，瘤细胞常分化较差，增殖迅速，骨骼破坏多见，肾功能损害较重。但并非最常见的高粘滞性多发性骨髓瘤类型。

选项 B：IgA 型多发性骨髓瘤占比约 15%-20%，IgA 易聚集成多聚体而引起高黏滞血症，因此是最常见的高粘滞性多发性骨髓瘤类型。

选项 C：IgE 型多发性骨髓瘤极为罕见，至今国际上仅有数例报告，不是最常见的高粘滞性多发性骨髓瘤类型。

选项 D：IgM 型多发性骨髓瘤少见，仅占 MM 的 1% 左右，除具有 MM 的一般临床表现外，因其分子量较大且易形成五聚体而使血液黏滞性增高，但并非最常见的高粘滞性多发性骨髓瘤类型。

选项 E：IgG 型是最常见的 MM 亚型，约占 MM 的 50% 左右，此型具有 MM 的典型临床表现，但并非最常见的高粘滞性多发性骨髓瘤类型。

144. 【答案】E

【解析】

选项 A：轻链型多发性骨髓瘤约占 15%~20%，此型瘤细胞常分化较差，增殖迅速，骨骼破坏多见，肾功能损害较重。因此，选项 A 错误。

选项 B：IgA 型多发性骨髓瘤约占 15%~20%，IgA 易聚集成多聚体而引起高黏滞血症。因此，选项 B 错误。

选项 C：IgE 型多发性骨髓瘤非常罕见，至今国际上仅有数例报告。因此，选项 C 错误。

选项 D：IgM 型多发性骨髓瘤少见，仅占 1% 左右，除具有 MM 的一般临床表现外，因其分子量较大且易形成五聚体而使血液黏滞性增高。因此，选项 D 错误。



选项 E: IgG 型是最常见的多发性骨髓瘤亚型, 约占 50% 左右, 此型具有 MM 的典型临床表现。因此, 选项 E 正确。

145. 【答案】D

【解析】

- A. 桡骨小头半脱位: 这是一种常见的小儿肘关节损伤, 发生时无需麻醉即可手法复位, 复位后无需固定, 因此选项 A 错误。
- B. 孟氏骨折: 指尺骨上 1/3 骨折伴上尺桡关节脱位, 多需要手法复位后外固定或者切开复位后内固定, 无需屈腕尺偏固定, 因此选项 B 错误。
- C. 盖氏骨折: 指桡骨干下 1/3 骨折合并尺骨小头脱位, 同样需要手法复位后外固定或者切开复位后内固定, 无需屈腕尺偏固定, 因此选项 C 错误。
- D. Colles 骨折: 这种骨折多为腕关节处于背伸位、手掌着地、前臂旋前时受伤, 以手法复位外固定治疗为主, 手法复位时, 需要屈腕、尺偏位检查骨折对位对线情况及稳定情况, 并使用石膏将复位满意的前臂固定, 因此选项 D 正确。
- E. 桡骨干骨折: 如果没有移位, 需要用石膏托或石膏管固定; 有移位者, 需要手法复位后外固定或切开复位后内固定, 无需屈腕尺偏固定, 因此选项 E 错误。

146. 【答案】A

【解析】

- A. 桡骨小头半脱位: 这是小儿肘关节在伸直位突然受到纵向牵拉, 导致的一种情况。复位后无需固定。
- B. 孟氏骨折: 尺骨上 1/3 骨折伴上尺桡关节脱位, 多需要手法复位后外固定或者切开复位后内固定。
- C. 盖氏骨折: 桡骨干下 1/3 骨折合并尺骨小头脱位, 也是需要手法复位后外固定或者切开复位后内固定。
- D. Colles 骨折: 这是一种腕关节处于背伸位、手掌着地、前臂旋前时受伤的情况, 以手法复位外固定治疗为主, 部分需要手术治疗。
- E. 桡骨干骨折: 单独桡骨干骨折, 如无移位, 需用石膏托或石膏管固定; 有移位者, 需手法复位后外固定或切开复位后内固定。

147. 【答案】D

【解析】

- A. 主动脉瓣关闭不全: 在这种情况下, 左心室舒张末压通常会升高, 因为血液会从主动脉回流到左心室。所以, 这个选项是错误的。
- B. 主动脉瓣狭窄: 这种情况会使得左心室舒张末压增加, 因为左心室必须更努力地将血液泵入主动脉。所以, 这个选项也是错误的。
- C. 二尖瓣关闭不全: 这种情况下, 左心室舒张末压同样会升高, 因为血液会从左心房回流到左心室。所以, 这个选项是错误的。
- D. 二尖瓣狭窄: 这是正确答案。二尖瓣狭窄会导致左心室舒张末压降低, 因为从左心房流入左心室的血流量减少。同时, 左心房内压力升高, 导致肺动脉楔压增加。

E. 肺动脉瓣关闭不全：在这种情况下，肺动脉楔压会降低，因为血液会从肺动脉回流到右心室。所以，这个选项是错误的。

148. 【答案】A

【解析】

选项 A：主动脉瓣关闭不全时，舒张期的血液大部分会反流回左心室，致使左心室内血液增加，主动脉内血液减少，导致舒张压下降。收缩期时，左心室血量增加，射入主动脉的血量增加，导致收缩压上升，脉压增大。这与题干中的动脉血压 130/50mmHg 相符，所以选项 A 是正确的。

选项 B：主动脉瓣狭窄会引起射入主动脉的血流量减少，导致收缩压降低，与题干描述不符，所以选项 B 是错误的。

选项 C：二尖瓣关闭不全会引起射入主动脉的血流量减少，导致收缩压降低，与题干描述不符，所以选项 C 是错误的。

选项 D：二尖瓣狭窄会引起射入主动脉的血流量减少，导致收缩压降低，与题干描述不符，所以选项 D 是错误的。

选项 E：肺动脉瓣关闭不全时，常导致舒张压升高，与题干描述不符，所以选项 E 是错误的。

149. 【答案】E

【解析】

选项 A：苦笑面容是一种病态笑容，主要见于破伤风患者，与 Addison 病无关，所以 A 选项错误。

选项 B：满月脸是一种特征性的面部肥胖，脂肪堆积呈满月状，皮肤潮红，皮肤变薄，常伴有痤疮和胡须生长。这主要是由于肾上腺皮质功能亢进或者医源性皮质醇增多症引起的，与 Addison 病（肾上腺皮质功能减退）相反，所以 B 选项错误。

选项 C：面色苍白常见于贫血患者，而 Addison 病患者则表现为全身皮肤色素明显加深，所以 C 选项错误。

选项 D：毛发旺盛通常与雄性激素水平过高有关，和 Addison 病无直接关系，所以 D 选项错误。

选项 E：Addison 病又称原发性慢性肾上腺皮质功能减退症，临床上可见全身皮肤色素明显加深，多呈弥漫性，以暴露部，经常摩擦部位和指（趾）甲根部，疤痕，乳晕，外生殖器，肛门周围，牙龈，口腔粘膜，结膜为明显。所以 E 选项正确。

150. 【答案】C

【解析】

A. 苦笑面容：这是破伤风的典型症状，与 Sheehan 综合征无关，所以选项 A 错误。

B. 满月脸：这是库欣综合征的特征表现，主要是由于肾上腺皮质激素分泌过多引起的，与 Sheehan 综合征无关，所以选项 B 错误。

C. 面色苍白：Sheehan 综合征是由于产后大出血导致垂体前叶功能减退，ACTH 缺乏，临床表现为皮肤色素减退、面色苍白等症状。所以选项 C 正确。

D. 毛发旺盛：这并不是 Sheehan 综合征的典型症状，所以选项 D 错误。

E. 色素沉着：这是 Addison 病的典型症状，与 Sheehan 综合征无关，所以选项 E 错误。

## 第三单元

### 1. 【答案】B

#### 【解析】

选项 A: RF 因子（类风湿因子）不仅可以见于结缔组织病，也可见于感染性疾病中。这是正确的，因此选项 A 错误。

选项 B: ANCA 为抗中性粒细胞胞浆抗体，对血管炎的诊断有帮助，不用来诊断系统性红斑狼疮。因此，选项 B 是错误的，这是本题的正确答案。

选项 C: 抗环瓜氨酸抗体可作为 RE 阴性的 RA 的诊断依据。这是正确的，因此选项 C 错误。

选项 D: 抗核抗体是结缔组织病的筛查项目之一，阳性需警惕结缔组织病的可能。这是正确的，因此选项 D 错误。

选项 E: 抗 dsDNA 抗体与系统性红斑狼疮有关，是诊断系统性红斑狼疮的重要指标。这是正确的，因此选项 E 错误。

### 2. 【答案】A

#### 【解析】

选项 A: 葡萄糖利用能力增加。这个选项是错误的，因为在外科手术后，患者的身体会处于应激状态，组织器官对葡萄糖的利用能力实际上会下降，而不是增加。

选项 B: 负氮平衡。这个选项是正确的，因为在外科手术后，由于蛋白质分解增加，会导致身体呈现负氮平衡。

选项 C: 脂肪动员增加。这个选项是正确的，因为在外科手术后，身体的脂肪分解和动员会增强，以提供额外的能量。

选项 D: 蛋白质分解增多。这个选项是正确的，因为外科手术后，身体会分解更多的蛋白质来满足能量需求。

选项 E: 机体代谢加快。这个选项是正确的，因为在外科手术后，身体会处于应激状态，代谢速度会加快。

### 3. 【答案】B

#### 【解析】

选项 A: 胸腔闭式引流通常是在已经控制了气胸的病因后，用于排出胸腔内的空气和积液。在交通性气胸的急救阶段，首要任务是封闭伤口，防止外界空气进入胸腔，所以此选项不正确。

选项 B: 无菌纱布覆盖伤口是交通性气胸的首要处理措施，因为这可以防止外界空气进入胸腔，避免肺部进一步塌陷，同时也可以防止细菌进入胸腔导致感染。所以此选项正确。

选项 C: 胸廓固定术多应用于肋骨骨折，而不是交通性气胸的首要处理措施，所以此选项不正确。

选项 D: 固定、吸氧是对休克或呼吸困难的患者的处理方法，虽然对于交通性气胸的患者可能有帮助，但不是首要处理措施，所以此选项不正确。

选项 E: 及时抽出胸腔气体是针对张力性气胸的紧急处理措施，而不是交通性气胸的首要处理措施，所以此选项不正确。

### 4. 【答案】E

#### 【解析】

选项 A: 周边粘膜充血水肿。此选项正确。胃溃疡发生时，周围的黏膜会发生反应性改变，包括充血和水肿。

选项 B：表面可有炎性渗出物。此选项正确。胃溃疡的表面通常会有炎性渗出物覆盖，这是身体对炎症的一种自然反应。

选项 C：可见坏死组织。此选项正确。胃溃疡的深部可能会出现坏死组织，这是因为溃疡破坏了胃壁的正常组织结构。

选项 D：可见肉芽组织。此选项正确。在胃溃疡愈合过程中，新生的肉芽组织会填充溃疡底部，以帮助恢复正常的组织结构。

选项 E：底部可见异型细胞。此选项错误，是本题的正确答案。胃溃疡的底部通常不会出现异型细胞，这种情况更多见于肿瘤或癌前病变。

5. 【答案】A

【解析】

A. 胃黏膜屏障受损：正确。胃溃疡的主要发病机制是胃黏膜屏障防御功能降低，这是因为胃黏膜的防御和修复功能对维持黏膜的完整性、促进溃疡愈合非常重要。

B. 胃黏膜免疫屏障破坏：错误。胃黏膜免疫屏障破坏多见于慢性胃炎，而非胃溃疡。

C. 迷走神经功能亢进：错误。迷走神经功能亢进可以导致胃内胃酸分泌增多，进而导致十二指肠溃疡，而非胃溃疡。

D. 胃泌素增加：错误。胃泌素增加可以导致胃酸分泌增多，进而导致十二指肠溃疡，而非胃溃疡。

E. 前列腺素合成减少：错误。前列腺素合成减少会导致黏膜修复障碍，出现糜烂和出血，是急性胃炎的发病机制，而非胃溃疡。

6. 【答案】A

【解析】

A. 前壁：正确。十二指肠溃疡穿孔最常见的部位是球部前壁，因为这里的管壁比较薄弱，血液循环相对不丰富，容易形成溃疡并发生穿孔。

B. 后壁：错误。十二指肠溃疡出血多发生在球部后壁，但穿孔的主要部位仍然是前壁。

C. 升部：错误。十二指肠溃疡穿孔主要发生在球部前壁，而非升部。

D. 降部：错误。十二指肠溃疡穿孔主要发生在球部前壁，降部不是主要的发病部位。

E. 水平部：错误。十二指肠溃疡穿孔主要发生在球部前壁，水平部也不是主要的发病部位。

7. 【答案】C

【解析】

A. 病情好转-错误。支气管哮喘患者  $\text{PaCO}_2$  增高并不表示病情好转，反而可能是病情恶化的标志。

B. 病情稳定-错误。同样， $\text{PaCO}_2$  增高并不代表病情稳定，而是可能出现严重气道阻塞的警示。

C. 病情危重，需要机械通气-正确。当  $\text{PaCO}_2$  较前增高，即使在正常范围内也要警惕严重气道阻塞的发生，此时需要进行机械通气。

D. 出现呼吸性碱中毒-错误。过度通气会导致  $\text{PaCO}_2$  下降，pH 上升，表现为呼吸性碱中毒，而非  $\text{PaCO}_2$  增高。

E. 合并心力衰竭，需要使用利尿剂-错误。PaCO<sub>2</sub>增高并不代表合并心力衰竭，因此无需使用利尿剂。

8. 【答案】E

【解析】

A. 结核菌：结核杆菌是结核病的常见致病菌，可导致空洞型肺结核，引起继发性肺脓肿，但不是形成单个空洞肺脓肿的主要致病菌。

B. 真菌：肺真菌病引起的肺脓肿多为多发性肺脓肿，不是形成单个空洞肺脓肿的主要致病菌。

C. 肺炎链球菌：虽然可以引起肺脓肿，但并非形成单个空洞肺脓肿的主要致病菌。

D. 金黄色葡萄球菌：虽然可以引起肺脓肿，但并非形成单个空洞肺脓肿的主要致病菌。

E. 厌氧菌：吸入性肺脓肿常为单发，致病菌多为厌氧菌，因此这是正确答案。

9. 【答案】B

【解析】

A. 1 级：内痔 I 度是指便时带血、滴血或手纸带血，便后出血可自行停止，无痔脱出。这与题干的病人情况不符，所以此选项错误。

B. 2 级：内痔 II 度是指排便时有痔脱出，便后可自行还纳，可能伴有出血。这完全符合题干所描述的病人情况，所以此选项正确。

C. 3 级：内痔 III 度是指排便或久站、咳嗽劳累负重时痔脱出肛门外，需用手辅助还纳，可能伴有出血。题干中的病人情况并未达到这一程度，所以此选项错误。

D. 4 级：并无 4 级的内痔分类，所以此选项错误。

E. 5 级：并无 5 级的内痔分类，所以此选项错误。

10. 【答案】C

【解析】

A 选项：大量炎性渗出。这是急性胰腺炎的基本病理改变，但并非 Grey-Turner 征的病理生理改变。

B 选项：腹腔间隔室综合征。这是由于胰腺炎引起腹腔内压增高所致，但并非 Grey-Turner 征的病理生理改变。

C 选项：胰腺出血坏死。这是 Grey-Turner 征的病理生理改变，表现为患者的双侧或单侧腰部皮肤出现蓝-绿-棕色大片不规则淤斑，由于胰酶溢出胰腺组织外，引起出血性积液，可沿腹膜后透过肌层等组织，到达皮下组织而引起毛细血管出血。

D 选项：肠麻痹。这是急性胰腺炎时腹腔神经丛受刺激引起腹胀的原因，但并非 Grey-Turner 征的病理生理改变。

E 选项：急性腹膜炎。这是急性胰腺炎导致的腹膜炎症状，但并非 Grey-Turner 征的病理生理改变。

11. 【答案】B

【解析】

A. 胸部正位 X 线：这种检查方法主要用于肺部疾病的检查，对于乳腺癌的筛查效果不佳，因为它对软组织的显影效果较差。

B. 乳腺 X 线：这是乳腺癌的常用筛查方法，能够有效地显示乳腺组织的结构和可能存在的异常。因此，这个选项



是正确的。

C. 乳腺 MRI: 虽然乳腺 MRI 能够提供更详细的图像信息, 对于微小病灶、多中心、多病灶的发现及评价病变范围有优势, 但由于成本较高, 一般不作为乳腺癌的首选筛查方法。

D. 穿刺活检: 这是一种诊断方法, 而非筛查方法。穿刺活检可以通过取得组织样本进行病理学检查, 从而准确诊断乳腺癌。

E. 胸部 CT: 同样, 胸部 CT 主要用于肺部疾病的检查, 对于乳腺癌的筛查效果不佳。

12. 【答案】A

【解析】

A 选项: 阻塞性肺炎主要特征是持续气流受限导致肺通气功能障碍。因此, 虽然肺泡有通气, 但由于肺泡周围的毛细血管受到挤压, 血流量减少, 导致通气与血流比例失调, 从而产生缺氧。这是阻塞性肺疾病的主要缺氧机制。

B 选项: 肺泡通气量不足会导致缺氧, 但同时也会有二氧化碳潴留, 引起 II 型呼吸衰竭。这并不是阻塞性肺疾病的主要缺氧机制。

C 选项: 氧弥散功能失调指的是气体通过肺泡膜进行交换的过程出现障碍, 这通常是 I 型呼吸衰竭的原因, 而非阻塞性肺疾病的主要缺氧机制。

D 选项: 分流率增加指的是肺动脉内的静脉血未经氧合直接流入肺静脉, 导致  $PO_2$  降低。这是通气/血流比例失调的特例, 但并非阻塞性肺疾病的主要缺氧机制。

E 选项: 呼吸功能增加时, 氧耗量增加, 也会导致低氧血症, 但并不是阻塞性肺疾病的缺氧机制。

13. 【答案】D

【解析】

选项 A: 限制性通气功能障碍, 主要出现在肺部无病变而胸廓活动度受限的病例, 如肺间质纤维化, 胸廓畸形, 胸腔积液, 胸膜增厚等, 这与急性呼吸窘迫综合征 (ARDS) 的病理机制不符, 所以错误。

选项 B: 弥散功能障碍, 是指肺的肺泡膜在进行氧气和二氧化碳的气体交换的时候, 发生的弥散障碍, 常见于肺部疾病如肺气肿, 肺炎, 肺间质纤维化等, 但并非 ARDS 导致顽固性低氧血症的主要机制, 所以错误。

选项 C: 通气/血流比例失衡, 常见于肺栓塞、阻塞性肺炎、肺不张等病症, 与 ARDS 导致顽固性低氧血症的主要机制不符, 所以错误。

选项 D: 分流率增加, 是急性呼吸窘迫综合征 (ARDS) 的主要病理特征之一, 由于肺泡膜通透性增加与肺表面活性物质减少, 引起肺间质和肺泡水肿以及小气道陷闭和肺泡萎陷不张, 进而导致肺内分流增加, 造成顽固性低氧血症和呼吸窘迫, 所以正确。

选项 E: 呼吸功能增加, 常见于体育活动或情绪过激时, 与 ARDS 无关, 所以错误。

14. 【答案】B

【解析】

选项 A: 胰腺。不正确。在腹部探查中, 胰腺并不是首先需要探查的脏器。虽然胰腺损伤可能导致严重的并发症, 但其位置深在腹腔内, 不易直接接触及, 因此通常在其他易达的脏器探查无异常后再进行。



选项 B: 胃。正确。在进行腹部探查时, 胃是应首先被探查的脏器。胃位于腹腔上部, 容易触及, 且胃损伤可能导致消化道内容物泄漏到腹腔内, 引发感染和腹膜炎, 因此需要优先探查。

选项 C: 直肠。不正确。直肠位于腹腔下部, 一般在探查完上腹部脏器后才会检查。此外, 直肠损伤的临床表现通常较为明显, 如肛门出血等。

选项 D: 十二指肠。不正确。十二指肠位于胃的下方, 通常在胃探查后才会进行。十二指肠损伤可能导致胆汁或胰液泄漏, 但由于其位置较深, 不易直接触及, 因此不会首先探查。

选项 E: 空肠。不正确。空肠位于腹腔中部, 通常在胃和十二指肠探查后才会进行。空肠损伤可能导致消化道内容物泄漏, 但由于其长度和位置, 不会首先探查。

15. 【答案】C

【解析】

A. 结肠镜是诊断结肠癌的重要手段, 但并非筛查首选, 因为它的侵入性较大。

B. 腹部 CT 可以了解腹部病变情况, 但作为筛查手段, 辐射和成本过高。

C. 粪潜血检测是筛查结肠癌的首选, 简单、无创、成本低, 且能有效发现早期病变。

D. 腹部 B 超虽能了解腹部病变情况, 但对结肠癌的早期筛查效果不佳。

E. 腹部 MRI 虽能提供较高分辨率的图像, 但成本高, 不适合作为筛查手段。

16. 【答案】A

【解析】

选项 A: 肛门排气。正确。阑尾炎手术后, 肠蠕动减弱, 容易造成粘连性肠梗阻。若可闻及肠鸣音或肛门排气, 代表肠道已恢复蠕动。

选项 B: 压痛反跳痛消失。错误。这个选项代表急性阑尾炎的症状减轻, 但不能提示肠道恢复蠕动。

选项 C: 腹胀消失。错误。腹胀消失也是急性阑尾炎症状的减轻, 但不能作为肠道恢复蠕动的标志。

选项 D: 有饥饿感。错误。外科手术后, 患者静息能量增加, 处于负氮平衡, 会有饥饿感, 但这并不能说明肠道恢复蠕动。

选项 E: 腹痛消失。错误。腹痛消失代表急性阑尾炎症状减轻, 但不能提示肠道恢复蠕动。

17. 【答案】B

【解析】

选项 A: 小儿阑尾炎的治疗原则是早期手术, 并配合输液、纠正脱水, 应用广谱抗生素等, 因此选项 A 错误。

选项 B: 小儿阑尾炎的临床特点包括病情发展较快且较重, 穿孔率较高, 这是因为小儿的阑尾壁薄, 易于穿孔, 所以选项 B 正确。

选项 C: 尽管右下腹体征是小儿阑尾炎的重要体征, 但其并不明显、不典型, 因此选项 C 错误。

选项 D: 小儿阑尾炎早期即出现高热、呕吐等症状, 故选项 D 错误。

选项 E: 小儿阑尾炎并发症和死亡率较高, 因此选项 E 错误。

18. 【答案】D

## 【解析】

- A. 1 周：此选项不正确。根除 Hp 感染后，用 C13 法复查需要在治疗后 4 周，避免在应用 PPI 或抗生素期间出现假阴性结果。
- B. 2 周：此选项不正确。同上，复查时间需要在治疗后的 4 周。
- C. 3 周：此选项不正确。同上，复查时间需要在治疗后的 4 周。
- D. 4 周：此选项正确。根据医学专业知识，根除 Hp 感染后，用 C13 复查需要在治疗后 4 周，以避免在应用 PPI 或抗生素期间出现假阴性结果。
- E. 5 周：此选项不正确。虽然超过了 4 周，但是按照医学专业的标准，复查的最佳时间是在治疗后的 4 周。

## 19. 【答案】D

## 【解析】

- A. 腹部 CT：虽然可以提高胃癌临床分期的精确度，但对于肿瘤浸润深度的判断不够准确。
- B. X 线钡剂造影：此方法可能发现胃内的溃疡及隆起型病灶，但难以鉴别良恶性，也无法明确肿瘤的浸润深度。
- C. 染色内镜：虽能清楚看到胃内的病变情况，但不能明确肿瘤的浸润深度。
- D. 内镜超声：可以较准确地判断肿瘤侵犯深度，有助于区分早期和进展期胃癌，并了解有无局部淋巴结转移，是最佳的选择。
- E. 腹部 MRI：对于肿瘤的浸润深度判断不够准确，不为此类检查的首选。

## 20. 【答案】A

## 【解析】

- A. 肝癌局限于一侧肝叶或肝段内：正确。如果肝癌局限于一侧肝叶或肝段内，且病人的一般情况较好，无明显心、肺、肾等重要脏器器质性病变，那么这是肝癌手术的一个重要指征。
- B. Child-Pugh 肝功能分级属 B 级或 C 级：错误。Child-Pugh 肝功能分级属 B 级或 C 级的患者，肝功能已经相对较差，不适合进行手术治疗。
- C. 大量腹水：错误。大量腹水通常表示肝硬化或肝功能衰竭，这种情况下进行手术风险较高。
- D. AFP>100：错误。AFP（甲胎蛋白）>100 可以作为诊断肝癌的一个参考指标，但并不是手术的指征。
- E. 胆红素过高：错误。胆红素过高通常表示肝功能不全或胆道阻塞，不适合进行手术。

## 21. 【答案】D

## 【解析】

- A 选项：手指指尖样刺痛。这是末梢神经炎的常见症状，与低钙血症无直接关联。
- B 选项：腱反射亢进。这是锥体束损害的常见症状，与低钙血症无直接关联。
- C 选项：口角紧张。这多见于口角炎，与低钙血症无直接关联。
- D 选项：面神经叩击阳性。这是低钙血症的一个常见症状，也被称为 Chvostek 征。当面神经受到轻微刺激（如叩击）时，会引发面部肌肉的痉挛。这是因为低钙血症会增加神经肌肉的兴奋性。
- E 选项：踝阵挛。这主要是由于锥体束以上病变所导致，可见于神经系统疾病。与低钙血症无直接关联。

## 22. 【答案】D

## 【解析】

- A. 肺血管通透性增加：这个现象多见于急性呼吸窘迫综合症，而非肺栓塞。
- B. 肺通气功能障碍：这个症状主要表现为肺泡通气量的减少、最大通气量的下降、气道阻力的增加等，多见于哮喘、肺不张、放射性的肺炎、阻塞性的肺气肿等疾病，而非肺栓塞。
- C. 动静脉血管分流：这个现象多见于肺动静脉瘘，并非由肺栓塞引起。
- D. 肺通气/血流比例失调：这是肺栓塞引起的血流动力学改变的正确答案。当肺动脉或其分支被栓子阻塞时，会导致肺部的血流减少，而通气功能可能仍然保持，从而导致肺通气/血流比例失调。
- E. 弥散障碍：这个问题常见于肺气肿、弥漫性肺纤维化等疾病，而非肺栓塞。

## 23. 【答案】E

## 【解析】

- A. 低位肠梗阻的腹胀是明显的，而非不明显，所以 A 选项错误。
- B. 低位肠梗阻的呕吐物并非主要是胃内容物，而可能是粪样物，所以 B 选项错误。
- C. 低位肠梗阻发生的位置并非主要在空肠，而是在回肠、回盲部、大肠，所以 C 选项错误。
- D. 低位肠梗阻的呕吐症状出现较晚，而并非早，所以 D 选项错误。
- E. 在低位肠梗阻中，X 线腹透可以见到腹部数个阶梯状含气液平面，这是因为扩张的肠袢在腹中部呈“阶梯状”排列，所以 E 选项正确。

## 24. 【答案】C

## 【解析】

- A. 甲状腺全切除+左侧改良根治性颈淋巴结清扫术：适用于肿瘤侵犯颈部组织或有远处转移者，本题中没有明确指出这些情况，所以此选项不正确。
- B. 甲状腺左叶切除+左侧改良根治性颈淋巴结清扫术：腺叶切除多适用于良性病变，本题中的病例为恶性病变，所以此选项不正确。
- C. 甲状腺次全切除术+左侧改良根治性颈淋巴结清扫术：正确选项，患者左侧甲状腺乳头状癌，伴淋巴结转移，适宜的手术方式为甲状腺次全切除+左侧改良根治性颈淋巴结清扫术。
- D. 甲状腺左叶切除+左侧 VI 区淋巴结清扫术：没有器官受累时一般选择改良根治性颈淋巴结清扫术，本题中的病例为恶性病变，所以此选项不正确。
- E. 甲状腺左叶部分切除+左侧 VI 区淋巴结清扫术：没有器官受累时一般选择改良根治性颈淋巴结清扫术，本题中的病例为恶性病变，所以此选项不正确。

## 25. 【答案】C

## 【解析】

- A. 血 D-二聚体：D-二聚体是肺动脉栓塞的疑诊检查，急性 PTE 时 D-二聚体升高，但由于其特异性差，对 PTE 无确诊价值。

- B. 超声心动图：超声心动图可以提示 PTE 和除外其他心血管疾病，及进行急性 PTE 危险度分层，但也仅是疑诊检查。
- C. CT 肺动脉造影：这是肺动脉栓塞的一线确诊手段，能直接显示血栓。
- D. 血气分析：肺血栓栓塞，动脉血气分析常表现为低氧血症、低碳酸血症，部分病人的血气结果可以正常，故无特异性。
- E. 肺功能检查：肺功能检查对诊断肺血栓栓塞无特异性。

26. 【答案】C

【解析】

选项 A：慢性细菌性痢疾主要表现为腹痛、腹泻、排黏液脓血便以及里急后重等。本题患者大便有粘液无脓血，排除了此答案。

选项 B：溃疡性结肠炎的症状包括腹痛、腹泻、排脓血便等。本题患者大便无脓血，排除了此答案。

选项 C：克罗恩病常见症状有腹泻、腹痛、右下腹腹部包块，肛门周围瘘管、脓肿及肛裂等病变。本题患者的症状与此相符，故此为正确答案。

选项 D：结肠癌，右侧结肠癌隆起型多见，易坏死、出血及感染，因此以腹痛、腹部肿块和全身症状为主。本题患者没有出血症状，排除了此答案。

选项 E：中毒性巨结肠的典型症状是腹痛、腹泻、血便、发热、心动过速等。本题患者没有血便和发热症状，排除了此答案。

27. 【答案】B

【解析】

选项 A：肝硬化患者呕血后，脾静脉回流阻力减小及门静脉压力降低，可以导致脾脏缩小。所以该选项是可能出现的临床表现。

选项 B：肝硬化患者呕血后，因有效循环血量不足及低蛋白血症，通常会导致腹腔积液增多，而不是减少。所以该选项是不可能出现的临床表现，是本题的正确答案。

选项 C：消化道出血是肝性脑病的常见诱因，扑翼样震颤为肝性脑病常见症状。所以该选项是可能出现的临床表现。

选项 D：腹胀、腹痛可由腹水增加引起，所以这也是可能出现的临床表现。

选项 E：嗜睡是肝性脑病的一种常见症状，所以这也是可能出现的临床表现。

28. 【答案】A

【解析】

选项 A：微循环灌注。这是正确答案。在抗休克治疗中，尿量的增加直接反映了肾脏的血液灌注情况，而肾脏的血液灌注又与微循环灌注密切相关。因此，微循环灌注的改善会直接影响到尿量的增加。

选项 B：心排血量。心排血量的增加确实可以提高尿量，但它并不是直接影响尿量的主要因素。因此，此选项不正确。

选项 C：动脉舒张压。动脉舒张压的提高可以改善全身的血液灌注，但它与尿量的增加没有直接关系。因此，此选

项不正确。

选项 D: 肺毛细血管楔压。肺毛细血管楔压是反映左心功能的一个重要指标, 但它与尿量的增加没有直接关系。因此, 此选项不正确。

选项 E: 中心静脉压。中心静脉压反映了全身血容量与右心功能之间的关系, 但它与尿量的增加没有直接关系。因此, 此选项不正确。

29. 【答案】B

【解析】

A. 呼酸合并代碱失代偿期: 这种情况下, PH 值应该降低, 二氧化碳分压升高, 碱剩余增加。但在这个患者中, 碱剩余是负数, 不符合此选项。

B. 呼碱合并代酸失代偿期: 这种情况下, PH 值降低, 二氧化碳分压降低, 碱剩余减少。在这个患者中, 这些条件都符合, 所以这是正确答案。

C. 呼酸: 呼吸性酸中毒时, PH 值应该降低, 二氧化碳分压升高。但在这个患者中, 二氧化碳分压是降低的, 所以这个选项是错误的。

D. 呼碱: 呼吸性碱中毒时, PH 值应该升高, 二氧化碳分压降低。但在这个患者中, PH 值是降低的, 所以这个选项是错误的。

E. 代碱: 代谢性碱中毒时, PH 值应该升高, 碱剩余增加。但在这个患者中, PH 值和碱剩余都降低了, 所以这个选项是错误的。

30. 【答案】C

【解析】

A. 输出袢梗阻: 该病症往往会导致上腹部饱胀不适, 严重时会有呕吐, 呕吐物含胆汁。但题干中并未提到这些症状, 因此 A 选项不正确。

B. 吻合口梗阻: 吻合口梗阻通常是由于吻合口过小或吻合时内翻过多, 加上术后吻合口水肿所致。然而, 题干中并没有提到这些信息, 因此 B 选项不正确。

C. 十二指肠残端破裂: 十二指肠残端破裂的典型症状包括剧烈的上腹痛, 可能伴有发热, 腹膜刺激体征, 腹腔穿刺可得腹腔液含胆汁。这些症状与题干中的信息相符, 因此 C 是正确答案。

D. 急性胰腺炎: 急性胰腺炎通常会有腹膜炎、休克等表现, 但题干中并未提到这些症状, 因此 D 选项不正确。

E. 残胃癌: 残胃癌是术后远期并发症, 但题干中的症状出现在术后 5 天, 因此 E 选项不正确。

31. 【答案】A

【解析】

A. Mirizzi 综合症: 此症状是由胆囊结石引起的, 结石嵌顿在胆囊颈部或胆囊管, 压迫肝总管, 造成肝总管扩张, 而胆总管无扩张, 符合题干描述, 所以是正确答案。

B. 胰头癌: 通常会导致腹部包块, 无痛性进行性黄疸, 胰管、胆总管可有梗阻扩张, 但不会导致胆囊增大, 所以不符合题干描述, 排除。



- C. 急性胆管炎：主要表现为腹痛、寒战高热、黄疸，可能会导致肝内外胆管扩张，但一般无胆囊增大，所以不符合题干描述，排除。
- D. 肝门胆管癌：可能会导致进行性黄疸，但胆囊不肿大，甚至可能缩小，所以不符合题干描述，排除。
- E. 肝内胆管结石：可能会导致胆管狭窄及近端胆管扩张，但不会导致胆囊增大，所以不符合题干描述，排除。

32. 【答案】A

【解析】

- A. 直肠息肉：病人的年龄、症状和体检结果与直肠息肉的典型表现相符，因此这是正确答案。
- B. 直肠癌：虽然直肠癌也可能出现便血的症状，但一般好发于老年人，且直肠指诊时会扪及高低不平的硬结、溃疡、菜花状肿物，肠腔可有狭窄，而非光滑柔软的包块。
- C. 直肠脱垂：直肠脱垂在排便时可见脱出，直肠指诊时感到肛门括约肌收缩无力，嘱病人用力收缩时，仅略有收缩感觉，与病例描述不符。
- D. 血栓性外痔：血栓性外痔会有肛门剧痛、肛周暗紫色卵圆形肿物的表现，与病例描述不符。
- E. 肛瘘：肛瘘直肠指诊可触及到粘膜外条索状肿物，检查时在肛周皮肤上可见到单个或多个外口，挤压时有脓液或脓血性分泌物排出，与病例描述不符。

33. 【答案】B

【解析】

- A. 肝脓肿：肝脓肿的典型症状包括寒战、高热、肝区疼痛和肝大，但黄疸少见，考虑患者的黄染，此选项不符合。
- B. 肝门静脉炎：肝门静脉炎是急性阑尾炎的并发症，临床表现为寒战、高热、肝大剑突下压痛轻度黄疸等，与题干中的病史相符，因此，此选项正确。
- C. 胆总管结石：胆总管结石主要表现为上腹部绞痛，黄疸程度取决于梗阻程度，但无右下腹痛，与题干不符，此选项错误。
- D. 胆囊炎：胆囊炎开始时仅有上腹胀痛不适，逐渐发展至呈阵发性绞痛，但无右下腹痛，与题干不符，此选项错误。
- E. 阑尾炎：阑尾炎典型表现为转移性右下腹疼痛，但无肝区压痛与黄疸，与题干不符，此选项错误。

34. 【答案】B

【解析】

选项 A：胃粘膜上皮和腺体被杯状细胞幽门腺细胞取代，这是化生的表现，不符合题干中“上皮异型增生”的病理改变，所以 A 选项错误。

选项 B：上皮细胞增生和分化缺失，这是胃粘膜上皮异型增生的主要特征，因此 B 选项正确。

选项 C：淋巴细胞，浆细胞等慢性炎症改变，这是胃粘膜的炎症变化，与题干中的“上皮异型增生”无关，所以 C 选项错误。

选项 D：腺体缺失，间质纤维化，这是胃粘膜萎缩的表现，与题干中的“上皮异型增生”无关，所以 D 选项错误。

选项 E：中性粒细胞浸润，这是炎症活动性的表现，与题干中的“上皮异型增生”无关，所以 E 选项错误。



## 35. 【答案】A

## 【解析】

- A. 胃镜：此选项正确。当病人出现反酸症状，且不能完全缓解，出现吞咽困难，最可能的诊断为食管癌，首选检查为胃镜。胃镜可以直接观察病灶形态，并取活检以确诊。
- B. CT 检查：此选项错误。虽然 CT 检查可以清晰显示食管与邻近纵隔器官的解剖关系、肿瘤外侵程度及转移病灶，有助于制订外科手术方式及放疗计划，但难以发现早期食管癌。
- C. 腹部 B 超：此选项错误。腹部 B 超对于食管癌的检查无太大帮助。
- D. 腹部平片：此选项错误。腹部平片对于食管癌的检查无太大帮助。
- E. X 线检查：此选项错误。X 线检查对于食管癌的检查无太大帮助。

## 36. 【答案】A

## 【解析】

- A. 反流性食管炎：中年男性，进食后出现反流和烧心，胃镜检查食管黏膜未见明显异常（排除食管癌），最可能的诊断为反流性食管炎。反流性食管炎最常见的症状为反流和烧心，胃镜是诊断反流性食管炎最准确的方法，并能判断反流性食管炎的严重程度和有无并发症。
- B. 胃溃疡：消化性溃疡多为规律性上腹痛、胃溃疡多为餐后痛，抑酸药可缓解。但在此题中，胃镜未见明显异常，故不符合胃溃疡的诊断。
- C. 慢性胃炎：慢性胃炎多数病人无明显症状，胃镜下可见明显胃粘膜损伤。此题中胃镜未见明显异常，故不符合慢性胃炎的诊断。
- D. 胆囊炎：胆囊炎多表现为右上腹绞痛，可向肩部、背部放射。此题中未见上述症状，故不符合胆囊炎的诊断。
- E. 消化性溃疡：消化性溃疡多为规律性上腹痛，但在此题中，胃镜未见明显异常，故不符合消化性溃疡的诊断。

## 37. 【答案】A

## 【解析】

- A. 利尿：错误。胰腺炎休克症状时，患者可能会出现大量炎性渗出和严重炎症反应，此时如果利尿，会导致血容量进一步降低，对抗休克治疗无益处。
- B. 补充体液：正确。胰腺炎休克时，需要进行液体复苏，补充体液可以恢复有效循环血量。
- C. 补充电解质：正确。胰腺炎休克时，需要补充电解质以保持电解质平衡。
- D. 去甲肾上腺素：正确。对于血容量不足所致的休克或低血压，去甲肾上腺素可作为急救时补充血容量的辅助治疗，以使血压回升暂时维持脑与冠状动脉灌注。
- E. 抗感染：正确。当胰腺坏死 $>30\%$ 时，胰腺感染风险增加，可预防性静脉给予抗生素，有助于减少坏死胰腺继发感染，及时抗感染治疗。

## 38. 【答案】A

## 【解析】

- A. 减慢输血：当出现输血过敏休克反应时，我们不能简单地减慢输血速度，因为这并不能解决问题。正确的做法

是立即停止输血。所以，选项 A 是错误的。

B. 停止输血：当出现过敏反应时，应立即停止输血，防止过敏反应继续加剧。所以，选项 B 是正确的。

C. 加速补液：在过敏休克反应中，补液是必要的，可以帮助纠正休克状态。所以，选项 C 是正确的。

D. 抗过敏治疗：过敏休克发生时，需要立即进行抗过敏治疗，如使用肾上腺素和（或）糖皮质激素。所以，选项 D 是正确的。

E. 升压：在过敏休克反应中，升压是必要的，可以帮助提高血压，改善血流灌注。所以，选项 E 是正确的。

39. 【答案】B

【解析】

A. 400-800ml：这是轻度休克时的估计失血量，此时收缩压正常或稍升高，舒张压增高，脉压缩小。本题中收缩压 90mmHg，不符合轻度休克的特征，所以选项 A 错误。

B. 800-1600ml：这是中度休克时的估计失血量，此时收缩压为 90--70mmHg，脉压小。本题中收缩压 90mmHg，符合中度休克的特征，所以选项 B 正确。

C. >1600ml：这是重度休克时的估计失血量，此时收缩压在 70mmHg 以下或测不到。本题中收缩压 90mmHg，不符合重度休克的特征，所以选项 C 错误。

D. 400-200ml：这个选项的范围有误，不符合实际，所以选项 D 错误。

E. 200-100ml：这个选项的范围过小，不符合实际，所以选项 E 错误。

40. 【答案】C

【解析】

选项 A：从腓窝寻找，这种方式不准确，因为阑尾的位置可以变动，不一定在腓窝处。

选项 B：用手指探查阑尾尖部，这种方法可能会对阑尾尖部产生刺激，增加术后并发症的风险。

选项 C：沿结肠带向回盲部寻找，这是最常用的方法，因为阑尾通常位于结肠和盲肠的交界处，沿着这个方向寻找可以最直接地找到阑尾。

选项 D：切开盲肠外侧腹膜寻找，这种方法可能会对腹膜产生不必要的损伤。

选项 E：沿盲肠外侧寻找，这种方法不准确，阑尾可能并不在盲肠外侧。

41. 【答案】B

【解析】

选项 A：高热量高蛋白高维生素低纤维素饮食，这种饮食方式对于糖尿病患者来说热量过高，可能导致血糖控制困难，而且纤维素偏低，不利于血糖的稳定。

选项 B：控制总热量低糖低脂高纤维饮食，这是糖尿病患者的理想饮食，可以帮助控制血糖和体重，同时高纤维食物可以延缓食物吸收，降低餐后血糖高峰。

选项 C：低脂低热量少盐粗纤维饮食，这种饮食方式虽然低热量，但是没有明确提到低糖，对于糖尿病患者来说，控制糖的摄入是非常重要的。

选项 D：高蛋白高纤维素高铁制品饮食，这种饮食方式虽然富含营养，但是没有考虑到糖尿病患者需要控制糖和脂

肪的摄入。

选项 E：低热量低盐高纤维易消化，这种饮食方式虽然考虑到了低热量和高纤维，但是没有明确提到低糖，对于糖尿病患者来说，控制糖的摄入是非常重要的。

42. 【答案】A

【解析】

A. 止血带固定到手术结束：这是错误的，因为在股骨干骨折出血时，用止血带固定时，需要每隔一段时间放松 1 分钟左右，以免导致股骨远端的肢体或者肌肉缺血坏死。

B. 结扎创面小血管止血：这是正确的，结扎创面小血管是止血的常规方法。

C. 持续牵引：这是正确的，对于存在手术禁忌的患者，可行持续牵引 8~10 周。

D. 钢板螺钉内固定：这是正确的，手术治疗成人股骨干骨折手术多采用钢板，带锁髓内钉固定。

E. 尽早进行肌肉，膝关节功能练习：这是正确的，床旁 X 线平片证实骨折愈合后，可逐渐下地活动。

43. 【答案】A

【解析】

A. VitB<sub>12</sub>：这是正确答案。免疫性胃炎导致壁细胞减少，内因子缺乏，使得维生素 B<sub>12</sub>无法被吸收，从而导致巨幼细胞贫血。因此，应补充维生素 B<sub>12</sub>。

B. 叶酸：叶酸也可以引起巨幼细胞性贫血，但在免疫性胃炎中，主要问题是维生素 B<sub>12</sub>的吸收受阻，所以此选项不正确。

C. 维生素 C：虽然维生素 C 对身体有很多益处，但它与免疫性胃炎导致的大细胞贫血无关，所以此选项不正确。

D. 铁离子：铁离子缺乏会导致缺铁性贫血，而非大细胞贫血，所以此选项不正确。

E. 维生素 B：虽然维生素 B 族有许多成员，包括维生素 B<sub>12</sub>，但此选项过于笼统，不能明确指出维生素 B<sub>12</sub>，所以此选项不正确。

44. 【答案】A

【解析】

选项 A：幽门螺杆菌感染是十二指肠溃疡的重要病因，大多数的十二指肠溃疡病人都有幽门螺杆菌感染的病史。因此，选项 A 是正确的。

选项 B：虽然饮酒可能会加重胃黏膜的损伤，但它并不是十二指肠溃疡的直接病因。因此，选项 B 是错误的。

选项 C：吸烟可能会增加胃酸分泌，影响胃黏膜的修复，但它也并不是十二指肠溃疡的直接病因。因此，选项 C 是错误的。

选项 D：应激可能导致胃酸分泌增加，但它也并不是十二指肠溃疡的直接病因。因此，选项 D 是错误的。

选项 E：自身免疫是一些免疫疾病和慢性胃炎的发病机制，但并不直接导致十二指肠溃疡。因此，选项 E 是错误的。

45. 【答案】A

【解析】

A. 浸润深度：正确。膀胱癌的 T 分期依据就是肿瘤的浸润深度，即肿瘤侵入膀胱壁的程度。

- B. 浸润广度：错误。膀胱癌的分期并不考虑浸润广度，而是以肿瘤的浸润深度为主要依据。
- C. 淋巴结转移数量：错误。淋巴结转移的数量是 N 分期的依据，这是评估肿瘤是否已经扩散到膀胱外部的重要标准。
- D. 侵犯周围脏器：错误。侵犯周围脏器也是一个重要的评估因素，但它并不是膀胱癌的 T 分期依据。
- E. 远处转移：错误。远处转移是 M 分期的依据，用于评估肿瘤是否已经扩散到膀胱以外的其他部位。

46. 【答案】A

【解析】

- 选项 A：语颤减弱。恶性胸水患者胸腔内液体增多，导致语颤传导受阻，因此语颤会减弱。此选项正确。
- 选项 B：叩诊呈实音。恶性胸水患者胸腔内液体增多，叩诊时应呈浊音，而非实音。此选项错误。
- 选项 C：肋间隙变窄。由于胸腔内液体积聚，肋间隙应该会变宽，而非变窄。此选项错误。
- 选项 D：呼吸运动增强。胸腔积液会压迫肺组织，使呼吸运动受限，呼吸运动应减弱，而非增强。此选项错误。
- 选项 E：呼吸音增强。胸腔积液会阻碍声音的传导，因此呼吸音应减低或消失，而非增强。此选项错误。

47. 【答案】B

【解析】

- 选项 A：结核性胸膜炎的胸水通常为淋巴细胞增多，胸腔积液中的腺苷脱氨酶（ADA）通常高于 45U/L，而此题中 LDH 值较高，但没有提到 ADA 值，因此此选项不正确。
- 选项 B：癌性胸腔积液常见于恶性肿瘤，特征是胸水呈血性，并且 LDH 值大于 500U/L。题目中患者的胸水呈血性，且 LDH 值为 580U/L，符合癌性胸腔积液的特征，所以此选项正确。
- 选项 C：肺炎伴胸腔积液时，患侧的胸部叩诊浊音，语颤减弱，呼吸音减弱。然而，题目中并未提到这些体征，所以此选项不正确。
- 选项 D：自发性液气胸时，气管向健侧移位，患侧胸部隆起，叩诊过清音或鼓音。然而，题目中并未提到这些体征，所以此选项不正确。
- 选项 E：漏出性胸腔积液的特征是透明清亮，静置不凝固，比重小于 1.016~1.018。漏出液蛋白含量较低，小于 30g/L。题目中并未提到这些特征，所以此选项不正确。

48. 【答案】A

【解析】

- 选项 AA 组 β 溶血性链球菌是急性肾小球肾炎的主要致病菌，因此选项 A 是正确的。
- 选项 BB 组溶血性链球菌虽然是一种革兰氏阳性球菌，但它主要是机会性致病菌，不是急性肾小球肾炎的主要致病菌，因此选项 B 是错误的。
- 选项 C 柯萨奇病毒是病毒性心肌炎的主要致病菌，并非急性肾小球肾炎的致病菌，因此选项 C 是错误的。
- 选项 D 草绿色链球菌属于甲型溶血性链球菌，一般不造成急性肾小球肾炎，因此选项 D 是错误的。
- 选项 E 金黄色葡萄球菌主要是各种化脓性感染的主要致病菌，并非急性肾小球肾炎的致病菌，因此选项 E 是错误的。

## 49. 【答案】C

## 【解析】

- A. 局部血运障碍：虽然局部血运障碍会影响伤口愈合，但它不是最常见的因素。血液供应良好的伤口更容易愈合，因为血液可以提供必要的氧气和营养物质，并帮助清除废物。
- B. 创面范围大：创面范围大会增加愈合时间，但并非最常见的影响因素。大面积创伤可能需要更长的恢复时间，但如果没有感染或其他并发症，仍可正常愈合。
- C. 感染：这是影响伤口愈合最常见的局部因素。感染可以损害细胞和基质，导致局部炎症持久不易消退，甚至形成化脓性病灶等。
- D. 异物清除不彻底：如果伤口中的异物没有清除干净，可能会引起感染和炎症，影响伤口愈合。但这并不是最常见的影响因素。
- E. 年龄：年龄确实会影响伤口愈合的速度，老年人的伤口愈合速度通常会慢于年轻人。但是，这并不是影响伤口愈合最常见的局部因素。

## 50. 【答案】A

## 【解析】

- 选项 A (X 线检查)：先天性巨结肠是一种消化道发育畸形，其主要临床表现为便秘。在 X 线检查中，可以看到病变肠段以上的肠管扩张，内含有气体和液性粪便形成的气液平面，而病变肠段中不含气体，这是典型的低位肠梗阻征象。因此，X 线检查是首选方法。
- 选项 B (CT 检查)：虽然 CT 检查也可以用来检查先天性巨结肠，但由于成本高并且对辐射敏感，因此不作为首选。
- 选项 C (结肠镜检查)：结肠镜检查是诊断大肠疾病最直接和最准确的方法，但没有 X 线方便快捷，因此不作为首选。
- 选项 D (腹部 B 超)：腹部 B 超是诊断胆道疾病的首选方法，对于结肠疾病帮助不大。
- 选项 E (胃镜检查)：胃镜检查主要用来诊断食管、胃部疾病，对结肠疾病无大帮助。

## 51. 【答案】B

## 【解析】

- A 选项：男性多见。这是正确的，血栓闭塞性脉管炎通常好发于男性青壮年。
- B 选项：发作呈对称性和间歇性。这是错误的，血栓闭塞性脉管炎的发作不一定呈对称性，而且其特点是慢性进展，非间歇性。
- C 选项：起病隐匿，进展缓慢。这是正确的，血栓闭塞性脉管炎的起病通常是隐匿的，而且疾病的进展是慢性的。
- D 选项：可发生肢体坏疽。这是正确的，严重的血栓闭塞性脉管炎可导致肢体末端的缺血性溃疡或坏疽。
- E 选项：呈游走性。这是正确的，血栓闭塞性脉管炎在发病过程中可能出现复发性游走性浅静脉炎。

## 52. 【答案】A

## 【解析】

- 选项 A：经尿道前列腺电切术。此选项正确，因为该方法能够迅速解除尿梗阻，对于本题中的患者来说，这是最快



的解决方法。

选项 B: 经尿道腺性膀胱炎切除术。此选项错误, 因为患者的症状并非由腺性膀胱炎引起, 所以此手术并不能解决患者的问题。

选项 C: 剖腹探查。此选项错误, 该方法虽然能明确具体病因, 但不是解除症状最快的方法。

选项 D:  $5\alpha$  还原酶抑制剂。此选项错误, 虽然这种药物可以用于治疗前列腺增生, 但其起效较慢, 并不能快速解除患者的症状。

选项 E:  $\alpha$  受体阻滞剂。此选项错误, 虽然这种药物也可以用于治疗前列腺增生, 但同样起效较慢, 不适合需要迅速解决问题的患者。

53. 【答案】C

【解析】

A. 支气管舒张实验阳性: 此选项错误。支气管舒张试验主要用于测定支气管哮喘, 而非 COPD。

B. 弥散功能下降: 此选项错误。弥散功能下降多见于间质性肺疾病, 并非 COPD 的主要特征。

C. FEV1/FVC 下降: 此选项正确。COPD 的一个关键特征就是 FEV1 (第一秒用力呼气容积)/FVC (用力肺活量) 比值下降, 通常小于 70%, 表明存在持续的气流受限。

D. 残气量下降: 此选项错误。COPD 时, 残气量 (RV) 通常会增高, 而非下降。

E. 肺总量下降: 此选项错误。COPD 时, 肺总量 (TLC) 可能会增高, 而非下降。

54. 【答案】A

【解析】

A. 急性胰腺炎-正确。根据题干信息, 患者有胆囊切除手术史, 一天前行十二指肠 ERCP 手术, 突发剧烈疼痛, 向背部放射, 这些都是急性胰腺炎的典型症状。

B. 消化性溃疡穿孔-错误。消化性溃疡穿孔通常会引起弥漫性腹膜炎, 体征有腹壁板样僵直, 压痛、反跳痛, 肝浊音界消失, 部分病人出现休克, 但题干中并无此类症状描述。

C. 急性心肌梗塞-错误。急性心肌梗塞主要表现为胸骨前压榨样疼痛, 与题干中的症状不符。

D. 急性胆管炎-错误。急性胆管炎主要表现为 Charcot 三联征: 腹痛、寒战高热、黄疸, 题干中并无此类症状描述。

E. 胆总管结石-错误。胆总管结石主要表现为上腹疼痛、寒战高热、黄疸, 题干中并无此类症状描述。

55. 【答案】A

【解析】

选项 A: 当患者在做诊断性胸穿时, 出现面色苍白、大汗、气急等症状, 应立即停止穿刺, 让患者卧床休息。这是因为这些症状可能是胸膜反应的表现, 需要立即停止操作, 避免病情恶化。

选项 B: 缓慢抽液在某些情况下可能适用, 但在患者出现严重症状时, 应立即停止操作, 而不是继续缓慢抽液。

选项 C 和 D: 静点阿托品和糖皮质激素治疗在处理这种情况时并不是首选, 虽然他们在其他病情下可能有用。

选项 E: 肾上腺素治疗在此情况下也不适用, 因为它主要用于处理休克或严重过敏反应, 而非胸膜反应。

56. 【答案】A



## 【解析】

选项 A：正确。贲门周围血管离断，脾切除术可以达到止血的目的，同时也保存了门静脉入肝血流。这种手术操作相对简单、创伤小，对肝脏门静脉血供影响较少。

选项 B：错误。仅进行脾切除术，并未处理食管胃底的静脉侧支，可能无法有效止血。

选项 C：错误。脾-肾静脉分流术，脾切除术虽然可以降低门静脉压力，但术后肝脏更加缺少门静脉血供，对肝功能不利。

选项 D：错误。门脉分流术同样会使肝脏缺少门静脉血供，而且术后肝性脑病的发生率较高。

选项 E：错误。肝总动脉结扎术并不适合处理食管胃底静脉曲张破裂出血和脾大的患者。

## 57. 【答案】A

## 【解析】

A. 抗休克治疗，急症准备手术：这是正确答案。患者的症状（低血压、全腹压痛反跳痛、肌紧张、移动性浊音阳性）提示可能存在腹腔内出血，应该立即进行抗休克治疗，并且准备手术。

B. 输血抗休克：虽然输血可以帮助改善休克状态，但没有解决可能的腹腔内出血问题，所以不是首选治疗方法。

C. 静脉注射糖皮质激素：糖皮质激素主要用于抗炎和免疫抑制，对于此类外伤引起的休克和可能的腹腔内出血无效。

D. 平卧休息：对于此类情况，仅仅平卧休息并不能解决问题，需要立即进行医疗干预。

E. 观察：延迟治疗可能导致患者病情恶化，因此这不是一个好的选择。

## 58. 【答案】D

## 【解析】

A. 病原抗原检测：该方法通常用于早期感染，但对于此患者的症状和胸片表现，可能不够敏感和特异。

B. 病原抗体检测：通常在感染后一段时间内进行，可能无法准确反映当前的病情。

C. 痰培养：虽然可以帮助识别病原体，但结果需要一段时间，对于急性呼吸道感染的快速诊断并不理想。

D. 核酸检测：对于发热、干咳、全身肌肉酸痛以及胸片显示双肺磨玻璃影的患者，核酸检测是最直接和最准确的方法，可以快速确定是否为新型冠状病毒感染。

E. 血培养，药敏：通常用于识别血液感染，对于呼吸道感染的诊断可能不够准确。

## 59. 【答案】B

## 【解析】

A. 胆囊结石的典型症状为胆绞痛，常放射至肩背部，与本题的症状不符。

B. 老年男性，茶色尿，大便发白，黄疸和肝内外胆管扩张，以及可触及无痛性肿物，这些都是胰头癌的典型表现，与本题的症状相符，故为正确答案。

C. 肝内胆管癌的黄疸表现逐渐加深，大便灰白，可伴有厌食、乏力、贫血等，与本题的症状不完全符合。

D. 肝外胆管结石一般无症状或仅有上腹部不适，当结石造成胆管梗阻时可出现反复腹痛或黄疸，与本题的症状不符。

E. 胆总管癌的临床表现与胰头癌相似，但胆总管癌更可能出现胆道感染，如右上腹疼痛、寒战高热、黄疸，甚至出现休克，与本题的症状不完全符合。

60. 【答案】E

【解析】

选项 A：大量补液、抗休克。此选项虽然在急性腹部损伤的初期处理中是重要的，但对于本例患者的最佳治疗方法并不准确。因为患者的临床表现和 B 超结果更符合小肠破裂，需要立即进行手术治疗。

选项 B：紧急输血。这个选项在患者出现严重失血的情况下会被考虑，但在本例中，没有明显的失血迹象，因此不适用。

选项 C：急诊肠镜。这个选项在疑似肠道疾病时可能会使用，但对于本例的小肠破裂，肠镜并不能提供有效的治疗，需要外科手术。

选项 D：腹腔引流。这个选项在腹腔有大量积液或感染时可能会使用，但对于本例的小肠破裂，仅仅通过引流并不能解决问题，需要外科手术。

选项 E：外科手术。这是正确答案。根据患者的临床表现和 B 超结果，最可能的诊断为小肠破裂，需要立即进行手术治疗。

61. 【答案】C

【解析】

A. B 超：B 超主要用于腹部器官如肝、胆、脾、肾等的检查，对于胃部病变的诊断价值较低。

B. X 线钡餐检查：虽然可以发现胃部的病变，但无法进行活组织检查，不能明确出血原因。

C. 胃镜：胃镜检查是诊断上消化道出血病因、部位和出血情况的首选方法，它不仅能直视病变、取活检，对于出血病灶可进行及时、准确的止血治疗。

D. 腹部 CT：对于胃部病变的诊断价值较低，主要用于腹部其他器官的检查。

E. 腹部平片：主要用于发现胃肠道气体积聚或者结石等问题，对于胃部病变的诊断价值较低。

62. 【答案】D

【解析】

选项 A：动脉导管未闭，常表现为胸骨左缘第 2 肋间及左锁骨下方可闻及连续性机械样杂音，常伴有震颤，传导范围广泛，与题干描述不符，错误。

选项 B：主动脉瓣关闭不全，一般会出现舒张期杂音，但没有收缩期吹风样杂音，错误。

选项 C：主动脉瓣狭窄，一般会出现收缩期杂音，但没有舒张期隆隆样杂音，错误。

选项 D：二尖瓣关闭不全合并狭窄，可以解释心尖区收缩期吹风样和舒张期隆隆样杂音的现象，正确。

选项 E：肺动脉瓣狭窄，一般会出现收缩期杂音，但没有舒张期隆隆样杂音，错误。

63. 【答案】E

【解析】

选项 A：胸腔抽刺排气。此处不适用，因为肺压缩仅 10%，无需穿刺、引流。

选项 B: 胸腔闭式引流。同样, 由于肺压缩程度不大, 无需进行引流处理。

选项 C: 建立有效的呼吸。患者目前无呼吸障碍, 因此无需特别建立有效呼吸。

选项 D: 静脉补液。患者血压未达到休克水平, 无需静脉补液。

选项 E: 镇静、止痛。对于患者的情况, 最有效的治疗措施是镇静和止痛。

64. 【答案】C

【解析】

选项 A: 腹股沟斜疝位于腹股沟韧带上内方, 但老年女性更常见的是股疝, 因此 A 选项不正确。

选项 B: 腹股沟直疝主要的临床表现为平卧时多能自行消失, 不需用手推送复位, 极少发生嵌顿, 与题干描述的病症不符, 所以 B 选项错误。

选项 C: 股疝好发于 40 岁以上妇女, 易发生嵌顿, 符合题干描述的病症, 所以 C 选项是正确答案。

选项 D: 腹股沟肿块过于宽泛, 不能明确指出具体的疾病, 所以 D 选项错误。

选项 E: 脂肪瘤基底不固定而活动度较大, 与题干描述的病症不符, 所以 E 选项错误。

65. 【答案】A

【解析】

A. 胃溃疡: 此选项正确。根据病人的年龄、性别以及上腹部进食后的不适, 结合 X 线钡餐检查结果, 最可能的诊断为胃溃疡。

B. 胃癌: 此选项错误。胃癌早期多无症状, 最常见的表现为体重减轻, 上腹痛、贫血、乏力等表现, X 线钡餐可见黏膜皱壁破坏、消失或中断, 邻近胃黏膜僵直, 蠕动消失。

C. 胃炎: 此选项错误。胃炎确诊需靠胃镜发现糜烂及出血病灶。

D. 十二指肠溃疡: 此选项错误。十二指肠溃疡多表现为饥饿痛、夜间痛。

E. 胃憩室: 此选项错误。胃憩室是指胃壁的局限性袋状扩张或囊样突出, 典型症状表现为剑突下疼痛、腹痛、腹胀、反酸、嗝气。

66. 【答案】C

【解析】

A. 内痔: 主要临床表现是出血和脱出, 间歇性便后出血是内痔的常见症状。但在这个案例中, 患者的主要症状是排便时肛门剧痛, 这不符合内痔的典型症状。

B. 外痔: 主要表现为肛门不适, 潮湿不洁, 有时有瘙痒。这与患者的症状也不符。

C. 肛裂: 肛裂病人有典型的临床表现, 即疼痛、便秘和出血。排便时由于肛裂病灶内神经末梢受刺激, 立刻感到肛管烧灼样或刀割样疼痛, 称为排便时疼痛。这与患者的症状完全符合, 因此选 C。

D. 直肠癌: 直肠癌临床表现为大便习惯及便状改变, 粪便性状改变, 常带有黏液或脓血。肛管内肿块: 用直肠指检或用肛窥器检查, 初起时肛管部出现小的硬结, 逐渐长大后表面溃烂。可见肛管内溃疡型肿块或息肉样、蕈状肿块。这些症状在这个案例中并未提及, 所以 D 选项不正确。

E. 肛瘘: 肛瘘外口持续或间断流出少量脓性、血性、粘液性分泌物。这也与患者的症状不符, 所以 E 选项不正确。

## 67. 【答案】A

## 【解析】

- A. 立位腹部 X 线：此选项正确。胃溃疡穿孔后，患者采取立位，可在 X 线片上看到膈下新月状游离气体影，这是胃溃疡穿孔的典型表现。
- B. B 超：此选项错误。B 超通常用于检查消化系统的实质脏器和胆道，对于胃溃疡穿孔这种情况，不是首选检查方法。
- C. CT：此选项错误。尽管 CT 能够提供更详细的腹部结构信息，但对于胃溃疡穿孔这种急性情况，不是首选检查方法。
- D. 增强 CT：此选项错误。增强 CT 虽然可以提供更多信息，但在胃溃疡穿孔的急性情况下，不是首选检查方法。
- E. 胃镜：此选项错误。胃镜对于诊断胃溃疡是有帮助的，但在胃溃疡穿孔的急性情况下，可能会加重患者病情，因此不是首选检查方法。

## 68. 【答案】A

## 【解析】

- A. 支气管扩张：此题目中，病人的症状包括咳痰、痰液分四层、偶尔咯血，这些都是支气管扩张的典型症状。特别是痰液分四层，这是支气管扩张的特征性表现，故 A 选项正确。
- B. 肺癌：肺癌早期常为无痰或少痰的刺激性干咳，且该病人 X 线无异常，而肺癌应有相应的影像学改变，故 B 选项不正确。
- C. 结核：结核病除了有肺部症状外，还有低热、盗汗等全身症状，而题干中未提及这些症状，故 C 选项不正确。
- D. 支气管肺炎：支气管肺炎发病急，X 线上可见边界模糊的片状或斑点状影，而题干中的病人 X 线无异常，故 D 选项不正确。
- E. 肺水肿：肺水肿多表现为粉红色泡沫样痰，而题干中的病人痰液分四层，与肺水肿的症状不符，故 E 选项不正确。

## 69. 【答案】C

## 【解析】

- A. 血栓闭塞性脉管炎：此病好发于男性青壮年，多为静息痛。本题中的病人是 78 岁老年男性，且无静息痛的描述，所以 A 选项不正确。
- B. 急性动脉栓塞：其临床表现可以概括为 5P，即疼痛、感觉异常、麻痹、无脉和苍白。本题中的病人没有明显的这些症状，所以 B 选项不正确。
- C. 动脉硬化性闭塞症：老年男性，右下肢疼痛、乏力，查体：病侧足背、胫动脉消失，股动脉正常，皮温下降，右足苍白（肢体远端缺血），符合动脉硬化性闭塞症的临床表现，所以 C 选项正确。
- D. 下肢深静脉血栓：其主要表现为突然发生的肿胀、疼痛、浅静脉扩张。本题中的病人没有这些症状，所以 D 选项不正确。
- E. 血栓性浅静脉炎：此病的主要表现为局部可扪及触痛的索状物，可有表面皮肤红肿。本题中的病人没有这些症

状，所以 E 选项不正确。

70. 【答案】D

【解析】

- A. 肿瘤标志物：肺癌尚无诊断敏感性和特异性高的肿瘤标志物。虽然一些标志物如 CEA、NSE、CYFRA21-1 和 ProGRP 检测或联合检测有一定参考价值，但不能作为明确诊断手段，所以 A 选项错误。
- B. 痰培养+药敏：这是肺结核的诊断检查，与病例的表现不符，所以 B 选项错误。
- C. 经皮穿刺活检：此方法在 X 线透视、胸部 CT 或超声引导下可进行病灶针吸或切割活检。对于紧贴胸壁或离胸壁较近的肺内病灶有一定的应用，但不能作为首选的诊断手段，所以 C 选项错误。
- D. 增强 CT：CT 可以显示病灶的局部影像特征，评估肿瘤范围、肿瘤与邻近器官关系、淋巴结转移状况，增强 CT 能敏感地检出肺门及纵隔淋巴结肿大。因此，D 选项是正确的。
- E. 痰找结核杆菌：这也是肺结核的诊断检查，与病例的表现不符，所以 E 选项错误。

71. 【答案】D

【解析】

- 选项 A：环孢素主要用于预防同种异体肾、肝、心、骨髓等器官或组织移植所发生的排斥反应，也适用于预防及治疗骨髓移植时发生的移植物抗宿主反应，而非治疗溃疡性结肠炎，因此 A 选项错误。
- 选项 B：蒙脱石散用于成人及儿童急、慢性腹泻，可用来缓解腹泻症状，但不能治疗溃疡性结肠炎，因此 B 选项错误。
- 选项 C：甲硝唑主要用于治疗肠道和肠外阿米巴病（如阿米巴肝脓肿、胸膜阿米巴病等），与本题病情不符，因此 C 选项错误。
- 选项 D：柳氮磺吡啶是氨基水杨酸制剂，用于治疗轻度溃疡性结肠炎，与题干描述的病情相符，因此 D 选项正确。
- 选项 E：泼尼松主要用于对 5-氨基水杨酸制剂疗效不佳的中度及重度病人的首选治疗，与题干描述的轻度溃疡性结肠炎病情不符，因此 E 选项错误。

72. 【答案】C

【解析】

- A. 外敷鱼石脂软膏：这是治疗甲沟炎未化脓时的一种处理方式，但根据题目描述，已经形成脓肿，所以这个选项是错误的。
- B. 拔甲：这是对于甲根脓肿的处理方式，需要分离拔出部分甚至全部指甲，但本题中的脓肿并未在甲根，所以此选项也是错误的。
- C. 切开引流：这是对于已经形成脓肿的甲沟炎的正确处理方式，通过切开引流可以有效地排出脓液，缓解病情，所以这个选项是正确的。
- D. 红外线诊疗：这也是治疗甲沟炎未化脓时的一种处理方式，对于已经形成脓肿的情况并不适用。
- E. 应用抗生素：虽然抗生素可以用来抑制细菌的生长，但对于已经形成脓肿的情况，仅仅应用抗生素是不够的，需要进行手术处理。



## 73. 【答案】C

## 【解析】

选项 A：第一期，主要表现为关节周围软组织肿胀影、关节附近骨质疏松。本题中，患者 X 线片可见关节间隙狭窄、骨质吸收破坏，已经超过了第一期的表现，所以选项 A 错误。

选项 B：第二期，主要表现为关节间隙狭窄。虽然本题中，患者 X 线片确实出现了关节间隙狭窄的情况，但同时还出现了骨质吸收破坏，已经进入了第三期，所以选项 B 错误。

选项 C：第三期，主要表现为关节面出现虫蚀样改变，也就是骨质吸收破坏。本题中，患者 X 线片出现了关节间隙狭窄、骨质吸收破坏，符合第三期的特征，所以选项 C 正确。

选项 D：第四期，主要表现为关节半脱位和关节破坏后的纤维性和骨性强直。本题中，患者的 X 线片并未出现这些情况，所以选项 D 错误。

选项 E：第五期，这个阶段并不存在于类风湿性关节炎的分期中，所以选项 E 错误。

## 74. 【答案】A

## 【解析】

A. 莫西沙星：此选项正确。莫西沙星是呼吸氟喹诺酮类药物，对支原体有较好的抗菌活性，适用于大环内酯类抗生素无效的支原体肺炎治疗。

B. 磺胺：此选项错误。磺胺主要抑制革兰氏阳性菌及一些阴性菌，对支原体的效果不明显。

C. 环丙沙星：此选项错误。环丙沙星主要用于治疗敏感革兰阴性杆菌所致的支气管感染急性发作及肺部感染，并非首选药物。

D. 阿奇霉素：此选项错误。虽然阿奇霉素属于大环内酯类抗生素，对支原体有一定的抗菌活性，但患者已经自行口服红霉素（同为大环内酯类抗生素）未见好转，可能对大环内酯类不敏感。

E. 罗红霉素：此选项错误。罗红霉素同样为大环内酯类抗生素，同样可能对于此患者无效。

## 75. 【答案】E

## 【解析】

A. 补液抗休克-正确。感染性休克的治疗首要任务是补充血容量，恢复足够的循环血量。

B. 输入抗生素抗感染治疗-正确。感染性休克需要积极抗感染，其中主要措施是应用抗菌药物和处理原发感染灶。

C. 物理降温-正确。患者高热表现，应辅助物理降温，以减少机体代谢负荷，保护脑部等重要器官。

D. 输白蛋白-正确。在补充血容量时，除了输注平衡盐溶液外，还可以适当使用胶体液（如白蛋白）进行补充。

E. 输血抗休克-错误。患者 Hb>100g/L，已经满足正常需求，无需输血。

## 76. 【答案】D

## 【解析】

A. 畸胎瘤：畸胎瘤多位于前纵隔，多为实质性，内含大小不同、数目不等的囊肿，囊壁常有钙化。在这个案例中，CT 显示的是一个 3cm 的圆形阴影，没有明显的囊性和钙化表现，因此不考虑畸胎瘤。

B. 重症肌无力：重症肌无力主要表现为肌无力，而患者的主要症状是上睑下垂，且 CT 显示前上纵隔有一 3cm 圆形



阴影，这并不符合重症肌无力的临床表现和影像学特征。

C. 神经性肿瘤：神经性肿瘤多位于后纵隔脊柱旁肋脊区内，且当肿瘤较大可压迫神经干或恶变侵蚀时可发生疼痛。

然而在这个案例中，患者的 CT 显示的肿瘤位于前上纵膈，因此不考虑神经性肿瘤。

D. 胸腺瘤：胸腺瘤多位于前上纵膈，呈椭圆形阴影或分叶状，易压迫迷走神经，出现 Horner 综合征，瞳孔缩小，上睑下垂、下睑轻度上提而脸裂变小。这与患者的临床表现和 CT 所示的前上纵膈有一 3cm 圆形阴影相符，因此选 D。

E. 胸骨后甲状腺瘤：胸骨后甲状腺瘤可随吞咽上下移动，大部分病人无症状。在这个案例中，患者没有吞咽困难的症状，且 CT 显示的肿瘤位置并不符合胸骨后甲状腺瘤的特征，因此不考虑胸骨后甲状腺瘤。

77. 【答案】A

【解析】

A. 胸廓外固定-正确。针对这种单根肋骨骨折，首先的处理应该是胸廓外固定。因为单根肋骨骨折断端有相邻完整的肋骨和肋间肌支撑，较少有肋骨断端错位、活动和重叠。采用多头胸带或弹性胸带固定胸廓，能减少肋骨断端活动、减轻疼痛。

B. 镇静，止痛-错误。虽然镇静和止痛是重要的处理步骤，但在这种情况下，它们不是首先需要进行的处理。首先应该进行胸廓外固定。

C. 吸氧观察-错误。虽然吸氧是对于肺损伤的一种常见处理，但在这种情况下，首先应该进行胸廓外固定。

D. 开胸探查-错误。开胸探查是对于开放性肋骨骨折的一种处理方式，而本题中的患者是闭合性肋骨骨折，所以不适用。

E. 抗休克-错误。患者无休克表现，无需抗休克治疗。

78. 【答案】B

【解析】

A. 肺炎克雷伯菌：主要存在于环境中，是医院感染的常见病原体，但在本例中不符合腹膜炎的病原体。

B. 大肠埃希菌：大肠埃希菌是胃肠道内的常驻菌群，引起继发性腹膜炎的细菌主要是胃肠道内的常驻菌群，以大肠埃希菌最为多见。因此，这是正确答案。

C. 变形杆菌：虽然也存在于人体肠道中，但其致病力相对较弱，不是腹膜炎的主要病原体。

D. 铜绿假单胞菌：主要存在于水源和土壤中，是医院感染的常见病原体，但在本例中不符合腹膜炎的病原体。

E. 肠球菌：虽然可以在肠道中找到，但并不是腹膜炎的主要病原体。

79. 【答案】B

【解析】

A. 桥本甲状腺炎：一种自身免疫性疾病，血清中可检出甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)和甲状腺球蛋白抗体(TgAb)等多种抗体。多为无痛性弥漫性甲状腺肿，对称，质硬，表面光滑，多伴甲状腺功能减退，较大腺肿可有压迫症状。本例中，患者甲状腺功能正常，故 A 选项错误。

B. 甲状腺癌：中年女性（甲状腺疾病好发人群），体检发现甲状腺左叶上级  $1.5 \times 1\text{cm}$  肿物，可随吞咽上下活动，B

超声边界不清、血流丰富的低回声团，纵横比 $>1$ （提示恶性可能性大），实验室检查 FT3、FT4、TSH 均在正常范围内，这些都是甲状腺癌的特征，故 B 选项正确。

C. 甲状旁腺瘤：早期出现癌症非特异性临床表现；晚期出现高钙血症、骨关节疼痛、骨质疏松、骨折、声音嘶哑等症状。本例中，患者无此类症状，故 C 选项错误。

D. 甲状腺腺瘤：大部分患者无任何症状。腺瘤生长缓慢。当乳头状囊性腺瘤因囊壁血管破裂发生囊内出血时，肿瘤可在短期内迅速增大，局部出现胀痛。本例中，患者无此类症状，故 D 选项错误。

E. 结节性甲状腺肿：可见甲状腺肿大、变形，体检可扪及多个大小不一的结节。本例中，患者只有一个肿物，故 E 选项错误。

80. 【答案】D

【解析】

A. 风湿性心脏瓣膜病：此类病患者通常有风湿热的病史，临床表现为心脏瓣膜病变，但此题中并未提及相关病史和明显症状。

B. 房室间隔缺损：房室间隔缺损一般在早期就会有明显的症状，如心动过速、心脏扩大等，但此题中并未提及这些症状。

C. 缩窄性心包炎：此病多发生在结核病患者，表现为心包积液、心包增厚等，但此题中并未提及。

D. 慢性肺源性心脏病：根据病史和临床表现（长期咳嗽咳痰，活动后气短，下肢水肿，颈静脉充盈，双肺呼吸音轻， $P2>A2$ ，三尖瓣听诊区可闻及收缩期杂音），最可能的诊断是慢性肺源性心脏病。

E. 慢性血栓性肺动脉高压：此病患者通常有血栓形成的病史，临床表现为活动后气促、胸痛等，但此题中并未提及。

81. 【答案】A

【解析】

选项 A：间质性肺炎。根据患者的年龄、性别、症状、X 线片和血象结果，最符合间质性肺炎的临床表现，因此选项 A 是正确答案。

选项 B：肺癌。肺癌患者多有数年吸烟史，咳嗽为早期症状，常为无痰或少痰的刺激性干咳，部分病人可有咳痰咯血、气短喘鸣等症状，X 线片可见类圆形阴影，边缘不清。但这与题干描述的患者情况不符，因此选项 B 错误。

选项 C：支扩伴感染。典型症状为持续或反复的咳嗽、咳痰或咳脓痰。X 线可见囊状支气管扩张的气道表现为显著的囊腔，腔内可存在气液平面。但这与题干描述的患者情况不符，因此选项 C 错误。

选项 D：浸润型肺结核。常有结核毒性表现，如低热、盗汗、乏力、消瘦等全身表现。影像学检查可见小片状或斑点状阴影。但这与题干描述的患者情况不符，因此选项 D 错误。

选项 E：病毒性肺炎。起病急，常有高热、头痛、全身酸痛等表现，实验室检查中以淋巴细胞、单核细胞升高为主。但这与题干描述的患者情况不符，因此选项 E 错误。

82. 【答案】B

【解析】

选项 A: 腹部 B 超是结石的首选检查方法, 但对于胆总管远端结石, 可能因为肥胖或肠气干扰而观察不清, 所以此选项错误。

选项 B: 经 T 管胆道造影可以准确地查看是否有残留结石, 符合患者术后两周复查的情况, 所以此选项正确。

选项 C: MRCP (磁共振胆胰管成像) 可以发现胆管梗阻的部位, 但对于观察结石可能不够满意, 所以此选项错误。

选项 D、E: PTC 和 ERCP 都是有创性检查, 能清楚地显示结石及部位, 但可能诱发胆管炎、急性胰腺炎, 以及出血、胆漏等并发症, 所以这两个选项都错误。

83. 【答案】C

【解析】

选项 A: 观察随诊是一种常见的医学监测手段, 但对于破伤风这种紧急且危险的情况, 仅靠观察随诊无法有效预防, 所以此选项错误。

选项 B: 打疫苗是预防破伤风的重要手段之一, 但对于已经发生创伤的情况, 打疫苗不能立即产生效果, 而且其保护期较短, 所以此选项错误。

选项 C: 彻底清创可以消除破伤风梭菌的生存环境, 从而防止破伤风的发生, 是预防破伤风最关键的措施, 所以此选项正确。

选项 D: 抗生素治疗可以用于预防和治疗感染, 但在破伤风的预防上, 其作用远不如彻底清创重要, 所以此选项错误。

选项 E: 隔离可以防止传染病的传播, 但破伤风并非通过人与人之间的接触传播, 所以此选项错误。

84. 【答案】E

【解析】

A. 高凝状态: 剖宫产术后, 身体处于高凝状态, 容易导致血液形成血栓, 所以 A 选项是正确的。

B. 妊娠: 妊娠期间, 由于荷尔蒙影响, 血液处于高凝状态, 容易形成血栓, 所以 B 选项也是正确的。

C. 卧床: 术后卧床不动, 血流缓慢, 也容易形成血栓, 所以 C 选项是正确的。

D. 剖宫产: 剖宫产是一个外科手术, 术后高凝状态和卧床不动都容易导致血栓形成, 所以 D 选项是正确的。

E. 早日下地活动: 早日下地活动可以加速血流, 预防血栓形成, 所以 E 选项是错误的, 是本题的正确答案。

85. 【答案】D

【解析】

A. 肺癌右胸腔转移: 肺癌多见于中老年病人, 多有长期吸烟史, 多有咳嗽、咳痰、胸痛、消瘦等临床表现, 但患者为肺癌可能性低, 因此 A 选项错误。

B. 支气管扩张: 主要症状为持续或反复的咳嗽、咳痰或咳脓痰。但是在本题中, 患者的症状并不完全符合支气管扩张的典型症状, 因此 B 选项错误。

C. 气胸: 原发性自发性气胸多见于瘦高体型的男性青壮年, 大量气胸时, 气管向健侧移位, 患侧胸部隆起, 呼吸运动与触觉语颤减弱, 叩诊过清音或鼓音, 但在本题中, 患者的症状并不完全符合气胸的典型症状, 因此 C 选项错误。

D. 结核性胸膜炎：青年女性，低热干咳 1 个月（肺结核典型症状），胸痛一周，右下肺语音震颤减弱，叩诊实音。结合患者低热、干咳的临床表现，判断患者最可能为结核性胸膜炎，因此 D 选项正确。

E. 慢阻肺：特征性体征为桶状胸，病人多有吸烟史，表现为慢性咳嗽、喘息。但是在本题中，患者的症状并不完全符合慢阻肺的典型症状，因此 E 选项错误。

86. 【答案】C

【解析】

A. 乳腺 x 线检查：乳腺 X 线检查是常用的影像学检查方法，广泛用于乳腺癌的普查。但在本题中，患者诊断为乳腺癌可能性小，因此采用 B 超检查效果好于 X 线。

B. 乳腺导管检查：适用于乳头溢液未扪及肿块者，但本题中并无乳头溢液的描述，因此此选项不正确。

C. 乳腺 B 超：对囊性病变有检出优势，可以进行血供情况观察，可提高判断的敏感性，且对肿瘤的定性诊断可提供有价值的依据。因此，对于本题中的中年女性乳腺肿块，首选乳腺 B 超。

D. CT：乳腺疾病较少使用 CT 进行检查，因为检出效果不如 B 超，且价格较贵。因此此选项不正确。

E. MRI：MRI 是乳腺 X 线摄影和超声检查的重要补充，对微小病灶、多中心、多病灶的发现及评价病变范围有优势。但在本题中，患者的肿块明显，无需使用 MRI 进行微小病灶的检查。

87. 【答案】E

【解析】

选项 A：Miles 手术，也称腹会阴联合直肠癌根治术，主要适用于腹膜返折以下的直肠癌，多适用于肿块距离肛缘 7cm 以下的患者。因此，本题中肿块距离肛门 10cm，不符合 Miles 手术的适应症，所以选项 A 不正确。

选项 B：腹会阴联合直肠癌根治术，同选项 A，适用于肿块距离肛缘 7cm 以下的患者，本题中肿块距离肛门 10cm，不符合此手术的适应症，所以选项 B 不正确。

选项 C：Hartmann 手术，主要适用于一般情况很差，不能耐受 Miles 手术或急性梗阻不宜行 Dixon 手术的病人。本题中患者的一般情况尚可，并无急性梗阻，不符合 Hartmann 手术的适应症，所以选项 C 不正确。

选项 D：姑息手术，主要是为了解除痛苦和处理并发症，例如：排便困难或肠梗阻可行乙状结肠双腔造口；肿瘤出血无法控制可行肿瘤姑息性切除。本题中患者的症状并不严重，无需进行姑息手术，所以选项 D 不正确。

选项 E：直肠低位前切除术，也称 Dixon 手术，一般要求癌肿距齿状线 5cm 以上，只要肛门外括约肌和肛提肌未受累，保证环周切缘阴性的前提下，均可行结肠-直肠低位吻合。本题中患者肿块距离肛门 10cm，符合此手术的适应症，所以选项 E 是正确答案。

88. 【答案】C

【解析】

A. 四联疗法后 HP 复查：主要针对幽门螺旋杆菌感染，但这并不能解决高级别上皮内瘤变的问题，故不是首选治疗方式。

B. 胃次全切+根治术：通常适用于进展期胃癌，而本题中的患者尚处于癌前病变阶段，过于激进，故不是首选治疗方式。



- C. 内镜下行黏膜剥离术：对于早期胃癌或者癌前病变，能够有效地去除病变组织，保留大部分正常胃组织，是首选治疗方式。
- D. 胃大部切除术：同样适用于进展期胃癌，对于早期病变过于激进，故不是首选治疗方式。
- E. 观察随访：对于已经发现的癌前病变，应当积极治疗，而非观察随访，故不是首选治疗方式。

89. 【答案】D

【解析】

- A. 急性脑血管病：此疾病的表现主要为神经系统症状，如偏瘫、失语、眩晕、共济失调等。患者没有此类症状，因此排除。
- B. 支气管扩张：此疾病常伴有反复咳痰咳血，痰液为黏液性、黏液脓性或脓性，可呈黄绿色。患者并无此类症状，因此排除。
- C. ARDS（急性呼吸窘迫综合征）：此症状为呼吸增快，并呈进行性加重的呼吸困难、发绀，常伴有烦躁、焦虑、出汗等。患者虽有部分症状，但并非全部符合，因此排除。
- D. 肺性脑病：根据患者的长期吸烟史，喘息症状，动脉血气分析结果及精神症状，最符合肺性脑病的诊断。
- E. 肝性脑病：此病的原发病有重症病毒性肝炎、重症中毒性肝炎、药物性肝病、妊娠期急性脂肪肝、各型肝硬化、门-体静脉分流术后、原发性肝癌以及其他弥漫性肝病的终末期，典型症状有性格改变、扑翼样震颤等。患者并无此类症状，因此排除。

90. 【答案】C

【解析】

- A. 肛瘘：肛瘘的主要症状是肛门外口持续或间断流出少量脓性、血性、黏液性分泌物。在这个案例中，病人没有出现渗出物的症状，所以排除此项。
- B. 直肠后间隙脓肿：这种病症的位置较深，局部症状不明显，主要表现为会阴、直肠部坠胀感，排便时疼痛加重。此项与病人的症状不完全符合，因此排除。
- C. 肛门周围脓肿：青年男性，发热、肛门红肿、触痛、无渗出，最可能的诊断为肛门周围脓肿。这与病人的症状完全符合，因此这是正确答案。
- D. 骨盆直肠间隙脓肿：这种病症的位置较深，引起的全身症状较重而局部症状不明显。早期就有全身中毒症状，如发热、寒战、全身疲倦不适。局部表现为直肠坠胀感，便意不尽，排便时尤感不适，常伴排尿困难。此项与病人的症状不完全符合，因此排除。
- E. 坐骨肛管间隙脓肿：发病时病侧出现持续性胀痛，逐渐加重，继而为持续性跳痛，排便或行走时疼痛加剧，可有排尿困难和里急后重。此项与病人的症状不完全符合，因此排除。

91. 【答案】A

【解析】

- A. 胸部 CT：正确。胸部高分辨 CT 扫描（HRCT）可以清晰地显示扩张的支气管，在无创、易重复、易接受的特点下，已成为支气管扩张的主要诊断方法。

- B. 支气管动脉造影：错误。虽然支气管动脉造影可以明确出血的部位，但它是一种有创检查，在明确诊断时，一般选用无创的胸部 HRCT。
- C. 支气管镜：错误。支气管镜同样可以明确出血的部位，但也是有创检查，不是首选的诊断方法。
- D. PetCT：错误。PetCT 常用于肺癌以及远处骨转移的诊断，对于本题中的支气管扩张咯血的诊断并不常用。
- E. 磁共振：错误。磁共振成像对纵膈疾病有较好的诊断价值，对支气管扩张咯血的诊断应用较少。

92. 【答案】B

【解析】

- A. 静滴垂体后叶素：此种治疗方法主要用于中等出血量的患者，对于大出血患者效果有限，因此本选项不正确。
- B. 肺叶切除手术：对于反复大咯血且病变局限的支气管扩张患者，肺叶切除手术是最有效的治疗方法，因此本选项正确。
- C. 抗生素治疗：抗生素治疗主要用于感染性疾病，对于支气管扩张这种结构性疾病效果有限，因此本选项不正确。
- D. 支气管动脉栓塞：此种治疗方法主要用于大出血来源于增生的支气管动脉，且保守治疗无效的患者。对于本题目中的患者，病变局限，因此外科手术更为适宜，所以本选项不正确。
- E. 静滴氨甲环酸：此种治疗方法主要用于治疗出血性疾病，对于支气管扩张效果有限，因此本选项不正确。

93. 【答案】E

【解析】

- A. 硬化剂注射：这是治疗痔的主要方法，对于肛瘘来说并不适用。
- B. 抗生素治疗：这种方法多用于高位复杂性肛瘘的辅助治疗，不能作为首选。
- C. 温水坐浴：这种方法可以改善局部血液循环，但只能作为辅助治疗手段，并不能解决问题的根源。
- D. 挂线疗法：这是利用橡皮筋或有腐蚀作用的药线的机械性压迫作用，缓慢切开肛瘘的方法。适用于距肛门 3~5cm，有内外口的低位或高位单纯性肛瘘，或作为复杂性肛瘘切开、切除的辅助治疗。
- E. 手术切除：这是肛瘘的首选治疗方法。通过将瘘管全程切开，显露管腔，靠肉芽组织生长使伤口二期愈合。

94. 【答案】C

【解析】

- A. 肝破裂：虽然肝破裂后可能有胆汁溢出，故可有腹痛和腹膜刺激征，但肝破裂出现脐周腹痛、肠间积液可能性小。此外，腹部 B 超显示肝周未见明显异常，因此排除此选项。
- B. 脾破裂：脾破裂一般会在脾上极及膈面处发生，有时在裂口对应部位有肋骨骨折。破裂如发生在脏面，尤其是邻近脾门者，有脾蒂撕裂的可能，若出现此种情况，出血量很大，病人可迅速发生休克，抢救不及时可致死亡。但在本题中，腹部 B 超显示膈下未见明显异常，因此排除此选项。
- C. 小肠破裂：患者腹痛并逐渐加重，查体显示全腹压痛、反跳痛、肌紧张（腹膜刺激征）。超声检查可见肠周少量积液（小肠损伤可能），这些都是小肠破裂的典型表现，因此选择此选项。
- D. 肾破裂：肾破裂常有腹膜后出血，导尿可导出血性液体。但在本题中，导尿时导出黄色尿液 300ml，没有血性液体，因此排除此选项。



E. 胰腺破裂：胰腺破裂后，胰液可积聚于网膜囊内而表现为上腹明显压痛和肌紧张，还可因膈肌受刺激而出现肩部疼痛。外渗的胰液经网膜孔或破裂的小网膜进入腹腔，可很快引起弥漫性腹膜炎伴剧烈腹痛。但在本题中，患者的主要症状集中在脐周，并无上腹或肩部疼痛的描述，因此排除此选项。

95. 【答案】A

【解析】

选项 A：自发性腹膜炎。中年女性患者，腹胀、乏力、纳差三年，近来出现发热、腹部隐痛、腹围增大（腹水可能），既往乙肝病史。查体：肝掌、腹部膨隆，腹膜刺激征表现，脾大。实验室检查：白细胞升高、尿素氮升高。综合分析，患者最可能为肝硬化合并自发性腹膜炎。

选项 B：门静脉血栓。通常会出现肠坏死及肝性脑病等，腹穿可抽出血性腹腔积液，而本例中未提及这些表现，因此 B 选项不正确。

选项 C：原发性肝癌。早期无症状，中晚期可出现肝大、肝区疼痛、乏力消瘦等全身表现，但是本例中没有明显的肝癌症状，因此 C 选项不正确。

选项 D：肝肾综合征。临床主要表现为少尿、无尿及氮质血症。本例中未提及这些表现，因此 D 选项不正确。

选项 E：继发性腹膜炎。常因腹腔脏器穿孔、破裂导致，往往可以找到原发病灶，而本例中没有明显的腹腔脏器穿孔、破裂的表现，因此 E 选项不正确。

96. 【答案】C

【解析】

A. 支气管造影：支气管造影可以明确出血的部位，对于咯血的诊断有一定帮助，但属于有创检查，不是首选的诊断方法，故 A 选项错误。

B. 支气管镜：支气管镜同样可以明确出血的部位，对于咯血的诊断有一定帮助，但也属于有创检查，不是首选的诊断方法，故 B 选项错误。

C. 胸部高分辨 CT：胸部高分辨 CT 扫描（HRCT）可以在横断面上清楚地显示扩张的支气管，且兼具无创、易重复、易接受的特点，已成为支气管扩张的主要诊断方法。因此，C 选项正确。

D. CT 肺动脉造影：CT 肺动脉造影主要用于诊断肺血栓栓塞，而非支气管扩张，故 D 选项错误。

E. 结核菌素检查：结核菌素检查主要用于检测结核杆菌，对诊断肺结核有帮助，但与本题的病情并不相关，故 E 选项错误。

97. 【答案】E

【解析】

选项 A：腹部 CT。腹部 CT 对于有腹部包块、肠梗阻征象的呕血病人有一定的诊断价值，但在这个病例中，患者没有腹部包块和肠梗阻的症状，因此这不是首选的检查方法。

选项 B：上消化道 X 线钡餐造影。这种检查有助于发现肠道憩室及较大的隆起或凹陷样肿瘤，但在急性消化道出血期间不宜选择该项检查，除其敏感性低，更重要的是可能影响之后的内镜、血管造影检查及手术治疗。

选项 C：腹部 X 线平片。这种检查对诊断消化道穿孔有较高的价值，但在这个病例中，患者没有穿孔的症状，所以

这也不是首选的检查方法。

选项 D: 腹部 B 超。腹部 B 超有助于了解肝胆胰病变, 是诊断胆道出血的常用方法, 但在这个病例中, 患者没有肝胆胰病变的症状, 因此这也不是首选的检查方法。

选项 E: 胃镜。胃镜检查是诊断上消化道出血病因、部位和出血情况的首选方法, 它不仅能直视病变、取活检, 对于出血病灶可进行及时、准确的止血治疗。因此, 这是最佳的选择。

98. 【答案】D

【解析】

A. 呼吸性酸中毒失代偿: 呼吸性酸中毒通常由于呼吸道疾病导致二氧化碳积累。但此患者动脉血气分析  $\text{PaCO}_2$  正常, 排除该选项。

B. 呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒: 该选项意味着同时存在呼吸道和代谢系统的问题。但根据患者的动脉血气分析,  $\text{PaCO}_2$  正常, 排除呼吸性酸中毒, 因此排除该选项。

C. 呼吸性碱中毒代偿期: 呼吸性碱中毒通常由于过度通气导致二氧化碳排出过多。但此患者的 PH 值低于正常范围, 排除该选项。

D. 代谢性酸中毒失代偿: 此选项与患者的情况相符, PH 值降低,  $\text{PaCO}_2$  正常, 提示代谢性酸中毒。BE 和  $\text{HCO}_3^-$  的降低也支持这一点。

E. 代谢性碱中毒代偿期: 代谢性碱中毒通常由于体内酸性物质过少或碱性物质过多导致。但此患者的 PH 值低于正常范围, 排除该选项。

99. 【答案】C

【解析】

选项 A: 肺叶切除, 是指切除整个肺叶, 但对于已经侵犯主支气管的肺癌, 仅切除肺叶可能无法完全清除肿瘤。

选项 B: 肺段切除, 是指切除肺的一部分, 通常用于治疗较小的、局限在肺段内的肺癌, 本题中的肺癌已经侵犯主支气管, 仅做肺段切除可能无法达到彻底清除肿瘤的目的。

选项 C: 袖状切除, 是指切除肺叶及一段受累的支气管, 再吻合支气管上下端, 适用于肺癌已侵犯主支气管但未波及临近肺叶的情况, 所以是本题的正确答案。

选项 D: 全肺切除, 是指切除整个肺, 适用于肺癌已广泛扩散至整个肺的情况, 本题中的肺癌尚未波及整个肺, 故不需全肺切除。

选项 E: 楔形切除, 是指切除肺的一小部分, 通常用于治疗小肺结节或早期肺癌, 本题中的肺癌已经侵犯主支气管, 仅做楔形切除无法彻底清除肿瘤。

100. 【答案】E

【解析】

选项 A: 抑酸药主要用于缓解上腹痛、灼热感等症状, 对于本例子的腹胀问题并无直接效果, 因此不正确。

选项 B: 抗幽门螺旋杆菌药用于治疗由幽门螺旋杆菌引起的消化性溃疡及慢性胃炎等, 但本例子中造影未见明显异常, 所以排除了这种可能, 因此不正确。

选项 C: 硝酸甘油主要用于冠心病心绞痛的治疗及预防,也可用于降低血压或治疗充血性心力衰竭,与腹胀无直接关系,因此不正确。

选项 D: 阿司匹林主要用于预防短暂脑缺血发作、心肌梗死、人工心脏瓣膜和静脉窦或其他手术后血栓的形成,与腹胀无直接关系,因此不正确。

选项 E: 促胃动力药可以显著改善胃肠道的动力,有助于缓解腹胀症状,符合题目中患者的临床表现,因此是正确答案。

101. 【答案】E

【解析】

选项 A: 广谱抗生素。在此情况下,使用广谱抗生素可以预防可能的感染,从而对控制休克有一定的意义,因此此选项是正确的。

选项 B: 维持水电解质平衡。在休克纠正过程中,应重视纠正酸中毒,并保持电解质平衡,以防止心律失常、心肌收缩力下降等问题,因此此选项是正确的。

选项 C: 查找病因。在治疗休克的同时,应积极寻找病因,以防止病情继续发展引起器官损害,因此此选项是正确的。

选项 D: 完善相关检查。在治疗休克的同时,应进行相关的检查以监控病情,因此此选项是正确的。

选项 E: 输血。根据现有的信息,患者的血红蛋白浓度大于 100g/L,不必进行输血,因此此选项是错误的。

102. 【答案】B

【解析】

A. 大便不成形: 虽然这是肠易激综合症的一个常见症状,但并不能确定诊断,因为许多其他消化系统疾病也可能出现此症状,所以该选项错误。

B. 结肠镜检阴性: 肠易激综合症的诊断标准是在缺乏可解释症状的形态学改变和生化异常基础上,结肠镜检阴性符合这一标准,所以该选项正确。

C. 腹痛腹泻: 这是肠易激综合症的常见症状,但并不能确定诊断,因为许多其他消化系统疾病也可能出现此症状,所以该选项错误。

D. 无脓血有粘液: 这是肠易激综合症的常见症状,但并不能确定诊断,因为许多其他消化系统疾病也可能出现此症状,所以该选项错误。

E. 排便与疼痛缓解有关: 这是肠易激综合症的相关诊断标准,但前提是在缺乏可解释症状的形态学改变和生化异常基础上,所以该选项错误。

103. 【答案】B

【解析】

A. 肝星状细胞激活: 肝星状细胞在非酒精性脂肪性肝病 (NAFLD) 中发挥重要作用,其激活会导致肝纤维化,因此与该病理改变有关。

B. 胶质细胞增生: 胶质细胞主要存在于中枢神经系统,与本题中的非酒精性脂肪性肝病无关,因此是正确答案。

C. 线粒体功能障碍：在 NAFLD 中，由于脂质过量沉积引起的氧化应激和脂质过氧化，会导致线粒体功能障碍，因此与该病理改变有关。

D. 脂质沉积：NAFLD 的主要特征就是肝细胞内脂质过量沉积，因此与该病理改变有关。

E. 胰岛素抵抗：胰岛素抵抗是 NAFLD 的重要发病机制之一，因此与该病理改变有关。

104. 【答案】D

【解析】

选项 A：正确。糖尿病患者术前禁食时，需要静脉输注葡萄糖加胰岛素以维持血糖在轻度升高状态（5.6-11.2mmol/L），防止低血糖发生。

选项 B：正确。患者血压 180/110mmHg，应观察病情，根据病情变化及时调整治疗方案。

选项 C：正确。患者血压过高，为避免手术风险，应暂停手术，待血压控制在一定水平后再进行。

选项 D：错误。患者虽然血压高，但并不需要将血压快速降至正常才能进行手术，过快降压可能会引起低血压或其他并发症。

选项 E：正确。如选项 D 所述，不应该快速降压到正常。

105. 【答案】C

【解析】

选项 A：低氯低钾，代谢性酸中毒。不正确，因为 PH 值 7.7 超过正常范围 7.35-7.45，属于碱中毒，而不是酸中毒。

选项 B：低氯低钠，呼吸性酸中毒。不正确，首先 PH 值显示为碱中毒，其次检查结果  $\text{Na}^+$  142mmol/L 在正常范围内，并非低钠。

选项 C：低氯低钾，代谢性碱中毒。正确，因为 PH 值高， $\text{Cl}^-$  和  $\text{K}^+$  均低，符合低氯低钾性碱中毒的诊断。

选项 D：低氯低钠。不正确，尽管  $\text{Cl}^-$  确实偏低，但  $\text{Na}^+$  的检查结果在正常范围内，并非低钠。

选项 E：低钾低钠。不正确，虽然  $\text{K}^+$  偏低，但  $\text{Na}^+$  的检查结果在正常范围内，并非低钠。

106. 【答案】A

【解析】

A. 肝穿刺检查：此患者的症状、体征和辅助检查结果均提示可能是肝癌。肝穿刺检查是在超声或 CT 引导下进行的细针穿刺组织学检查，是确诊肝癌的可靠方法，因此 A 选项是正确的。

B. 超声检查：超声检查是目前肝癌筛查的首选方法，但对于已经有明确病变的患者，其不能提供病变性质的确切信息，所以 B 选项是错误的。

C. X 线检查：X 线检查对软组织显影效果较差，对于肝癌的确诊无太大帮助，所以 C 选项是错误的。

D. MRCP 检查：MRCP 是磁共振胰胆管造影，主要用于检查肝胆管系统疾病以及胰腺疾病，并不适用于肝癌的确诊，所以 D 选项是错误的。

E. CT 检查：CT 检查可以发现肝内占位，但对占位的性质不能确定，需要在 CT 引导下进行肝穿刺检查，所以 E 选项是错误的。

107. 【答案】A

【解析】

选项 A: 肠结核。根据题干中的男性患者, 近来低热、体重减轻, 查体: 右下腹肿块、回盲部跳跃征, 盲肠结肠短缩, 这些都是肠结核的典型症状, 因此 A 选项正确。

选项 B: 克罗恩病。虽然克罗恩病也可能出现类似的症状, 但其典型的 CTE 表现为肠壁明显增厚、肠黏膜明显强化, 题干中并未提及, 因此 B 选项错误。

选项 C: 溃疡性结肠炎。这种病症通常表现为反复发作的腹泻、黏液脓血便及腹痛, 而题干中并未提及这些症状, 因此 C 选项错误。

选项 D: 结肠癌。结肠癌的早期常仅见粪便隐血阳性, 而题干中并未提及这一症状, 因此 D 选项错误。

选项 E: 肠易激综合征。这种病症的主要临床表现是腹痛、排便习惯和粪便性状的改变, 而题干中并未提及这些症状, 因此 E 选项错误。

108. 【答案】B

【解析】

A. 金葡菌肺炎起病急, 可有寒战、高热、脓血痰、气急、毒血症、休克症状, X 线可见肺叶或小叶浸润, 早期空洞, 脓胸, 液气囊腔。故此选项不符合题干描述。

B. 军团菌肺炎特征性临床表现为高热、肌痛、相对缓脉, X 线可见下叶斑片浸润, 进展迅速, 无空洞。故此选项符合题干描述, 为正确答案。

C. 衣原体肺炎起病多隐袭, 早期表现为上呼吸道感染症状, 与支原体肺炎颇为相似。通常症状较轻, 伴有发热、寒战、肌痛、干咳, 非胸膜炎性胸痛, 头痛、不适和乏力, 少有咯血, X 线检查显示疾病早期以单侧、下叶肺泡渗出为主, 后期可发展成双侧病变。故此选项不符合题干描述。

D. 肺炎链球菌肺炎起病急, 寒战、高热、咳铁锈色痰、胸痛, 有肺实变体征, X 线可见肺叶或肺段实变, 无空洞, 可伴胸腔积液。故此选项不符合题干描述。

E. 病毒性肺炎起病急, 常有发热、头痛、全身酸痛、倦怠等症状, 胸部 X 线检查可见肺纹理增多, 磨玻璃状阴影, 小片状浸润或广泛浸润、实变。故此选项不符合题干描述。

109. 【答案】D

【解析】

A. X 线: 对内脏显影不良, 对于本例中的疑似肠道病变, X 线检查并不能提供足够的信息, 因此此选项错误。

B. B 超: 多用于胆囊、胰腺等脏器的检查, 对于肠道病变的诊断价值有限, 因此此选项错误。

C. CT: 虽然 CT 可以反映肠壁的炎症改变、病变分布的部位和范围、狭窄的存在、肠腔外并发症如瘘管形成、腹腔脓肿或蜂窝织炎等, 但在首选的检查方法中, 结肠镜更为直接和准确, 因此此选项错误。

D. 肠镜: 克罗恩病常见右下腹包块、压痛, 多伴有肛门周围病变, 有时肛周病变可为本病的首发症状。首选的检查为结肠镜。镜下一般表现为节段性、非对称性的各种黏膜炎症, 其中具有特征性的表现为非连续性病变、纵行溃疡和卵石样外观。因此, 此选项正确。



E. CEA（癌胚抗原）：是广谱性肿瘤标志物，对大肠癌、乳腺癌和肺癌的疗效判断、病情发展、监测和预后估计是一个较好的肿瘤标志物，但对于本例中的克罗恩病诊断并无直接帮助，因此此选项错误。

110. 【答案】A

【解析】

选项 A：红斑狼疮，根据题目中的病史和实验室检查结果，女性，月经增多，脱发，dsDNA（+），ANCA（+），尿蛋白（+++），这些都是系统性红斑狼疮的典型临床表现和实验室检查结果，因此选项 A 是正确答案。

选项 B：类风湿关节炎，主要表现为对称性双手、腕、足等多关节肿痛，RF 阳性，与题目中的病史和实验室检查结果不符，所以选项 B 是错误的。

选项 C：甲亢，主要症状包括心悸、乏力、怕热、多汗、消瘦、食欲亢进等，与题目中的病史和实验室检查结果不符，所以选项 C 是错误的。

选项 D：干燥综合征，主要表现为干燥性角结膜炎和口腔干燥症，还可累及内脏器官，与题目中的病史和实验室检查结果不符，所以选项 D 是错误的。

选项 E：原发性血管炎，临床表现包括炎症引起的全身症状以及血管病变所在器官的炎症、缺血改变和功能异常，与题目中的病史和实验室检查结果不符，所以选项 E 是错误的。

111. 【答案】A

【解析】

选项 A：鸟嘴征，通常出现在乙状结肠扭转中，X 线检查可以看到扭转部位钡剂受阻，钡影尖端呈“鸟嘴”形，这与题干中的患者病情相符，因此是正确答案。

选项 B：铅管征，多见于溃疡性结肠炎，X 线钡剂灌肠可见肠管缩短，结肠袋消失，肠壁变硬，可呈铅管状，但并不符合题干中的病情描述。

选项 C：杯口征，多见于肠套叠，CT 可见环形套叠的肠管，这与题干中的患者病情不符。

选项 D：鹅卵石征，多见于克罗恩病，钡剂造影可见肠黏膜皱襞粗乱、纵行性溃疡或裂沟、鹅卵石征等，这与题干中的患者病情不符。

选项 E：充盈缺损，可见于胃肠道肿瘤或息肉，这与题干中的患者病情不符。

112. 【答案】A

【解析】

选项 A：切开引流。这是乳腺脓肿形成后的主要治疗措施，因此这个选项是正确的。

选项 B：广谱抗生素。这种药物在未形成脓肿之前使用，可获得良好效果。但一旦形成脓肿，单纯使用抗生素效果有限，因此这个选项是错误的。

选项 C：局部热敷。这是一种辅助治疗方法，不能作为主要治疗措施，因此这个选项是错误的。

选项 D：局部注射抗生素。乳腺脓肿时，一般无需局部注射抗生素，因此这个选项是错误的。

选项 E：促使乳汁通畅排出。这是预防乳腺炎的一种措施，对于已经形成的乳腺脓肿并无直接治疗效果，因此这个选项是错误的。



## 113. 【答案】D

## 【解析】

- A. 患侧胸廓萎陷：此选项错误。在气胸的情况下，胸腔内充满了空气，导致肺部无法充分膨胀，但不会导致胸廓萎陷。
- B. 患肺泡通气量/血流量 $>0.8$ ：此选项错误。在气胸的情况下，患肺泡的通气量会减少，而血流量不变，因此，患肺泡通气量/血流量会小于 $0.8$ 。
- C. 吸气时向患侧偏：此选项错误。在气胸的情况下，由于患侧肺组织压缩，纵隔会向健侧移位。
- D. 胸膜腔压力升高：此选项正确。在气胸的情况下，胸腔内充满了空气，导致胸膜腔内的压力增加。
- E. 患侧肺组织膨胀：此选项错误。在气胸的情况下，患侧肺组织会压缩，不会膨胀。

## 114. 【答案】C

## 【解析】

- A. 骨髓纤维化：此病也可以表现为脾大，但无 Ph 染色体。半数以上的患者有 JAK2V617F 突变，与题干描述不符，故排除。
- B. 急性髓系白血病：急性白血病多可见淋巴结肿大，而题干中全身淋巴结无肿大，故排除。
- C. 慢性髓系白血病：老年男性，脾大、全身淋巴结无肿大，染色体 t(9;22)(q34;q11)，这些特征都符合慢性髓系白血病的表现，因此是正确答案。
- D. 慢性淋巴细胞白血病：此病早期可表现为乏力、疲倦、消瘦、低热、盗汗等。60%~80%的病人存在淋巴结肿大，多见于头颈部、锁骨上、腋窝、腹股沟等部位，与题干描述不符，故排除。
- E. 急性淋巴细胞白血病：此病同样多可见淋巴结肿大，与题干描述不符，故排除。

## 115. 【答案】A

## 【解析】

- A. 原发性肺结核-正确。考虑到男性，20岁，低热、咳嗽的症状，以及X线检查出现的肺门哑铃状阴影，这些都是原发性肺结核的典型表现。
- B. 支气管肺癌-错误。支气管肺癌少有低热表现，X线早期多呈局限性小斑片状阴影，边缘不清，密度较淡，也可呈结节、球状、网状阴影或磨玻璃影，与题目描述不符。
- C. 肺炎-错误。肺炎全身症状较少，X线可见肺叶或肺段实变，与题目描述不符。
- D. 肺结节病-错误。肺结节病多表现为双侧肺门淋巴结肿大，与题目描述不符。
- E. 肺气肿-错误。肺气肿X线可出现肺纹理增粗、紊乱等非特异性改变，病人多有咳嗽、喘息等临床表现，与题目描述不符。

## 116. 【答案】A

## 【解析】

- 选项 A：支气管扩张+并发感染。病人中老年男性，长期咳嗽、咳浓痰、咯血，近来发热、症状加重，痰培养可见铜绿假单胞菌，这些都是支气管扩张并发感染的典型症状和体征，所以此选项正确。

选项 B: 肺癌。肺癌病人多有吸烟史, 咳嗽为早期症状, 常为无痰或少痰的刺激性干咳, 与病人的临床表现不符, 所以此选项错误。

选项 C: 肺栓塞。肺栓塞多见“三联征”, 即同时出现呼吸困难、胸痛及咯血, 与病人的临床表现不符, 所以此选项错误。

选项 D: 肺炎链球菌肺炎。肺炎链球菌肺炎通常急骤起病, 以高热、寒战、咳嗽、血痰及胸痛为特征, 与病人的临床表现不符, 所以此选项错误。

选项 E: COPD。COPD 为慢性阻塞性肺疾病, 起病缓慢, 病程较长, 早期可以没有自觉症状。主要症状包括: 慢性咳嗽、咳痰, 一般为白色黏液或浆液泡沫性痰, 偶可带血丝, 清晨排痰较多, 病人可见特征性体征: 桶状胸, 与病人的临床表现不符, 所以此选项错误。

117. 【答案】B

【解析】

A. 头孢呋辛: 头孢呋辛是一种广谱抗生素, 对许多革兰氏阳性和阴性菌有很好的抑制作用, 但对铜绿假单胞菌的效果不佳, 所以此选项不正确。

B. 哌拉西林/他唑巴坦: 哌拉西林/他唑巴坦是一种  $\beta$ -内酰胺类/ $\beta$ -内酰胺酶抑制剂, 能有效抑制铜绿假单胞菌, 是治疗该病的首选药物, 所以此选项正确。

C. 阿奇霉素: 阿奇霉素主要用于治疗支原体、衣原体等感染, 对铜绿假单胞菌的抑制效果不强, 所以此选项不正确。

D. 罗红霉素: 罗红霉素主要用于治疗肺炎支原体和衣原体等感染, 对铜绿假单胞菌的抑制效果不强, 所以此选项不正确。

E. 诺氟沙星: 诺氟沙星是一种氟喹诺酮类药物, 对许多革兰氏阳性和阴性菌有很好的抑制作用, 但对铜绿假单胞菌的效果不如哌拉西林/他唑巴坦, 所以此选项不正确。

118. 【答案】A

【解析】

A. 经胸壁穿刺活检: 此方法对于紧贴胸壁或离胸壁较近的肺内病灶有很好的诊断效果, 创伤小、操作简便, 可迅速获得结果。在这个病例中, 肿块位置靠近右上肺尖, 因此经胸壁穿刺活检是首选辅助检查, 所以 A 选项正确。

B. 支气管镜检查: 对于中央型肺癌, 直视下组织活检加细胞刷刷检的诊断阳性率可达 90% 左右。但本题中肿块在肺尖部, 靠近胸壁, 选用穿刺活检更合适, 所以 B 选项错误。

C. 痰涂片: 虽然是重要的诊断方法之一, 但必须获得气道深部的痰液, 敏感性较低, 所以 C 选项错误。

D. 血常规: 这是一种一般性检查, 对肿瘤的诊断无意义, 所以 D 选项错误。

E. 肺功能检查: 这同样是一种一般性检查, 对肿瘤的诊断无意义, 所以 E 选项错误。

119. 【答案】E

【解析】

A 选项: 全身化疗。此选项不正确。虽然全身化疗是肺癌的常规治疗手段之一, 但在此情况下, 患者出现大量胸腔

积液并呼吸困难，需要立即处理积液引起的症状，而非进行全身化疗。

B 选项：同步放化疗。此选项不正确。同步放化疗也是肺癌的常规治疗方式，但在此情形下，首要任务是处理积液引起的呼吸困难，而不是立即进行放化疗。

C 选项：胸椎放疗。此选项不正确。胸椎放疗可以用于治疗胸椎转移，但在此情况下，应优先处理积液引起的呼吸困难。

D 选项：局部放疗。此选项不正确。局部放疗可以用于治疗肺部肿块，但在此情况下，应优先处理积液引起的呼吸困难。

E 选项：胸腔闭式引流。此选项正确。在大量胸腔积液导致呼吸困难的情况下，应优先进行胸腔闭式引流以缓解症状。

120. 【答案】B

【解析】

选项 A：疖是一种皮肤感染疾病，主要是细菌感染引发的，好发于头面、颈项和背部。一般会出现红肿痛的小硬结，但直径小于 2cm。这个病例中的病人病变部位在小腿，且面积大于疖的常见面积，所以 A 选项不正确。

选项 B：丹毒是由链球菌引起的一种急性皮肤感染疾病，好发于下肢和面部。患者通常有畏寒、发热、头痛等全身症状，病变部位表现为片状微隆起的皮肤红疹，色鲜红，中间稍淡，边界清楚。这与病例中的病人症状相符，所以 B 选项是正确答案。

选项 C：急性蜂窝组织炎是一种皮肤和皮下组织的急性弥漫性感染，病变部位皮肤发红、肿胀明显，疼痛剧烈，红肿边缘界限不清。这与病例中的病人症状不符，所以 C 选项不正确。

选项 D：痈是一种深部皮肤和皮下组织的急性化脓性感染，好发于皮肤较厚的项部和背部。病变初起表现为局部小片皮肤硬肿、热痛，肤色暗红。这与病例中的病人症状不符，所以 D 选项不正确。

选项 E：气性坏疽是一种严重的皮肤和深部组织感染，病情急剧恶化，全身情况可在 12~24 小时内迅速恶化。病例中的病人症状并未表现出这样的严重程度，所以 E 选项不正确。

121. 【答案】A

【解析】

选项 A：红肿切开引流。此处是错误的治疗方式，因为这种情况下的丹毒并没有形成脓肿，无需进行切开引流。

选项 B：抗生素治疗。对于丹毒这种感染性疾病，全身应用抗菌药物是必要的，因此这个选项是正确的。

选项 C：硫酸镁湿敷。局部可用 50%硫酸镁液湿敷，有助于缓解炎症，是正确的治疗方式。

选项 D：抬高患侧肢体。卧床休息，抬高患肢，有助于减少肿胀和疼痛，是正确的治疗方式。

选项 E：按摩理疗。在此情况下，按摩理疗可能会加重病情，因此不是正确的治疗方式。

122. 【答案】A

【解析】

选项 A：支气管舒张试验。这是本题的正确答案。病人年轻，有过敏性鼻炎史，工作环境可能存在室内变应原（如灰尘），突发咳嗽、气喘、呼吸困难，听诊双肺散在哮鸣音，最可能的诊断为支气管哮喘。支气管舒张试验可以评

估患者的支气管反应性，帮助确诊。

选项 B：胸部 X 线片。胸部 X 线片在支气管哮喘中可见两肺透亮度增加，呈过度通气状态，但特异性不如支气管舒张试验。

选项 C：胸部高分辨 CT。在部分病人可见支气管壁增厚、黏液阻塞，但对于初步诊断支气管哮喘的价值不大。

选项 D：超声心动图。主要用于心脏疾病的诊断，与本题关系不大。

选项 E：动脉血气分析。在支气管哮喘急性发作时，可能出现缺氧等表现，但缺乏特异性，不能作为首选的诊断方法。

123. 【答案】B

【解析】

选项 A 急性左心衰：此症状表现为突发严重呼吸困难，呼吸频率常达 30-50 次/分，强迫坐位、面色灰白、发绀、大汗、烦躁，同时频繁咳嗽，咳粉红色泡沫状痰。但患者没有这些表现，因此 A 选项错误。

选项 B 支气管哮喘急性发作：青年男性，整理图书时（存在灰尘）突发咳嗽、气喘、呼吸困难，既往有过敏性鼻炎史，听诊双肺散在哮鸣音，患者最可能的诊断为支气管哮喘发作。因此，B 选项正确。

选项 C 支气管炎：主要症状为干咳，肺部听诊可闻及湿啰音。患者的症状并不完全符合，因此 C 选项错误。

选项 D 急性呼吸窘迫综合征：最早出现的症状是呼吸增快，并呈进行性加重的呼吸困难、发绀，常伴有烦躁、焦虑、出汗等。患者没有这些症状，因此 D 选项错误。

选项 E 上气道咳嗽综合征：主要表现为咳嗽、鼻后滴等鼻咽部症状。患者的症状与此不符，因此 E 选项错误。

124. 【答案】A

【解析】

选项 A：T2N2M0，表示肿瘤的最大直径在 2-5cm（T2），腋窝淋巴结肿大、融合成团（N2），无远处转移（M0）。这与题干中的描述相符，所以是正确答案。

选项 B：T3N2M0，表示肿瘤的最大直径大于 5cm（T3），但题干中描述的肿瘤大小为 4cm×3cm，不符合此选项。

选项 C：T3N1M0，表示肿瘤的最大直径大于 5cm（T3），且只有移动的腋窝淋巴结（N1），但题干中描述的肿瘤大小为 4cm×3cm，且淋巴结融合成团，不符合此选项。

选项 D：T2N1M0，表示肿瘤的最大直径在 2-5cm（T2），且只有移动的腋窝淋巴结（N1），但题干中的淋巴结融合成团，不符合此选项。

选项 E：T1N2M0，表示肿瘤的最大直径小于 2cm（T1），但题干中描述的肿瘤大小为 4cm×3cm，不符合此选项。

125. 【答案】B

【解析】

选项 A：放疗通常用于保留乳房的乳腺癌根治术后，应于肿块局部广泛切除后给予适当剂量放射治疗。但在这个案例中，患者已经进行了乳房改良根治术，因此放疗不是首选。

选项 B：化疗是实体瘤中应用最有效的肿瘤之一，尤其在乳腺癌治疗中占有重要地位。由于手术尽量去除了肿瘤负荷，残存的肿瘤细胞易被化学抗癌药物杀灭。因此，这是正确的选择。



选项 C：放疗+化疗在某些情况下可能适用，但在这个案例中，由于患者已经进行了乳房改良根治术，因此放疗并非必须，化疗是更优的选择。

选项 D：靶向治疗主要针对 HER2 过度表达的乳腺癌病人。但在这个案例中，患者为三阴性乳腺癌，HER2（-），因此靶向治疗并不适用。

选项 E：内分泌治疗主要应用于激素受体阳性的病例。但在这个案例中，患者 ER（-）和 PR（-），因此内分泌治疗并不适用。

126. 【答案】C

【解析】

- A. 急性心肌梗死：通常表现为心前区压榨性疼痛，没有腹膜炎表现，所以此选项错误。
- B. 急性胰腺炎：腹痛可向背部放射，腹痛由轻转重，实验室检查淀粉酶明显升高，但这与题干描述的症状不符，所以此选项错误。
- C. 胃溃疡穿孔：中年男性，间断性腹痛 4 年，多于进食后发生，突发剧烈腹痛，迅速波及全腹，全腹反跳痛、肌紧张，局部压痛，这些都是胃溃疡并发穿孔的典型症状，所以此选项正确。
- D. 急性冠心病：疼痛表现为心前区绞痛，无腹膜炎表现，所以此选项错误。
- E. 急性胃粘膜病变：常有相关饮酒史或药物服用史，通常无腹膜炎表现，所以此选项错误。

127. 【答案】E

【解析】

- 选项 A：腹部 X 钡剂检查。此项在急性溃疡穿孔时是禁用的，因为可能会使病情加重。
- 选项 B：腹部 B 超。虽然腹部 B 超可以检查腹部实质脏器，但对于胃溃疡穿孔的诊断并不首选。
- 选项 C：胃镜。胃镜可以证实胃溃疡，但对于胃溃疡穿孔的诊断意义不大。
- 选项 D：腹部 CT。同样，腹部 CT 多用于腹部实质脏器的检查，对于胃溃疡穿孔的诊断并不首选。
- 选项 E：立位腹平片。这是首选的诊断方法，可以看到隔下新月状游离气体影，从而确定诊断。

128. 【答案】C

【解析】

- A. 迷走神经切断术：此方法已很少应用，主要是因为它并不能解决溃疡的根本问题，只是暂时性地缓解症状。
- B. 全胃切除术：对于胃溃疡并发穿孔的情况，全胃切除术过于激进，不是首选治疗方案。
- C. 胃大部切除术：对于胃溃疡并发穿孔的情况，胃大部切除术可以一次性解决穿孔和溃疡两个问题，是最有效的治疗方法。
- D. 穿孔修补术：此方法适用于穿孔 8 小时以上的患者，而本题中病人发病 4 小时，所以此方法不适用。
- E. 抗酸+补液：这是对胃溃疡的保守治疗，但并非胃溃疡穿孔的有效根治方法。

129. 【答案】D

【解析】

- A. HLA-b27：这是一种与强直性脊柱炎有关的基因，但在亚洲普通人群中的阳性率仅为 4%~8%，因此并不是首选检

查。

- B. 类风湿因子：这是类风湿关节炎的一个重要指标，但本题患者的症状更符合强直性脊柱炎，因此此选项不正确。
- C. 关节液检查：虽然可以用于诊断关节疾病，但对于强直性脊柱炎并无特异性，因此不是首选检查。
- D. 骶髂关节 X 线：强直性脊柱炎的典型表现是骶髂关节炎，因此骶髂关节 X 线是最有效的检查方法。
- E. 抗环瓜氨酸多肽抗体：这是诊断类风湿关节炎的一个重要指标，但本题患者的症状更符合强直性脊柱炎，因此此选项不正确。

130. 【答案】B

【解析】

- A. 膝关节结核：起病缓慢，有低热、乏力、疲倦、食欲缺乏、消瘦、贫血等全身症状。早期处于滑膜结核阶段，检查时发现膝眼饱满，髌上囊肿大，浮髌试验阳性。但此选项与题干描述的症状不符，故排除。
- B. 脊柱关节炎：症状包括下腰背痛伴晨僵，夜间休息或久坐时较重，活动后可以减轻。部分病人可出现反复发作的葡萄膜炎或虹膜炎。这与题干给出的症状完全吻合，故此为正确答案。
- C. 类风湿关节炎：典型症状为关节肿胀、疼痛，包括晨起僵硬等。全身表现，例如全身乏力、发热、食欲下降、精神不振。少数患者可能会伴有关节骨质疏松，存在早期损害。但此选项与题干描述的症状不完全符合，故排除。
- D. 滑膜炎：早期可出现关节肿胀、疼痛等不适症状，症状轻微，一般休息后可好转，多发生于过度劳累或运动后。但此选项与题干描述的症状不符，故排除。
- E. 骨关节炎：起病隐匿，进展缓慢。主要表现为关节及其周围疼痛、僵硬、关节骨性肥大和功能障碍。关节疼痛初期为轻度或中度间断性隐痛，休息时好转，活动后加重，疼痛常与天气变化有关。晚期可出现持续性疼痛或夜间痛。但此选项与题干描述的症状不符，故排除。

131. 【答案】A

【解析】

- 选项 A：高钾血症。这是正确答案。患者有慢性肾衰竭，定期血液透析，近期食用了大量富含钾元素的橘子，出现了口周麻木、四肢乏力、心率和下降等症状，这些都是高钾血症的表现。在肾衰竭的情况下，肾脏对钾的排泄能力下降，如果摄入过多的钾，更易出现高钾血症。
- 选项 B：代谢性酸中毒。此选项错误。代谢性酸中毒的症状包括疲乏、眩晕、嗜睡、感觉迟钝或烦躁等，而且最明显的表现是呼吸加快加深，这与题干中描述的症状不符。
- 选项 C：高磷血症。此选项错误。高磷血症并不产生特殊的临床症状，而且高磷常会引发低钙血症，导致抽搐、心律失常、低血压等症状，这与题干中描述的症状不符。
- 选项 D：低钙血症。此选项错误。低钙血症会导致口周和指（趾）尖麻木及针刺感、手足抽搐、腱反射亢进等症状，而题干中并未提到这些症状。
- 选项 E：高钙血症。此选项错误。高钙血症的症状包括疲乏无力、精神不集中、失眠、抑郁、腱反射迟钝、肌力下降等，严重者可出现神志不清甚至昏迷，恶心、呕吐、便秘也很常见，这与题干中描述的症状不符。

132. 【答案】A



## 【解析】

选项 A: 血液透析。对于肾衰竭伴急重症高钾血症者, 以血液透析为最佳。透析疗法是最快速有效的降低血钾方法, 有血液透析和腹膜透析两种, 前者对钾的清除速度明显快于后者, 可用于上述治疗仍无法降低血钾浓度或者严重高钾血症病人。

选项 B: 阳离子交换树脂。虽然可以从消化道排出钾离子, 但不是最有效的措施。

选项 C: 注射钙剂。可以促进钾离子转入细胞内, 但并非最有效方法。

选项 D: 大量激素。对排钾无帮助。

选项 E: 利尿剂。排钾利尿剂可促进钾的排出, 但对肾衰竭患者效果差。

133. 【答案】A

## 【解析】

A. 急性胰腺炎: 此患者有内镜逆行胰胆管造影术后出现上腹部剧烈疼痛, 伴有恶心、呕吐, 血淀粉酶升高, 这些都是急性胰腺炎的典型表现, 因此这是正确答案。

B. 消化性溃疡穿孔: 此病前期多有规律性上腹痛, 穿孔后, X 线可见肝浊音界消失, 而此患者未有此表现。

C. 急性心肌梗塞: 主要表现为突发性、持久的胸骨后或心前区剧烈的压榨性疼痛, 血淀粉酶往往不升高, 与此患者表现不符。

D. 急性胆管炎: 常表现为右上腹痛、高热、黄疸等, 严重者可出现谵妄休克等表现, 而此患者未有此表现。

E. 胆总管结石: 以上腹痛、寒战高热、黄疸为主要表现, 一般为右上腹绞痛, 与此患者表现不符。

134. 【答案】C

## 【解析】

A. 超声: 虽然可以作为初诊首选检查, 但是超声受胃肠气体干扰, 可能影响诊断的准确性, 所以这个选项错误。

B. 胃镜: 胃镜检查主要用于胃肠道疾病的诊断, 对于胰腺疾病的诊断价值不大, 所以这个选项错误。

C. CT: CT 扫描是诊断胰腺疾病最具价值的影像学检查, 不仅能诊断急性胰腺炎, 还能鉴别是否合并胰腺组织坏死, 所以这个选项正确。

D. X 线: X 线对软组织显影不良, 不适合用于胰腺病变的检查, 所以这个选项错误。

E. ERCP: 虽然 ERCP 是一种内镜逆行胰胆管造影术, 但是它可能对胰腺造成二次伤害, 不推荐使用, 所以这个选项错误。

135. 【答案】B

## 【解析】

A. 胰腺假性囊肿: 患者术后出现上腹部疼痛, 血淀粉酶升高, 考虑胰腺炎的可能, 胰腺炎是可以并发胰腺假性囊肿的。

B. 肝脓肿: 虽然患者有黄疸, 但是查体肝脾肋下未触及, 肝浊音界存在, 这些都不支持肝脓肿的诊断。

C. 消化道瘘: 胰腺炎可以并发消化道瘘。

D. 腹腔间隔室综合征: 急性胰腺炎的全身并发症包括腹腔间隔室综合征。

E. SIRS: 急性胰腺炎的全身并发症也包括 SIRS。

136. 【答案】B

【解析】

A. 0.2-此选项错误。成年女性双小腿和双足的烧伤面积不是 20%。

B. 0.19-此选项正确。根据中国新九分法,成年女性双小腿的烧伤面积占 13%,双足的烧伤面积占 6%,总共是 19%。

C. 0.13-此选项错误。这只考虑到了双小腿的烧伤面积,没有将双足的烧伤面积计算在内。

D. 0.21-此选项错误。成年女性双小腿和双足的烧伤面积不是 21%。

E. 0.3-此选项错误。这个面积过大,超出了中国新九分法对于成年女性双小腿和双足的烧伤面积的计算。

137. 【答案】D

【解析】

A. 4700ml- 此选项错误。根据烧伤休克补液原则,该患者第一个 24 小时需要补充的体液量为  $19 \times 60 \times 1.5 + 2000 = 3710\text{ml}$ ,最接近 3700ml,不是 4700ml。

B. 5700ml-此选项错误。计算结果明显小于 5700ml,所以这个选项不正确。

C. 1700ml-此选项错误。计算结果明显大于 1700ml,所以这个选项不正确。

D. 3700ml- 此选项正确。根据烧伤休克补液原则,该患者第一个 24 小时需要补充的体液量为  $19 \times 60 \times 1.5 + 2000 = 3710\text{ml}$ ,最接近 3700ml。

E. 2700ml-此选项错误。计算结果明显大于 2700ml,所以这个选项不正确。

138. 【答案】C

【解析】

选项 A: 皮肤黄疸。这是由于胆汁淤积引起的,但并不能直接反应病情的危重程度,所以此选项错误。

选项 B: 发热。这是急性梗阻性化脓性胆管炎的一种常见症状,但也不能直接反应病情的危重程度,所以此选项错误。

选项 C: 谵妄休克。这是急性梗阻性化脓性胆管炎严重时的症状,表明病情已经非常危重,所以此选项正确。

选项 D: 腹痛。这是急性梗阻性化脓性胆管炎的一种常见症状,但也不能直接反应病情的危重程度,所以此选项错误。

选项 E: 低血压。这可能是由于病情严重导致的,但不如选项 C 的谵妄休克更能直接反应病情的危重程度,所以此选项错误。

139. 【答案】D

【解析】

A. 剖腹探查: 剖腹探查多适用于病因不明的疾病,寻找原发病。在此情况下,已经有明确的诊断和治疗方向,因此该选项错误。

B. 纠正水、电解质平衡: 这是非手术治疗,可以作为术前准备,但不是当前首选的治疗方法,因此该选项错误。

C. 穿刺引流: 对于高位胆管梗阻引起的胆管炎,穿刺引流的效果并不确定,因此该选项错误。

D. 胆管切开减压：这是正确的答案。在急性梗阻性化脓性胆管炎的治疗中，立即解除胆道梗阻并引流是关键。只有使胆道压力降低，才有可能中止胆汁或细菌向血液的反流，阻断病情的恶化。

E. 造瘘术：造瘘术难以达到有效的引流，一般不宜采用，因此该选项错误。

140. 【答案】B

【解析】

A. 胃角溃疡合并出血：胃角溃疡合并出血多为餐后痛，轻者表现为大便隐血阳性、黑便，重者出现大出血、表现为呕血或暗红色血便。慢性腹痛在出血后常减轻。因此，这不是剧烈呕吐后呕鲜血的最可能原因。

B. 食管贲门黏膜撕裂伤：剧烈呕吐后继而呕鲜血，应首先考虑食管贲门黏膜撕裂综合征，也叫 Mallory-Weiss 综合征。这是因为剧烈呕吐会导致食管下段和胃上段（贲门区）的黏膜撕裂，产生鲜血。

C. 十二指肠球部溃疡出血：十二指肠球部溃疡出血多为饥饿痛、夜间痛，进食可缓解。因此，这不是剧烈呕吐后呕鲜血的最可能原因。

D. 食管胃底静脉曲张破裂出血：食管胃底静脉曲张破裂出血多见于肝硬化门脉高压症患者，这种情况下的出血通常不会由剧烈呕吐引发。

E. 胃恒径动脉破裂出血：胃恒径动脉破裂出血以间歇性反复性呕血或柏油便为主要症状，起病突然，无明显征兆。因此，这也不是剧烈呕吐后呕鲜血的最可能原因。

141. 【答案】D

【解析】

A. 胃角溃疡合并出血：胃角溃疡出血多为餐后痛，轻者表现为大便隐血阳性、黑便，重者出现大出血，表现为呕血或暗红色血便。慢性腹痛在出血后常减轻。

B. 食管贲门黏膜撕裂伤：食管贲门黏膜撕裂伤常见剧烈呕吐后呕鲜血。

C. 十二指肠球部溃疡出血：十二指肠球部溃疡出血多为饥饿痛、夜间痛，进食可缓解。

D. 食管胃底静脉曲张破裂出血：长期大量饮酒可导致酒精性肝硬化，肝硬化失代偿期可因门静脉高压导致侧支循环形成，食管胃底静脉曲张，食用粗糙食物或饮酒导致食管胃底静脉曲张破裂出血。

E. 胃恒径动脉破裂出血：胃恒径动脉破裂出血以间歇性反复性呕血或柏油便为主要症状，起病突然，无明显征兆。

142. 【答案】B

【解析】

选项 A：一侧腹痛，持续性，向会阴部放射，这是输尿管结石的典型症状，与急性坏死性胰腺炎的症状不符。

选项 B：上腹持续性剧烈腹痛，成束带状，像腰背部放射，这是急性坏死性胰腺炎的典型症状。患者通常在饱餐或饮酒后突然发作，疼痛范围较宽并呈束带状向腰背部放射。

选项 C：上腹钻顶样剧烈腹痛，阵发性加剧，间歇期完全缓解，这是胆道蛔虫症的典型症状，与急性坏死性胰腺炎的症状不符。

选项 D：上腹剧烈样绞痛，阵发性，像右侧肩部放射，这是胆囊结石的典型症状，与急性坏死性胰腺炎的症状不符。

选项 E：上腹突发刀割样剧烈腹痛，迅速波及全腹，这是消化性溃疡穿孔的典型症状，与急性坏死性胰腺炎的症状不符。

不符。

143. 【答案】D

【解析】

- A. 一侧腹痛，持续性，向会阴部放射：这是输尿管结石的典型症状，与胆总管结石嵌顿的腹痛特点不符。
- B. 上腹持续性剧烈腹痛，成束带状，像腰背部放射：这是急性坏死性胰腺炎的典型症状，与胆总管结石嵌顿的腹痛特点不符。
- C. 上腹钻顶样剧烈腹痛，阵发性加剧，间歇期完全缓解：这是胆道蛔虫症的典型症状，与胆总管结石嵌顿的腹痛特点不符。
- D. 上腹剧烈样绞痛，阵发性，向右侧肩放射：这是胆总管结石嵌顿的典型腹痛特点，因此是正确答案。
- E. 上腹突发刀割样剧烈腹痛，迅速波及全腹：这是消化性溃疡穿孔的典型症状，与胆总管结石嵌顿的腹痛特点不符。

144. 【答案】E

【解析】

- 选项 A：呼吸性碱中毒，多见于肺泡过度通气时，例如高原反应、疼痛、情绪激动等，这些情况下会导致  $\text{PaCO}_2$  降低，所以 A 选项错误。
- 选项 B：呼酸合并代碱，这是一种混合型的酸碱平衡失衡，需要同时存在呼吸性酸中毒和代谢性碱中毒，这与题干描述的肺泡通气不足的情况不符，所以 B 选项错误。
- 选项 C：代谢性碱中毒，常见于剧烈呕吐、长时间胃肠减压或碱性物质摄入过度，这与题干描述的情况无关，所以 C 选项错误。
- 选项 D：呼酸合并代酸，这是一种混合型的酸碱平衡失衡，需要同时存在呼吸性酸中毒和代谢性酸中毒，这与题干描述的肺泡通气不足的情况不符，所以 D 选项错误。
- 选项 E：呼吸性酸中毒，肺泡通气不足会引起  $\text{PaO}_2$  下降和  $\text{PaCO}_2$  上升，从而发生缺氧和  $\text{CO}_2$  潴留，导致呼吸性酸中毒，所以 E 选项正确。

145. 【答案】B

【解析】

- 选项 A：呼碱，指的是肺泡过度通气导致的碱中毒，这在慢性肺源性心脏病失代偿期患者中不常见，因为他们通常存在呼吸功能障碍，不能有效排除二氧化碳，所以这个选项错误。
- 选项 B：呼酸合并代碱，这是正确答案。患者因为慢性肺源性心脏病和二型呼吸衰竭，会存在低氧血症和高碳酸血症，形成呼吸性酸中毒。同时，应用袢利尿剂后，由于  $\text{H}^+$  经肾大量丢失，使  $\text{HCO}_3^-$  重吸收增加，造成代谢性碱中毒。
- 选项 C：代碱，这种情况主要发生在剧烈呕吐、长时间胃肠减压或碱性物质摄入过度等情况，与本题中的患者情况不符，所以这个选项错误。
- 选项 D：呼酸合并代酸，这种情况在严重腹泻、肠痿、胰痿、肾脏排酸保碱功能障碍、组织低灌注等情况下可能出

现，与本题中的患者情况不符，所以这个选项错误。

选项 E：呼酸，虽然患者存在呼吸性酸中毒，但是由于使用袪利尿剂，使得代谢性碱中毒也出现，所以单独的呼酸并不能完全反映患者的状态，这个选项错误。

146. 【答案】A

【解析】

选项 A：呼碱。在慢性阻塞性肺疾病中，由于患者长期存在呼吸困难，会造成二氧化碳排除不畅，导致血液中二氧化碳含量升高，形成呼吸性酸中毒。当这种情况下气管插管机械通气后设置了较大潮气量，二氧化碳迅速降至正常范围，会出现呼吸性碱中毒，即呼碱。因此，选项 A 正确。

选项 B：呼酸合并代碱。此选项描述的是同时存在呼吸性酸中毒和代谢性碱中毒的情况，但题干中的情况是二氧化碳迅速降至正常范围，因此不会出现呼酸的情况，所以选项 B 错误。

选项 C：代碱。此选项描述的是代谢性碱中毒，但题干中的情况是由于呼吸问题导致的酸碱失衡，因此不会出现代谢性碱中毒，所以选项 C 错误。

选项 D：呼酸合并代酸。此选项描述的是同时存在呼吸性酸中毒和代谢性酸中毒的情况，但题干中的情况是二氧化碳迅速降至正常范围，因此不会出现呼酸的情况，所以选项 D 错误。

选项 E：呼酸。此选项描述的是呼吸性酸中毒，但题干中的情况是二氧化碳迅速降至正常范围，因此不会出现呼吸性酸中毒，所以选项 E 错误。

147. 【答案】B

【解析】

选项 A：Bassini 法是一种修补腹股沟管后壁的手术方法，所以这个选项是错误的。

选项 B：Ferguson 法是在精索前方将腹内斜肌下缘和联合腱缝至腹股沟韧带上，消灭腹内斜肌弓状下缘与腹股沟韧带之间的空隙。这是修补加强腹股沟管前壁修补最常见的手术方法，所以这个选项是正确的。

选项 C：McVay 法也是一种修补腹股沟管后壁的手术方法，所以这个选项是错误的。

选项 D：Shouldice 法也是一种修补腹股沟管后壁的手术方法，所以这个选项是错误的。

选项 E：Halsted 法也是一种修补腹股沟管后壁的手术方法，所以这个选项是错误的。

148. 【答案】C

【解析】

A 选项：Bassini 法，主要用于加强腹股沟管后壁的修补，不常用于股疝修补。

B 选项：Ferguson 法，主要用于修补加强腹股沟管前壁，不常用于股疝修补。

C 选项：McVay 法，常用于股疝修补，能加强腹股沟管后壁并堵住股环，因此是正确答案。

D 选项：Shouldice 法，主要用于加强或修补腹股沟管后壁的方法，不常用于股疝修补。

E 选项：Halsted 法，主要用于加强或修补腹股沟管后壁的方法，不常用于股疝修补。

149. 【答案】A

【解析】



- A 选项：血清腹水白蛋白梯度 $>11\text{g/L}$ ，这是肝硬化门静脉高压的腹腔积液特点之一，因此此选项正确。
- B 选项：AFP 升高，这通常是肿瘤导致的腹水的特征，与肝硬化门静脉高压的腹腔积液无直接关系，因此此选项错误。
- C 选项：ADA 升高，这是结核性腹膜炎的特征，与肝硬化门静脉高压的腹腔积液无直接关系，因此此选项错误。
- D 选项：白细胞  $300\times 10^9/\text{L}$ ，中性粒细胞居多，这是细菌感染导致的腹膜炎的特征，与肝硬化门静脉高压的腹腔积液无直接关系，因此此选项错误。
- E 选项：找到异型细胞，这通常是肿瘤导致的腹水的特征，与肝硬化门静脉高压的腹腔积液无直接关系，因此此选项错误。

150. 【答案】C

【解析】

- 选项 A：血清腹水白蛋白梯度 $>11\text{g/L}$ 。这是门静脉高压所致腹腔积液的特征，与结核性腹膜炎无关，所以选项 A 错误。
- 选项 B：AFP 升高。AFP 升高多见于肿瘤所致腹水，不是结核性腹膜炎的特征，所以选项 B 错误。
- 选项 C：ADA 升高。结核性腹膜炎的腹腔积液腺苷脱氨酶（ADA）活性常增高，因此选项 C 正确。
- 选项 D：白细胞  $300\times 10^9/\text{L}$ ，中性粒细胞居多。这是细菌感染导致的腹膜炎的特点，与结核性腹膜炎无关，所以选项 D 错误。
- 选项 E：找到异型细胞。异型细胞在肿瘤所致腹水中更常见，不是结核性腹膜炎的特征，所以选项 E 错误。



## 第四单元

### 1. 【答案】D

#### 【解析】

- A. 维生素 PP：也称为烟酸，参与体内脱氢反应，可以有效地维持机体发育和中枢神经系统的正常，但不是预防 Wernicke 脑病的关键因素。
- B. 维生素 K：能促进血液凝固，还可参与骨骼代谢，但与预防 Wernicke 脑病无直接关联。
- C. 维生素 A：主要维持正常视觉功能，与此题目无关。
- D. 维生素 B<sub>1</sub>：是预防 Wernicke 脑病的关键，因为它的缺乏会导致丙酮酸脱氢酶活性下降，影响组织供能。
- E. 维生素 B<sub>6</sub>：可以防治妊娠呕吐和放射病呕吐，但对于 Wernicke 脑病的预防作用有限。

### 2. 【答案】E

#### 【解析】

- 选项 A：早产儿由于发育不完全，棕色脂肪的含量较少。棕色脂肪是新生儿的主要产热器官，缺乏则会影响产热，因此这个选项是正确的。
- 选项 B：早产儿的体温调节中枢未完全发育，无法有效地调节体温，因此也是导致早产儿低体温的一个重要原因，所以这个选项也是正确的。
- 选项 C：早产儿的皮肤表面角化层较差，皮肤的保护功能较弱，更容易散热，因此这个选项也是正确的。
- 选项 D：早产儿的皮下脂肪薄，脂肪层可以起到保温的作用，皮下脂肪薄则保温效果差，容易散热，所以这个选项也是正确的。
- 选项 E：早产儿的体表面积相对较大，而非较小。由于体积小，体表面积相对大，散热面积大，容易导致体温下降。因此，这个选项是错误的。

### 3. 【答案】C

#### 【解析】

- 选项 A：视神经乳头水肿是颅内压增高的早期表现之一，因此选项 A 错误。
- 选项 B：喷射性呕吐也是颅内压增高的早期表现，因此选项 B 错误。
- 选项 C：双侧瞳孔散大是颅内压增高的晚期表现，不是早期表现，因此选项 C 正确。
- 选项 D：头痛是颅内压增高的早期表现之一，因此选项 D 错误。
- 选项 E：颅内压增高可以刺激交感神经，导致血压升高，因此选项 E 错误。

### 4. 【答案】A

#### 【解析】

- A. 妊娠 12 周后可在耻骨联合上方触及。这是正确的，因为在妊娠的第 12 周末，子宫底的高度可以在耻骨联合上方 2~3 横指处触及。
- B. 子宫增大主要是因为肌细胞数目增多。这是不正确的，虽然妊娠期间肌细胞的数量会有所增加，但子宫的增大主要是由于肌细胞的肥大和延长，以及结缔组织的增生。

- C. 妊娠晚期子宫轻度左旋。这是不正确的，实际上，妊娠晚期子宫会轻度右旋，这与乙状结肠位于盆腔左侧有关。
- D. 妊娠晚期子宫容量约 500ml。这是不正确的，实际上，妊娠足月时，子宫的容量约为 5000ml，是非孕期的 500~1000 倍。
- E. 妊娠早期子宫呈对称的球形。这是不正确的，妊娠早期子宫略呈球形但并不对称，受精卵着床部位的子宫壁会明显突出。

5. 【答案】C

【解析】

- A. 已婚：错误。已婚是精神分裂症预后良好的因素之一，因为已婚者通常有更多的社会支持和更好的心理调适能力。
- B. 急性或亚急性起病：错误。急性或亚急性起病通常与预后良好相关，因为这种情况下的疾病往往容易被及时识别和治疗。
- C. 以阴性症状为主：正确。阴性症状，如情感淡漠、社会退缩等，是精神分裂症预后不良的重要指标，因为这些症状往往更难以治疗。
- D. 初发时年龄晚：错误。晚发初发的精神分裂症患者预后通常较好，因为他们在生活技能和社会适应方面通常具备更强的能力。
- E. 文化程度高：错误。文化程度高的患者通常能更好地理解和管理自己的病情，因此预后通常较好。

6. 【答案】C

【解析】

- A 选项：发热、咳嗽，早期出现肺部细湿啰音。这个选项错误的原因是腺病毒肺炎的肺部啰音出现较迟，多于高热 3~7 天后才出现。
- B 选项：高热伴刺激性干咳。这个选项错误的原因是腺病毒肺炎的典型表现并不是刺激性干咳，而是频繁的咳嗽，呈阵发性喘憋，轻重不等的呼吸困难和发绀。
- C 选项：持续性发热，伴有憋喘，肺实变体征。这个选项正确。腺病毒肺炎的特征性临床症状包括持续性发热和呼吸道症状，如频繁的咳嗽，呈阵发性喘憋，轻重不等的呼吸困难和发绀。当肺部病变融合时，可出现实变体征。
- D 选项：反复发作呼气性呼吸困难。这个选项错误的原因是腺病毒肺炎的呼吸困难并非反复发作的呼气性呼吸困难，而是阵发性喘憋。
- E 选项：咳大量脓痰或反复咯血。这个选项错误的原因是腺病毒肺炎的典型表现并不包括咳大量脓痰或反复咯血。

7. 【答案】C

【解析】

- A 选项：免疫系统在婴儿时期并不是先慢后快，而是随着年龄增长逐渐发展和完善，所以 A 选项错误。
- B 选项：神经系统在胎儿期就开始发育，并在出生后的前几年内发展迅速，其发展并不是先慢后快，所以 B 选项错误。
- C 选项：生殖系统在婴儿期发育较慢，但在青春期开始迅速发展，符合先慢后快的特点，所以 C 选项正确。

D 选项：消化系统在出生后就开始逐渐发展，其发展并不是先慢后快，所以 D 选项错误。

E 选项：呼吸系统在出生后就开始逐渐发展，其发展并不是先慢后快，所以 E 选项错误。

8. 【答案】B

【解析】

A. 胎盘一个或两个：这是正确的。在双卵双胎妊娠中，每个胎儿都有自己的胎盘，但这两个胎盘有可能融合成一个。

B. 双胎性别一定一致：这是错误的。双卵双胎妊娠中的两个胎儿是由两个不同的卵子分别受精形成的，所以他们的性别可以是相同的，也可以是不同的。

C. 双胎指纹可不同：这是正确的。即使是单卵双胎（同卵双胎），他们的指纹也会因为环境因素而有所不同。

D. 双胎外貌性格表型可不同：这是正确的。双卵双胎妊娠中的两个胎儿是由两个不同的卵子分别受精形成的，所以他们的外貌和性格可以有所不同。

E. 羊膜腔可两个，也可一个：这是正确的。在双卵双胎妊娠中，每个胎儿都有自己的羊膜腔。然而，在单卵双胎妊娠中，两个胎儿共享一个羊膜腔。

9. 【答案】D

【解析】

A. 阴道因素：包括阴道炎、阴道畸形等，都可能导致不孕。但这并非最常见原因。

B. 宫体因素：如子宫内膜异位症、子宫肌瘤等也可能导致不孕，但相比输卵管因素，发生率较低。

C. 宫颈因素：如宫颈炎、宫颈糜烂等可能影响精子通过，但通常不是最主要的原因。

D. 输卵管因素：如输卵管阻塞、输卵管炎等，这是继发性不孕最常见的原因，因为这会影响精子和卵子的结合。

E. 精神因素：如压力过大、精神紧张等，虽然可能影响妊娠，但并非最常见原因。

10. 【答案】A

【解析】

A. 肛提肌：正确。肛提肌是骨盆底的重要组成部分，主要功能是支撑骨盆内脏，在排便和排尿过程中起到关键作用。

B. 会阴深横肌：错误。会阴深横肌位于骨盆底，但其主要功能是帮助维持会阴部的正常结构，而非起支持作用。

C. 尿道括约肌：错误。尿道括约肌主要负责控制尿液的排放，而非起支撑作用。

D. 坐骨海绵体肌：错误。坐骨海绵体肌主要参与性生理反应，对于支撑骨盆底结构的作用较小。

E. 肛门外括约肌：错误。肛门外括约肌主要负责控制排便，而非起支撑作用。

11. 【答案】E

【解析】

A. 尼莫地平：这是一种钙离子拮抗剂，多用于预防血管性头痛的发作，不是偏头痛的首选治疗药物。

B. 普萘洛尔：这是一种  $\beta$  肾上腺素能受体阻滞剂，用于偏头痛的预防治疗，而非缓解偏头痛发作。

C. 丙戊酸钠：这是一种抗癫痫药，也用于偏头痛的预防治疗，但不是偏头痛发作的首选治疗药物。

D. 阿米替林：这是一种抗抑郁药，也用于偏头痛的预防治疗，但不是偏头痛发作的首选治疗药物。

E. 曲普坦：这是一种特异性药物，用于偏头痛发作的缓解，是偏头痛的首选治疗药物。

12. 【答案】A

【解析】

A. 剖宫产：正确。根据题干描述，胎儿目前处于不完全臀先露的状态，符合剖宫产手术的指征。

B. 静滴缩宫素：错误。静滴缩宫素主要用于宫缩不良，此情况下并无宫缩不良的表现，因此不适用。

C. 观察待自然分娩：错误。由于胎儿处于不完全臀先露的状态，自然分娩有一定风险，因此不适宜选择观察待自然分娩。

D. 破膜：错误。破膜可能会导致胎儿窘迫或者脐带先露，增加分娩风险，因此不适用。

E. 臀位助产：错误。臀位助产对母体和胎儿的条件要求较高，此情况下胎儿处于不完全臀先露，不适宜进行臀位助产。

13. 【答案】C

【解析】

A. 运动幻觉：这是一种感觉到不存在的物体或者场景的运动，比如感觉到自己在飞翔或者旋转。这种幻觉在精神分裂症中并不常见。

B. 视幻觉：患者会看到实际不存在的图像或者场景。虽然这种幻觉在精神分裂症中也有出现，但是并不是最常见的。

C. 听幻觉：患者会听到实际不存在的声音，比如别人的谈话、音乐声等。这是精神分裂症最常见的幻觉形式。

D. 触幻觉：患者会感觉到实际不存在的触觉刺激，比如感觉到有虫子在爬行。这种幻觉在精神分裂症中并不常见。

E. 嗅幻觉：患者会嗅到实际不存在的气味。这种幻觉在精神分裂症中并不常见。

14. 【答案】B

【解析】

A. 口服维生素 B<sub>12</sub>：虽然维生素 B<sub>12</sub>是治疗营养性巨幼细胞贫血的重要手段，但对于有神经系统症状的患儿，口服吸收可能不足，效果不如肌肉注射。

B. 肌肉注射维生素 B<sub>12</sub>：对于有神经系统症状的营养性巨幼贫患儿，肌肉注射维生素 B<sub>12</sub>是最重要的治疗措施，因为这样可以保证药物的有效吸收和利用，改善病情。

C. 口服叶酸：叶酸也可以用于治疗营养性巨幼细胞贫血，但对于有神经系统症状的患儿，其效果不如维生素 B<sub>12</sub>。

D. 口服葡萄糖酸钙：葡萄糖酸钙是钙补充剂，与本题无关。

E. 口服铁剂：铁剂用于治疗缺铁性贫血，与本题中的营养性巨幼贫血无关。

15. 【答案】C

【解析】

选项 A：头孢曲松钠是对淋病奈瑟菌有良好抑制作用的药物，因此常被选用于淋病的治疗，选项正确。

选项 B：由于 20%-40%的淋病可能会合并沙眼衣原体感染，因此在治疗淋病时，常常需要同时应用抗衣原体药物，

选项正确。

选项 C：淋病的治疗并不推荐单次、大剂量治疗，因为这样容易导致药物耐药性的产生，也不利于病情的控制，所以这个选项是错误的。

选项 D：由于淋病是通过性接触传播的，所以在治疗时，需要性伴侣同时接受治疗，以防止交叉感染，选项正确。

选项 E：淋病的治疗要求及时、足量、规范化的用药，这样才能有效控制病情，防止病情反复或者加重，选项正确。

16. 【答案】D

【解析】

A. AMH 下降：抗米勒管激素（AMH）在女性生殖系统中的主要功能是抑制卵泡的过早发育。随着年龄的增长，AMH 水平会逐渐下降，这与女性的卵巢储备能力减少有关，因此，AMH 下降是绝经综合征的一部分，所以 A 选项正确。

B. 孕酮下降：孕酮是一种重要的性激素，对于维持怀孕起到关键作用。在绝经期，由于卵巢功能减退，孕酮的分泌会减少，所以 B 选项正确。

C. 雌激素波动大：绝经期女性的雌激素水平会发生大幅度的波动，这是由于卵巢功能衰退引起的，所以 C 选项正确。

D. GnRH 下降：促性腺激素释放激素（GnRH）是控制性激素分泌的关键激素。在绝经期，由于卵巢功能减退，GnRH 的分泌实际上会增加，而不是减少，所以 D 选项错误，为本题正确答案。

E. FSH 明显升高：在绝经期，由于卵巢功能减退，促卵泡激素（FSH）的分泌会明显增加，所以 E 选项正确。

17. 【答案】C

【解析】

选项 A：乙肝疫苗，新生儿出生后 24 小时内需要接种第一剂，因此选项 A 错误。

选项 B：卡介苗，通常在新生儿出生后接种，用于预防结核病，因此选项 B 错误。

选项 C：麻腮风疫苗，一般在婴儿出生后 8 个月开始接种，用于预防麻疹、腮腺炎和风疹。因此，选项 C 是正确答案。

选项 D：脊髓灰质炎疫苗（口服脱毒活疫苗），通常在新生儿出生后 2 个月开始接种，因此选项 D 错误。

选项 E：白百破疫苗，通常在新生儿出生后 3 个月开始接种，用于预防百日咳、白喉和破伤风，因此选项 E 错误。

18. 【答案】B

【解析】

A. 面神经：错误。面神经主要在颞骨岩部骨折时容易受损。

B. 嗅神经：正确。颅前窝骨折最易损伤嗅神经，因为嗅神经通过颅底的筛板进入颅腔，颅前窝骨折很容易导致筛板破裂，从而损伤嗅神经。

C. 视神经：错误。视神经位于颅底中央，一般在骨折位于中线处时可能受损。

D. 听神经：错误。听神经主要在颞骨岩部骨折时容易受损。

E. 动眼神经：错误。动眼神经位于颅底中央，一般在骨折位于中线处时可能受损。

19. 【答案】A



## 【解析】

- A. 规律渐强式宫缩：正确。临产的重要标志为有规律且逐渐增强的子宫收缩，持续 30 秒或以上，间歇 5~6 分钟，同时伴随进行性宫颈管消失、宫口扩张和胎先露部下降。
- B. 阴道流血：错误。阴道流血（见红）属于先兆临产的表现，而非临产的标志。
- C. 胎儿下降感：错误。胎儿下降感同样属于先兆临产的表现，而非临产的标志。
- D. 羊水早破：错误。羊水早破是早产的征兆，如果在子宫没有出现规律性收缩以及阴道见红的情况下就发生了羊水破裂，这种情况被称为羊水早破，它是产科常见的一种并发症。
- E. 不规则宫缩：错误。不规则宫缩也属于先兆临产的表现，而非临产的标志。

## 20. 【答案】A

## 【解析】

- 选项 A：“左侧 T5 脊髓损伤”是正确答案。因为患者表现出的是脊髓半切综合征的特征，这种病症的主要特点是病变节段以下同侧上运动神经元性瘫痪、深感觉障碍、精细触觉障碍及血管舒缩功能障碍，对侧痛温觉障碍。对侧传导束性感觉障碍平面较脊髓损害节段水平低，所以患者病变部位在左侧 T5。
- 选项 B：“右侧 T5 脊髓损伤”是错误的。因为根据脊髓半切综合征的特性，病变应该在患者的左侧，而不是右侧。
- 选项 C：“左侧 T7 脊髓损伤”是错误的。虽然病变在左侧，但是根据患者的症状，病变部位应该在 T5，而不是 T7。
- 选项 D：“右侧 T7 脊髓损伤”是错误的。这个选项既错误地指出了病变在右侧，也错误地指出了病变位置在 T7。
- 选项 E：“脊髓震荡”是错误的。脊髓震荡是一种轻微的脊髓损伤，通常在受到外力损伤后立即出现短暂的神经功能异常，且这种异常是可逆的。但患者的症状并不符合这种情况。

## 21. 【答案】D

## 【解析】

- A. 氯硝西泮：主要用于治疗癫痫和惊厥，对各型癫痫均有效，尤以小发作和肌阵挛发作疗效最佳。但并非首选用于治疗原发性三叉神经痛。
- B. 左乙拉西坦：用于成人和儿童（4 岁以上）癫痫患者部分性发作的加用治疗，而非首选用于治疗原发性三叉神经痛。
- C. 乙琥胺：常用于失神发作。治疗癫痫小发作，而非首选用于治疗原发性三叉神经痛。
- D. 卡马西平：是治疗原发性三叉神经痛的首选药物，有效率可达 70%~80%，是正确答案。
- E. 托吡酯：用于初诊为癫痫的患者的单药治疗或曾经合并用药现转为单药治疗的癫痫患者，也可用于成人及 2-16 岁儿童部分性癫痫发作的加用治疗，而非首选用于治疗原发性三叉神经痛。

## 22. 【答案】A

## 【解析】

- A. 中度低渗性脱水：血钠 125mmol/L，属于低渗性脱水。血压稍下降、精神尚可、皮肤弹性差，考虑为中度缺水。因此，A 选项是正确答案。
- B. 重度低渗性脱水：重度脱水时，患儿可有心率增快；脉搏减弱；血压降低；皮肤灌注减少，可出现花纹；前囟



凹陷；皮肤弹性差；黏膜干燥；无泪少尿，严重者可有昏迷。但在此题中，患儿的症状并未达到这种程度，所以 B 选项是错误的。

C. 轻度低渗性脱水：轻度脱水患儿皮肤弹性正常，血压正常。在此题中，患儿的皮肤弹性差，血压也有所下降，所以 C 选项是错误的。

D. 中度等渗性脱水：此选项的判断主要依据血钠的浓度。在此题中，患儿的血钠为  $125\text{mmol/L}$ ，低于  $130\text{mmol/L}$ ，所以不属于等渗性脱水。因此，D 选项是错误的。

E. 中度高渗性脱水：高渗性脱水通常血钠  $>150\text{mmol/L}$ ，而此题中，患儿的血钠为  $125\text{mmol/L}$ ，所以不属于高渗性脱水。因此，E 选项是错误的。

23. 【答案】B

【解析】

A：错误。心电图主要用于诊断心脏疾病，与此题目无关。

B：正确。肌电图是一种电生理检查，可以早期发现感觉和运动神经传导速度减慢，对于糖尿病并发的远端对称性多发性神经病变有重要的诊断价值。

C：错误。下肢血管彩超主要用于检查下肢深静脉血栓、狭窄等，与此题目无关。

D：错误。腰椎 CT 主要用于观察腰椎是否有侧弯、错位、滑移、椎间盘突出、腰椎骨折等症状，与此题目无关。

E：错误。磁共振主要用于检测颅内疾病，与此题目无关。

24. 【答案】A

【解析】

A. 膀胱结石：中年男性，排尿间断，伴阴茎头部疼痛，改变体位后可继续排尿，最可能的诊断为膀胱结石。膀胱结石的典型症状为排尿突然中断，疼痛放射至远端尿道及阴茎头部，伴排尿困难和膀胱刺激症状。跑跳或改变排尿姿势后，能使疼痛缓解，继续排尿。

B. 前列腺增生：前列腺增生最常见的早期症状为尿频，夜间更为明显。随着病情发展，梗阻加重，残余尿量增多，膀胱有效容量减少，尿频逐渐加重。但在这个病例中，患者没有表现出这些典型的症状，因此 B 错。

C. 尿道炎：尿道炎多表现为尿频、尿痛、尿急和血尿，急性期男性可有尿道分泌物，初始为黏液性，后多有量脓性分泌物。但在这个病例中，患者没有表现出这些典型的症状，因此 C 错。

D. 急性细菌性膀胱炎：急性细菌性膀胱炎发病突然，有尿痛、尿频、尿急，严重者数分钟排尿一次，且不分昼夜。排空后仍有尿不尽感。病人常诉排尿时尿道有烧灼感，甚至不敢排尿。常见终末血尿，有时为全程血尿，甚至有血块排出。可有急迫性尿失禁。但在这个病例中，患者没有表现出这些典型的症状，因此 D 错。

E. 肾积水：肾积水伴有上尿路急性梗阻时，常常出现肾绞痛、恶心、呕吐、血尿及肾区压痛等。伴有上尿路慢性梗阻由于发展常较缓慢，症状不明显或仅有腰部隐痛不适，当发展成巨大肾积水时，腹部可出现肿块；伴有下尿路梗阻时，主要表现为排尿困难和膀胱排空障碍，甚至出现尿潴留，而引起肾积水出现的症状常较晚，临床多表现为不同程度的肾功能损害。但在这个病例中，患者没有表现出这些典型的症状，因此 E 错。

25. 【答案】E

## 【解析】

- A. 新斯的明：新斯的明属于胆碱酯酶抑制剂，是治疗重症肌无力的药物，因此选项 A 错误。
- B. 糖皮质激素：糖皮质激素可以抑制自身免疫反应，减少乙酰胆碱受体抗体的生成，因此选项 B 错误。
- C. 丙种球蛋白：丙种球蛋白可以干扰乙酰胆碱受体抗体与乙酰胆碱受体的结合，保护乙酰胆碱受体不被抗体阻断，因此选项 C 错误。
- D. 维生素 C：重症肌无力时可适当补充维生素 C，增强自身免疫力，还可减少肌肉、毛细血管、胸腺、运动终板、微小静脉发生细胞浸润，因此选项 D 错误。
- E. 氨基糖苷类抗生素：重症肌无力时禁用和慎用的药物有氨基糖苷类抗生素，因此选项 E 正确。

## 26. 【答案】E

## 【解析】

- 选项 A：等张，表示溶液的渗透压与体液相等。在这里不符合题干中口服补液盐的张力描述，所以 A 选项错误。
- 选项 B：1/2 张，表示溶液的渗透压是体液的一半。在这里不符合题干中口服补液盐的张力描述，所以 B 选项错误。
- 选项 C：1/3 张，表示溶液的渗透压是体液的三分之一。在这里不符合题干中口服补液盐的张力描述，所以 C 选项错误。
- 选项 D：1/5 张，表示溶液的渗透压是体液的五分之一。在这里不符合题干中口服补液盐的张力描述，所以 D 选项错误。
- 选项 E：2/3 张，表示溶液的渗透压是体液的三分之二。根据题干中口服补液盐的配方，可以计算出其张力为 2/3 张，所以 E 选项正确。

## 27. 【答案】D

## 【解析】

- 选项 A：高血压是 1 型子宫内膜癌（非雌激素依赖）的高危因素。高血压可能会引发内分泌紊乱，进一步影响到女性的月经周期和卵巢功能，增加子宫内膜癌的风险。
- 选项 B：糖尿病也是 1 型子宫内膜癌（非雌激素依赖）的高危因素。糖尿病患者体内胰岛素抵抗增强，胰岛素水平升高，会刺激内膜细胞过度增生，从而增加子宫内膜癌的风险。
- 选项 C：肥胖同样是 1 型子宫内膜癌（非雌激素依赖）的高危因素。肥胖人群体内脂肪组织多，导致雌激素水平升高，过多的雌激素会刺激子宫内膜过度增生，增加子宫内膜癌的风险。
- 选项 D：多产并不是 1 型子宫内膜癌（非雌激素依赖）的高危因素，因此是正确答案。实际上，多产女性的子宫内膜癌风险较低，可能与每次怀孕都会引起激素水平的变化，对子宫内膜进行一次“清扫”，减少异常细胞的机会有关。
- 选项 E：绝经延迟是 1 型子宫内膜癌（非雌激素依赖）的高危因素。绝经延迟意味着女性的月经周期更长，子宫内膜暴露在雌激素刺激下的时间更长，增加了子宫内膜癌的风险。

## 28. 【答案】E

## 【解析】

选项 A: 盆腔炎的临床表现为下腹痛伴肛门坠胀, 可伴寒战、高热、脉速、头痛等全身症状。体征为下腹明显压痛、反跳痛、肌紧张; 宫旁一侧或两侧结缔组织增厚、压痛和(或)触及炎性包块, 严重者整个盆腔形成“冰冻骨盆”。但在题目中, 患者的全身症状更加严重, 更符合感染性休克的症状。

选项 B: 阴道炎表现为阴道异常分泌物且增多, 呈脓性或浆液性或血性或豆腐渣样。外阴瘙痒, 阴道有灼热、坠胀感, 出现性交痛。阴道分泌物刺激尿道口出现尿频、尿痛, 小腹部不适, 或全身乏力。但在题目中, 患者并未出现这些症状。

选项 C: 宫颈炎患者一般无明显的症状, 部分患者会出现阴道分泌物增多呈黏液脓性、外阴瘙痒或灼热感、性交痛、阴道接触性出血等症状。但在题目中, 患者并未出现这些症状。

选项 D: 阑尾炎典型表现为转移性右下腹疼痛, 但在题目中, 患者并未出现这种症状。

选项 E: 感染性休克的症状包括高热、休克等表现, 与题目中患者的症状相符。

29. 【答案】B

【解析】

A. 幻觉: 幻觉是没有现实刺激作用于感觉器官时出现的知觉体验, 是一种虚幻的知觉。在这个例子中, 男子是在有实际物体(衣帽架)存在的情况下产生了错误的知觉, 所以不属于幻觉。

B. 错觉: 错觉是对客观事物歪曲的知觉。在这个例子中, 男子在光线暗淡的环境中将衣帽架看错成人影, 属于错觉。这是正确答案。

C. 妄想: 妄想是在病态推理和判断基础上形成的一种病理性的歪曲的信念。在这个例子中, 男子并无此类病态推理和判断, 所以不属于妄想。

D. 精神分裂: 精神分裂存在以下五个症状维度(亚症状群): 幻觉、妄想症状群; 阴性症状群; 瓦解症状群; 焦虑抑郁症状群及激越症状群。在这个例子中, 男子并未表现出这些症状, 所以不属于精神分裂。

E. 躯体障碍: 躯体障碍是一类精神障碍, 特征为患者长时间担心或坚信自己得了某种躯体疾病。在这个例子中, 男子并未表现出此类情况, 所以不属于躯体障碍。

30. 【答案】E

【解析】

选项 A: 立刻剖宫产。该选项不正确。尽管胎儿的心率低且出现晚期减速, 表明胎儿缺氧严重, 但是由于宫口已经开全, 胎头双顶径已达坐骨棘平面以下, 优先考虑阴道助产术, 而不是剖宫产。

选项 B: 观察。该选项不正确。胎儿心率低和晚期减速表明胎儿处于窘迫状态, 需要立即采取措施, 不能仅仅观察。

选项 C: 静滴缩宫素。该选项不正确。缩宫素主要用于产后出血, 不适用于此种胎儿窘迫的情况。

选项 D: 硫酸镁静滴。该选项不正确。硫酸镁主要用于预防和治疗子痫前期, 不适用于此种胎儿窘迫的情况。

选项 E: 产钳助产。该选项正确。在宫口开全, 胎头双顶径已达坐骨棘平面以下的情况下, 如果出现胎儿窘迫, 应尽快行阴道助产术结束分娩。

31. 【答案】A

【解析】

- A. 地西洋：对于 18 个月的小儿，如果出现高热、持续抽搐 15 分钟且未缓解的情况，首选药物应该是地西洋。因为地西洋具有快速控制和阻止惊厥发作的效果，是处理儿童热性惊厥的一线药物。
- B. 苯妥英钠：虽然苯妥英钠也是一种抗惊厥药物，但主要用于治疗惊厥持续状态或者地西洋治疗无效的情况，所以这个选项是错误的。
- C. 苯巴比妥：这种药物主要用于新生儿惊厥，对于本题中已经 18 个月大的小儿，首选应该是地西洋，所以这个选项也是错误的。
- D. 物理降温：虽然降低体温可以帮助缓解热性惊厥，但它不能直接控制惊厥发作，因此不能作为首选药物，这个选项是错误的。
- E. 糖皮质激素：糖皮质激素并不是治疗热性惊厥的首选药物，所以这个选项也是错误的。

32. 【答案】A

【解析】

- A. 先天性肥厚性幽门梗阻：此选项为正确答案。该疾病的典型症状和体征为无胆汁的喷射性呕吐、胃蠕动波和右上腹肿块，部分患儿可有黄疸表现，这与题干中的情况一致。
- B. 先天性肠扭转不良：此疾病多表现为出生后有正常胎粪排出，生后 3~5 天出现间歇性呕吐，呕吐物含有胆汁，与题干描述不符。
- C. 先天性巨结肠：患儿生后 24~48 小时内多无胎便或仅有少量胎便排出，可于生后 2~3 天出现低位肠梗阻症状，这与题干中的情况不一致。
- D. 胃扭转：多在出生后数周即可发现，喂奶几分钟后即可发生吐奶，少数患儿会呈喷射状，呕吐物多为奶汁或乳凝块，不含胆汁，若移动患儿吐奶会更明显，腹部有轻微胀气，与题干描述不符。
- E. 十二指肠瘀滞症：典型表现为上腹部疼痛、憋胀、恶心，呕吐胆汁样物等，部分患者可出现消瘦等症状，与题干描述不符。

33. 【答案】C

【解析】

- A. 重症肌无力：此病状主要表现为极易疲劳、眼睑下垂、复视、抬头、抬手困难、吞咽困难等症状，严重者累及呼吸肌造成呼吸衰竭，但患者没有出现这些症状，所以 A 选项错误。
- B. 短暂性脑缺血发作：此病状多表现为脸部、手臂或腿部特别是身体的一侧突发麻木、虚弱或无力（偏瘫），突视力下降，如突然眼花、模糊。突发言语或语言障碍，例如突然不能说话、或说话不利索，或突然听不懂说话。突发行走障碍或身体失衡，如突然跌倒，但患者没有出现这些症状，所以 B 选项错误。
- C. 蛛网膜下腔出血：中年女性，左眼睑下垂 3 天（可能有颅内神经压迫），突发剧烈头痛、伴恶心呕吐。查体：神志清楚，左眼睑下垂、瞳孔扩大、对光反射消失、眼球处于外展位，内收及上下视受限。这些都是蛛网膜下腔出血的典型症状，所以 C 选项正确。
- D. 脑内出血：也可出现血性脑脊液，但此时应有明显局灶性体征如偏瘫、失语等，患者没有出现这些症状，所以 D 选项错误。



E. 硬膜下血肿：患者大部分会表现昏迷、恶心、呕吐、剧烈疼痛等症状，部分患者可出现头晕、耳鸣、记忆力减退等，但患者没有出现这些症状，所以 E 选项错误。

34. 【答案】C

【解析】

A. 抑郁症：虽然病人有精神萎靡、终日酗酒等抑郁症状，但其主要症状是与车祸相关的恐惧和回避，这更符合创伤后应激障碍。

B. 焦虑症：病人有明显的焦虑症状，但是这些症状是由于特定的创伤事件引起的，因此更符合创伤后应激障碍。

C. 创伤后应激障碍：病人的症状（频繁梦见车祸现场，对与车祸相关的事物产生强烈的回避行为，精神萎靡，终日酗酒）完全符合创伤后应激障碍的诊断标准。

D. 急性应激障碍：此病的症状在创伤事件后立即出现，并且持续时间较短，通常不超过一个月。病人的症状已经持续了两个月，因此不符合急性应激障碍的诊断标准。

E. 适应障碍：此病是对特定的应激事件（如失业、离婚等）的过度反应。虽然车祸可以视为应激事件，但病人的症状更符合创伤后应激障碍。

35. 【答案】C

【解析】

A. 下丘脑性闭经：特点是下丘脑合成和分泌促性腺激素释放激素（GnRH）缺陷或下降，导致垂体促性腺激素的分泌功能低下，属于低促性腺激素性闭经。但在这个病例中，体温监测为双相型，说明存在排卵，因此不符合下丘脑性闭经的特征。

B. 垂体性闭经：主要病变在垂体。腺垂体器质性病变或功能失调，均可影响促性腺激素分泌，继而影响卵巢功能引起闭经。但在这个病例中，体温监测为双相型，说明存在排卵，因此不符合垂体性闭经的特征。

C. 子宫性闭经：闭经原因在子宫，月经调节功能正常，第二性征发育也正常。常见原因为 Asherman 综合征，多因人工流产刮宫过度或产后、流产后出血刮宫损伤子宫内膜，导致宫腔粘连而闭经。在这个病例中，患者有人流术史，孕激素试验和雌孕激素序贯试验均阴性，体温监测为双相型，说明存在排卵，最符合子宫性闭经的特征。

D. 卵巢性闭经：闭经的原因在卵巢。卵巢分泌的性激素水平低下，子宫内膜不发生周期性变化而导致闭经。这类闭经促性腺激素升高，属高促性腺素性闭经。但在这个病例中，体温监测为双相型，说明存在排卵，因此不符合卵巢性闭经的特征。

E. 大脑皮层功能失调性闭经：这是一个不存在的表述，可能是为了增加选项数量而设置的干扰项。

36. 【答案】A

【解析】

A. 泌乳热：题目中提到初产妇顺产后 3 天，体温略升高，乳房胀痛，这些症状符合泌乳热的表现，因此 A 选项是正确的。

B. 产后体温调节功能失调：如果是这种情况，产妇会突然高热，发热时不伴有出汗，皮肤温度分布不均。题目中并未描述出这样的症状，所以 B 选项是错误的。

C. 会阴切口感染：感染会引起剧烈疼痛、发热、脓性分泌物等症状。但题目中提到的会阴切口略红，无渗出，所以 C 选项是错误的。

D. 急性乳腺炎：主要症状为乳房疼痛、局部红肿、发热、脓肿，早期可出现寒战、高热、脉搏快速等脓毒症血症表现。题目中并未描述出这样的症状，所以 D 选项是错误的。

E. 子宫内膜炎：常见症状为下腹部疼痛，白带增多、偶有血性白带，子宫有轻微压痛等。题目中并未描述出这样的症状，所以 E 选项是错误的。

37. 【答案】C

【解析】

选项 A：酒精性痴呆是长期、大量饮酒后出现的持续性智力减退，表现为短期、长期记忆障碍，抽象思维及理解判断障碍，人格改变。此患者虽有不认识家人的情况，但并无其他痴呆特征，故 A 选项错误。

选项 B：酒精性幻觉症是慢性酒精依赖患者所出现的持久的精神病性障碍，也可能是酒依赖者突然停饮后出现器质性幻觉，表现为在意识清晰状态下出现生动、持续性的视听幻觉。此患者的症状并无持续性，故 B 选项错误。

选项 C：震颤谵妄出现在突然断酒后，大约在 48 小时后，表现为意识模糊，分不清东南西北，不识亲人，不知时间，有大量的知觉异常，如常见形象歪曲而恐怖的毒蛇猛兽、妖魔鬼怪，患者极不安宁、情绪激越、大喊大叫。此患者的症状与震颤谵妄一致，故 C 选项正确。

选项 D：柯萨可夫综合征主要表现为近事记忆障碍、虚构、定向障碍三大特征，患者还可能有幻觉、夜间谵妄等表现。此患者并无记忆障碍和虚构的症状，故 D 选项错误。

选项 E：酒精性妄想主要表现为在意识清晰的情况下的妄想状态，特别是嫉妒妄想。此患者的症状并非妄想，故 E 选项错误。

38. 【答案】A

【解析】

选项 A：动脉导管未闭。根据题干，2 岁女婴有喂养困难、气促、多汗、生长落后等症状，胸骨左缘第二肋间可闻及响亮的粗糙机器音，心电图示左室肥厚，这些都是动脉导管未闭的典型症状和体征，因此选项 A 是正确答案。

选项 B：房间隔缺损。一般会在胸骨左缘第 2~3 肋间听到收缩期杂音，患者易反复发生呼吸道感染，表现为体形瘦长、面色苍白、乏力、多汗、活动后气促和生长发育迟缓，与题干描述不符，所以选项 B 错误。

选项 C：室间隔缺损。体格检查时会听到胸骨左缘第 3、4 肋间响亮的全收缩期杂音，患者多生长迟缓，体重不增，有消瘦、喂养困难，活动后乏力、气短、多汗，易患反复呼吸道感染，易导致充血性心力衰竭等，虽然部分症状与题干相符，但没有提到“机器”样杂音，所以选项 C 错误。

选项 D：法洛四联症。多表现为青紫、蹲踞症状、杵状指（趾）、阵发性缺氧发作，与题干描述不符，所以选项 D 错误。

选项 E：肺动脉狭窄。生长发育多正常，半数患儿面容硕圆，大多无青紫，面颊和指端可能暗红，与题干描述不符，所以选项 E 错误。

39. 【答案】E



## 【解析】

- A. 颈膨大以下颈髓：如果是颈膨大以下颈髓损伤，会表现为两上肢呈下运动神经元性瘫痪，两下肢呈上运动神经元性瘫痪，平面以下各种感觉缺失，可能有肩部和上肢的放射性痛，尿便障碍。但在这个案例中，患者四肢肌力 3 级，肌张力增高，颈 4 以下的深浅感觉减退，所以 A 选项错误。
- B. 脑实质：脑实质损伤多会有精神障碍，而这个案例中，患者神志清楚，所以 B 选项错误。
- C. 胸髓：胸髓损伤会导致平面以下感觉缺失，双下肢呈上运动神经元性瘫痪，括约肌障碍，受损节段常伴有束带感。但在这个案例中，患者四肢肌力 3 级，肌张力增高，颈 4 以下的深浅感觉减退，所以 C 选项错误。
- D. 腰骶膨大：腰骶膨大损伤会导致双下肢下运动神经元性瘫痪，双下肢及会阴部位各种感觉缺失，括约肌障碍。但在这个案例中，患者四肢肌力 3 级，肌张力增高，颈 4 以下的深浅感觉减退，所以 D 选项错误。
- E. 颈膨大及以上颈髓：根据患者的症状和体征，最可能的损伤部位是颈膨大及以上颈髓，所以 E 选项正确。

## 40. 【答案】B

## 【解析】

- A. 低镁血症：虽然患儿有抽搐、多汗等症状，但血镁并未低于  $0.58\text{mmol/L}$ ，所以排除此选项。
- B. VitD3 缺乏性手足搐搦症：患儿有间断抽搐、多汗、反复惊厥的症状，查体发现有枕秃、方颅等维生素 D 缺乏性佝偻病的特征表现，实验室检查血钙略低，因此该选项符合患儿的病情。
- C. 婴儿痉挛：婴儿痉挛症的典型症状是频繁的痉挛发作、脑电图表现为特异性高幅失律 EEG 图形，以及病后精神运动发育倒退，但患儿并未显示这些典型症状，所以排除此选项。
- D. 低血糖症：虽然患儿血糖略低，但并未低于  $2.2\text{mmol/L}$ ，且无进食不足或腹泻史，所以排除此选项。
- E. 甲状旁腺激素减退：此病表现为间歇性惊厥或手足搐搦，但患儿血钙并未降至  $1.75\text{mmol/L}$  以下，血磷并未升高  $>3.2\text{mmol/L}$ ，且无颅骨 X 线可见基底核钙化灶等情况，所以排除此选项。

## 41. 【答案】A

## 【解析】

- 选项 A：子宫内膜异位症根据题干信息，患者为 25 岁女性，有痛经、痛经加重、不孕等症状，妇科检查发现阴道后穹窿蓝紫色结节，双附件未扪及肿大，这些都是子宫内膜异位症的典型表现，因此 A 选项正确。
- 选项 B：子宫腺肌病子宫腺肌病的主要症状是经量过多、经期延长和逐渐加重的进行性痛经，妇科检查子宫呈均匀增大或有局限性结节隆起，质硬且有压痛，这与题干所述病情不符，因此 B 选项错误。
- 选项 C：盆腔炎后遗症盆腔炎后遗症可能导致不孕、异位妊娠、慢性盆腔痛等问题，但题干中并未提到患者有这些症状，因此 C 选项错误。
- 选项 D：卵巢癌转移卵巢癌转移时，妇科检查通常可以扪及肿块多为双侧，实性或囊实性，表面凹凸不平，活动差，常伴有腹腔积液。这与题干所述病情不符，因此 D 选项错误。
- 选项 E：子宫内膜癌子宫内膜癌的主要症状是阴道流血或阴道排液，这与题干所述病情不符，因此 E 选项错误。

## 42. 【答案】E

## 【解析】

- A. 宫腔操作至病原体感染：虽然人工流产术可能会引起宫腔的感染，但是这种情况下，一般会出现腹痛、发热等全身性症状，而不仅仅是外阴瘙痒和阴道豆腐渣样分泌物。
- B. 阴道局部黏膜潮湿：这个因素可能会导致阴道炎症，但是不是本题的最直接原因。
- C. 术后发热阴道 Ph 升高：术后发热可能会导致阴道的 PH 值升高，但并不能直接导致外阴瘙痒和阴道豆腐渣样分泌物。
- D. 流产后雌激素下降：流产后雌激素确实会下降，但这并不能直接导致外阴瘙痒和阴道豆腐渣样分泌物。
- E. 乳杆菌生长受抑制：正确答案。头孢曲松是广谱抗菌药，可能会抑制乳杆菌的生长，进而影响阴道内的菌群平衡，导致假丝酵母菌过度增殖，引起外阴瘙痒和阴道豆腐渣样分泌物。

43. 【答案】C

【解析】

- A. 躯体形式障碍：此病症的主要表现为对身体外表或部分功能的过度关注和担忧，而患者的身体实际上并无明显缺陷或异常。这与题干中患者的症状不符。
- B. 精神分裂症：精神分裂症的主要症状是思维紊乱、情感淡漠和行为异常，这与题干中患者的症状也不符。
- C. 社交焦虑障碍：社交焦虑障碍的主要症状是对公共场合有过度的恐惧和紧张，害怕在人前出丑，与题干中患者的症状相符。
- D. 创伤后应激障碍：通常由于经历了极度恐怖的创伤事件后产生，表现为回避与创伤相关的事物，持续的恐惧和警觉，与题干中没有提及创伤事件，所以不符。
- E. 强迫障碍：强迫障碍的主要症状是反复出现的强迫观念或行为，患者明知这些观念和行為是无意义的，但无法自控。题干中的症状并非强迫性的，所以不符。

44. 【答案】C

【解析】

- A. 患者存在溶血性疾病：患者在输血后出现寒战、高热、心慌气短等溶血反应的表现，说明可能存在溶血性疾病，这是可能的原因，所以选项 A 错误。
- B. 输血时血液处理不当：如果血液在处理过程中出现问题，如温度、pH 值控制不当等，也可能导致溶血反应，所以选项 B 错误。
- C. 患者尿路结石发作：尿路结石发作通常不会导致溶血反应，而且这个情况与输血无关，所以选项 C 是正确答案。
- D. 血型不合输血：血型不合也会引起溶血反应，所以选项 D 错误。
- E. 血液保存不当：血液保存不当，如超期使用，也可能导致溶血反应，所以选项 E 错误。

45. 【答案】C

【解析】

- 选项 A：骨龄测定，主要用于判断患儿的生长发育水平，对明确原发病无意义。
- 选项 B：血清 T<sub>3</sub>、T<sub>4</sub>、TSH，多用于诊断呆小症、先天性甲状腺功能减退症等，与本题目的病例不符。
- 选项 C：染色体核型，是唐氏综合征的明确诊断方法，因为唐氏综合征是由于染色体的异常导致的。

选项 D：尿三氯化铁，主要用于检测苯丙酮尿症，这是一种氨基酸代谢性疾病，与本题目的病例不符。

选项 E：血氨基酸分析，多用于测定遗传代谢病，与本题目的病例不符。

46. 【答案】E

【解析】

A. 磷下降：营养性维生素 D 缺乏病早期，血磷可能正常，因此此选项不正确。

B. 碱性磷酸酶升高：营养性维生素 D 缺乏病早期，碱性磷酸酶可能正常，因此此选项不正确。

C. 钙下降：营养性维生素 D 缺乏病早期，血钙可能正常，因此此选项不正确。

D. 长骨 X 线异常：营养性维生素 D 缺乏病早期，长骨 X 线可能正常，因此此选项不正确。

E. 25 (OH) D<sub>3</sub>下降：营养性维生素 D 缺乏病早期，血 25 (OH) D<sub>3</sub>下降，这是诊断的可靠指标，因此此选项正确。

47. 【答案】D

【解析】

A. 接种卡介苗正常阳性：患者预防接种史不详，且接种卡介苗后的结核菌素试验硬结直径多为 5~9mm，而患者的硬结只有 3mm，所以此选项错误。

B. 结核菌素失效阴性：一般来说，结核菌素失效阴性不会出现红肿，但患者的结核菌素试验结果是红肿 10mm，硬结 3mm，所以此选项错误。

C. 未感染结核分枝杆菌呈阳性：患者的临床表现和 X 线结果都提示患者可能已经感染了结核分枝杆菌，所以此选项错误。

D. 免疫抑制导致的假阴性：患者之前患有麻疹，可能导致免疫抑制，影响结核菌素试验结果，使其成为假阴性。所以此选项是正确答案。

E. 感染结核阳性：结核菌素试验硬结平均直径不足 5mm 为阴性，患者的硬结只有 3mm，所以此选项错误。

48. 【答案】A

【解析】

A. 短暂性脑缺血 (Transient Ischemic Attack, TIA) 是由于局部脑或视网膜缺血引起的短暂性神经功能缺损，临床症状一般不超过 1 小时，最长不超过 24 小时，且无责任病灶的证据。患者的表现符合这一描述，故此为正确答案。

B. 脑出血通常会导致一侧身体麻木无力或瘫痪，嘴歪、流口水等症状，但不会自行恢复，与患者的症状不符。

C. 脑梗死的神经功能缺损症状通常会持续超过 1 小时，且大多数患者会有持续存在的神经功能缺损，与患者的症状不符。

D. 蛛网膜下腔出血的主要症状是头痛，可能伴有恶心、呕吐、意识障碍、局灶性神经功能缺损、癫痫发作等，与患者的症状不符。

E. 局灶癫痫发作通常表现为持续数秒至数分钟的肢体抽搐或麻木针刺感，从躯体的一处开始，并向周围扩展，可能伴有脑电图异常，与患者的症状不符。

49. 【答案】E

## 【解析】

选项 A：浅表性胃炎。这是患者的一种症状，但并不是最主要的诊断。这可能是由于患者神经性贪食导致的。

选项 B：双相障碍。这是一种情感障碍，表现为躁狂或轻躁狂发作和抑郁发作。根据题干描述，患者并未出现这些症状。

选项 C：神经性呕吐。这种情况下，患者会有反复呕吐、表演型人格、睡眠障碍等症状。虽然患者有呕吐行为，但并没有其他相关症状。

选项 D：神经性厌食。这种疾病的诊断需要满足一系列条件，如体重指数小于或等于 17.5，或体重保持在至少低于正常体重的 15%以上的水平等。题干中提到的患者并未满足这些条件。

选项 E：神经性贪食。这是最符合患者症状的诊断。患者有大量饮食、自我引吐、担心发胖等典型的神经性贪食症状。

## 50. 【答案】C

## 【解析】

A. 加用环磷酰胺治疗：环磷酰胺是一种免疫抑制剂，主要用于治疗重症肾病综合征或对激素无反应的病例。在本题中，患者使用泼尼松治疗 3 周后，尿蛋白仍然存在，但这并不意味着需要立即加用环磷酰胺，因为泼尼松的疗效可能需要 4 周以上才能明显。

B. 甲泼尼龙冲击治疗：甲泼尼龙冲击治疗通常用于严重或复发的肾病综合征，但在本例中，患者尚未完成足量泼尼松治疗的 4 周疗程，因此暂时没有必要改变治疗方案。

C. 继续足量泼尼松治疗：根据肾病综合征的治疗指南，患者在开始泼尼松治疗后需要至少 4 周才能评估疗效。因此，尽管患者在治疗 3 周后尿蛋白仍然存在，但应继续使用足量的泼尼松治疗。

D. 增加泼尼松剂量继续口服：在本例中，患者已经在使用足量的泼尼松，因此没有必要增加剂量。

E. 减少泼尼松剂量继续口服：在评估泼尼松疗效之前，不应减少其剂量。

## 51. 【答案】D

## 【解析】

A. 涂片可见芽孢和菌丝，这是外阴阴道假丝酵母菌病的检查结果，与本题的症状不符。

B. 核酸扩增实验衣原体阳性，这是沙眼衣原体的可靠检查，与本题的症状不符。

C. 涂片见中性粒细胞内含革兰阴性双球菌，这是淋病的实验室检查结果，与本题的症状不符。

D. 悬滴法发现阴道毛滴虫，这是滴虫阴道炎的典型检查结果，与本题的症状相符，故为正确答案。

E. 暗视野显微镜发现螺旋体，这多见于梅毒，与本题的症状不符。

## 52. 【答案】A

## 【解析】

选项 A：轮状病毒肠炎。这是正确答案。轮状病毒肠炎多发生在 6~24 个月的婴幼儿，常伴有发热和上呼吸道感染症状，大便次数及水分多，呈黄色水样或蛋花样便带少量黏液，无腥臭味。

选项 B：产毒性大肠杆菌肠炎。起病较急，重症腹泻频繁，量多，呈水样或蛋花样混有黏液，但镜检无白细胞，此



选项错误。

选项 C：生理性腹泻。多见于 6 个月以下的婴儿，大便次数增多，含少量水分，无特殊腥臭味，食欲好，无呕吐，生长发育不受影响，此选项错误。

选项 D：侵袭性大肠杆菌肠炎。起病急，高热，大便呈黏液状带脓血，有腥臭味，常伴恶心、呕吐、腹痛和里急后重，可出现严重的中毒症状，此选项错误。

选项 E：真菌性肠炎。病程迁延，常伴鹅口疮，大便次数增多，黄色稀便，泡沫较多，带黏液，有时可见豆腐渣样细块，此选项错误。

53. 【答案】B

【解析】

A. 子宫肉瘤：一种恶性肿瘤，早期可能无异常表现，随着病情发展可出现阴道不规则流血、腹痛等症状，但与题干描述的症状不符。

B. 子宫腺肌病：当子宫内膜腺体及间质侵入子宫肌层时，称为子宫腺肌病。主要症状为经量过多、经期延长和逐渐加重的进行性痛经，这与题干中的症状相符。

C. 子宫肌瘤：患者多无明显症状，多在体检中发现。症状与肌瘤部位、大小和有无变性相关，部分患者会出现月经异常等症状，但与题干描述的症状不完全符合。

D. 子宫内膜异位症：主要表现为下腹痛和痛经、不孕、性交不适、月经异常，与题干描述的症状不完全符合。

E. 子宫内膜炎：症状一般不明显，常见症状为下腹部疼痛，白带增多等，但与题干描述的症状不符。

54. 【答案】E

【解析】

选项 A：7，不符合骨龄简易计算方法，错误。

选项 B：3，不符合骨龄简易计算方法，错误。

选项 C：4，不符合骨龄简易计算方法，错误。

选项 D：6，不符合骨龄简易计算方法，错误。

选项 E：5，符合骨龄简易计算方法的结果（年龄+1），正确。

55. 【答案】B

【解析】

选项 A：调转体位观察，这是错误的，因为这样做不能解决脐带受压的问题，会增加胎儿窒息的风险。

选项 B：上抬胎头，同时剖宫产，这是正确的。在脐带脱垂的情况下，最重要的是尽快娩出胎儿，减少胎儿窒息的风险。上抬胎头可以暂时减轻脐带受压，剖宫产则是为了尽快娩出胎儿。

选项 C：上抬胎头观察，这是错误的。虽然上抬胎头可以暂时减轻脐带受压，但仅仅观察并不能解决问题，需要尽快娩出胎儿。

选项 D：上抬胎头静滴缩宫素，这是错误的。缩宫素是用来加强宫缩的，而在这种情况下，我们需要尽快娩出胎儿，而不是加强宫缩。

选项 E：上抬胎头，同时还纳条索状物，这是错误的。脐带脱垂是不能手动还纳的，这样做可能会导致更严重的后果。

56. 【答案】C

【解析】

- A. 鞍旁脑膜瘤：此类瘤体一般不会出现高密度影，且临床表现和题干描述不符。
- B. 鞍叶脑脓肿：脑脓肿通常会伴有明显的脑水肿表现，但题干中并未显示这一特征。
- C. 颈内动脉-后交通动脉瘤：患者有蛛网膜下腔出血病史，颅内动脉瘤可能性大，且右眼神经麻痹的表现提示动眼神经受压，与此类瘤体的特性相符。
- D. 鞍叶胶质瘤：胶质瘤罕见在增强 CT 下表现为高密度影，且临床表现与题干描述不符。
- E. 三叉神经鞘瘤：三叉神经鞘瘤一般不会出现高密度影，且临床表现和题干描述不符。

57. 【答案】E

【解析】

- A. 子宫颈因素：子宫颈因素导致的不孕包括宫颈松弛和宫颈病变等。但在题干中，阴道通畅，子宫大小正常，无压痛，未触及包块，所以可以排除子宫颈因素。
- B. 宫颈管因素：宫颈管因素导致的不孕也可能，但同样在题干中，子宫检查正常，可以排除宫颈管因素。
- C. 甲状腺因素：甲状腺因素可能导致不孕，但在题干中， $TSH 3.2 \mu U/L$ ，这是正常范围，因此可以排除甲状腺因素。
- D. 子宫体因素：子宫体因素导致不孕的原因有子宫黏膜下肌瘤、体积较大影响宫腔形态的肌壁间肌瘤、子宫腺肌症、宫腔粘连和子宫内膜息肉等。但在题干中，子宫大小正常，质中，无压痛，未触及包块，所以可以排除子宫体因素。
- E. 排卵功能障碍：题干中提到连续 3 年体温呈单相型，这是无排卵性基础体温的特点，因此不孕的原因可能是排卵功能障碍。

58. 【答案】D

【解析】

- A. Rh 血型鉴定：Rh 血型是除 ABO 血型外的第二大血型系统，对于输血来说十分重要，需要进行鉴定，因此这个选项是不正确的。
- B. ABO 血型鉴定：ABO 血型是最基本的血型系统，输血前必须进行鉴定以避免血型不合引发的严重反应，因此这个选项也是不正确的。
- C. 交叉配血试验：这是为了确保受血者与供血者的血液兼容性，避免输血反应，因此这个选项也是不正确的。
- D. 血小板抗体筛查：这主要适用于反复输血的病人。由于该病例中并未提及患者有反复输血的情况，因此这项检查在此处并不必要，所以这个选项是正确的。
- E. 不规则抗体筛查：这是为了检测是否存在可能影响输血安全的不规则抗体，因此这个选项也是不正确的。

59. 【答案】B

【解析】



- A. 脑挫裂伤：这种情况下，病人会有意识障碍，还可能出现头痛、恶心、呕吐等症状。但在这个案例中，患者没有这些症状，所以 A 选项错误。
- B. 脑震荡：脑震荡通常在外伤后立即出现短暂的意识丧失，持续数秒至数分钟，一般不超过半小时。意识恢复后，对受伤当时和伤前近期的情况不能记忆，即逆行性遗忘。神经系统检查无明显阳性体征。这与病例描述相符，所以 B 选项正确。
- C. 硬膜下血肿：硬膜下血肿会有意识障碍和颅内压增高等表现，CT 检查可见明显高密度影。但在这个案例中，CT 检查颅内无异常，所以 C 选项错误。
- D. 硬膜外血肿：硬膜外血肿也会有意识障碍和颅内压增高等表现，CT 检查可见明显高密度影。同样，在这个案例中，CT 检查颅内无异常，所以 D 选项错误。
- E. 脑出血：脑出血通常在活动和情绪激动时发病，出血前多无预兆，半数患者出现头痛并很剧烈，常见呕吐，出血后血压明显升高，临床症状常在数分钟至数小时达到高峰，临床症状体征因出血部位及出血量不同而异。但在这个案例中，患者没有这些症状，所以 E 选项错误。

60. 【答案】C

【解析】

- 选项 A：1 天。抑郁症的病程不能仅为 1 天，因此此选项错误。
- 选项 B：7 天。抑郁症的病程也不能仅为 7 天，因此此选项错误。
- 选项 C：2 周。根据 ICD-10 的标准，诊断抑郁发作时，一般要求病程持续至少 2 周，并且存在具有临床意义的痛苦或社会功能的受损。因此此选项正确。
- 选项 D：21 天。虽然 21 天超过了 2 周，但 ICD-10 的标准是至少 2 周，不必达到 21 天。因此此选项错误。
- 选项 E：30 天。同样，虽然 30 天超过了 2 周，但 ICD-10 的标准是至少 2 周，不必达到 30 天。因此此选项错误。

61. 【答案】C

【解析】

- A. 血钙：早期佝偻病可能会出现一过性血钙下降，但这并不是最典型的实验室检查表现，因此选项 A 错误。
- B. 血磷：早期佝偻病可能会出现血磷降低，但这也不是最典型的实验室检查表现，因此选项 B 错误。
- C. 血清 25-(OH) D<sub>3</sub>：早期佝偻病最典型的实验室检查表现就是血清 25-(OH) D<sub>3</sub> 下降，因此选项 C 正确。
- D. 碱性磷酸酶：早期佝偻病可能会出现碱性磷酸酶正常或稍高，但这并不是最典型的实验室检查表现，因此选项 D 错误。
- E. 甲状旁腺素：早期佝偻病可能会出现甲状旁腺素升高，但这并不是最典型的实验室检查表现，因此选项 E 错误。

62. 【答案】A

【解析】

- A. 原发性妄想：正确。原发性妄想是没有明显基础的妄想，内容不可理解，不能用既往经历、当前处境及其他心理活动等加以解释。本题病例描述符合原发性妄想的特点。
- B. 继发性妄想：错误。继发性妄想是发生在其他病理心理基础上的妄想，或与某种经历、情境等有关的妄想。本

题病例描述并未提及有此类基础。

C. 谵妄：错误。谵妄以注意障碍和意识障碍为临床特征性表现，而本题病例描述并未体现出这些特征。

D. 失神发作：错误。失神发作的临床特点为有短暂的意识丧失，突然开始，突然结束，发作时正在进行的活动中断，双目凝视，眼球短暂上翻等，本题病例描述与此不符。

E. 错觉：错误。错觉是对客观事物歪曲的知觉，而本题病例描述并不符合错觉的特征。

63. 【答案】C

【解析】

A. 宫内节育环：对于哺乳期的女性，虽然宫内节育环可以使用，但并不是首选，因为可能会对乳汁质量产生影响。

B. 口服复方避孕药：哺乳期不适宜使用雌、孕激素复合避孕药，因为这些药物可能会通过乳汁进入婴儿体内，对婴儿产生不良影响。

C. 避孕套：这是首选的避孕措施，因为它既可以有效防止怀孕，又不会影响乳汁质量和婴儿健康。

D. 安全期避孕：哺乳期的女性月经未恢复，无法准确判断安全期，所以这不是一个可靠的避孕方法。

E. 紧急避孕药：这种药物只在紧急情况下使用，不能作为常规的避孕手段。

64. 【答案】C

【解析】

A. AFP（甲胎蛋白）：对卵巢卵黄囊瘤有特异性诊断价值，但不适用于本题的病例。

B. HCG（人绒毛膜促性腺激素）：对非妊娠性绒癌有特异性，但不适用于本题的病例。

C. CA125：80%的卵巢上皮性肿瘤患者的血清 CA125 水平会升高，因此是最常用的肿瘤标志物，故此选项正确。

D. CA199：作为胰腺癌、结直肠癌等疾病的肿瘤标志物，不适用于本题的病例。

E. E2（雌二醇）：卵巢颗粒细胞瘤、卵泡膜细胞瘤会产生较高水平的雌激素，但不适用于本题的病例。

65. 【答案】D

【解析】

A 选项：子宫肌瘤合并感染，通常会有不规则阴道流血或血样脓性排液的症状，但是在这个病例中，患者并没有阴道流血的症状，所以 A 选项错误。

B 选项：子宫肌瘤合并肉瘤样变，多见于绝经后子宫肌瘤伴疼痛和出血的患者。肌瘤恶变后，组织变软且脆，切面灰黄色，似生鱼肉状，与周围组织界限不清。但在这个病例中，患者并未处于绝经期，也无出血症状，所以 B 选项错误。

C 选项：子宫肌瘤合并玻璃样变，肌瘤剖面漩涡状结构消失，由均匀透明样物质取代。但在这个病例中，患者并无相关症状，所以 C 选项错误。

D 选项：子宫肌瘤合并红色样变，多见于妊娠期或产褥期，患者可有剧烈腹痛伴恶心、呕吐、发热，白细胞计数升高，检查发现肌瘤增大、压痛。这与病例中的情况相符，所以 D 选项正确。

E 选项：子宫肌瘤合并囊性变，肌瘤内出现大小不等的囊腔，其间有结缔组织相隔，数个囊腔也可融合成大囊腔，腔内含清亮无色液体，也可凝固成胶冻状。但在这个病例中，患者并无相关症状，所以 E 选项错误。

## 66. 【答案】D

## 【解析】

- A. 子宫内膜炎：通常会表现为下腹部疼痛，白带增多、偶有血性白带，子宫有轻微压痛等，但患者并未出现这些症状，因此 A 选项不正确。
- B. 黄体功能不良：是排卵性异常子宫出血的表现之一。黄体周期中有卵泡发育及排卵，但黄体期孕激素分泌不足或黄体过早衰退，导致子宫内膜分泌反应不良和黄体期缩短，临床表现为月经周期缩短，本题中为单相体温，无排卵，因此 B 选项不正确。
- C. 黄体萎缩不全：表现为月经淋漓不尽，黄体萎缩不全，雌孕激素下降缓慢，常表现为月经淋漓不尽，持续很长时间，但患者并未出现这些症状，因此 C 选项不正确。
- D. 无排卵性子宫异常出血：青少年女性，月经不规律、月经量增多，无痛经，基础体温单相型。盆腔 B 超检查未见明显异常，该患者最可能诊断为无排卵性子宫异常出血，因此 D 选项是正确的。
- E. 子宫腺肌病：主要症状是经量过多、经期延长和逐渐加重的进行性痛经，疼痛位于下腹正中，常于经前 1 周开始，直至月经结束。妇科检查子宫呈均匀增大或有局限性结节隆起，质硬且有压痛，经期压痛更甚，但患者并未出现这些症状，因此 E 选项不正确。

## 67. 【答案】B

## 【解析】

- A. 黏液镜下可见羊齿状结晶：这是排卵的一个标志，但并不能证明妊娠状态，因此此选项错误。
- B. 尿妊娠试验阳性：在女性月经推迟十天以后或者性生活 14 天后进行尿妊娠试验，一般都可以得到阳性结果，说明可能已经怀孕。所以，此选项正确。
- C. 双合诊可见黑加征：在妊娠 6~8 周时，双合诊检查子宫峡部极软，感觉宫颈与宫体之间似不相连，这种情况被称为黑加征。但由于此女性只停经 36 天，尚未到达 6~8 周，所以此选项错误。
- D. 子宫增大为非孕时的 3 倍：正常情况下，妊娠 12 周时子宫才会增大为非孕时的 3 倍，此女性只停经 36 天，尚未到达 12 周，所以此选项错误。
- E. 出现严重的早孕反应：早孕反应一般在停经 6 周左右出现，在停经 12 周左右自行消失，此女性只停经 36 天，尚未到达 6 周，所以此选项错误。

## 68. 【答案】C

## 【解析】

- 选项 A：丛集性头痛，平均发病年龄约为 25 岁，以男性多见，头痛突然发生，无先兆症状，几乎发生于每日同一时间，常在晚上发作，使患者从睡眠中痛醒。头痛位于一侧眶周、眶上、眼球后和（或）颞部，呈尖锐、爆炸样、非搏动性剧痛。头痛持续 15 分钟至 3 小时不等。
- 选项 B：偏头痛，表现为反复发作的一侧或双侧额颞部疼痛，呈搏动性，疼痛持续时伴颈肌收缩可使症状复杂化。常伴有恶心、呕吐、畏光、畏声、出汗、全身不适、头皮触痛等症状。
- 选项 C：三叉神经痛，中年女性，反复发作的右侧脸颊、上唇疼痛，每次持续数秒钟，刷牙洗脸均可诱发。神经系

统检查未见明显异常，该患者最可能的诊断为三叉神经痛。三叉神经痛发作时表现为以面颊上下颌及舌部明显的剧烈电击样、针刺样、刀割样或撕裂样疼痛，持续数秒或1~2分钟，突发突止，间歇期完全正常。

选项D：上颌窦炎，症状与鼻炎类似。主要临床表现为鼻塞、流涕、面颊部疼痛或嗅觉减退症状，常伴有畏寒、发热、食欲减退、便秘及周身不适等，严重者可累及骨质和周围组织邻近器官，引起严重并发症。

选项E：面神经麻痹，主要表现为病灶对侧下面部肌瘫痪，周围性面神经麻痹主要表现为病灶同侧上部及下面部肌瘫痪。不同的病因有其特征性的伴随症状。

69. 【答案】A

【解析】

A. 先天性甲状腺功能减退症：正确。该病患者常为过期产，出生体重大于正常，表现为喂养差、腹胀便秘，少哭且哭声低，肌张力降低，符合题干描述。

B. 骨软骨发育不良：错误。此病多有生长迟缓、身材矮小等表现，与题干描述不符。

C. 黏多糖贮积病：错误。此病表现为体格发育障碍、智力发育落后，是一种遗传性疾病，与题干描述不符。

D. 唐氏综合征：错误。唐氏综合征主要特征为智能落后、特殊面容等和生长发育迟缓，并可伴有多种畸形，与题干描述不符。

E. 先天性巨结肠：错误。此病主要表现为胎便排出延缓、顽固性便秘和腹胀，与题干描述不完全符合。

70. 【答案】B

【解析】

选项A：CA125测定适用于有子宫外转移者或浆液性癌，血清CA125值可升高。也可作为疗效观察的指标。但在这个病例中，没有明显的证据表明有子宫外转移或浆液性癌，因此该选项不正确。

选项B：分段诊刮是子宫内膜癌常用而有价值的诊断方法。常行分段诊刮，以同时了解宫腔和宫颈的情况。在这个病例中，患者的症状和体检结果都指向可能的子宫内膜癌，因此该选项是正确的。

选项C：宫颈细胞学检查多用于检查宫颈的细菌感染、宫颈部位肿瘤以及炎症。在这个病例中，查体阴道及宫颈未见异常，因此该选项不正确。

选项D：宫腔镜检查可直接观察宫腔及宫颈管内有无癌灶存在，癌灶大小及部位，直视下活检，对局灶型子宫内膜癌的诊断和评估宫颈是否受侵更为准确。但在这个病例中，查体阴道及宫颈未见异常，因此该选项不正确。

选项E：阴道镜检查主要诊断女性子宫内状况，观察局部黏膜是否存在损伤、肿块等情况，对宫颈肥大、子宫肌瘤以及宫颈癌等妇科疾病有诊断价值。但在这个病例中，查体阴道及宫颈未见异常，因此该选项不正确。

71. 【答案】B

【解析】

A. 病毒性脑膜炎：在婴儿患者中可能表现为发热、呕吐、烦躁不安、易激惹、嗜睡、精神差等症状，而颈强直由于囟门未闭轻微甚至缺如；脑脊液检查，糖含量多为正常，所以A选项错误。

B. 结核性脑膜炎：结核性脑膜炎可能有发热、食欲缺乏、盗汗等结核病表现，随着病情进展，还可出现惊厥、明显脑膜刺激征等。脑脊液检查可见无色透明，白细胞数多为 $(50\sim 500) \times 10^6/L$ ，分类以淋巴细胞为主，白细胞数



可 $>1000 \times 10^6/L$ 。糖和氯化物均降低为结核性脑膜炎的典型改变。因此，B 选项是正确的。

C. 中毒性脑病：症状表现多样，既有高热不退者，也有仅为低热者。通常都有不同程度的头痛、呕吐、精神面色不好，困倦多睡。重者可有抽风、昏迷、肢体瘫痪、呼吸节律不整等表现。脑脊液检查通常无特异性表现，所以 C 选项错误。

D. 化脓性脑膜炎：主要表现为高热、寒战、剧烈头痛、呕吐，可伴有局部或者全身性抽搐发作和意识障碍。脑脊液检查（腰椎穿刺）：脑脊液压力常升高，外观呈现混浊或脓性；细胞数明显升高，以中性粒细胞为主，通常为 $(1000-10000) \times 10^6/L$ ；脑脊液中蛋白质升高，糖含量下降，通常低于 $2.2mmol/L$ ，氯化物降低，所以 D 选项错误。

E. 新型隐球菌脑膜炎：起病缓慢，不同程度发热、阵发性头痛并逐渐加重、恶心、呕吐、眩晕。数周或数月后可出现颅内压增高的症状及脑神经受累的表现，常伴有眼底渗出和视网膜渗出性改变。脑脊液墨汁染色涂片及培养是确定隐球菌感染的“金标准”，所以 E 选项错误。

72. 【答案】B

【解析】

选项 A：淋病是由淋病奈瑟菌引起的化脓性感染，早期症状包括尿频、尿急、尿痛，且分泌物为黄色脓性。但在此题中，患者的分泌物为浆液性，故 A 选项错误。

选项 B：生殖道衣原体感染的临床表现与淋病类似但较轻，常见症状为尿道刺痒、刺痛或烧灼感，尿道分泌物呈浆液性，量少，符合题干描述，故 B 选项正确。

选项 C：生殖道疱疹的皮损为簇集或散在的小水疱，2~4 天后破溃形成糜烂或浅溃疡，后结痂自愈。但在此题中，患者并未出现这些症状，故 C 选项错误。

选项 D：软下疳的临床症状是生殖器部位多个痛性溃疡，伴有腹股沟淋巴结炎、疼痛。但在此题中，患者并未出现这些症状，故 D 选项错误。

选项 E：硬下疳是梅毒感染后最早发生的皮肤黏膜损害，典型的硬下疳初起为小红斑，迅速发展为无痛性炎性丘疹，数天内丘疹扩大形成硬结，表面发生坏死，形成单个直径为 $1 \sim 2cm$ 、圆形或椭圆形无痛性溃疡，边界清楚，周边水肿并隆起，基底呈肉红色，触之具有软骨样硬度，表面有浆液性分泌物。但在此题中，患者并未出现这些症状，故 E 选项错误。

73. 【答案】A

【解析】

选项 A：化脓性脑膜炎，一岁女婴的症状（反复发热、恶心、喷射性呕吐，克氏征阳性）以及脑脊液检查结果（白细胞总数显著增多，以中性粒细胞为主，糖含量降低，蛋白含量显著增高）符合化脓性脑膜炎的诊断，因此答案选 A。

选项 B：结核性脑膜炎，虽然也可能有发热、食欲缺乏等症状，但脑脊液检查结果（白细胞数多为淋巴细胞为主，糖和氯化物均降低）与本题不符，因此排除。

选项 C：中毒性脑病，症状表现多样，但脑脊液检查通常无特异性表现，与本题不符，因此排除。

选项 D：新型隐球菌脑膜炎，起病缓慢，症状和脑脊液检查结果（墨汁染色涂片及培养是确定感染的“金标准”）与本题不符，因此排除。

选项 E：病毒性脑膜炎，婴儿患者中可能有发热、呕吐等症状，但脑脊液检查结果（糖含量多为正常）与本题不符，因此排除。

74. 【答案】B

【解析】

- A. 氢氯噻嗪：此药物为利尿药，可以应用于急性肾炎的治疗，有助于控制水肿，因此选项 A 是错误的。
- B. 甘露醇：此药物能迅速提高血浆渗透压，产生组织脱水作用和渗透性利尿作用。但在进行性肾功能衰竭的患者中禁用，因为它可能加重肾脏的缺血，从而出现肾功能不全。因此选项 B 是正确的。
- C. 青霉素：此药物为抗感染药，可以用于急性肾炎的治疗，特别是在有感染灶时使用，因此选项 C 是错误的。
- D. 呋塞米：此药物为利尿药，可用于急性肾炎的治疗，特别是在控制水、盐入量后仍水肿、少尿者使用，因此选项 D 是错误的。
- E. 硝苯地平：此药物为降压药，可用于急性肾炎伴有高血压的患者，因此选项 E 是错误的。

75. 【答案】A

【解析】

- A. 精神分裂症：患者有被害妄想、行动退化、自言自语和突然大笑等症状，符合精神分裂症的诊断标准。因此，这是正确答案。
- B. 妄想障碍：虽然患者有妄想，但妄想障碍的患者在不涉及妄想的情况下，情感、言语和行为基本正常，而此患者有明显的行动退化和自言自语等症状，所以此选项错误。
- C. 强迫障碍：主要表现为反复出现的强迫观念、强迫冲动或强迫行为等，患者并无此症状，所以此选项错误。
- D. 分离障碍：患者会非自主地、间断地丧失部分或全部心理-生理功能的整合能力，此患者并无此症状，所以此选项错误。
- E. 躁狂发作：主要原发症状为心境或情感高涨，患者并无此症状，所以此选项错误。

76. 【答案】A

【解析】

- A. 乳杆菌生长抑制：正确。乳杆菌是阴道的正常菌群，可以抑制假丝酵母菌的过度生长。在使用广谱抗生素如头孢曲松钠后，可能会抑制乳杆菌的生长，导致假丝酵母菌繁殖过度，引发阴道炎症。
- B. 人流术后雌激素减少：错误。虽然雌激素减少可能导致阴道环境改变，但并非本例中阴道炎症的直接原因。
- C. 宫腔手术操作后病原体感染：错误。虽然宫腔手术后可能会有病原体感染，但并非本例中阴道炎症的直接原因。
- D. 人流术后阴道 PH 升高：错误。虽然人流术后可能会导致阴道 PH 值升高，但并非本例中阴道炎症的直接原因。
- E. 阴道 PH 升高：错误。虽然阴道 PH 值升高可能会导致阴道环境改变，但并非本例中阴道炎症的直接原因。

77. 【答案】A

【解析】



- A. 化疗：正确。绒癌的主要治疗方式是化疗，尤其是在有肺转移的情况下。常用的化疗药物有甲氨蝶呤、放线菌素-D、氟尿嘧啶、环磷酰胺、长春新碱、依托泊苷等。
- B. 免疫治疗：错误。免疫治疗并非绒癌的首选治疗方式。
- C. 中药治疗：错误。虽然中药在一些疾病的治疗中有一定的效果，但对于绒癌这种严重的恶性肿瘤，并不是首选治疗方式。
- D. 放疗：错误。放疗通常作为化疗的辅助治疗方式，而非首选。
- E. 手术治疗：错误。手术治疗通常在化疗无效或者病灶局限时采用，而非首选。

78. 【答案】C

【解析】

- A. 放置子宫颈托：子宫颈托是一种支持子宫和阴道壁并使其维持在阴道内而不脱出的工具，主要用于全身状况不适宜做手术的患者，妊娠期和产后，以及膨出面溃疡手术前促进溃疡面的愈合。本例中，患者全身状况良好，不适合使用子宫颈托。
- B. 阴道前后壁修补术及主韧带缩短术：这是一种针对筋膜修补的手术，主要适用于年轻的宫颈延长子宫脱垂患者。本例中，患者年龄较大，不适合此方案。
- C. 经阴道全子宫切除及阴道前后壁修补：适合于无生育要求，且全身状况良好的患者，如本例中的 57 岁女性，故此为正确答案。
- D. 阴道全封闭术：该手术将阴道前后壁相对缝合完全封闭阴道，术后失去性交功能，仅适用于年老体弱不能耐受较大手术者。本例中，患者全身状况良好，不适合此方案。
- E. 宫颈部分切除及阴道前后壁修补：这是一种针对年轻宫颈延长子宫脱垂患者的手术，本例中，患者年龄较大，不适合此方案。

79. 【答案】A

【解析】

- A. 缺血性卒中：这是正确答案。患者有风湿热的病史，可能存在风湿性心脏病，合并房颤时血栓脱落，导致脑栓塞，从而引发缺血性卒中。此外，患者的临床表现（如右侧肢体活动不便，言语不利等）也与缺血性卒中的典型症状相符。
- B. 蛛网膜下腔出血：该病通常会伴随剧烈的头痛、一过性意识障碍和恶心、呕吐等症状，而这些在题干中并未描述，因此排除。
- C. 转换障碍：此类疾病主要表现为随机运动和感觉功能障碍，但体检和实验室检查不能发现其内脏器官和神经系统有相应的器质性损伤，患者的症状和体征不符合这个诊断。
- D. 低血糖：低血糖通常不会出现面舌瘫、运动性失语等症状，因此排除。
- E. 脑出血：脑出血常由于颅内压升高，会出现头痛、呕吐和不同程度的意识障碍，如嗜睡或昏迷等，而这些在题干中并未描述，因此排除。

80. 【答案】E

## 【解析】

选项 A: 脑炎的主要表现有发热、抽搐、不同程度的意识障碍等, 严重情况下可能出现昏迷, 甚至死亡。但在这个病例中, 患者没有发热的症状, 头颅 CT 表现也不符合脑炎。

选项 B: 脑膜瘤病人往往以头痛和癫痫为首发症状。根据肿瘤位置不同, 还可以出现视力、视野、嗅觉或听觉障碍及肢体运动障碍等。头颅 CT 强化可见脑膜尾征。但在这个病例中, 患者的头颅 CT 表现与脑膜瘤不符。

选项 C: 脑膜炎主要是急性或亚急性起病, 可表现为感染症状(发热、寒战或呼吸道感染)、脑膜刺激征(颈项强直、Kernig 征和 Brudzinski 征)、颅内压增高(剧烈头痛、呕吐、意识障碍等), 也可伴有癫痫、肢体运动障碍等。但在这个病例中, 患者的症状和头颅 CT 表现都与脑膜炎不符。

选项 D: 脑梗死初期脑梗死患者一般意识清醒; 中期出现意识障碍、延髓性麻痹、四肢瘫、昏迷、中枢性高热、应激性溃疡等; 晚期并发脑疝时, 常危及生命, 最终导致脑死亡。但在这个病例中, 患者的头颅 CT 表现与脑梗死不符。

选项 E: 中年女性, 头痛、呕吐 2 周, 发作性抽搐 3 次。既往行乳腺癌根治术, 头部 CT 提示左额叶大片低密度影, 占位明显, 考虑最可能的诊断为转移性脑瘤。

## 81. 【答案】C

## 【解析】

选项 A: 甲减, 也称为甲状腺功能减退症, 会导致婴儿的前囟延迟闭合, 而非凹陷, 因此选项 A 错误。

选项 B: 佝偻病是由于维生素 D 缺乏引起的, 会导致婴儿的前囟增大、延迟闭合, 同样不会导致前囟凹陷, 所以选项 B 错误。

选项 C: 脱水, 当婴儿出现严重脱水时, 体内的液体减少, 会导致颅内压下降, 表现为前囟凹陷, 因此选项 C 正确。

选项 D 和 E: 婴儿脑膜炎和病毒性脑炎都会导致颅内压升高, 这时候的前囟会隆起, 而非凹陷, 所以选项 D 和 E 都是错误的。

## 82. 【答案】B

## 【解析】

A. 新生儿期: 这一阶段的发育速度虽然快, 但是相比较于婴儿期, 其发育速度还是稍慢一些。

B. 婴儿期: 这是婴幼儿发育最快的时期, 主要体现在体重、身高等方面的增长, 以及大脑和神经系统的发育。

C. 幼儿期: 此阶段的发育速度已经开始放缓, 不再像婴儿期那样迅速。

D. 学龄前期: 此阶段的发育速度更加缓慢, 主要体现在学习能力和社会技能的提高上。

E. 学龄期: 此阶段的发育速度进一步放缓, 主要体现在学习能力和社会技能的提高上。

## 83. 【答案】B

## 【解析】

A. 乏力, 出汗: 这些症状在许多疾病中都可能出现, 不具有特异性, 因此不是艾森曼格综合征的特征症状。

B. 持续性青紫: 这是艾森曼格综合征的特征症状, 由于肺动脉高压导致的右向左分流, 使得缺氧血液直接进入全身循环, 导致皮肤粘膜出现青紫。

- C. 发育生长迟缓：虽然先天性心脏病可能影响儿童的生长发育，但并非艾森曼格综合征的特征症状。
- D. 心尖上翘：这是法洛四联症的特征，而非艾森曼格综合征。
- E. 体重下降：这同样不是艾森曼格综合征的特征症状。

84. 【答案】A

【解析】

- A. 羊水增多：过期妊娠时，由于胎盘功能可能出现减退，羊水往往会迅速减少，而不是增多。因此，这个选项是错误的。
- B. 羊水粪染：过期妊娠时，由于胎儿可能会在子宫内排便，导致羊水粪染，所以这个选项是正确的。
- C. 胎儿生长受限：过期妊娠时，由于胎盘功能可能出现减退，胎儿的生长可能受到限制，所以这个选项是正确的。
- D. 胎儿过熟：过期妊娠时，胎儿可能会出现过熟的情况，所以这个选项是正确的。
- E. 巨大胎儿：过期妊娠时，如果胎盘功能正常，胎儿可能会过度生长，变成巨大胎儿，所以这个选项是正确的。

85. 【答案】E

【解析】

- 选项 A：催乳素主要由垂体前叶腺嗜酸细胞分泌，其主要作用是促进乳腺发育生长，刺激并维持泌乳，并非卵巢所分泌，因此错误。
- 选项 B：促黄体生成素是腺垂体细胞分泌的一种糖蛋白类促性腺激素，可以促进胆固醇在性腺细胞内转化为性激素，但不是由卵巢直接分泌，因此错误。
- 选项 C：卵泡刺激素（FSH）是由垂体分泌的一种激素，能促进卵泡生长、发育、成熟，但不是由卵巢分泌，因此错误。
- 选项 D：HCG 是由胎盘的滋养层细胞分泌的一种糖蛋白，与卵巢无直接关系，因此错误。
- 选项 E：孕激素是由卵巢黄体细胞分泌的一种类固醇激素，包括孕酮、 $20\alpha$ -羟孕酮、 $17\alpha$ -羟孕酮，其中孕酮的生物活性最强，所以此选项正确。

86. 【答案】B

【解析】

- 选项 A：剖宫产适用于胎头下降无进展，胎头位置在 $\leq +2$  水平以上的情况，此题中胎头已达坐骨棘平面下 3cm，所以 A 选项错误。
- 选项 B：产钳助产适用于宫口开全，胎心存在，胎膜已破，胎头已衔接，胎先露已达正三或以下，胎方位明确的情况。此题中初产妇，孕 38 周，已进入第一产程，骨盆正常、头位，胎心率 150 次/分，S+3（胎头已达坐骨棘平面下 3cm），羊水Ⅲ度浑浊，此时应行产钳助产。所以 B 选项正确。
- 选项 C：此题中羊水三度浑浊，要警惕存在宫内窘迫的情况，不能只是继续观察，需要进行助产，所以 C 选项错误。
- 选项 D：缩宫素适用于协调性宫缩乏力、胎心良好、胎位正常、头盆相称者，此题中并未明示宫缩乏力，所以 D 选项错误。
- 选项 E：胎头吸引术适用于因宫缩乏力所导致的第二产程延长，因产科合并症或并发症需要尽快结束第二产程，如

妊高症、心功能一级、二级等，胎心异常或有羊水混浊等胎儿窘迫表现时。此题中并未明示宫缩乏力，所以 E 选项错误。

87. 【答案】A

【解析】

A 选项：手法逆时针 90 度旋转后产钳助产。这是正确答案。在此情况下，由于胎儿为枕左后位，需要先将其转至枕前位。逆时针旋转 90° 可以实现这一目标，然后进行产钳助产。

B 选项：手法顺时针 90 度旋转后等候。这是错误的。在此情况下，应优先将胎儿位置从枕后位转至枕前位，而不是等待。

C 选项：积极剖宫产。这是错误的。剖宫产通常用于第二产程延长且胎头双顶径仍在坐骨棘以上，或伴有胎儿窘迫的情况。在本题中，这些条件并未满足。

D 选项：静滴缩宫素。这是错误的。在本题中，产妇的宫缩乏力，但此时应通过调整胎儿位置，而不是使用药物来促进宫缩。

E 选项：密切监护，暂不做处理。这是错误的。虽然胎心监护显示胎心基线平稳，但由于胎儿为枕左后位，应立即采取行动调整其位置，而不是仅进行监护。

88. 【答案】B

【解析】

选项 A：IL1 是一种细胞因子，主要在免疫反应中发挥作用，与本题的支气管哮喘病理过程关系不大。

选项 B：IL4 是 Th2 细胞产生的白介素之一，能激活 B 淋巴细胞并合成特异性 IgE，这是支气管哮喘发病机制的关键步骤，因此是正确答案。

选项 C：IL12 主要由巨噬细胞和树突状细胞分泌，主要作用是刺激 NK 细胞和 T 细胞产生 IFN- $\gamma$ ，与本题的支气管哮喘病理过程关系不大。

选项 D：IL2 主要由活化的 T 细胞产生，对于 T 细胞的生长和分化有重要作用，与本题的支气管哮喘病理过程关系不大。

选项 E：与选项 A 重复，不予考虑。

89. 【答案】C

【解析】

选项 A：听力测试。此题中的病人表现为智力发育迟缓和一些特殊的体征，而并无听力损失的迹象，因此排除。

选项 B：胸部 X 线。胸部 X 线通常用于检查肺部或心脏病变，此题中的病人并无相关症状，因此排除。

选项 C：染色体检查。根据病人的表现（智力发育迟缓、眼距宽、通贯手、眼外侧上斜），这些都是唐氏综合征的典型表现，而唐氏综合征是染色体异常所导致的，因此染色体检查是首选的诊断方法。因此选 C。

选项 D：肝功能。此题中的病人并无肝脏疾病的症状，因此排除。

选项 E：b 超超声。B 超超声通常用于检查内脏器官，例如心脏、肝脏、胆囊等，此题中的病人并无相关症状，因此排除。

## 90. 【答案】E

## 【解析】

- A. 盆腔结核：盆腔结核的早期可能会有月经过多或淋漓出血症状，但随着病情进展，大部分子宫内膜被破坏，月经稀少。因此，此选项不符合题干中的症状描述。
- B. 盆腔淤血综合征：该疾病主要表现为慢性疼痛、极度的疲劳感和某些神经衰弱的症状，与题干中的症状描述不符。
- C. 腹膜间皮瘤：腹膜间皮瘤的临床表现缺乏特异性，可能会有腹痛、便秘、腹胀、体重减轻及肠梗阻表现。体检可能会发现腹水或腹块等，但并无黑褐色出血点的描述，因此此选项不符合题干中的症状描述。
- D. 盆腔炎症后遗症：盆腔炎症后遗症可能包括不孕、异位妊娠、慢性盆腔痛、盆腔炎性疾病反复发作等，与题干中的症状描述不符。
- E. 子宫内膜异位症：育龄期女性，痛经 3 年，镜检宫底和直肠子宫陷凹可见黑褐色出血点，最可能诊断为子宫内膜异位症。子宫内膜异位症是指子宫内膜组织（腺体和间质）出现在子宫体以外的部位，主要症状为继发性痛经、进行性加重。因此，此选项符合题干中的症状描述。

## 91. 【答案】D

## 【解析】

- A. 前置胎盘：这是一种妊娠并发症，主要表现为妊娠晚期或临产时，突发无诱因、无痛性阴道流血，可伴有因出血多所致的相应症状。但在本题中，患者并没有出现阴道流血的症状，故此选项不正确。
- B. 先兆流产：先兆流产通常会有腹痛、阴道流血等症状，但在本题中，患者并没有这些症状，且患者已经孕 40 周，超过了流产的可能时间，因此此选项不正确。
- C. 癫痫：癫痫的症状包括全身、四肢抽搐、一过性意识丧失等全身强直-痉挛性发作，有局部肢体抽搐等临床表现。但在本题中，患者并没有出现这些症状，因此此选项不正确。
- D. 羊水栓塞：羊水栓塞是由于羊水进入母体血液循环，引起的肺动脉高压、低氧血症、循环衰竭、弥散性血管内凝血（DIC）以及多器官功能衰竭等一系列病理生理变化的过程。本题中，患者在破膜后突发呼吸困难、发绀、大汗淋漓、烦躁不安，数分钟后死亡，符合羊水栓塞的临床特征，因此此选项是正确的。
- E. 先兆子宫破裂：先兆子宫破裂的四大表现包括下腹部疼痛、病理缩复环、血尿、胎心率改变，多发生于梗阻性难产、高龄多产、产程长，以及子宫曾经做过手术，或子宫存在一定损伤的产妇。但在本题中，患者并没有出现这些症状，因此此选项不正确。

## 92. 【答案】C

## 【解析】

- A. 思维散漫：这是一种思维的连贯性障碍，即联想概念之间缺乏必要的联系。患者表现为思维跳跃，无法集中注意力。在这个案例中，患者的症状并不符合。
- B. 被控制感：患者感到自己的思想、情感或意志行为受到某种外界力量的控制而身不由己。虽然患者有被控制的感觉，但其主要症状是对被迫害的强烈妄想，因此这个选项也不适用。



- C. 被害妄想症：患者坚信自己被某些人监视、迫害，与本题症状相符，故为正确答案。
- D. 错觉：是对客观事物歪曲的知觉。在这个案例中，患者的症状并不符合。
- E. 关系妄想：患者认为周围环境中所发生的与自己无关的事情均与自己有关。虽然患者有这样的感觉，但其主要症状是对被迫害的强烈妄想，因此这个选项也不适用。

## 93. 【答案】D

## 【解析】

- 选项 A：情感低落，主要表现为忧郁、苦闷、唉声叹气、暗自落泪等，有时感到前途灰暗，没有希望，严重时可能因悲观绝望而出现自杀企图及行为。这与题干中的描述不符，所以 A 选项错误。
- 选项 B：情感不稳，情感活动的稳定性障碍，表现为患者的情感反应极易发生变化，从一个极端波动至另一极端，显得喜怒无常，变化莫测。题干中的描述并未提及情感的剧烈波动，所以 B 选项错误。
- 选项 C：情感倒错，情感表现与其内心体验或处境明显不相协调，甚至截然相反。题干中的描述并未提及情感的倒错，所以 C 选项错误。
- 选项 D：情感淡漠，对外界刺激缺乏相应的情感反应，缺乏内心体验。表现为面部表情呆板，对周围发生的事物漠不关心，即使对与自身有密切利害关系的事情也如此。这与题干中的描述相符，所以 D 选项正确。
- 选项 E：情感矛盾，指患者在同一时间对同一人或事物产生两种截然不同的情感反应，但患者并不感到这两种情感的矛盾和对立，没有痛苦和不安。题干中的描述并未提及情感的矛盾，所以 E 选项错误。

## 94. 【答案】C

## 【解析】

- 选项 A：错误。考虑到胎心率低于正常范围，表明胎儿可能出现宫内窘迫，此时不能继续观察自然分娩，需要立即采取措施。
- 选项 B：错误。在胎儿出现窘迫的情况下，使用缩宫素可能会加重胎儿的窘迫状态，所以不应使用。
- 选项 C：正确。鉴于胎儿可能出现窘迫，且骨盆各径线正常，胎头双顶径已达坐骨棘平面以下，应尽快行阴道助产术结束分娩。
- 选项 D：错误。应用镇静剂并不能改善胎儿窘迫的状况，所以此选项错误。
- 选项 E：错误。剖宫产是在宫口未开全或预计短期内无法阴道分娩的情况下才会选择，因此此选项错误。

## 95. 【答案】B

## 【解析】

- A. 新生儿颅内出血：这种情况下，常见的症状包括神志改变、呼吸改变、颅内压力增高、眼征异常、瞳孔不等大或对光反射消失、肌张力改变以及无明显原因的苍白、贫血和黄疸。然而，题干中并未提及这些症状，所以 A 选项不正确。
- B. 新生儿败血症：这是一种由病原体侵入新生儿血液循环并生长、繁殖、产生毒素引起的全身性炎症反应。主要表现为黄疸、肝脾肿大、出血倾向、休克等，与题干描述的症状相符，因此 B 选项是正确答案。
- C. 新生儿核黄疸：也叫胆红素脑病，主要表现为嗜睡、拒乳、肌张力减退、拥抱反射减弱或消失等抑制症状。虽



然题干中提到了新生儿拒乳，但并未提及其它核黄疸的主要症状，所以 C 选项不正确。

D. 感染性肺炎：多在生后 24 小时内发病，出生时常有窒息史，复苏后可出现气促、呻吟、发绀、呼吸困难，体温不稳定，反应差。肺部听诊呼吸音可为粗糙、减低或闻及湿啰音。题干中并未提及这些症状，所以 D 选项不正确。

E. 新生儿寒冷综合征：主要表现为低体温或者皮肤硬肿，严重者有多器官功能的损害，主要发生在寒冷季节或者重症感染时候，多发生于生后一周内，早产儿比较多见，低体温和皮肤硬肿是主要表现。题干中并未提及这些症状，所以 E 选项不正确。

96. 【答案】A

【解析】

A. 右向左分流减少：此为正确答案。在法洛四联症中，由于右心室流出道梗阻，部分血液会从右向左通过室间隔缺损分流至全身，导致口唇青紫等缺氧症状。当患者下蹲时，下肢动脉受压，体循环阻力增加，使得右向左的分流减少，从而暂时缓解缺氧症状。

B. 循环阻力下降：错误。实际上，当患者下蹲时，由于下肢动脉受压，体循环阻力会增加。

C. 右心室压力增加：错误。下蹲时，虽然体循环阻力增加，但由于静脉回心血量减少，反而会导致右心室负荷减轻，压力不会增加。

D. 左心室压力下降：错误。下蹲并不直接影响左心室的压力。

E. 心脏前负荷增加：错误。下蹲时，由于静脉回心血量减少，实际上会导致心脏的前负荷减轻。

97. 【答案】D

【解析】

选项 A：动脉硬化。这是一种常见的心血管疾病，早期可能无明显症状，中期可能出现心悸、胸闷、头晕等症状。与题干中的症状不符，故错误。

选项 B：豆状核变性。主要表现为肝病症状、神经症状、精神症状和角膜色素环，与题干中的症状不符，故错误。

选项 C：阿尔茨海默症。这是一种神经退行性疾病，主要表现为记忆力下降、认知能力减退，与题干中的症状不符，故错误。

选项 D：帕金森病。这是一种常见的神经系统疾病，主要表现为静止性震颤、运动迟缓、肌强直和姿势平衡障碍，与题干中的症状相符，因此正确。

选项 E：扭转痉挛。这是一种神经系统疾病，表现为肌张力障碍，导致四肢、躯干的不随意的扭转，与题干中的症状不符，故错误。

98. 【答案】A

【解析】

选项 A：无创性产前检查。这是一种通过检测孕妇血液中的胎儿 DNA 进行遗传疾病筛查的方法，不会对胎儿造成伤害，敏感性和特异性高，对于单胎 21-三体综合征（唐氏综合征）的检出率高达 99% 以上，且假阳性率低。对于本题中的 40 岁高龄孕妇，这是最安全、有效的筛查方法。

选项 B：羊膜腔穿刺术。该方法适用于唐氏筛查、NT 异常，或既往有唐氏儿生产史的孕妇。但此方法有一定风险，

可能导致流产等并发症，所以不是首选。

选项 C：超声了解颈项厚度（NT）。这是一种在妊娠 11-13 周期间使用的筛查方法，可以评估胎儿发生唐氏综合征的风险，并可早期发现部分严重的胎儿畸形。但在 18 周的孕妇中，已经过了最佳筛查期。

选项 D：脐带穿刺术。这种手术一般在妊娠 18 周后进行，孕 18 周前进行可能会增加胎死宫内风险，所以不适用于本题的情况。

选项 E：母体血清检查。这是一种产前筛查方法，但不是产前诊断方法，不建议单独使用妊娠中期生化血清学方法对双胎妊娠行唐氏综合征的筛查，影响结果的因素较多，不如无创性产前检查便捷准确。

99. 【答案】D

【解析】

选项 A：口服水合氯醛，主要用于地西洋、苯巴比妥治疗无效时，在没有条件很快使用静脉注射地西洋或者肌肉注射咪达唑仑的情况下，也可以作为首选止惊治疗。但在这种急诊情况下，不适合作为首选药物。

选项 B：肌注苯巴比妥，吸收较慢，不适宜用于急救的一线用药，镇静作用较强，持续时间长，容易影响意识判断。因此目前此药已经仅作为止惊治疗的二线、甚至三线治疗。

选项 C：静推苯妥英钠，主要用于处理惊厥持续状态，不适合作为本例中的首选药物。

选项 D：静推地西洋，是本题的正确答案。地西洋静注是新生儿发热伴抽搐的首选药物，每次  $0.3 \sim 0.5 \text{mg/kg}$ （单剂最大剂量  $10 \text{mg}$ ）静注（每分钟  $1 \sim 2 \text{mg}$ 、新生儿  $0.2 \text{mg}$ ）。

选项 E：静推硫喷妥钠，属于巴比妥类药物，常用于静脉麻醉，诱导麻醉，基础麻醉，及复合麻醉等，不适合作为本例中的首选药物。

100. 【答案】A

【解析】

A. 行 OGTT 试验：正确。OGTT 是诊断 GDM 的金标准。在妊娠 24-28 周时，首先检查空腹血糖。如果  $\text{FPG} > 5.1 \text{mmol/L}$ ，可以直接诊断为 GDM。本题中患者空腹血糖  $5.0 \text{mmol/L}$ ，下一步应行  $75 \text{gOGTT}$ 。

B. 复查空腹血糖：错误。虽然复查空腹血糖是监控糖尿病的一种方法，但在这种情况下，更应该进行 OGTT 试验以确诊是否患有 GDM。

C. 定期产检：错误。虽然定期产检是孕妇的常规操作，但无法针对性地诊断 GDM。

D. 查尿糖：错误。尿糖检查可以用来监测糖尿病，但不是诊断 GDM 的主要手段。

E. 查尿酮：错误。尿酮检查主要用于诊断和监测糖尿病酮症，而不是 GDM。

101. 【答案】A

【解析】

选项 A：胎儿尿液和肺。这是正确答案。在妊娠晚期，羊水的主要来源是胎儿的尿液和胎肺。胎儿的尿液贡献了大部分的羊水，而胎肺通过呼吸运动将液体排入羊膜腔。

选项 B：胎儿尿液和脐带。虽然脐带可以参与羊水的形成，但其贡献量较小，不是主要来源。

选项 C：胎儿尿液和皮肤。胎儿皮肤在妊娠早期可以参与羊水的形成，但到了妊娠晚期，皮肤已经角化，不再产生

羊水。

选项 D：胎儿尿液和胎膜。胎膜在妊娠早期主要通过母体血清的透析形成羊水，到了妊娠晚期，胎膜的贡献减少。

选项 E：母体血清和胎儿尿液。妊娠早期的羊水主要来自母体血清经胎膜进入羊膜腔的透析液，而在妊娠晚期，母体血清的贡献减少。

102. 【答案】A

【解析】

选项 A：分离（转换）障碍。此患者在起病前常有明确的心理社会因素，神经系统检查体征与患者症状表现不匹配，体征常按照患者对神经系统的理解呈现。此患者的病症符合这些特征，所以是正确答案。

选项 B：创伤后应激障碍。主要包括侵入性症状群（梦魇、闪回等）、持续性回避、认知和心境的负性改变、警觉性增高。此患者的病症并不符合这些特征。

选项 C：抑郁障碍。以显著而持久的心境低落为主要临床特征，临床表现可从闷闷不乐到悲痛欲绝。此患者的病症并不符合这些特征。

选项 D：精神分裂症。阳性症状包括幻觉、妄想及言语和行为的紊乱（瓦解症状）。阴性症状包括意志减退、快感缺乏、情感迟钝、社交退缩、言语贫乏。此患者的病症并不符合这些特征。

选项 E：急性应激障碍。最核心的症状为创伤性重现体验、回避与麻木、高度警觉状态。部分患者在病情严重阶段可出现幻觉、妄想、焦虑、抑郁，此患者的病症并不符合这些特征。

103. 【答案】B

【解析】

A. 物理治疗：此类治疗通常用于处理身体疾病或损伤，例如肌肉骨骼问题，对于心理性的疾病效果有限，因此不适用于此患者。

B. 暗示治疗：这是一种心理治疗方法，通过对患者进行积极的暗示，帮助他们改变对某些事物的认知，以改善症状。对于此患者的情况，暗示治疗可能会有很好的效果。

C. 抗焦虑药物治疗：抗焦虑药物主要用于治疗焦虑症，但该患者的主要症状并非焦虑，因此此选项不正确。

D. 行为治疗：行为治疗着重于改变不良的行为模式，但对于此患者的情况，行为治疗可能效果有限。

E. 抗精神药物治疗：抗精神药物主要用于治疗精神疾病，如精神分裂症、躁狂抑郁症等，对于此患者的症状并无明显效果。

104. 【答案】D

【解析】

选项 A：分裂情感性障碍，典型表现为躁狂、妄想、情绪低落、迟滞等，部分患者可出现伤害他人、自杀倾向等症状，发作期间精神分裂症和心境障碍同时存在。但这并不符合患者的病史和症状。

选项 B：精神分裂症，除了有幻觉外，还多有妄想、言语行为紊乱，多表现为语词新作、模仿语言、重复语言、刻板言语等。但患者的症状并不符合这个描述。

选项 C：应激相关障碍，主要表现为精神运动性兴奋、木僵或轻度意识障碍等症状。患者的症状也并不符合这个描

述。

选项 D：双相障碍抑郁发作，中年男性，10 个月前被领导表扬后，出现情绪高涨、思维奔逸、活动增多、睡眠需求减少等表现，符合躁狂的表现，经治疗后好转。近 1 个月因女儿离婚，导致情绪低落、自责自罪、兴趣减退、睡眠障碍、自杀观念，符合抑郁发作的表现。这与患者的病史和症状匹配。

选项 E：双相障碍躁狂发作，虽然患者有过躁狂发作的病史，但目前的症状更符合抑郁发作。

105. 【答案】D

【解析】

- A. 抗焦虑药：此类药物主要治疗焦虑症状，如恐惧、紧张等，但在本题中，患者的主要症状是情绪低落和自杀观念，并非焦虑，因此 A 选项不正确。
- B. 抗抑郁药：此类药物主要用于治疗抑郁症，包括情绪低落、兴趣减退等症状。虽然患者目前表现出抑郁症状，但他的病史显示他同时具有躁狂症状，即双向障碍。对于双向障碍，抗抑郁药物可能导致躁狂发作，因此 B 选项不正确。
- C. 镇静催眠药：此类药物主要用于处理睡眠问题和临时的焦虑状态，但不能解决患者的主要问题，即情绪波动，因此 C 选项不正确。
- D. 心境稳定剂：此类药物主要用于治疗双向障碍，可以平衡患者的情绪波动，预防或减少抑郁和躁狂发作。因此，D 选项是正确答案。
- E. 抗精神病药：此类药物主要用于治疗精神分裂症等严重的精神病症状，对本题的患者并不适用，因此 E 选项不正确。

106. 【答案】C

【解析】

- A. 双相障碍：这种疾病的特征是情绪在高涨与低落之间反复波动。抑郁时，患者会出现明显的情绪低落、兴趣缺乏等症状；躁狂时，则会出现异常的自我感觉良好、思维活跃、兴奋性增高等症状。但这与题干中的病例描述不符，所以选项 A 错误。
- B. 精神分裂症：这种疾病的主要症状包括感知觉的障碍（如各种幻觉）、思维障碍（如各种妄想）、情感障碍、意志和行为障碍等。虽然病例中有一些此类症状，但并未提到精神衰退、精神残疾等常见并发症，所以选项 B 错误。
- C. 脑血管病引起的精神障碍：根据题干中的病例描述，患者有高血压病史，并且病情随着血压升高而加重，这都是脑血管病引起的精神障碍的常见表现。因此，选项 C 是正确答案。
- D. 躯体疾病引起的精神障碍：这是由于中枢神经系统以外的各种躯体疾病造成中枢神经系统功能紊乱所致的精神障碍。然而，根据题干中的病例描述，患者的主要问题是高血压，这是一个中枢神经系统的问题，而不是中枢神经系统以外的躯体疾病，所以选项 D 错误。
- E. 急性应激障碍：这种疾病的主要表现为精神运动性兴奋、木僵或轻度意识障碍等症状。虽然病例中有一些此类症状，但并未提到应激事件，所以选项 E 错误。

107. 【答案】A



## 【解析】

- A. 头 MRI：本题中，患者出现了视幻觉、思维不连贯等精神症状，且有既往高血压病史，病情随血压升高而加重。这些症状可能由脑血管病引起，头颅 MRI 对于检查白质病变、腔隙性梗死等小血管病比 CT 更敏感，因此是最有意义的检查。
- B. 脑电图：虽然脑电图在癫痫的诊断和治疗中具有重要作用，但在本题中，患者的症状更可能由脑血管病引起，因此脑电图并非最有意义的检查。
- C. 脑脊液：脑脊液检查主要用于诊断脑膜炎，而本题中患者的症状更可能由脑血管病引起，因此脑脊液检查并非最有意义的检查。
- D. 人格测试：人格测试主要用于诊断人格障碍，而本题中患者的症状更可能由脑血管病引起，因此人格测试并非最有意义的检查。
- E. 头颅 CT：虽然头颅 CT 可以用于检查脑部的结构和功能，但头颅 MRI 对于检查白质病变、腔隙性梗死等小血管病比 CT 更敏感，因此头颅 CT 并非最有意义的检查。

## 108. 【答案】A

## 【解析】

- A. 支气管肺炎：女孩发热伴咳嗽，体温 38.8℃，双肺闻及固定湿啰音，腹胀，肝稍大。血液检查白细胞升高，以中性粒细胞为主，这些病症符合支气管肺炎的典型症状。
- B. 支气管炎：通常先有上呼吸道感染症状，之后以咳嗽为主要症状，但本例中女孩的全身症状和固定湿啰音与支气管炎的表现不符。
- C. 大叶性肺炎：多见于年长儿，起病急骤，可有寒战、高热可达 40℃ 等症状，与本例中的症状不符。
- D. 间质性肺炎：病初有全身不适、乏力、头痛等症状，与本例中的症状不符。
- E. 毛细支气管炎：常发生于 2 岁以下小儿，但主要表现为下呼吸道梗阻症状，出现呼气性呼吸困难、呼气相延长伴喘息，与本例中的症状不符。

## 109. 【答案】B

## 【解析】

- 选项 A：感染性休克通常表现为烦躁、易怒、嗜睡、气紧、口干、少尿等灌注不足表现，本题中的患者没有出现这些症状，因此排除。
- 选项 B：中毒性肠麻痹的表现频繁呕吐、严重腹胀、呼吸困难加重，听诊肠鸣音消失。重症患儿还可呕吐咖啡样物，大便潜血阳性或柏油样便。本题中的患者出现了这些症状，因此 B 选项正确。
- 选项 C：心衰可有不同程度的呼吸困难、双下肢凹陷性水肿、颈静脉怒张等表现，本题中的患者没有出现这些症状，因此排除。
- 选项 D：脑性低钠血症也被称作是脑性盐损耗综合征，是脑干或下丘脑损伤导致，血钠低于 135mmol/L。本题中的患者没有出现这些症状，因此排除。
- 选项 E：中毒性脑病轻型仅仅只有发热、头痛、呕吐、可精神不振，严重时会出现昏迷、癫痫、四肢瘫痪等情况发

生，部分患者仅仅表现为智力下降、淡漠等，合并有大小便失禁，而无其他临床表现。本题中的患者没有出现这些症状，因此排除。

110. 【答案】C

【解析】

选项 A：切线性损伤，是指致伤物与颅骨呈切线擦过，造成头部沟槽状损伤。在这个病例中，没有提到有这样的切线性痕迹，所以 A 选项错误。

选项 B：加速性损伤，是指相对静止的头部突然受到外力打击，头部沿外力的作用方向呈加速运动而造成的损伤，例如钝器击伤。这种情况下，损伤部位主要发生在头部着力点，即着力伤。但在这个病例中，病人的头部是由于车祸撞击后进行减速运动，所以 B 选项错误。

选项 C：减速性损伤，是指运动着的头部，突然撞在静止的物体后引起的损伤，例如坠落或跌倒时头部被物体阻挡停止运动。这类损伤发生于着力部位，以及着力部位对侧的脑组织及血管，即对冲伤。这个病例中，病人的头部是由于车祸撞击后进行减速运动，所以 C 选项正确。

选项 D：挥鞭伤，是指外力作用躯干，引起躯干突然加速运动，由于惯性作用，头颅的运动落后于躯干，运动的躯干再快速带动相对静止的头颅，在颅颈之间发生强烈的过伸或过屈，头颅运动有如挥动鞭子末端的运动，造成颅颈交界处延髓与脊髓连接部的损伤。但在这个病例中，没有提到有这样的挥鞭伤痕迹，所以 D 选项错误。

选项 E：挤压伤，是指两个或两个以上不同方向的外力同时作用于头部，颅骨变形造成的损伤，如车轮压轧和新生儿头颅产伤。在这个病例中，没有提到有这样的挤压伤痕迹，所以 E 选项错误。

111. 【答案】A

【解析】

选项 A：脑 CT。对于急性颅脑损伤，脑 CT 是首选的检查手段，能清楚地显示脑挫裂伤的部位、范围和程度，包括血肿、水肿、脑室受压和中线结构移位等情况。因此，选项 A 是正确答案。

选项 B：脑 MRI。虽然 MRI 可以提供更高分辨率的脑部图像，但其检查时间较长，不适合用于急性颅脑损伤的诊断。

选项 C：脑电图。这主要用于诊断癫痫和其他脑电活动异常，与本题的颅脑损伤无直接关系。

选项 D：肌电图。这是用于诊断神经原性损伤和肌原性损伤的，如脊髓前角急、慢性损伤，神经根及周围神经病变，与本题的颅脑损伤无直接关系。

选项 E：脑血管造影。这主要用于诊断颅内血管性疾病和颅内占位性病变，虽然在颅脑外伤引起的脑外血肿等情况下有一定价值，但不如脑 CT 检查直观快速。

112. 【答案】E

【解析】

A. 绝对卧床休息：虽然在一些轻度脑损伤中，卧床休息是必要的，但在这种情况下，由于血肿体积较大，脑室受压，中线结构移位，仅靠卧床休息无法有效降低颅内压，故此选项错误。

B. 腰椎穿刺排放脑脊液：对于颅内高压，尤其是由于颅内血肿引起的，腰椎穿刺可能会加重脑疝，增加风险，所以此选项错误。



- C. 大剂量糖皮质激素：糖皮质激素主要用于治疗脑水肿，但对于颅内血肿效果有限，不能替代手术治疗，故此选项错误。
- D. 脑室外引流：虽然可以暂时性地降低颅内压，但无法清除颅内血肿，不能解决根本问题，故此选项错误。
- E. 急诊开颅手术：在这种情况下，颅内血肿体积大，且引起脑室受压和中线结构移位，急诊开颅手术可以及时清除血肿，降低颅内压，改善病情，故此选项正确。

113. 【答案】E

【解析】

- 选项 A：血压 140/90mmHg，这个指标属于正常范围，不能作为绒毛羊膜炎的诊断依据。
- 选项 B：体温 37.8℃，稍微偏高，但不足以支持绒毛羊膜炎的诊断，因为绒毛羊膜炎的临床表现之一是母体体温  $>38^{\circ}\text{C}$ 。
- 选项 C：胎心率正常，这是一个健康的指标，不能作为绒毛羊膜炎的诊断依据。
- 选项 D：宫口开 7CM，这是正常分娩的过程中的一个阶段，不能作为绒毛羊膜炎的诊断依据。
- 选项 E：WBC  $15.6 \times 10^9/\text{L}$ ，这是白细胞明显升高，这是绒毛羊膜炎的临床表现之一，因此是支持产妇绒毛羊膜炎诊断的依据。

114. 【答案】B

【解析】

- A. 继续观察：产妇已经存在规律宫缩且宫口开得足够，此时不应只是观察，需要积极处理。
- B. 静滴缩宫素：正确选项。产妇已经进入活跃期，宫口开得足够，胎头下降良好，此时应用缩宫素可以帮助产妇尽快分娩，避免因绒毛膜羊膜炎导致的感染风险增加。
- C. 静滴硫酸镁：硫酸镁主要用于防治子痫前期和子痫的发作，本题中产妇虽然血压升高，但并未出现子痫前期或子痫的症状，故此选项不正确。
- D. 剖宫产：剖宫产通常在胎儿或母亲存在生命危险，或者阴道分娩无法进行时选择。本题中产妇已经进入活跃期，且胎位正常，无需选择剖宫产。
- E. 口服降压药：虽然产妇血压升高，但并未出现子痫前期或子痫的症状，此时的主要问题是绒毛膜羊膜炎，需要尽快分娩，故此选项不正确。

115. 【答案】D

【解析】

- 选项 A：LEEP 手术，是一种利用低温等离子射频技术进行的切除手术，适用于宫颈病变，但在明确诊断前不应作为首选。
- 选项 B：分段诊刮术，主要用于清除宫腔内的病变组织，本例中没有明显的宫腔病变，故不适用。
- 选项 C：宫腔镜检查，适用于宫腔疾病的诊断，本例中主要病变在宫颈，故不适用。
- 选项 D：阴道镜下宫颈活检，能够直接取得病变组织进行病理检查，对于本例中高度怀疑的宫颈癌最为合适，因此是正确答案。
- 选项 E：宫颈锥切术，是一种治疗宫颈癌的手术，但在明确诊断前不应作为首选。

116. 【答案】E

【解析】

选项 A: IIA 期, 肿瘤侵犯阴道上 2/3, 无明显宫旁浸润。但根据题干, 患者的局部间质浸润深度为 8mm, 并未侵犯到阴道, 所以此选项错误。

选项 B: IA 期, 镜下浸润癌, 浸润深度 $<5.0\text{mm}$ 。但根据题干, 患者的局部间质浸润深度为 8mm, 超过了 5mm, 所以此选项错误。

选项 C: IIIA 期, 肿瘤累及阴道下 1/3, 没有扩展到骨盆壁。但根据题干, 患者并未出现这种情况, 所以此选项错误。

选项 D: IIB 期, 有明显宫旁浸润, 但未达到盆壁。但根据题干, 患者并未出现宫旁浸润, 所以此选项错误。

选项 E: IB 期, 局部间质浸润深度 $>5\text{mm}$  且 $\leq 7\text{mm}$ , 对应题干中患者的情况, 所以此选项正确。

117. 【答案】A

【解析】

A. 广泛性子宫切除术+盆腔淋巴结切除术: 此选项考察的是对于宫颈癌 IB 期以上患者的常规手术方式, 根据题干描述, 患者符合这个情况, 故此选项正确。B. 宫颈锥切术: 此选项通常适用于 IA1 期无淋巴脉管间隙浸润的年轻患者, 想要保留生育功能, 但题干中的患者已经达到 IB 期, 故此选项错误。C. 筋膜外全子宫切除术: 此选项适用于 IA1 期宫颈癌, 但题干中的患者已经达到 IB 期, 故此选项错误。D. 改良广泛性子宫切除术+盆腔淋巴结切除术: 此选项适用于 IA2 期宫颈癌, 但题干中的患者已经达到 IB 期, 故此选项错误。E. 筋膜内全子宫切除术: 此选项一般适合子宫附件良性疾病患者, 比较年轻而需全子宫切除者, 题干中的患者为宫颈癌患者, 故此选项错误。

118. 【答案】B

【解析】

A. 急性宫颈炎: 此症状在妇科检查中会看到子宫颈充血、水肿、黏膜外翻, 有黏液脓性分泌物附着甚至从子宫颈管流出, 子宫颈管黏膜质脆, 容易诱发出血。但在本题中, 患者的宫颈光滑, 没有这些症状, 所以排除。

B. 急性子宫内膜炎: 此症状多因流产、产褥感染、子宫腔内安放避孕器、子宫颈扩张等原因导致病原体侵入子宫内膜, 扩散至整个内膜层, 引发急性炎症病延伸累及子宫壁表浅肌层, 临床表现主要为发热、下腹隐痛、脓性阴道分泌物等。在本题中, 患者有相应的症状, 所以是正确答案。

C. 急性阑尾炎: 此症状典型表现为转移性右下腹痛, 但在本题中, 患者并没有这种症状, 所以排除。

D. 急性腹膜炎: 此症状患者多有腹膜刺激征(压痛、反跳痛、肌紧张), 但在本题中, 患者并没有这种症状, 所以排除。

E. 急性膀胱炎: 此症状典型表现为排尿时有尿频、尿急、尿痛的感觉, 排尿次数多但尿量不多, 伴随尿急, 排尿时有不同程度的疼痛, 可能尿液因此而断断续续, 患者多会因排尿感觉异常而对排尿十分抵触。但在本题中, 患者并没有这种症状, 所以排除。

119. 【答案】C

【解析】

- A. 中药治疗：虽然中药在某些情况下可以辅助治疗，但对于这种急性子宫内膜炎的情况，中药治疗并不是最优选择。
- B. 手术治疗：对于严重的子宫内膜炎，可能需要手术治疗，但根据题目描述，这位患者的情况并不严重到需要手术。
- C. 抗感染治疗：抗感染治疗是最适合该患者的治疗方法，因为她的症状（腹痛、发热）和体征（白细胞升高，中性粒细胞为主）都表明存在感染。
- D. 输液治疗：输液治疗可能作为辅助治疗的一部分，但并不是最主要的治疗方式。
- E. 物理降温：物理降温可以帮助控制发热，但不能解决根本的感染问题。

120. 【答案】A

【解析】

- A. 化脓性脑膜炎：这是正确答案。化脓性脑膜炎的典型临床表现包括感染中毒和急性脑功能障碍症状、颅内压增高表现、脑膜刺激征。脑脊液检查可见白细胞升高，以中性粒细胞为主，糖含量明显降低。
- B. 结核性脑膜炎：虽然结核性脑膜炎也会导致脑脊液检查结果异常，但通常以淋巴细胞增多为主，涂片或培养可发现抗酸杆菌。本题中脑脊液涂片找菌阴性，PPD 阴性，排除了此选项。
- C. 中毒性脑病：中毒性脑病的脑脊液检查结果一般正常，不符合题干中的脑脊液检查结果。
- D. 热性惊厥：热性惊厥一般发生在 6 个月到 5 岁的小孩，与发热相关，但脑脊液检查结果通常正常。
- E. 病毒性脑炎：病毒性脑炎的脑脊液检查结果一般正常或轻度异常，不符合题干中的脑脊液检查结果。

121. 【答案】A

【解析】

- 选项 A：硬膜下积液。对于这个选项，根据题干的描述，患儿在经过治疗后有一定的好转，但在 3 日后再次出现发热、呕吐和惊厥发作，这些症状都是硬膜下积液的典型表现，因此这个选项是正确的。
- 选项 B：脑脓肿。虽然脑脓肿也可能导致发热、呕吐和惊厥发作，但通常会伴随有局部或全身感染症状、颅内压增高症状和局限性神经功能障碍症状，如头痛、肌肉酸痛以及癫痫等，而题干中并没有明确提到这些症状，所以这个选项是错误的。
- 选项 C：抗利尿激素分泌异常综合征。这种病症的主要表现为惊厥和意识障碍加重，或直接因低钠血症引起惊厥发作。但根据题干的描述，患儿并未出现这些症状，所以这个选项是错误的。
- 选项 D：脑室管膜炎。这种病症主要发生在治疗被延误的婴儿，患儿在有效抗生素治疗下发热不退、惊厥、意识障碍不改善、进行性加重的颈项强直甚至角弓反张。但根据题干的描述，患儿并未出现这样的症状，所以这个选项是错误的。
- 选项 E：脑水肿。脑水肿会导致各种脑损害症状，如癫痫、瘫痪、头痛等，但根据题干的描述，患儿并未出现这些症状，所以这个选项是错误的。

122. 【答案】D

【解析】

- A. 肌电图，主要用来检查神经肌肉系统的功能，对于本题的病例并无直接帮助。
- B. MRI，虽然可以用于脑部疾病的诊断，但在此情况下，头颅透光检查更为直接和简便。
- C. 心电图，用于检查心脏功能，与病例无关。
- D. 头颅透光检查，对于婴儿硬膜下积液的诊断非常有帮助，因此是正确答案。
- E. 硬膜下穿刺，虽然可以用于确诊，但在初步检查阶段，并非首选。

123. 【答案】B

【解析】

- A. 结膜充血：结膜充血是麻疹的常见症状，但不具有特异性，其他很多疾病也可能出现此症状，所以不是最有诊断价值的临床表现。
- B. Koplik 斑：Koplik 斑（口腔麻疹粘膜斑）是麻疹的特异性症状，具有很高的诊断价值，所以是正确答案。
- C. 眼鼻卡他样症状：这是麻疹的常见症状，但同样不具有特异性，其他很多疾病也可能出现此症状，所以不是最有诊断价值的临床表现。
- D. 发热：发热是麻疹的常见症状，但是并不具有特异性，很多疾病都可能导致发热，所以不是最有诊断价值的临床表现。
- E. 皮疹形态：皮疹形态是麻疹的常见症状，但是并不具有特异性，许多其他疾病也可能出现类似的皮疹，所以不是最有诊断价值的临床表现。

124. 【答案】C

【解析】

- A. 补充维生素 A：对于麻疹的治疗，世界卫生组织推荐给予麻疹患儿补充大剂量维生素 A，可以减少并发症的发生，有利于疾病的恢复。所以，选项 A 是正确的。
- B. 高热可给与退热药物：麻疹患者在高热时可以酌情使用退热剂，但应避免急骤退热，特别是在出疹期。所以，选项 B 也是正确的。
- C. 静脉糖皮质激素：麻疹患者易并发呼吸系统感染，使用糖皮质激素会抑制免疫功能并可能加重感染。因此，这个选项是错误的，也是本题的正确答案。
- D. 呼吸道管理：对于麻疹患者，需要注意皮肤和眼、鼻、口腔的清洁，这包括呼吸道的管理。所以，选项 D 是正确的。
- E. 躁狂可给与镇静药物：麻疹患者在烦躁时可以适当给予镇静剂。因此，选项 E 也是正确的。

125. 【答案】D

【解析】

- 选项 A：湿肺多见于足月儿或剖宫产儿，因肺内液体吸收及清除延迟所致，为自限性疾病。生后数小时内出现呼吸增快，但一般状态及反应较好。本题中的病例为早产儿，且症状更严重，不符合湿肺的特征。
- 选项 B：新生儿溶血大多数 Rh 溶血病患儿生后 24 小时内出现黄疸并迅速加重，而多数 ABO 溶血病在第 2~3 天出现。本题中的病例并未提到有黄疸的症状，故此选项错误。



选项 C：吸入胎粪性肺炎常见于足月儿或过期产儿，多有宫内窘迫史和（或）出生窒息史。患儿皮肤、脐带和指、趾甲床留有胎粪污染的痕迹；口、鼻腔吸引物中含有胎粪。本题中的病例并未提到有以上相关的症状和历史，故此选项错误。

选项 D：新生儿呼吸窘迫综合征（RDS）是因肺表面活性物质（PS）缺乏所致，以生后不久出现呼吸窘迫并进行性加重为特征的临床综合征。胎龄越小，PS 合成及分泌量也越低，RDS 的发生率越高。本题中的病例为早产儿，孕龄 32 周，且有呼吸困难并进行性加重的症状，符合 RDS 的特征，故此选项正确。

选项 E：产程过长可导致胎儿头部血肿、胎儿死亡、胎儿缺氧、胎儿宫内窘迫、新生儿窒息等疾病。本题中的病例并未提到有产程过长的历史，故此选项错误。

126. 【答案】D

【解析】

- A. HLA-b27：虽然强直性脊柱炎患者中 HLA-B27 阳性率较高，但在亚洲普通人群中，HLA-B27 阳性率仅为 4%-8%，因此不能作为首选检查。
- B. 类风湿因子：类风湿因子主要用于诊断类风湿关节炎，不适用于本题的患者。
- C. 关节液检查：虽然可以帮助诊断一些关节疾病，但对于强直性脊柱炎并无特异性，不作为首选。
- D. 骶髂关节 X 线：对于疑似强直性脊柱炎的患者，骶髂关节 X 线是最有效的检查方式。
- E. 抗环瓜氨酸多肽抗体：主要用于诊断类风湿关节炎，不适用于本题的患者。

127. 【答案】A

【解析】

- A. 肺表面活性物质缺乏：这是早产儿呼吸窘迫综合征的主要发病机制，由于肺表面活性物质合成及分泌量低，导致肺泡表面张力增加，肺泡趋于萎陷，引起呼吸困难。
- B. 肺炎引起：虽然肺炎也可以导致呼吸困难，但在这个案例中，没有出现肺炎的典型临床症状和体征，如高热、咳嗽、咳痰等，因此不太可能是肺炎。
- C. 肺泡液挤出障碍：这通常发生在新生儿期的湿肺病，但在此案例中，孕龄 32 周的早产儿更有可能是由于肺表面活性物质缺乏导致的呼吸窘迫综合征。
- D. 宫内缺氧：宫内缺氧会引发一系列的问题，其中包括呼吸问题，但在此案例中，没有明显的宫内缺氧的证据，因此不太可能。
- E. 宫内窘迫：宫内窘迫通常会引发新生儿的一系列问题，但在此案例中，没有明显的宫内窘迫的证据，因此不太可能。

128. 【答案】C

【解析】

- A. 中毒性脑膜炎：中毒性脑膜炎主要是由于中毒引起的脑膜病变，患者脑脊液检查中，糖、氯化物等指标通常正常，所以这个选项不正确。
- B. 结核性脑膜炎：结核性脑膜炎主要表现为淋巴细胞增多，涂片或培养可发现抗酸杆菌，与本题病例描述不符，

所以这个选项不正确。

C. 化脓性脑膜炎：化脓性脑膜炎主要表现为白细胞升高，以中性粒细胞为主，糖含量明显降低，与本题病例描述相符，所以这个选项是正确的。

D. 病毒性脑炎：病毒性脑炎的脑脊液较清亮，分类以淋巴细胞为主，糖含量正常，与本题病例描述不符，所以这个选项不正确。

E. 热性惊厥：热性惊厥主要是因高热引起的抽搐，脑脊液检查正常，与本题病例描述不符，所以这个选项不正确。

129. 【答案】C

【解析】

A. 物理降温：对于发热的患儿，可以进行物理降温，作为辅助治疗。因此，这个选项是合适的。

B. 静脉注射地西泮：地西泮是一种常用的抗惊厥药物，可以控制惊厥发作。因此，这个选项是合适的。

C. 腰穿放脑脊液：在未有效降低颅内压之前，腰椎穿刺有诱发脑疝的危险。因此，这个选项是不合适的，是本题的正确答案。

D. 甘露醇：甘露醇是一种常用的降颅内压药物，对于颅内压增高的患者是合适的。因此，这个选项是合适的。

E. 呋塞米：呋塞米也是一种常用的降颅内压药物，对于颅内压增高的患者是合适的。因此，这个选项是合适的。

130. 【答案】E

【解析】

A. 猩红热：猩红热的典型症状包括发热、咽部发炎、皮疹、草莓舌、环口苍白圈、帕氏线。但是题干中并未提及环口苍白圈和帕氏线，所以 A 选项不正确。

B. 咽结合膜热：咽结合膜热的症状包括急性起病、高热、咽部充血、疼痛明显、眼睛发红显著，多数仅限于一侧眼睛。题干的病情描述中并未提及这些，所以 B 选项不正确。

C. 传染性单核细胞增多症：传染性单核细胞增多症的典型症状为咽喉痛、发热、扁桃体肿大、乏力、淋巴结肿大和腭部瘀点等。题干中并未提及这些，所以 C 选项不正确。

D. 手足口病：手足口病的特征性症状主要是手足臀部的皮疹以及口痛。题干中并未提及这些，所以 D 选项不正确。

E. 川崎病：题干中提到的症状，如高热、皮肤多形性红斑、手足指端硬性水肿、球结膜水肿、颈部淋巴结肿大、口咽黏膜弥漫性充血、口唇皸裂、舌乳头轮廓突出（草莓舌）等，都符合川崎病的诊断标准，因此 E 选项正确。

131. 【答案】B

【解析】

选项 A：X 线示心脏心影上部扩大。这是一种可能的情况，但不是预后最有价值的检查。川崎病的主要表现为冠状动脉损害，而不仅仅是心脏形状的改变。

选项 B：超声心动图示冠状动脉扩大。这是正确答案。川崎病患者多见冠状动脉损伤，如冠状动脉扩张或冠状动脉瘤形成。超声心动图是本病最重要的辅助检查手段。

选项 C：血沉速度快。虽然川崎病可能会导致血沉速度加快，但这并不是预后最有价值的检查。

选项 D：抗 EBV-IgM 抗体阳性。这可能与其他疾病相关，如传染性单核细胞增多症，但与川崎病无直接关系。



选项 E：抗角蛋白抗体谱。这可能与其它自身免疫性疾病相关，但与川崎病无直接关系。

132. 【答案】D

【解析】

- A. 青霉素：这是一种抗菌药物，但在这个病例中，青霉素治疗无效，因此不适用。
- B. 伐昔洛韦：这是一种抗病毒药物，考虑到川崎病的致病因素尚未明确，不推荐使用抗病毒药物。
- C. 利巴韦林：同样是一种抗病毒药物，对于川崎病的治疗并不适用。
- D. 丙种球蛋白：这是川崎病的主要治疗方法，可以迅速退热，预防冠状动脉病变发生。
- E. 糖皮质激素：虽然可用于川崎病的治疗，但是通常只在 IVIG 输注无效时使用。

133. 【答案】D

【解析】

- A. 生理性贫血通常出现在新生儿后 2~3 个月，不会有肝脾大的表现，因此 A 选项错误。
- B. 营养性巨幼细胞性贫血的患者呈现虚胖或颜面轻度水肿，血涂片中红细胞以大细胞为主，与题干描述不符，因此 B 选项错误。
- C. 地中海贫血症状随年龄增长而日益明显，通常会有轻度黄疸，与题干描述不符，因此 C 选项错误。
- D. 缺铁性贫血是婴儿期常见的一种贫血，特别是在母乳喂养且未添加辅食的婴儿中。题干中的男婴出现面色苍白，肝脾大，实验室检查显示血红蛋白和红细胞计数低，血细胞大小不等，以小细胞为主，中央淡染区扩大，这些都是缺铁性贫血的典型表现，因此 D 选项正确。
- E. 肺含铁血黄素沉着症的典型表现为发热、咳嗽、咯血及贫血，与题干描述不符，因此 E 选项错误。

134. 【答案】A

【解析】

选项 A：铁代谢。对于本题，男婴一直母乳喂养且未添加辅食，铁摄入量可能不足，而且查体表现为面色苍白，肝脾大，血细胞以小细胞为主，中央淡染区扩大，这些都是缺铁性贫血的表现，因此，检查铁代谢对于诊断有很大帮助，所以选项 A 正确。

选项 B：骨髓活检。骨髓活检通常用于诊断再生障碍性贫血和骨髓异常增生症等疾病，而本题中没有提供这方面的线索，所以选项 B 错误。

选项 C：血清维生素 B<sub>12</sub> 和叶酸。这两种物质的测定通常用于诊断营养性巨幼细胞性贫血，但是本题中并没有提供相关线索，所以选项 C 错误。

选项 D：胸部 X 线片。对于贫血的诊断，胸部 X 线片并无直接帮助，所以选项 D 错误。

选项 E：血 Hb。虽然血红蛋白的测定可以反映贫血的程度，但是它不能区分贫血的类型，缺乏特异性，所以选项 E 错误。

135. 【答案】A

【解析】

- A. 口服铁剂和维生素 C：这是正确答案。病例中的男婴长期母乳喂养且未添加辅食，导致铁摄入量不足，出现了缺

铁性贫血的表现。口服铁剂和维生素 C 可以有效治疗缺铁性贫血，因为维生素 C 具有还原性，可以促进铁剂在胃肠道的吸收。

B. 合理营养，及时添加辅食：虽然这是预防缺铁性贫血的有效方法，但在已经出现贫血的情况下，仅仅通过改善营养和添加辅食无法迅速改善贫血的症状。

C. 口服维生素 B<sub>12</sub> 和叶酸：这是治疗大细胞性贫血的方法，而病例中的男婴患的是小细胞性贫血，所以此选项不正确。

D. 口服泼尼松：泼尼松是一种免疫抑制剂，用于治疗自身免疫性疾病，如溶血性贫血，对于缺铁性贫血并无效果。

E. 输血：对于重度贫血或者生命威胁的贫血，可能需要输血。但在这个病例中，男婴的贫血并不严重，应优先考虑口服铁剂和维生素 C。

136. 【答案】A

【解析】

A. 葡萄胎：孕龄期女性，停经 9 周，阴道不规则流血 2 周，子宫如孕 4 月大（子宫大于停经月份），超声提示宫腔内充满光点和小囊状强回声（落雪征）。这些都是葡萄胎的典型表现，因此选项 A 是正确的。

B. 绒癌：绒癌超声肌层内可见高回声团块，边界清但无包膜；也可表现为整个子宫呈弥漫性增高回声，内部伴不规则低回声或无回声。此题中未出现这些特征，所以选项 B 是错误的。

C. 双胞胎妊娠：双胞胎妊娠多见双羊膜囊，也可为单羊膜囊，超声为落雪征。但此题中未明确提到双胞胎的存在，所以选项 C 是错误的。

D. 妊娠合并子宫肌瘤：妊娠合并子宫肌瘤多见肌瘤红色变，患者可有剧烈腹痛伴恶心、呕吐、发热，白细胞计数升高。此题中未出现这些特征，所以选项 D 是错误的。

E. 胎盘早剥：胎盘早剥的声像图显示胎盘与子宫壁之间出现边缘不清楚的液性低回声区即为胎盘后血肿，胎盘异常增厚或胎盘边缘“圆形”裂开。此题中未出现这些特征，所以选项 E 是错误的。

137. 【答案】A

【解析】

A. 清宫术：此为葡萄胎的标准治疗方法，因此此选项正确。

B. 化疗：对于葡萄胎患者，不常规推荐预防性化疗，此选项错误。

C. 放疗：化疗为主、手术和放疗为辅的综合治疗多用于侵蚀性葡萄胎及绒癌，此选项错误。

D. 保胎治疗：葡萄胎诊断一经成立，应及时清宫，此选项错误。

E. 全子宫切除术：全子宫切除术极少应用，除非患者合并其他需要切除子宫的指征，此选项错误。

138. 【答案】B

【解析】

A. 阴道检查：在这种情况下，阴道检查可能会导致更大的出血，因此不是最佳的选择。

B. 产科超声：在孕妇突然出现阴道流血的情况下，产科超声可以清晰地显示子宫壁、胎盘、胎先露部及宫颈的位置，有助于确定前置胎盘类型，是最佳的检查方式。

C. 双合诊：同样，双合诊可能会刺激子宫，引起更大的出血，不适合在这种情况下进行。D. CRP：CRP 是 C 反应蛋白的简称，通常用于检测炎症，与这种情况无关。

E. 查血 hcg：人绒毛膜促性腺激素通常用于早期妊娠测试或检查异位妊娠，对此情况无帮助。

139. 【答案】B

【解析】

A. 检测胎心：这是正确的，因为在孕妇出现阴道流血情况下，需要及时检测胎心以评估胎儿的状况。

B. 急诊剖腹产：这是错误的，因为根据题目描述，患者的一般情况良好，胎心正常，阴道流血量少，无需紧急分娩。应采取期待疗法，观察并处理可能的并发症。

C. 输血：这是正确的，因为孕妇出现阴道流血，可能会导致贫血，需要输血进行治疗。

D. 促胎肺成熟：这是正确的，如果预计可能需要早产，应使用药物促进胎肺成熟，以减少新生儿呼吸窘迫综合症的风险。

E. 预防感染：这是正确的，孕妇出现阴道流血，可能会增加感染的风险，应采取预防措施。

140. 【答案】E

【解析】

A. 妊娠反应出现的时间：妊娠反应出现的时间不准确，且个体差异较大，所以这个选项是错误的。

B. 胎儿身长：胎儿的头臂长在妊娠早期是估计孕周最准确的指标，而不是胎儿全身长，所以这个选项是错误的。

C. 宫底高度：宫底高度只能粗略估计孕周，不如停经时间准确，所以这个选项是错误的。

D. 估计胎儿体重：胎儿体重不能精确判断孕周，所以这个选项是错误的。

E. 停经时间：预产期（EDC）推算方法是按末次月经（LMP）第一日算起，月份减 3 或加 9，日数加 7，故停经时间有助于核对孕周，所以这个选项是正确的。

141. 【答案】C

【解析】

选项 A：口服利尿剂。这个选项是错误的。在妊娠期间，一般不推荐使用利尿剂降压，因为这可能会导致血液浓缩、有效循环血量减少和高凝倾向。

选项 B：静滴硫酸镁。这个选项也是错误的。硫酸镁主要用于防止子痫前期和子痫的发生，但在这个病例中，患者蛋白尿阴性且肾功能正常，不属于子痫前期，并无抽搐，因此不需要使用硫酸镁。

选项 C：口服降压药。这是正确的选项。由于患者血压升高，已超过 150mmHg，所以需要进行降压治疗。

选项 D：口服抗生素。这个选项是错误的。抗生素主要用于处理感染，但在这个病例中，没有提到有感染的情况。

选项 E：静滴白蛋白。这个选项也是错误的。静滴白蛋白通常用于处理肝脏疾病和水肿，但在这个病例中，没有提到有这些情况。

142. 【答案】B

【解析】

选项 A：浆液性癌，这是一种常见的卵巢癌类型，但它对放疗的敏感性并不高，因此这个选项是错误的。

选项 B：无性细胞瘤，这是一种罕见的卵巢肿瘤类型，它对放疗非常敏感，因此这个选项是正确的。

选项 C：胚胎瘤，这是一种由胚胎细胞发展而来的肿瘤，它对放疗的敏感性并不高，因此这个选项是错误的。

选项 D：卵黄囊瘤，这是一种由卵黄囊细胞发展而来的肿瘤，它对放疗的敏感性并不高，因此这个选项是错误的。

选项 E：未成熟畸胎瘤，这是一种由未成熟的畸形胚胎细胞发展而来的肿瘤，它对放疗的敏感性并不高，因此这个选项是错误的。

143. 【答案】D

【解析】

A. 浆液性癌：这是一种常见的卵巢癌类型，但其并不伴随 AFP(甲胎蛋白)升高。此类肿瘤更常见的标志物是 CA125。

B. 无性细胞瘤：这是一种罕见的卵巢肿瘤，通常不伴随 AFP 升高。

C. 胚胎瘤：虽然胚胎瘤可能导致某些肿瘤标志物升高，但 AFP 并不是其主要的标志物。

D. 卵黄囊瘤：这是一种罕见的卵巢肿瘤，常伴随 AFP 升高，因此是正确答案。

E. 未成熟畸胎瘤：这是一种罕见的卵巢肿瘤，通常不伴随 AFP 升高。

144. 【答案】B

【解析】

A. 猩红热：症状包括发热、咽痛、头痛、呕吐、杨梅舌、环口苍白圈、颈部淋巴结肿大等。皮疹特点为全身皮肤弥漫充血，上有密集针尖大小丘疹，疹退后伴脱皮。这与题干中的症状不符。

B. 水痘：水痘的典型临床表现为“四世同堂”，即斑疹、丘疹、疱疹和结痂同时存在，这与题干中的症状完全符合，所以应该选择 B。

C. 小儿急疹：临床表现为一般情况好，高热时可有惊厥，耳后枕部淋巴结可肿，常伴有轻度腹泻。皮疹特点为红色细小密集斑丘疹，头面颈及躯干部多见，四肢较少，一天出齐，次日即开始消退。这与题干中的症状不符。

D. 手足口病：临床表现为急性起病，可发热或不伴发热，多有咳嗽、流涕、食欲缺乏等非特异性症状。皮疹特点为手、足、口、臀等部位可见散发性的皮疹和疱疹，偶见于躯干。口腔内疱疹多位于舌、颊黏膜和硬腭等处，常发生溃疡。皮疹不留瘢痕或色素沉着。无并发症表现。多在 1 周内痊愈，预后良好。这与题干中的症状不符。

E. 麻疹：临床表现为发热、咳嗽、畏光、鼻卡他、结膜炎，Koplik 斑。皮疹特点为红色斑丘疹，自头面部→颈→躯干→四肢，退疹后有色素沉着及细小脱屑。这与题干中的症状不符。

145. 【答案】C

【解析】

A. 猩红热：表现有发热，咽痛，头痛，呕吐、杨梅舌，环口苍白圈，颈部淋巴结肿大等，皮疹全身皮肤均可受累，疹退后伴脱皮。本题中没有提到这些特征，所以 A 选项不正确。

B. 水痘：皮疹特点是胸腹部可见斑疹、丘疹、疱疹和结痂同时存在（“四世同堂”）。本题中并未提到这些特征，所以 B 选项不正确。

C. 小儿急疹：1 岁女童，发热、热退后出现皮疹（热退疹出），查体：颈部、躯干充血性斑丘疹，结膜无充血，最可能的诊断为小儿急疹。因此，C 选项正确。



- D. 手足口病：临床表现为急性起病，可发热或不伴发热，多有咳嗽、流涕、食欲缺乏等非特异性症状。皮疹特点为手、足、口、臀等部位可见散发性的皮疹和疱疹，偶见于躯干。本题中并未提到这些特征，所以 D 选项不正确。
- E. 麻疹：临床表现为发热、咳嗽、畏光、鼻卡他、结膜炎，Koplik 斑。皮疹特点为红色斑丘疹，自头面部→颈→躯干→四肢，退疹后有色素沉着及细小脱屑。本题中没有提到这些特征，所以 E 选项不正确。

146. 【答案】A

【解析】

- A. 猩红热：根据病史和临床表现，这是最可能的诊断。猩红热的特征是发热、咽痛、杨梅舌、鲜红色粟粒疹以及帕氏线的出现。
- B. 水痘：虽然水痘也会有皮疹，但其特点是胸腹部可见斑疹、丘疹、疱疹和结痂同时存在，这与题干描述的情况不符。
- C. 小儿急疹：小儿急疹的皮疹特点为红色细小密集斑丘疹，头面颈及躯干部多见，四肢较少，一天出齐，次日即开始消退，这与题干描述的情况不符。
- D. 手足口病：手足口病的皮疹特点为手、足、口、臀等部位可见散发性的皮疹和疱疹，偶见于躯干，这与题干描述的情况不符。
- E. 麻疹：麻疹的临床表现为发热、咳嗽、畏光、鼻卡他、结膜炎，Koplik 斑。皮疹特点为红色斑丘疹，自头面部→颈→躯干→四肢，退疹后有色素沉着及细小脱屑，这与题干描述的情况不符。

147. 【答案】D

【解析】

- A. 难免流产：此选项错误。难免流产通常在先兆流产基础上发展，表现为阴道流血量增多，阵发性下腹痛加剧，或出现阴道流液（胎膜破裂）。妇科检查宫颈口已扩张，有时可见胚胎组织或羊膜囊堵塞于宫颈口内。
- B. 不全流产：此选项错误。不全流产是指部分妊娠物排出宫腔，还有部分残留。妇科检查见宫颈口已扩张，宫颈口有妊娠物堵塞及持续性血液流出。
- C. 流产合并感染：此选项错误。流产合并感染是指流产过程中，若阴道流血时间长，有组织残留于宫腔内或非法堕胎，可能引起宫腔感染。
- D. 先兆流产：此选项正确。停经 40 天，阴道少量流血，无妊娠物排出，胚胎存活，属于先兆流产。
- E. 稽留流产：此选项错误。稽留流产是指胚胎或胎儿已死亡滞留宫腔内未能及时自然排出。

148. 【答案】E

【解析】

- A. 难免流产：在先兆流产基础上，阴道流血量增多，阵发性下腹痛加剧，或出现阴道流液（胎膜破裂）。妇科检查宫颈口已扩张，有时可见胚胎组织或羊膜囊堵塞于宫颈口内，子宫大小与停经周数基本相符或略小。本题中，子宫小于孕周，故 A 选项错误。
- B. 不全流产：难免流产继续发展，部分妊娠物排出宫腔，还有部分残留于宫腔内或嵌顿于宫颈口处，或胎儿排出后胎盘滞留宫腔或嵌顿于宫颈口，影响子宫收缩，导致出血，甚至发生休克。妇科检查见宫颈口已扩张，宫颈口

有妊娠物堵塞及持续性血液流出，子宫小于停经周数。本题中，没有明显的出血和宫颈口扩张等情况，故 B 选项错误。

C. 流产合并感染：流产过程中，若阴道流血时间长，有组织残留于宫腔内或非法堕胎，有可能引起宫腔感染，常为厌氧菌及需氧菌混合感染，严重感染可扩展至盆腔、腹腔甚至全身，并发盆腔炎、腹膜炎、败血症及感染性休克。本题中，没有明显的感染症状，故 C 选项错误。

D. 先兆流产：妊娠 28 周前先出现少量阴道流血，常为暗红色或血性白带，无妊娠物排出，随后出现阵发性下腹痛或腰背痛。妇科检查宫颈口未开，胎膜未破，子宫大小与停经周数相符。经休息及治疗后症状消失，可继续妊娠；若阴道流血量增多或下腹痛加剧，可发展为难免流产。本题中，没有明显的阴道流血和下腹痛等情况，故 D 选项错误。

E. 稽留流产：妊娠 13 周，耻骨联合上未扪及子宫，正常妊娠 13 周，宫底应达到耻骨联合上 2~3 横指以上，本题中提示子宫小于孕周，胎心未闻及，B 超提示胚胎停止发育，如 8 周大小，最可能的诊断为稽留流产。所以 E 选项正确。

149. 【答案】A

【解析】

选项 A：单纯疱疹病毒。这是正确答案。根据题干描述的临床表现，患者最可能的诊断为生殖器疱疹，其致病原为单纯疱疹病毒。

选项 B：人乳头状瘤病毒。这是尖锐湿疣的常见致病原，但尖锐湿疣的临床表现与题干描述不符，所以这个选项是错误的。

选项 C：麻疹病毒。麻疹病毒主要引起全身性的疾病，表现为全身性皮疹，与题干描述不相符，所以这个选项是错误的。

选项 D：巨细胞病毒。巨细胞病毒感染后，多数患者无症状或表现为与其他病毒感染类似的临床症状，而不是题干描述的生殖器区域的水疱，所以这个选项是错误的。

选项 E：HIV。HIV 主要引起全身性的病变，包括发热、腹泻、体重下降等，而不是题干描述的生殖器区域的水疱，所以这个选项是错误的。

150. 【答案】B

【解析】

选项 A：单纯疱疹病毒，主要导致生殖器疱疹，皮损为簇集或散在的小水疱，不符合题干描述，所以 A 错误。

选项 B：人乳头状瘤病毒，可以引起外阴鸡冠状赘生物，醋酸白试验阳性，符合题干描述，所以 B 正确。

选项 C：麻疹病毒，主要表现为发热、咳嗽等全身症状和特有的红色斑丘疹，与题干描述不符，所以 C 错误。

选项 D：巨细胞病毒，感染后多数患者无症状或表现类似其他病毒感染症状，与题干描述不符，所以 D 错误。

选项 E：HIV，主要导致艾滋病，患者有发热、腹泻等全身症状，与题干描述不符，所以 E 错误。